



*Koch. Botae. Denesii.*

BCU - Lausanne



1094800051

Digitized by Google



Virtus sibi semper similis

Koch. 1758.



CAROLI LINNÆI

S. R. REGIÆ M. TIS SVETICÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

**SPECIES  
PLANTARUM,**

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

*GENERA RELATAS,*

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

*SYSTEMA SEXUALE*

DIGESTAS.

TOMUS II.



---

*Cum Privilegio S. R. M. tis Suecicæ & S. R. M. tis Poloniæ ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,  
IMPENSIS LAURENTII SALVII.  
1753.



## Classis XIV.

DIDYNAMIA,  
GYMNOSPERMIA.

## AJUGA.

1. AJUGA floribus resupinatis. *orientalis.*  
*Teucrium* staminibus tubo corollæ brevioribus. *Roy. lugdb.* 306.  
*Bugula orientalis* villosa, flore inverso candido cum oris purpureis. *Tournef. cor.* 14.
2. *Bugula orientalis* villosa, flore inverso cæruleo; alba macula notato. *Tournef. cor.* 14. *Dill. elth.* 60. t. 43. f. 61.  
*Habitat in Oriente.*
3. AJUGA tetragono-pyramidalis. *Fl. suec.* 475. *Mat. pyramidalis, med.* 306. *Dalib. parif.* 169.  
*Consolida media pratensis* cærulea. *Bauh. pin.* 260. *non synon.*  
*Consolida media geneventis.* *Bauh. hist.* 3. p. 432.  
*Bugula* foliis angulose dentatis, caule simplici. *Hall. herb.* 635.  
*Phyllochois.* *Reneal. spec.* 125. \*  
*Habitat in Suecia, Helvetia, Germania.*
4. AJUGA foliis tomentosis, calycibus hirsutis *genevensis.*  
*Bugula* carneo flore. *Clas. hist.* 2. p. 43.  
*Habitat in Europa australiori.*
5. AJUGA stolonibus reptatricibus. *reptans.*  
*Ajuga* foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Gort. gelr.* 330.  
*Teucrium* foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Hort. cliff.* 301.  
*Roy. lugdb.* 306. *Dalib. parif.* 170.  
*Consolida media pratensis* cærulea. *Bauh. pin.* 260.  
*Bugula.* *Dod. pempt.* 135.  
*Habitat in Europa australiori.*

## TEUCRIUM.

- campanula-*  
*tum.* 1. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus solitariis.  
Teucrium foliis cuneiformibus trifidis: laciniis divisis, floribus solitariis. *Roy. lugdb.* 306.  
Teucrium, calyce campanulato, laciniatum, flore magno & parvo subcæruleo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 131.  
*Habitat in Oriente.*
- orientale.* 2. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus racemosis.  
Teucrium foliis pinnatifidis, laciniis linearibus, infimis divisis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 307.  
Teucrium orientale angustifolium laciniatum, flore magno suaverubente. *Tournef. cor.* 14.  
*Habitat in Oriente.*
- Botrys.* 3. TEUCRIUM foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis.  
Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. paris.* 171. *Sauv. monsp.* 248.  
*Botrys chamædryoides.* *Baub. pin.* 138.  
*Chamæpitys altera.* *Dod. pempt.* 46.  
*Habitat in Germaniæ, Galliæ, Helvetiæ, Italiæ apricis cultis.* ☉
- Pseudochamæpitys.* 4. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis subracemosis, caule erecto.  
*Chamæpitys spuria*, multifido folio, lamii flore. *Baub. pin.* 250.  
*Pseudochamæpitys.* *Clus. hist.* 2. p. 185.  
*Chamæpitys alia.* *Cam. epit.* 680.  
*Habitat in Hispania.*
- Chamæpitys.* 5. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Hort. nps.* 160. *Mat. med.* 287.  
Teucrium foliis simpliciter trifidis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Guett. stamp.* 2. p. 248. *Gron. virg.* 64. *Dalib. paris.* 173. *Sauv. monsp.* 175.  
*Chamæpitys lutea vulgaris* f. folio trifido. *Baub. pin.* 249.  
*Chamæpitys prima.* *Dod. pempt.* 46.  
*Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Hungariæ, Helvetiæ arvis.* ☉

6. TEU.

6. TEUCRIUM foliis tripartitis linearibus, racemo terminali, caule repente.

*Teucrium repens*, folio trifido: *Nissol.*

*Habitat* - - -

Folia tripartita, linearia, glabra. Flores in racemo terminali, oppositi, pedunculati.

7. TEUCRIUM foliis subtridentatis linearibus, floribus solitariis sessilibus.

*Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis sessilibus.* *Roy. lugdb.* 306. *Sauv. monsp.* 141.

*Chamæpitys moschata*, foliis serratis. *Bauh. pin.* 249.

*Chamæpitys spuria* prior. *Dod. perist.* 47.

*Anthyllis altera.* *Clus. hist.* 2. p. 186.

*Habitat* in Lusitania, G. Narbonensi, Monspelii.

8. TEUCRIUM foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis.

*Teucrium, delphinii folio*, non ramosum: *Shaw. afric.*

575. t. 575.

*Habitat* in Mauritania.

9. TEUCRIUM foliis integerrimis oblongo-ovatis petiolatis: supra glabris subtus tomentosis.

*Teucrium foliis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis.* *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305.

*Teucrium peregrinum*, folio sinuoso: *Bauh. pin.* 247.

*Teucrium fruticans baticum.* *Clus. hist.* 1. p. 348.

*Habitat* in Baticæ, Siciliæ maritimis. h

10. TEUCRIUM foliis integerrimis rhombeis acutis: subtus tomentosis.

*Teucrium fruticans baticum*, ampliore folio. *Dill. elth.* 397. t. 284. f. 367.

*Teucrium baticum humilius & ramosius*, folio subrotundo. *Hort. angl.* t. 3.

*Habitat* in regione Batica. h

11. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subspicato.

*Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis.* *Hort. cliff.* 303. *Hort. ups.* 159. *Mat. med.* 286. *Roy. lugdb.* 307.

*Polium angustifolium creticum.* *Bauh. pin.* 221.

*Rosmarinum stœchados facie.* *Alp. exot.* 103. t. 102.

*Habitat* in Creta. h

- Marum.* 12. TEUCRIUM foliis integerrimis ovatis utrinque acutis, racemis secundis villosis.  
 Teucrium foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis utrinque digestis. *Hort. cliff.* 303. *Hort. ups.* 159. *Mat. med.* 285. *Roy. lugdb.* 305.  
 Marum cortusi. *Bauh. hist.* 3. p. 242.  
*Habitat in regno Valentino.* §
- multiflorum* 13. TEUCRIUM foliis ovatis utrinque acutis: superne ferrato-dentatis, floribus racemosis. *Roy. lugdb.* 307.  
 Teucrium foliis ovatis utrinque acutis utrinque bidentatis, verticillis laxis. *Hort. cliff.* 303.  
 Chamædrys multiflora tenuifolia Hispanica. *Tournef. inst.* 205. *Berh. lugdb.* 1. p. 182.  
*Habitat in Hispania.*
- sibiricum.* 14. TEUCRIUM foliis ferratis ovatis, pedunculis trifloris, bracteis lineari-lanceolatis.  
 Teucrium chamædryos folio, flore parvo purpureo. *Gmel. mss.*  
*Habitat in Sibiria.* 2
- canadense.* 15. TEUCRIUM foliis ovato-lanceolatis ferratis, caule erecto, racemo terminali, verticillis hexaphyllis.  
 Teucrium foliis lanceolatis ferratis petiolatis, floribus solitariis. *Gron. virg.* 64.?  
 Chamædrys canadensis, urticæ folio subtus incano. *Tournef. inst.* 205.  
*Habitat in Canada.* 2  
 Planta e Canada Foliis gaudet angustioribus, equaliter ferratis, subtus tomentosis, planis; Spica ex verticillis aut sparsis floribus bractea minima singulis subjecta; at Hortensis Foliis majoribus rugosis, inæqualiter ferratis, vix subtus pubescentibus & Floribus in Racemum subspicatum ex verticillis sexfloris, hexaphyllis: bracteis ferratis.
- virginicum.* 16. TEUCRIUM foliis ovatis inæqualiter ferratis, racemis terminalibus. *Gron. virg.* 64.  
*Habitat in Virginia.*
- Scorodonia.* 17. TEUCRIUM foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto.  
 Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis. *Hort. cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. paris.* 171. *Gort. gelr.* 331.  
 Scorodonia. *Riv. mon. t.* 12.

Scor-



*Scordium alterum* f. *Salvia sylvestris*. *Baub. pin.* 247.  
*Habitat in arenosis editis* Germaniæ, Helvetiæ, Gal-  
 liæ, Angliæ, Belgii: *in dunis prædii Hartecampi, be-*  
*ati quondam mihi Paradisi.* 2

18. **TEUCRIUM** foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus, caule diffusis. *Scordium.*

*Teucrium* foliis ovato-lanceolatis serratis sessilibus,  
 floribus sæpius binatis. *Hort. cliff.* 302. *Fl. suec.* 476.  
*Mat. med.* 289. *Roy. lugdb.* 306. *Dalib. paris.* 171.  
*Scordium. Baub. pin.* 247. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.*  
 126.

*Habitat in Europæ paludosis.* 2

19 **TEUCRIUM** foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis, floribus subverticillatis. *Chamædrys.*  
*Hort. cliff.* 302. *Mat. med.*  
 288. *Roy. lugdb.* 307. *Dalib. paris.* 170. *Sauv. monsp.*  
 145.

*Chamædrys* major repens. *Baub. pin.* 248.

*Chamædrys. Riv. mon.* 10.

β. *Chamædrys* minor repens. *Baub. pin.* 248.

*Habitat in* Germania, Helvetia, Gallia. 2

20. **TEUCRIUM** foliis cordatis undulatis obtuse serratis: floralibus integerrimis concavis, caule fruticoso.

*Teucrium* foliis subovatis crenatis, floribus laxè spicatis  
 pedunculatis, caule frutescente. *Hort. cliff.* 302. *Hort.*  
*upf.* 160. *Roy. lugdb.* 307. *Sauv. monsp.* 145.

*Teucrium. Baub. pin.* 247.

*Chamædrys* fruticosior, flore ochroleuco. *Morif. hist.* 3.  
 p. 421. f. 11. t. 22. f. 1.

*Teucrium* vulgare fruticans 1. *Clus. hist.* 1. p. 348.

β. *Teucrium* lucidum, parvo folio, flore venuste purpu-  
 reo. *Pluk. alm.* 367. t. 65. f. 2.

*Habitat in* Italia, Sicilia, Maltha, Hispania, Monspel-  
 lii. 5

21. **TEUCRIUM** corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis. *montanum.*

*Teucrium* foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, spicis  
 laxis subrotundis. *Hort. cliff.* 302. *Roy. lugdb.* 305.  
*Dalib. paris.* 172. *Sauv. monsp.* 141.

*Polium*, lavendulæ folio. *Baub. pin.* 220.

*Polium* majus. *Cord. hist.* 124. b.

*Ajuga* folio integro. *Riv. mon.* 15

*Habitat in* siccis Germaniæ, Monspellii, Genevæ, Hel-  
 vetiæ, Parisiis. 2

- supinum.* 22. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis linearibus.  
 Polium montanum repens. *Bauh. pin.* 220.  
 Polium montanum supinum minimum. *Lob. ic.* 488.  
*Habitat in agro Viennensi.*  
*Præcedenti maxime affinis est.*
- pyrenaicum.* 23. TEUCRIUM corymbo terminali, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis.  
 Teucrium foliis cuneiformibus crenatis, corymbo terminali, foliolis floralibus linearibus. *Vir. cliff.* 55.  
*Roy. lugdb.* 305.  
 Teucrium foliis suborbiculatis crenatis, spica laxa orbiculata depressa. *Hort. cliff.* 301.  
 Polium pyrenaicum supinum, hederæ terrestris folio.  
*Tournef. inst.* 206.  
 Polium laxatile purpureum chamædryoides, ampla coma.  
*Bocc. mus.* 2. t. 61. *Barr. rar.* 315. t. 1086. *folia male.*  
*Habitat in Pyrenæis.* 2
- Polium.* 24. TEUCRIUM spicis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus. *Hort. cliff.* 302.  
*Roy. lugdb.* 305. *Sauv. monsp.* 141.  
 Polium montanum luteum. *Bauh. pin.* 220.  
 β. Polium montanum album. *Bauh. pin.* 221.  
 γ. Polium montanum supinum alterum. *Bauh. pin.* 221.  
 δ. Polium maritimum supinum venetum. *Bauh. pin.* 221.  
 Polium montanum γ. *Clus. hist.* 1. p. 362.  
*Habitat in Italia, Hispania, Lusitania, Narbona.* 2  
*Species Polii, a varietatibus distinctas, hodie confusas,*  
*inquirant solidi Botanici, in solo natali.*
- capitatum.* 25. TEUCRIUM capitulis pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosis, caule erecto.  
 Polium montanum album serratum latifolium. *Barr. rar.* 325. t. 1079. 1078.  
*Habitat in Hispania.*  
*Habitus Organi majoranæ, sed tomentosum & angustifolium.*
- spinosum.* 26. TEUCRIUM spinosum, calycibus labio superiore ovatis, corollis resupinatis. *Lafl. descr.* VII. 38.  
 Chamædrys multifida spinosa odorata. *Griff. lussit.*  
 Chamædrys spinosa. *Bauh. pin.* 248. *prodr.* 117. f. 117.  
*Morif. hist.* 3. p. 423. f. 11. t. 22. f. 17.  
*Habitat in Lusitania.* ☉
- minoromentali* 27. TEUCRIUM foliis ferratis, spinis terminalibus, corollis rectis.  
 Scor.

*Scordium spinosum odoratum. Corn. can. 123. Barr. rar. 319. t. 202.*  
*Habitat - - - - - †*

# SATUREJA.

1. SATUREJA capitulis terminalibus, foliis lanceolatis. *virginiana.*  
*Satureja virginiana. Herm. par. 218. t. 218.*  
*Pulegium erectum virginianum angustifolium, floribus in cymis dispositis. Moris. hist. 3. p. 371. f. 11. t. 7. f. 8.*  
*Clinopodium foliis lanceolatis acuminatis, capitulis terminalibus. Hort. cliff. 304. Gron. virg. 65. Roy. lugdb. 314.*  
*Clinopodium, pulegii angusto rigidoque folio, virginianum, flosculis in cymis dispositis. Pluk. alm. 110. t. 54. f. 2.*  
*Serpentaria virginiana. Bocc. mus. 2. p. 161. t. 115.*  
*Habitat in Virginia. 2*  
*Stamina in fundo corollae latent Anthoris minimis effectis, ut fere posset genere proprio tradi.*
2. SATUREJA verticillis fastigiatis concatenatis, foliis *juliana*, linear-lanceolatis.  
*Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis glabris. Roy. lugdb. 324.*  
*Satureja spicata. Baub. pin. 218.*  
*Satureja perennis, verticillis spicatis & densius dispositis. Moris. hist. 3. p. 412. f. 11. t. 17. f. 4.*  
*Habitat in Hetruria, in Tyrrheni maris asperis, Florentiae. 2*
3. SATUREJA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis. *Thymbra.*  
*Roy. lugdb. 324.*  
*Thymus frutescens, verticillis fere nudis globosis, foliis ovato-lanceolatis Hort. cliff. 306.*  
*Thymbra legitima. Clus. hist. 1. p. 358.*  
*Thymum creticum pone verticillatum. Barr. rar. 279. t. 893.*  
*Habitat in Creta.*
4. SATUREJA verticillis lanuginosis, dentibus calycinis setaceis pilosis. *massichina.*  
*Hort. cliff. 306. Hort. ups. 160.*  
*sub Thymo.*  
*Samplicus s. Marum massichen redolens. Baub. pin. 224.*  
*Marum vulgare s. Clinopodium. Dod. pempt. 271.*  
*Habitat in Hispaniae petrosis. 2*

5. SA-

*graca.*

5. SATUREJA pedunculis corymbosis lateralibus geminis, bracteis calyce brevioribus.

Satureja annua orientalis tenuior, ad singulos nodos florifera. *Morif. hist.* 3. p. 411. f. 11. t. 17. f. 2.

Clinopodium creticum. *Alp. exot.* 265. t. 264.

*Habitat ad Archipelagum.* ☉

*Facie convenit cum S. montana, a qua differt foliis minus mucronatis; sed precipue corymbis florum, qui utrinque non soli sed bini; accedit quod bractee s. involucrum in hac minimum est; in montana vero longitudine corymbi.*

*montana,*

6. SATUREJA pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, foliis mucronatis.

Satureja pedunculis dichotomis, verticillis concatenatis.

*Vir. cliff.* 57. *Hort. ups.* 161. *Roy. lugdb.* 324. *Sauv. monsp.* 142.

- .. Satureja montana. *Bauh. pin.* 218.

Satureja perennis. *Riv. mon.* 41.

Melissa foliis linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 308.

*Habitat in Hetruria, Narbona.* 2

*hortensis,*

7. SATUREJA pedunculis bifloris. *Vir. cliff.* 87. *Hort.*

*ups.* 161. *Mat. med.* 284. *Roy. lugdb.* 324. *Sauv.*

*monsp.* 142.

Satureja hortensis. *Bauh. pin.* 218.

Satureja altera. *Cam. epit.* 487.

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus.

*Hort. cliff.* 306.

*Habitat in G. Narbonensi & Italia.* ☉

*capitata,*

8. SATUREJA floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Mat. med.* 283.

Thymus capitatus qui dioscoridis. *Bauh. pin.* 219.

Thymum legitimum. *Clus. hist.* 1. p. 357.

*Habitat in Creta, Bætica, Hispali, Græcia.* 2

*origanoides,*

9. SATUREJA foliis ovatis ferratis, corymbis terminalibus dichotomis.

Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, corymbis lateralibus terminalibus pedunculatis. *Gron. virg.* 64.

Calamintha mariana, mucronatis rigidioribus & crenatis foliis, hosculeorum calyculis villis argenteis summo margine fimbriatis. *Pluk. mant.* 35. t. 344. f. 2.

Calamintha erecta virginiana, mucronato folio glabro.

*Morif. hist.* 3. p. 413. f. 11. t. 19. f. 7.

*Habitat in Virginia.*

THYM-

THYMBRA.

1. THYMBRA floribus spicatis. *spicata.*  
*Thymbra spicata* verior *hispanica*. *Barr. rar.* 281. t. 1230.  
*Thymum majus longifolium*, *stoechadis* foliaceo capite purpurascens, pilosum. *Pluk. alm.* 368. t. 116. f. 5.  
*Hyssopus montanum macedonicum* valerandi dourez.  
*Baub. hist.* 3. p. 276.  
*Hyssopus capitata africana*, saturejæ rigido hirsuto folio.  
*Morif. hist.* 3. p. 361.  
*Satureja hirsuta purpurea olibani*. *Dodart. mem.*  
*Habitat in Macedonia: Libano.*
2. THYMBRA floribus verticillatis. *verticillata.*  
*Hyssopus angustifolia montana aspera*. *Baub. pin.* 218.  
*Hyssopus montana*. *Dalech. hist.* 934.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Planta* 1. 2. *similis* Caules vix pedales. Folia opposita, lineari-lanceolata, integra, punctata: Floralia paulo latiora, acutiora, sed ciliata. Hæc omnino verticillata, floribus sessilibus; Præcedens obsolete spicata, spica oblonga bracteis s. foliis ciliatis imbricata. Calyx monophyllus, durus, utrinque latere linea hirsuta exaratus, bilabiatus: labio superiore latiore, semitrisido, æquali; L. inferiore angustiore, bipartito. Corolla ringens: labio superiore concavo, semibifido, obtuso; l. inferiore trisido, subæquali; Stamina didynama sub labio superiore. Antheræ didymæ. Stylus semibifidus, filiformis. Semina 4

HYSSOPUS.

1. HYSSOPUS spicis secundis. *Hort. cliff.* 304. *Hort. officinalis.* n<sup>o</sup> 152. *Mat. med.* 290. *Roy. lugdb.* 323. *Gort. gelr.* 336.  
*Hyssopus officinarum cærulea* s. *spicata*. *Baub. pin.* 217.  
*Hyssopus vulgaris*. *Dod. pempt.* 287.  
*Hyssopus rubro flore*. *Baub. pin.* 217.  
*Habitat in* - - - 4
2. HYSSOPUS corollis transversalibus, staminibus inferioribus corolla brevioribus. *Hort. n<sup>o</sup> 162. \**  
*Habitat in Sibiria.* 2
3. HYSSOPUS caule acuto quadrangulo. *Hort. n<sup>o</sup> 3. \* nepetoides.*  
*Nepeta caule acute quadrangulo glabro*. *Vir. cliff.* 58.  
*Roy. lugdb.* 316. *Græn. virg.* 66  
N n 5 Bru-

*Brunella bracteis lanceolatis Hort. cliff. 316.*  
*Betonica virginiana elatior, foliis scrophulariæ glabris,*  
*flore ochroleuco. Pluk. alm. 67. t. 150. f. 3. Moris.*  
*hist. 3. p. 365. f. 11. t. 4. f. 11.*  
*Habitat in Virginia, Canada. &*

# NEPETA.

- Cataria.* 1. *NEPETA* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis,  
foliis petiolatis cordatis dentato-serratis.  
*Nepeta floribus interrupte spicatis pedunculatis. Hort.*  
*cliff. 310. Hort. ups. 163. Fl. succ. 486. Roy. lugdb.*  
*316. Gron. virg. 65. Mat. med. 291. Dalib. parif.*  
*116.*  
*Mentha cataria vulgaris & major. Baub. pin. 228.*  
*Cataria herba. Dod. pempt. 99.*  
*Habitat in Europa. &*
- Pannonica.* 2. *NEPETA* floribus paniculatis, foliis cordatis petio-  
latis obsolete crenatis.  
*Nepeta caule paniculato, pedunculis partialibus ramosis*  
*multifloris. Roy. lugdb. 316.*  
*Nepeta pannonica major & elatior. Moris. hist. 3. p. 415.*  
*f. 11. t. 6. f. 6.*  
*Mentha montana verticillata. Baub. pin. 227.*  
*Habitat in Pannonia. &*
- Dialacca* 3. *NEPETA* verticillis pedunculatis corymbosis, foliis  
petiolatis cordato-oblongis dentatis.  
*Nepeta foliis ovatis petiolatis glabris, verticillis diffuse*  
*spicatis glabris. Sauv. monsp. 151.*  
*Nepeta montana purpurea major, sparsa spica. Barr.*  
*ic. 601. Bocc. mus. 2. p. 46. t. 36.*  
*Cataria hispanica, betonicæ folio angustiore, flore cæ-*  
*ruleo. Tournef. inst. 202.*  
*Habitat in Hispania. &*
- Ucranica.* 4. *NEPETA* floribus paniculatis, foliis lanceolatis serra-  
tis sessilibus.  
*Cataria betonicæ folio angustiore, flore cærulescente.*  
*Gerb. tan. 87.*  
*Habitat in Ucraina.*
- India.* 5. *NEPETA* foliis cordato-oblongis subsessilibus serra-  
tis, racemis verticillatis nudis.  
*Nepeta foliis sessilibus verticillatis nudis.*  
*Nepeta foliis sessilibus nudis, calycibus fructus ovatis*  
*æqualibus. Hort. ups. 164. \* Men-*

*Mentha cataria hispanica*, olim *Sideritis altissima*, flore albo. *Bauh. hist.* 3. p. 226.

*Habitat in Hispania.* 2

6. NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, verticillis tomento obvolutis. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 316.

*Horminum spicatum*, lavendulæ flore & odore. *Bocc. sic.* 48. t. 25. f. 2.

*Habitat in Sicilia.*

7. NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis.

*Mentha Cataria minor alpina.* *Bauh. pin.* 228. *prodr.* 110.

*Habitat in Italia.* *D. Ratgeb.* 2

*Radix perennis.* Caulis pedalis. Folia cordata, obtusa, crenata, petiolata. Spicæ terminales, verticillatæ: verticilli remoti, sessiles, obvallati bracteis lanceolatis, viridibus, lateribus albidioribus, longitudine calycum, acuminatis. Calyces erecti, æquales. Corollæ albæ.

8. NEPETA floribus spicatis sessilibus, bracteis ovatis tuberosa, coloratis verticilla excipientibus, foliis sessilibus. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 316.

*Nepeta tuberosa spicata hispanica.* *Bocc. mus.* 2. p. 44. t. 36. *Barr. ic.* 1131.

*Habitat in Hispania, Lusitania.* 2

9. NEPETA foliis lanceolatis, capitulis terminalibus, flaminibus flore longioribus.

*Clinopodium foliis lanceolatis, capitulis terminalibus.* *Hort. cliff.* 305. *Gron. virg.* 65.

*Clinopodium amaraci folio, floribus albis.* *Pluk. alm.* 110. t. 85. f. 2.

*Clinopodium*, flore albo, ramosius, angustioribus foliis glabris, virginianum. *Morif. hist.* 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. ult.

*Habitat in Virginia.* 2

*Labium inferius corollæ serratum, at non concavum.*

10. NEPETA corollarum labio superiore integerrimo indicæ brevissimo.

*Leucas foliis subrotundis serratis, flore albo.* *Burm. zeyl.* 140. t. 63. an?

*Nepeta indica*, rotundiore folio. *Morif. hist.* 3. p. 415. f. 11. t. 6. f. 7.

Ka-

Katu-kurka. *Rheed. mal.* 10. p. t. 90.

*Habitat in India.*

*Labium corollæ superius brevissimum omnium, integrum; flamina autem, longitudine labii inferioris. Flores verticillati.*

- sibirica.* 11. NEPETA corymbis geminis pedunculatis axillaribus, foliis cordato oblongis acuminatis serratis. *Hort. upf.* 164. \*

*Cataria montana, foliis veronicæ pratensis. Buxb. cent.* 3. p. 27. t. 50. f. 1.

*Habitat in Sibiria. 2*

- multifida.* 12. NEPETA floribus spicatis, foliis pinnatifidis integerimis.

*Lavandula montana, folio valerianellæ varie secto, cærulea. Amm. ruth.* 69.

*Betonica sibirientis. Walth. hort.* 122. t. 20.

*Habitat in Dauria.*

*Caulis erectus absque ramis; Folia inferiora petiolata; superiora sessilia, non crenata, oblonga, triloba, quadriloba, quinqueloba: lobis alternis, oblongis. Flores valde parvi; Antheræ bipartitæ.*

### LAVANDULA.

- Spica.* 1. LAVANDULA foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *Hort. upf.* 162. *Mat. med.* 296. *Roy. lugdb.* 322. *Sauv. monsp.* 143.

*Lavandula angustifolia. Bauh. pin.* 216.

*Lavandula altera. Dod. pempt.* 273.

- β. *Lavandula latifolia. Bauh. pin.* 216.

*Habitat in Europa australi. b*

- multifida.* 2. LAVANDULA foliis duplicato-pinnatifidis. *Vir. cliff.* 50. *Hort. cliff.* 303. *Roy. lugdb.* 322. *Hort. upf.* 162.

*Lavandula folio dissecto. Bauh. pin.* 216.

*Lavandula multifido folio. Clus. hist.* 1. p. 345.

*Habitat in regione Bætica. δ*

- dentata.* 3. LAVANDULA foliis pinnato-dentatis. *Hort. cliff.* 303. *Roy. lugdb.* 323.

*Stæchas folio serrato. Bauh. pin.* 216.

*Stæchas crispo folio. Clus. hist.* 1. p. 346.

*Habitat in Hispaniæ Calape. h*



4. LAV ANDULA foliis lanceolato-linearibus, spica co-*Stachas*.  
mosa. *Hort. cliff.* 303. *Hort. nps.* 162. *Mat. med.*  
297. *Roy. lugdb.* 323. *Sauv. monsp.* 143.  
*Stachas purpurea.* *Bauh. pin.* 216.  
*Stachas brevioribus ligulis.* *Clus. hist.* 1. p. 344.  
β. *Stachas cauliculis non foliatis.* *Bauh. pin.* 216.  
*Stachas longioribus ligulis.* *Clus. hist.* 1. p. 344.  
*Habitat in Europa australi.* 5

### BETONICA.

1. BETONICA spica interrupta, corollarum lacinia la-*officinalis.*  
bii intermedia emarginata. *Roy. lugdb.* 316. *Fl. suec.*  
487. *Hort. nps.* 164.  
*Betonica.* *Dod. pempt.* 40. *Hort. cliff.* 310.  
*Betonica purpurea.* *Bauh. pin.* 235.  
β. *Betonica alba.* *Bauh. pin.* 235.  
*Habitat in Europa.* 2
2. BETONICA spica integra, corollarum lacinia labii *orientalis.*  
intermedia integerrima. *Roy. lugdb.* 316.  
*Betonica orientalis,* angustissimo & longissimo folio,  
spica florum crassiori. *Tournef. cor.* 13.  
*Habitat in Oriente.* 2
3. BETONICA spica basi foliosa.  
*Horminum minus album,* *betonicæ facie.* *Bauh. pin.* *alopecuros.*  
239. *prodr.* 114. *Burf. XIII:* 119.  
*Betonica montana lutea.* *Barr. icon.* 339? *Bocc. mus.*  
2. p. 82. t. 7.?  
*Betonicæ folio,* capitulo *alopecuri.* *Bauh. pin.* 235.  
*Betonicæ folio Alopecuros quorundam.* *Bauh. hist.* 3.  
p. 303.  
*Alopecuros alpina,* *betonicæ folio,* capitulo *alopecuri.*  
*Pont. anth.* 253. *Segu. ver.* 318.  
*Horminum alpinum luteum,* *betonicæ spica.* *Raj. hist.*  
547.  
*Habitat in montibus Sabaudicis, Austriæ superioris,*  
*Lessanenſibus, Italicis, Galloprovinciæ.* 2
4. BETONICA verticillata, calycibus spinosis. *Hort. nps.* *annua.*  
165.  
*Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis.* *Hort.*  
*cliff.* 310. *Gron. virg.* 66. β. *Dalib. parif.* 180.  
*Betonica arvensis annua,* flore ex albo flavescente. *glabra.*  
*Tournef. inst.* 203.

Be-

Betonica foliis inter dissitos verticillos longioribus ellipticis serratis. *Hall. helv.* 645.

Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bauh. pin.* 233.

Alyssum majus. *Tabern. hist.* 929.

*influta.*

β. Sideritis vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. pin.* 233.

Sideritis vulgaris 1. *Clus. hist.* 2. p. 39.

Betonica foliis inter verticillos dissitos brevibus in aristam terminatis integris. *Hall. helv.* 646.

*Habitat ad agrorum margines* Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ. ☉

De Genere dubium, utrum ad Betonicas vel Stachydes pertineat; prius statuit *Tournefort*, posterius *Spina* calycis præsent.

### SIDERITIS.

*canariensis.*

1. SIDERITIS fruticosa tomentosa, foliis cordatis, pedunculis ante florescentiam nutantibus.

Stachys fruticosa, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Hort. cliff.* 310.

Stachys canariensis frutescens, verbasci folio. *Comm. hort.* 2. p. 197. t. 99.

Stachys amplifolia verbasci foliis, floribus albis parvis non galeatis, spica betonicæ. *Pluk. alm.* 356. t. 322.

*Habitat in* Canariis. ♀

*cretica.*

2. SIDERITIS fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis petiolatis, ramis divaricatis

Stachys cretica latifolia. *Tournef. inst.* 186.?

*Habitat in* Creta. ♀

*syriaca.*

3. SIDERITIS fruticosa tomentoso-lanata, foliis linearilanceolatis.

Cunila calycibus inermibus lanigeris. *Hort. cliff.* 313.

Sideritis cretica tomentosa candidissima, flore luteo.

*Tournef. cor.* 12.

β. Stachys fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus. *Hort. cliff.* 310.

Stachys minor italica. *Bauh. pin.* 236.

Stachys lychnoides incana angustifolia, flore aureo. *Barr. ic.* 1187.

Pilosella syriaca. *Bauh. pin.* 262.

*Habitat in* Creta. ♀

Fruticulus facie *Salvia*, sed longior. Folia *salvia*, tomentosa, lanata, alba: inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores ex albo flavescentes.

4. SI-

4. **SIDERITIS** herbacea hispido-pilosa, foliis superiori-*perfoliata*-  
bus amplexicaulibus.  
Sideritis orientalis, phlomidis folio. *Tournef. cor.* 12.?  
Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus ferratis:  
floralibus cordatis acutis integerrimis. *Roy. lugdb.* 318.  
*Habitat in Oriente?*  
Caulis erectus, herbaceus. Folia inferiora caulis peti-  
olata; superiora sessilia, opposita, amplexicaulia, hinc  
singularia. Corollæ albæ venis aliquot rufis.
5. **SIDERITIS** herbacea decumbens, calycibus spinosis, *montana*  
labio superiore trifido.  
Cunila calycum labio spinoso: superiore trifido, inferi-  
ore bipartito. *Hort. cliff.* 313. *Hort. nps.* 169. *Roy.*  
*lugdb.* 329.  
Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin.* 233.  
Sideritis montana, parvo flore nigro-purpureo, capite  
medio croceo. *Col. ecphr.* 1. p. 198. t. 196.  
*Habitat in Italia* ☉  
Omnes enumeratas species esse genuinas Sideritides, patet  
ex styli altero ramulo amplexante ramulum longiorem,  
ut & ex staminibus intra corollæ tubum, limbo vix  
ringentem; Confirmat hoc floris color partim quasi fer-  
ruginens.
6. **SIDERITIS** herbacea decumbens, calycibus spinosis: *romana*  
labio superiori indiviso.  
Cunila calycum lacinia superiore latiori ovata trinervi.  
*Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 321.  
Sideritis genus verticillis spinosis. *Bauh. hist.* 3. p. 428.  
Sideritis, verticillis spinosis, minor procumbens *Morif.*  
*hist.* 3. p. 388. f. 11. t. 12. f. 5.  
*Habitat in agris Europæ australis.* ☉  
Calycis lobus 5:tus s. superior ovatus, reliquis duplo la-  
tior.
7. **SIDERITIS** foliis lanceolatis glabris integerrimis, bra-*hyssopifolia*-  
cteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.  
Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris.  
*Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 322.  
Sideritis alpina hyssopifolia. *Bauh. pin.* 233.  
Sideritis VII. *Clus. hist.* 2. p. 41.  
*Habitat in* Hetruria, Pyrenæis, Thuri. " & *mons Helv.*
8. **SIDERITIS** foliis lanceolatis subdentatis, bracteis cor-*hirsuta*-  
datis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.

Side-

Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis. *Bauh. pin.* 232.  
 Sideritis montana scordioides altera. *Barr. ic.* 1160.  
*Habitat in* G. Narbonensi.

## MENTHA.

- crispa.* 1. MENTHA floribus spicatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Hort. upf.* 168. *Mat. med.* 278.  
 Mentha crispa danica f. germanica speciosa. *Morif. hist.* 3. p. 367. f. 11. t. 6. f. 5.  
 Mentha crispa. *Riv. mon.* 47  
*Habitat in* Sibiria. 2
- spicata.* 2. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. *Hort. upf.* 168.  
 Mentha sylvestris, longioribus nigrioribus & minus incanis foliis. *Bauh. pin.* 227.
- viridis.* α. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. parif.* 177.  
 Mentha angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 227.  
 Mentha III. IV. *Dod. pempt.* 95.  
 Mentha aquatica spicata, foliis oblongis viridibus serratis acuminatis. *Gron. virg.* 167.
- longifolia.* β. Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. parif.* 177. *Mat. med.* 279. *Gort. gelr.* 341.  
 Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.  
 Menthastrum spicatum, folio longiore candicante. *Bauh. hist.* 3. p. 321.
- rotundifolia.* γ. Mentha sylvestris, rotundiore folio. *Bauh. pin.* 227.  
*Habitat in* Dania, Germania, Anglia, Gallia. 2
- aquatica.* 3. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Fl. succ.* 482. *Roy. lugdb.* 325. *Dalib. parif.* 177.  
 Mentha rotundifolia palustris f. aquatica major. *Bauh. pin.* 227.  
 Silybrium sylvestre. *Dalech. hist.* 677.  
*Habitat in* Europa ad aquas. 2
- Planta non hirta. Verticilli terminales in capitulum f. spicam obtusam conferti; Stamina corollæ longiora.
- piperita.* 4. MENTHA floribus capitatis, foliis lanceolatis serratis subpetiolatis.

Men-

*Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuscæ, sapore fervido piperis. Raj. angl. 3. p. 234. t. 10. f. 2.*

*Habitat in Anglia. 2*

5. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis *sergentilis*, ratis, staminibus corolla brevioribus.

*Mentha hortensis verticillata, ocyimi odore. Bauh. pin. 227.*

*Mentha verticillata minor acuta non crispa, odore ocyimi. Bauh. hist. 3. p. 216.*

*Mentha quarta. Fuchs. hist. 291.*

*Habitat in Europa australiore. 2*

*Simillima M. arvensi, at minus hirta, Caulibus rubris; Stamina Tubo corollæ non longiora; Verticilli laterales.*

6. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis *arvensi*, ferratis, staminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.*

*307. Fl. succ. 481. Roy. lugab. 326. Hall. helv. 658.*

*Dalib. parisi. 178.*

*Mentha arvensis verticillata procumbens. Moris. hist. 3. p. 369. f. 11. t. 7. f. 5.*

*Calamintha arvensis verticillata. Bauh. pin. 229.*

*Habitat in Europæ agris frequens post messem. 2*

*Caules diffusi; Verticilli laterales; Planta tota hirta; Stamina corollæ limbo longitudine æqualia.*

7. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolatis *sercanadensis*, ratis petiolatis.

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Differt a precedenti Caule altiore, non ramoso, multum piloso. Foliis dimidio angustioribus, acutioribus, profundius ferratis, obscurioribus pilis vagis adspersis, uti etiam calyces. Calyces quinquedentati, subæquales.*

*Corolla 4fida: lobo superiore oblongo, longiore, integro; reliquis æqualibus. Stamina 4, intra tubum corollæ.*

*Stylus corollæ longior, apice bifidus.*

8. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis *Pulegium*, subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus. *Hort.*

*cliff. 307. Roy. lugab. 326. Dalib. parisi. 178. Mat.*

*med. 280. Gort. gelr. 344.*

*Pulegium latifolium. Bauh. pin. 222.*

*Pulegium. Fuchs. hist. 199.*

*Habitat in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ inundatis. 2*

*Cervina.*

9. MENTHA floribus verticillatis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 307. *Hort. ups.* 168. *Sauv. monsp.* 143.  
 Pulegium angustifolium. *Bauh. pin.* 222. *Morif. hist.* 3. p. 371. f. 11. t. 7. f. 7. *Riv. mon.* 22.  
*Habitat* Monspeli & ad Rhodanum. 2

*canariensis.*

10. MENTHA floribus capitatis axillaribus dichotomis, foliis ovatis crenatis, caule arborecente. *Hort. cliff.* 307.  
 Mentha canariensis frutescens, foliis subtus lanugine candidissima villolis, floribus glomeratis e sinu foliorum longioribus pediculis insidentibus. *Pluk. alm.* 248. t. 307. f. 2.  
 Heliotropium canariense arborecens, scorodoniæ folio. *Comm. hort.* 2. p. 129. t. 65.  
*Habitat* in Canariis, 5

## GLECOMA.

*hederacen.*

1. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Hort. cliff.* 307. *Fl. succ.* 483. *Roy. lugdb.* 320. *Mat. med.* 303.  
 Hedera terrestris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.  
 Chamæcissus, *Fuchs. hist.* 876.  
*Habitat* in Europæ septentrionalioris sepibus. 2

*arvensis.*

2. GLECOMA foliis cordatis oblongis crenatis, caule hispido erecto.  
 Sideritis calycibus subinermibus hispidis. *Fl. succ.* 488.  
 Sideritis alfine trixaginis folio. *Bauh. pin.* 233. *prodr.* 111.  
*Habitat* in arvis Europæ. ☉

*belgica.*

3. GLECOMA foliis cordato-oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320. *Gort. gelr.* 339.  
 Lamium paludosum belgicum, melissæ folio. *Herm. lugdb.* 351. t. 353.  
*Habitat* in Belgii jubbhumidis. ☉

## ORVALA.

*garganica.* 1. ORVALA.

- Papia garganica, foliis urticæ alternis & eleganter incilis, flore purpureo. *Mich. gen.* 20. t. 17.  
 Mentha hirsutior brachyplatyphyllos exotica. *Pluk. alm.* 248. t. 45. f. 2.  
*Habitat* in valle Garganica montis Apuliæ.

LA-

LAMIUM.

1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolo-album.  
*Hort. cliff.* 314. *Fl. succ.* 493. *Mat. med.* 307.  
*Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 178.  
 Lamium album non foetens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.  
*Galeopsis. Cam. epit.* 865.
- β. Lamium maculatum. *Bauh. pin.* 231.  
*Habitat in Europæ cultis.* 2
3. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Hort. cliff.* ~~purpureum.~~  
 314. *Fl. succ.* 494. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 179.  
 Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 230.  
 Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.  
*Habitat in Europæ cultis.* ☉
3. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus amplexica-  
obtusis. *Hort. cliff.* 314. *Fl. succ.* 495. *Roy. lugdb.* le.  
 319. *Gron. virg.* 66. *Dalib. paris.* 179.  
 Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Bauh. pin.* 231.  
 Morfus gallinæ, folio hederulæ, alterum. *Lob. ic.* 463.
- β. Lamium, folio caulem ambiente, majus. *Bauh. pin.* 231.  
*Habitat in Europæ cultis.* ☉
4. LAMIUM foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 315. *multifidum.*  
 Lamium orientale, foliis eleganter laciniatis. *Tournef.*  
*cor.* 11. *Comm. rar.* 26. *t.* 26.  
*Habitat in Oriente.*

GALEOPSIS.

1. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus: verticil-Ladanum.  
 lis omnibus remotis.  
 Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Hort. cliff.* 314.  
*Fl. succ.* 492. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 181.  
 Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.  
 Ladanum segetum folio latiore. *Riv. mon.* 24.  
*Habitat in Europæ arvis & campis sabulosis.* ☉
2. GALEOPSIS internodiis superne incrassatis, verticillis Tetrahit.  
 summis subcontiguis.  
 Galeopsis ramis summis strigosis. *Hort. cliff.* 314. *Fl.*  
*succ.* 491. *Roy. lugdb.* 319. *Dalib. paris.* 181.

Galeopsis corolla rubra aut alba. *Fl. lapp.* 237.

Urtica aculeata, foliis ferratis. *Bauh. pin.* 232.

Cannabis spuria. *Riv. mon.* 44.

β. Galeopsis corolla flava: labio inferiore maculato. *Fl. lapp.* 193.

Lamium cannabinum aculeatum, flore specioso luteo: labiis purpureis. *Pluk. alm.* 204. t. 41. f. 4.

Cannabis spuria, flore majore. *Riv. mon.* 45.

*Habitat inter Europæ segetes & olera.* ☉

*hirsuta.*

3. GALEOPSIS caule piloso, calycibus labio corollæ superiore longioribus.

Marrubium nigrum rotundifolium. *Bauh. pin.* 230.

Ocymastrum valentinum. *Clus. hist.* 2. p. 42.

*Habitat in Hispania.* ☉

*Galeobdolon*

4. GALEOPSIS verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo.

Leonurus foliis ovatis ferratis acutis. *Hort. cliff.* 313.

*Roy. lugdb.* 310. *Fl. suec.* 479. *Dalib. paris.* 182.

*It. scan.* 64.

Lamium folio oblongo luteum. *Bauh. pin.* 231.

Urtica iners tertia s. Lamium flore luteo. *Dod. pempt.* 153.

*Habitat in Europæ nemoribus.* 2

Fructificatio parum recedit a congeneribus, vix tamen distincto genere nominari meretur.

## STACHYS.

*Sylvatica.*

1. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Fl. suec.* 489. *Dalib. paris.* 180.

Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxè spicatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Hall. helv.* 642.

Lamium maximum sylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.

Galeopsis legitima. *Clus. hist.* 2. p. 35.

*Habitat in Europæ nemoribus umbrosis.* ☉

*palustris.*

2. STACHYS verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semi-amplexicaulibus. *Fl. suec.* 490. *Dalib. paris.* 180.

Stachys foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.

Stachys palustris fœtida. *Bauh. pin.* 236.

Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.

*Habi-*



*Habitat in Europa ad ripas, inque cultis humidiusculis. 2.*

3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis *alpino*.  
apice cartilagineis.

Stachys verticillis duodecim-floris, caule villoso. *Hort.*  
*ups.* 170. \*

Stachys foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis, verticillis tomentosis. *Hort. cliff.* 301. *Roy lugdb.* 317.  
*Dalib. paris.* 180.

Stachys latifolia major, foliis obscure virentibus, flore  
galeato ferrugineo. *Pluk. alin.* 356. t. 317. f. 4.

Pseudo-stachys alpina. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.

*Habitat in Germania, Helvetia. 2.*

S. alpina minor, colore obscuro, corollarum galea horizontali, foliorum dentibus apice cartilagineo fusco. S.  
germanica altior, lana alba, corollarum galea erecta.  
*Foliorum serraturis subimbricatis.*

4. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis.

Stachys verticillis quadraginta-floris, caule lanato. *Hort.*  
*ups.* 170. \*

Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis.

*Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Dalib. paris.* 179.

Stachys major germanica. *Bauh. pin.* 236.

Stachys. *Fuchs. hist.* 766.

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia. 2.*

5. STACHYS verticillis triginta-floris, calycibus pungentibus. *Hort. ups.* 170. \*

Stachys folio obscure virente, flore purpurascente.

*Walth. hort.* 108. t. 19.

Stachys cretica. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.

*Habitat in Creta. 2.*

6. STACHYS ramis ramosissimis, foliis lanceolatis glutinosis.

*Hort. cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 318.

Sideritis glutinosa bitumen redolens. *Morif. hist.* 3. p.

389.

Sideritis viscosa cretica bitumen redolens. *Zan. hist.* 136.

*Habitat in Creta.*

7. STACHYS ramulis spina terminatis. *Hort. cliff.* 310. spinosa.

*Roy. lugdb.* 318.

Stachys spinosa cretica. *Bauh. pin.* 236. *Morif. hist.*

3. p. 283. f. 11. t. 10. f. 9.

Gaidarothymo. *Clus. hist.* 2. p. 311.

*Habitat in occidentali Græcæ.*

- orientalis.* 8. STACHYS foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillis brevioribus. *Roy. lugdb.* 318.  
 Stachys orientalis altissima foetidissima. *Tournef. cor.* 12.  
*Boerb. lugdb.* 1. p. 154.  
*Habitat in Oriente.*

### BALLOTA.

- nigra* 1. BALLOTA foliis cordatis indivisis ferratis. *Fl. succ.* 484.  
 Ballota. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 315.  
 Ballote. *Fuchf. hist.* 154. *Cam. epit.* 572.  
 Marrubium nigrum foetidum. *Bauh. pin.* 230.  
*Habitat in Europæ ruderatis. &*
- lanata.* 2. BALLOTA foliis palmatis dentatis, caule lanato.  
 Ballote foliis geranii batrachioides. *Amm. ruth.* 47.  
*Habitat in Sibiria.*  
 Caules lana alba induti. Verticilli hirsutissimi. Folia grossulariæ, semizfida s. semisfida, lobis obtusis tridentatis, supra glabra, subtus hirsuta. Calyces 5dentati denticulis setaceis. Corollæ albæ, ventricosæ, magna in hac gente.

### MARRUBIUM.

\* *Calycibus 5dentatis.*

- Alysson.* 1. MARRUBIUM foliis cuneiformibus, verticillis involucro densitatis. *Hort. cliff.* 311. \* *Roy. lugdb.* 314. *Sauv. monsp.* 151.  
 Marrubium album, foliis profunde incis, flore cæruleo. *Morif. hist.* 3. p. 377. f. 11. t. 10. f. 12.  
 Alysson verticillatum, foliis profunde incis. *Bauh. pin.* 232.  
 Alysson galeni. *Clus. hist.* 2. p. 35.  
*Habitat in Hispania. &*
- peregrinum.* 2. MARRUBIUM foliis ovato-lanceolatis ferratis, calycum denticulis setaceis. *Hort. cliff.* 311. n. 3. *Roy. lugdb.* 314.  
 Marrubium album latifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 230. *Morif. hist.* 3. p. 577. f. 11. t. 9. f. 8.  
 Marrubium alterum pannonicum. *Clus. hist.* 2. p. 34.  
 β. Marrubium album angustifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 230. Mar-

Marrubium creticum. *Dalech. hist.* 962.

*Habitat in* Siciliæ, Cretæ, Austriæ *siccis.* 2

3. MARRUBIUM foliis subovatis lanatis superne emarginato-crenatis, denticulis calycinis subulatis. *Hort. cliff.* 312. n. 4. *candidissimum.*

Marrubium album candidissimum & villosum. *Tournef. cor.* 12.

*Habitat in* Creta?

4. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis rectis villosis. *Hort. cliff.* 312. *Roy. lugdb.* 315. *Sauv. monsp.* 151. *supinum.*

Marrubium album, sericeo parvo & rotundo folio. *Barr. ic.* 685. *Bocc. mus.* 2. p. 78. t. 69.

Marrubium album hispanicum majus. *Barr. ic.* 686.

*Habitat in* Hispania, G. Narbonensi, 2

\* *Calycibus* 10dentatis.

5. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Hort. cliff.* 342. *Fl. suec.* 485. *Mat. med.* 305. *Roy. lugdb.* 315. *Hall. belv.* 648. *Dalib. paris.* 182. *vulgare.*

Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.

Marrubium vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 34.

*Habitat in* Europæ borealioris *ruderatis.* 2

6. MARRUBIUM foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 314. \* *africanum.*

Pseudo-Dictamnus africanus, foliis subrotundis subtus incanis. *Comm. hort.* 2. p. 179. t. 90.

*Habitat ad* Cap. b. *Spei.* 2

7. MARRUBIUM calycum limbis patentibus: denticulis acutis. *Hort. cliff.* 312. *Hort. ups.* 169. \* *Roy. lugdb.* 315. *hispanicum.*

Marrubium album rotundifolium hispanicum. *Herm. par.* 201. t. 201.

Marrubium subrotundo folio. *Barr. ic.* 767. *Bocc. mus.* 2. p. 167. t. 122.

*Habitat in* Hispania. 2

8. MARRUBIUM calycum limbis planis villosis, foliis pseudoDictamni cordatis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 312. \* *Hort. flammul.* *ups.* 169. *Roy lugdb.* 315.

PseudoDictamnus verticillatus inodorus. *Bauh. pin* 222.

PseudoDictamnus. *Dod. pempt.* 281.

*Habitat in.* Creta. 5

acetabulo-  
sum.

9. MARRUBIUM calycum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. Pseudo Dictamnus acetabulis moluccæ. *Bauh. pin.* 222. Dictamnus falsus verticillatus, pericarpio conoide, bæticus. *Barr. ic.* 129. \*

*Habitat in Creta.* ♀

Limbus calycis absoluta florescentia excrefcit, fit tubo duplo longior, nudus & membranaceus, nec villosus ut in precedentibus; limbi margo 20 angulis: minoribus fcilicet acutis, latioribus obtufiffimis rotundatis.

## LEONURUS.

*Cardiaca.*

1. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Hort. cliff.* 313. *Fl. sæc.* 496. *Mat. med.* 308. *It. scan.* 231. *Roy. lugdb.* 312. *Dalib. parif.* 182.

Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.

Cardiaca. *Fuchf. hift.* 395.

- β. Cardiaca crispa. *Raj. hift.* 572.

*Habitat in Europæ ruderatis.* ♀

*Marrubia-  
strum.*

2. LEONURUS foliis ovatis lanceolatisque serratis, calycibus sessilibus spinosis.

Sideritis foliis ovatis & lanceolatis inciso-serratis. *Hort. cliff.* 313. *Sauv. monsp.* 279.

Marrubialtrum foliis cardiacæ. *Bocc. mus.* 2. p. 120. t. 98.

*Habitat in Bohemia, Ucraina.*

*tataricus.*

3. LEONURUS foliis tripartitis laciniatis, calycibus villosis. *Hort. upf.* 171. \*

Sideritis foliis tripartito-multifidis. *Hort. cliff.* 313. *Hort. upf.* 169.

Cardiaca, foliis tenuius & profundius incisiss, glabra f. villosa. *Amm. ruth.* 49. 50. ♂

*Habitat in Tartaria.* ♂

*sibiricus.*

4. LEONURUS foliis tripartitis multifidis linearibus obtusiusculis *Hort. upf.* 170. \*

Ballote inodora, foliis coronopî. *Amm. ruth.* 48. t. 8.

*Habitat in Sibiria, China.* ♂

## PHLOMIS.

*fruticosa.*

1. PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis.

Phlomis involucris tomentosis lanceolatis, foliis cordatis villosis, caule fruticoso. *Hort. upf.* 171.

Phlo-

*Phlomis involucri radiis lanceolatis villosis. Hort. cliff.*  
315.

*Verbascum latis salviæ foliis. Baub. pin. 240.*

*Verbascum sylvestre alterum. Dod. pempt. 146.*

β. *Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo.*  
*Tournef. cor. 10.*

*Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora. Dill. elth. 316.*  
*t. 237. f. 306.*

*Habitat in Sicilia, Hispania. h*

2. *PHLOMIS involucri lanceolatis, foliis ovatis subtus purpurea,*  
*tomentosis.*

*Verbascum subrotundo salviæ folio. Baub. pin. 240.*

*Salvia fruticosa, cisti folio haud incano, floribus pur-*  
*pureis. Pluk. alm. 329. t. 57. f. 6.*

*Phlomis fruticosa lusitanica, flore purpurascenæ, foliis*  
*acutioribus, Tournef. inst. 178.*

*Habitat in Lusitania. h*

3. *PHLOMIS foliis radicalibus cordatis utrinque tomen-*  
*tosis villosis.*

*Phlomis orientalis, foliis auriculatis incanis, flore lu-*  
*teo. Nissol.*

*Habitat in Oriente.*

*Folia radicalia profunde cordata, oblonga, obtusiuscula;*  
*Floralia ovata. Calyces hirsuti.*

4. *PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis: floralibus o-*  
*vatis, involucri setaceis lanatis.*

*Phlomis foliis ligulatis utrinque tomentosis, radiis in-*  
*volucri setaceis villosis. Sauv. monsp. 143.*

*Verbascum angustis salviæ foliis. Baub. pin. 240.*

*Verbascum sylvestre, foliis salviæ tenuifoliæ. Lob. ic.*  
*558.*

*Habitat in Europa australi. D. Sauvages.*

*Habitus speciei 1, sed Folia angustiora. Corollæ vix ca-*  
*lyce majores. Involucra linearia, pilis longis crinita.*

5. *PHLOMIS foliis alternatim pinnatis: foliolis lacinia-*  
*tis, calycibus lanatis.*

*Phlomis orientalis, foliis laciniatis. Tournef. cor. 10.*

*Habitat in Oriente.*

6. *PHLOMIS foliis ovatis subtus tomentosis, involu-*  
*cris subulatis strictis tripartitis.*

*Phlomis radiis involucri setaceis trifidis, foliis cordatis.*

*Sauv. meth. 152.*

*Phlomis involucri radiis subulatis strictis. Hort. cliff.*  
315. \*

*Phlomis famia herbacea, folio lunaræ. Tournef. cor. 10.*  
*Habitat in Samo.*

*herba venti.* 7. *PHLOMIS* involucris setaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris; caule herbaceo. *Hort. upf.* 171. \*  
*Sauv. monsp.* 152.

*Phlomis involucri radiis setaceis hispidis. Hort. cliff.*  
315.

*Marrubium nigrum longifolium. Banb. pin.* 230.

*Habitat in Persia, Tataria, Narbona ad aggeres. 2*

*tuberosa.* 8. *PHLOMIS* involucris hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo. *Hort. upf.* 171.

*Phlomis foliis cordiformibus, galea lacera. Act. gotz.*  
211. t. 12.

*Phlomis, urticæ foliis, glabra. Ann. ruth.* 40. 39.

*Galeopsis maxima, foliis hormini. Buxb. cent.* 1. p. 4.  
t. 6.

*Habitat in Sibiria campesribus. 2*

*Involucria subulata & Calycis dentes patentes, hispida.*  
*Corollæ galea dentata. Radix tuberosa.*

*zeylanica.* 9. *PHLOMIS* foliis lanceolatis subserratis, capitulis terminalibus, calycibus octodentatis.

*Leonurus foliis lanceolatis subserratis obtusiusculis, calycibus octodentatis. Fl. zeyl.* 227. \*

*Cardiaca* f. *Leonurus*, hyssopi hirsutis foliis, maderaspatana, floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum cymis. *Pluk. alm.* 81. t. 118. f. 4.

*Habitat in India.*

*indica.* 10. *PHLOMIS* involucris linearibus, calycibus unilabiatibus obliquis, foliis lanceolato ovatis pilosis.

*Habitat in India.*

*Folia ovata, serrata, basi attenuata, petiolata, pilis mollibus vestita, viridia. Verticilli versus apicem duo vel tres, crassi, cincti Involucris erectis, linearibus, carinatis, villosis. Calyces tubulosi, oblongi, decagoni, exteriori margine oris producti in labium 3 dentatum; a tergo, ubi margo brevissimus, dentes duo minutissimi. Corolla Leonuri Cardiaca, galea hirsutissima pilis albis, longior, incana. Labium inferius parvum.*

*nepetaspolia.* 11. *PHLOMIS* foliis ovatis, calycibus decagonis septendecimatis inæqualibus. *Hort. cliff.* 312. sub *Leonuro.*

*Car-*

*Cardiaca americana* aumna, nepetæ folio, floribus brevibus phceniceis villosis. *Herm. lugdb.* 115. t. 117.  
*Habitat* Surinami? 2.

12. PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, involucris lineari-*Leonurus*, ribus nudis, calycibus decagonis decemdentatis.

*Leonurus* foliis lanceolatis obtuse serratis. *Hort. cliff.* 312.

*Leonurus* capitis bonæ spei. *Breyn. cent.* 171. t. 86.

*Stachys africana* frutescens angustifolia, flore longissimo phceniceo, *Leonurus* dicta. *Morif. hist.* 3. p. 383. f. 11. t. 19. f. 17.

*Habitat* ad Cap. b. Spei. b

## MOLUCCELLA.

1. MOLUCCELLA calycibus quinqueidentatis: denti-*lævis*, culis æqualibus. *Roy. lugdb.* 314. *Hort. ups.* 172.

*Molucca lævis*. *Dod. pempt.* 92.

*Melissa moluccana* odorata. *Bauh. pin.* 229.

*Habitat* in Syria. ☉

2. MOLUCCELLA calycibus septemdentatis. *Roy. spinosa*. *lugdb.* 314. *Hort. ups.* 172.

*Molucca spinosa*. *Dod. pempt.* 92.

*Melissa moluccana* foetida. *Bauh. pin.* 229.

*Habitat* in Moluccis. ☉

3. MOLUCCELLA calycibus quinquefidis, corollis cæ *frutescens*, lyce longioribus.

*Scordium spinosum*, floris labio superiore f. galea lanuginosa f. villosa. *Raj. suppl.* 311.

*Habitat* in Pedemontio inter Tende & Braille e rupibus. *D. Sauvages.* b

Fruticulus *Ramulis dichotomis*. Folia ovata, pollicaria, pilis raris pubescentia, utrinque 2. f. 3. profundis serraturis notata, petiolata. Spinæ axillares, utrinque ternatæ ut in *Berberide*, sed tantum ad florum verticillos. Calyces infundibuliformes, parvi, decagoni, limbo quinquefido, spinis terminalibus 12 ad 15. Corolla cardiaca, galea lunata. Media inter *Balloten*, *Leonurum* & *Moluccellum*.

## CLINOPODIUM

1. CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis.

*Climo-*

*Clinopodium* foliis ovatis, capitulis verticillatis. *Hart. cliff.* 305. *Fl. succ.* 479. *Roy. lugdb.* 313.  
*Clinopodium* origano simile. *Bauh. pin.* 224.  
*Clinopodium.* *Cam. epit.* 563.  
*Habitat in rupestribus* Europæ, Canadæ. &  
*Americana ex seminibus duplo minores gerit corollas, cæ-*  
*terum eadem.*

- Incarnum.* 2. **CLINOPODIUM** foliis subtus tomentosis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis.  
*Clinopodium* foliis lanceolatis ferratis, verticillis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 313.  
*Clinopodium*, menthæ folio, *incarnum* & odoratum. *Dill. elth.* 87. t. 74. f. 85.  
*Clinopodium* majus virginianum non ramosum, verticillis majoribus, floribus brevioribus carneis. *Morisi. hist.* 3. p. 374. f. 11. t. 8. f. 4.  
*Clinopodium* Serpentaria dictum, latiori folio, capitulis grandioribus. *Pluk. mant.* 51. t. 344. f. 7. *Raj. suppl.* 298.  
*Origanum* foliis ad summitatem caulium canis. *Raj. hist.* 1229.  
*Habitat in Europa boreali.* &

- Rugosum.* 3. **CLINOPODIUM** foliis rugosis, capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis.  
*Clinopodium* rugosum, capitulis scabiosæ. *Dill. elth.* 88. t. 75. f. 86.  
*Scabiosæ* affinis, chrysanthemi facie, lamii foliis, americana. *Pluk. alm.* 335. t. 222. f. 1.  
*Sideritis* spicata, scrophulariæ folio, flore albo, spicis brevibus habitioribus rotundis pediculis insidentibus. *Sloan. jam.* 65. *hist.* 1. p. 174. t. 109. f. 2.  
*Mentha* americana inodora, foliis subincanis. *Raj. suppl.* 284.  
*Mentha* melissoides americana. *Pluk. mant.* 129.  
*Melissa* altissima globularia. *Plum. spec.* 6.  
*Habitat in Carolina, Jamaica, Gallia æquinoctiali.* &

## ORIGANUM.

- ægyptiacum.* 1. **ORIGANUM** foliis carnosiss tomentosis.  
*Majorana* rotundifolia scutellata exotica. *Tournef. inst.* 199.  
*Origano* cognata Zatarhendi. *Bauh. pin.* 223. *Morisi. hist.* 3. p. 360. f. 11. t. 3. f. ult.

Zatar-



Zatarhendi. *Alp. ægypt.* 94. t. 95.

*Habitat in Ægypto.* 2

2. ORIGANUM foliis inferioribus tomentosis, spicis nu- *Dictamnus*,  
tantibus. *Hort. cliff.* 304. *Mat. med.* 106. *Roy. lugdb.*  
323.

*Dictamnus creticus. Bauh. pin.* 222.

*Dictamnus cretense. Cam. epit.* 472

*Dictamnus. Lob. ic.* 502.

*Habitat in Cretæ monte Ida.* 5

3. ORIGANUM foliis omnibus glabris, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 323.

*Origanum montis sipyli. Herm. lugdb.* 462. t. 463.

*Dictamnus sipyleus, majoranæ foliis. Moris. hist.* 3.

p. 457. f. 11. t. 4. f. 2.

*Habitat in Phrygiæ monte Sipylo.*

4. ORIGANUM spicis aggregatis longis prismaticis re- *creticum*,  
ctis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus.

*Origanum foliis ovatis acutis glabris: venis scabris, spi-*  
*cis tetragonis. Mat. med.* 300.

*Origanum foliis ovatis obtusis scabris integerrimis, spi-*  
*cis confertis compactis glabris. Amæn. acad.* 1. p. 160.

*Origanum creticum. Bauh. pin.* 223.

5. *Origanum folio subrotundo. Bauh. pin.* 223.

*Origanum monspeliense pulchrum. Cam. epit.* 468.

*Habitat in Europa australi.* 2

5. ORIGANUM foliis ovatis acutis serratis, spicis con- *smyrnum*,  
gestis umbellatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 304. *Roy.*  
*lugdb.* 324.

*Origanum smyrnæum. Wheel. itin.* - - *Raf. hist.* 450.

*Majorana cretica, origani foliis, villosa, saturejæ odo-*  
*re, corymbis majoribus albis. Tournef. cor.* 13.

*Habitat in Creta & Smyrnæ in monte cui arx inadi-*  
*ficata.*

6. ORIGANUM spicis longis pedunculatis aggregatis, *heracleoti-*  
bracteis longitudine calycum. *cum.*

*Origanum heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii.*  
*Bauh. pin.* 223.

*Orega, Origanum heracleoticum, Cunila. Lob. ic.* 492.

*Habitat in Europa australi, Græcia.* 2

*Habitus O. sylvestris, sed spicæ digitales, laxè imbrica-*  
*te; at differt ab O. cretico, quod bractæ vix calyci-*  
*bus longiores & demum quod spicæ pedunculatæ.*

7. ORI-



*vulgare.*

7. **ORIGANUM** spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis. *Hort. cliff.* 305. *Fl. succ.* 480. *Mat. med.* 299. *Roy. lugdb.* 323. *Gron. virg.* 65.  
 Origanum sylvestre. *Bauh. pin.* 223.  
 Origanum sylvestre f. vulgare. *Fuchs. hist.* 522.  
*Habitat in Europa, Canadæ rupestribus.*  
*Americanum bracteis coloratissimis gaudet.*

*onites.*

8. **ORIGANUM** spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis.  
 Origanum lignosum syracusanum perenne, umbella amplissima brevi, lato & nervoso folio. *Bocc. mus.* 2. p. 45. t. 38.  
 Origanum onites. *Bauh. pin.* 222. an?  
*Habitat Syracusæ.* b  
 Habitus *Majoranæ* sed lignosus. Caules pilis longis parvis. Folia parva, cordata, subsessilia, acuta, rarius serrata, utrinque tomentosa, ex alis ramorum rudimenta. Spicæ congestæ, ut in *Majorana*, sed oblongæ, in singulo pedunculo ternæ, intermedio sessili, villosæ; Flores albi.

*syriacum.*

9. **ORIGANUM** spicis longis ternatis pedunculatis villosis, foliis ovatis villosis.  
 Majorana syriaca vel cretica. *Bauh. pin.* 224.  
 Marum syriacum. *Lob. ic.* 499. \*  
*Habitat* - - - - -  
 Habitus *Majoranæ*. Folia subrotundo-ovata, acuta, pilis vagis adpersa. Rami ex axillis. Corymbus terminalis, ex ramis longioribus brachiatus. Spicæ sæpius ubique 3, terminales, longæ, erectæ, tetragonæ, villosæ.

*Majorana.*

10. **ORIGANUM** foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304. *Hort. ups.* 161. *Mat. med.* 298. *Roy. lugdb.* 324.  
 Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.  
 Amaracus vulgarior. *Lob. ic.* 498.  
 β. Majorana tenuifolia. *Bauh. pin.* 224.  
 Majorana hortensis odorata perennis. *Moris. hist.* 3. p. 359.  
*Habitat* - - - - - ©

## THYMUS.

*Serpyllum.*

1. **THYMUS** floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. succ.* 477. *Mat. med.* 282. Thy-

*Thymus repens*, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.

*Serpyllum vulgare minus*. *Bauh. pin.* 220.

*Serpyllum vulgare*. *Dod. pempt.* 277.

β. *Serpyllum vulgare majus*. *Bauh. pin.* 220.

γ. *Serpyllum vulgare minus*, capitulis lanuginosis. *Tournef. inst.* 197. *It. gotl.* 219.

δ. *Serpyllum angustifolium hirsutum*. *Bauh. pin.* 220.

ε. *Serpyllum foliis citri odore*. *Bauh. pin.* 220.

*Habitat in Europæ aridis apricis.* h

2. **THYMUS** erectus, foliis revolutis ovatis, floribus vulgaris. verticillato-spicatis. *Hort. cliff.* 305. *Hort. upf.* 160.

*Mat. med.* 281. *Roy. lugdb.* 325. *Sauv. monsp* 148.

*Thymus vulgaris*, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 219.

β. *Thymus vulgaris*, folio latiore. *Bauh. pin.* 219.

*Thymum durius*. *Dod. pempt.* 276.

*Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ montosis saxosis.* h

3. **THYMUS** floribus verticillato-spicatis, caule suffru-Zygis, ticofo, foliis linearibus basi ciliatis. *Læfl.*

*Thymo* vulgatori rigidiori simile. *Bauh. hist.* 2. p. 271.

*Thymum angusto longiorique folio*. *Barr. ic.* 777.

*Serpyllum sylvestre* Zygis dioscoridis. *Clus. hist.* 358.

*Serpyllum folio thymi*. *Bauh. pin.* 220?

*Habitat in Hispania.*

*Facies T. vulgaris, at Folia basi ciliata.*

4. **THYMUS** floribus verticillatis, pedunculis unifloris, Acinor. caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis.

*Fl. succ.* 478.

*Thymus* caulibus vix ramosis, foliis ovatis acutis, pedunculis plurimis unifloris. *Hort. cliff.* 306. *Roy.*

*lugdb.* 325.

*Clinopodium arvense*, ocymi facie. *Bauh. pin.* 225.

*Clinopodium vulgare*. *Lob. ic.* 506.

*Habitat in Europæ glareosis, cretaceis, siccis.* ☉

5. **THYMUS** verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis alpinus, concavis subserratis.

*Clinopodium* verticillis paucifloris in spicam congestis.

*Hall. belv.* 653.

*Clinopodium montanum*. *Bauh. pin.* 225. *Bocc. mus.*

2. p. 50. t. 45.

*Acini* pulchra species. *Bauh. hist.* 3. p. 620. 200.

Ha-

## 592 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

*Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Monspeli.*

*D. Rathgeb. ☉*

*Habitus & affinitas cum antecedenti.*

*cephalotos.* 6. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis.

Thymus lusitanicus cephalotos, squamis capitulorum amplioribus. *Tournef. inst.* 196.

Tragoriganum, dictamni capite, hispanicum. *Barr. ic.* 787. *Bocc. musf.* 2. p. 50. t. 43.

β. Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo majori. T.

γ. Thymus lusitanicus cephalotos, capitulo minori. T.

*Habitat in Hispania, Lusitania. ♀*

*villosus.* 7. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis setaceis pilosis.

Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascens oblongo. *Tournef. inst.* 190.

β. Thymus lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascens rotundo. *Tournef. inst.* 190.

*Habitat in Lusitania. ♀*

*pulegioides.* 8. THYMUS ramis verticillatis longis, foliis ovalibus striatis.

Acinos thymi folio & facie, floribus inexpanfis. *Morif. hist.* 3. 404. f. 11. t. 19. f. 6.

*Habitat Monspeli. D. Sauvages. ☉*

Habitus *Melissæ pulegioidis* s. *Menthæ pulegii*, at *Caryocates bilabiati* a *Satureja*, ore barbati a *Melissa* & *Mentha* eam distinguunt. Caulis spithameus, erectus. Rami pauci, simplices, breves. Folia ovalia, obtusa, glabra, subtus striata. Rami & plantæ maxima pars verticillis obvallata.

## MELISSA.

*officinalis.* 1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 307. *Hort. upf.* 163. *Mat. med.* 294. *Roy. lngdb.* 320. *Sauv. monsp.* 149.

Melissa hortensis. *Baub. pin.* 229.

Apiastrum s. Melissophyllum. *Lob. hist.* 227.

*Habitat in montibus Genevensibus, Allobrogicis, Italiciis. 2.*

*grandiflora.* 2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. Cala

*Calamintha magno flore. Baub. pin. 229. Riv. mon. 43.*

*Calamintha montana præstantior. Bess. cyst. æst. 7. t.*

*7. f. 1.*

*Habitat in Hetruriæ montosis. 2*

3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitu- *Calamintha*,  
dine foliorum.

*Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo commu-  
ni confertis. Hort. cliff. 307. Roy. lugdb. 320. Mat.  
med. 295. Sauv. monsp. 149.*

*Calamintha vulgaris & officinarum germaniæ. Baub.  
pin. 228.*

*Calamintha montana. Dod. pempt. 98.*

*Habitat in Italiæ, Hispaniæ, Galliæ clivis saxosis. 2*

4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio lon- *Nepeta*,  
gioribus, caule decumbente.

*Melissa floribus ex alis superioribus, pedunculo dichoto-  
mo, caule procumbente. Hort. cliff. 308. Gron. virg. 65.*

*Roy. lugdb. 321. Sauv. monsp. 149. Gort. gelr. 337.*

*Calamintha pulegii odore f. Nepeta. Baub. pin. 228.*

5. *Calamintha montana præalta, pulegii odore. Bocc. mus.  
2. p. 45. t. 40. f. 38.*

*Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ, Helvetiæ aggeribus  
glareosis.*

5. MELISSA racemis terminalibus, pedunculis solitariis *cretica*.  
brevissimis.

*Calamintha incana, ocymi foliis. Baub. pin. 569.*

*Calamintha, pulegii odore, minor. Barr. ic. 1166.*

*Calamintha clinopodii austriaci foliis, odore pulegii.*

*Pluk. alm. 75. t. 163. f. 4*

*Habitat Montpelii.*

6. MELISSA fruticosa. ramis attenuatis virgatis, foliis *fruticosa*.  
subtus tomentosis.

*Melissa caule fruticoso, racemis verticillatis. Roy. lugdb.  
321.*

*Calamintha hispanica frutescens, mari folio. Tournef.  
inst. 194.*

*Habitat in Hispania. 8*

7. MELISSA floribus verticillatis glomeratis secundum *Palegioid*.  
longitudinem caulis, foliis tomentosis. *Gron. virg.*  
*167.*

*Habitat in Virginia, Canada. ☉*

*Planta spithamæa, brachiata: Ramis brevioribus, simpli-  
cibus.*

P p

*cibus. Folia lanceolata, glabra. Verticilli laxi florum a radice ad summities plantæ conferti. Differt a Thymo pulegioides, cui simillima, non tantum floribus minime spicatis ut in thymo, verum lateralibus per caulem sparsis, sed præcipue fauce calycis vix manifeste villosa, minime pilis albis clausa. Folia in hac utrinque uno alterove dente notata, in Thymo autem sæpius integerrima.*

## DRACOCEPHALUM.

\* *Spicata.*

*virginianum* 1. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis lanceolatis serratis.

Dracocephalum foliis simplicibus, floribus spicatis. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 311.

Dracocephalum. *Breyn. ic.* 33. t. 27. *Hir. act.* 1712. p. 276. t. 11.

Dracocephalus angustifolius, folio glabro serrato. *Morif. hist.* 3. p. 407. f. 11. t. 4. f. 1.

Pseudodigitalis persicæ foliis. *Bocc. sic.* 12. t. 6. f. 3.

Lylinachia galericulata spicata purpurea canadensis. *Barr. ic.* 1152.

*Habitat in America septentrionali. ♀*

*canariense.* 2. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis compositis. *Hort. cliff.* 308. *Mat. med.* 293.

Dracocephalo affinis americana trifoliata, terebinthinæ odore. *Volk. norib.* 145. t. 145.

Camphorosma. *Morif. hist.* 3. p. 366. f. 11. t. 11. f. ult.

Melissa forte canarina triphyllus, odorem camphoræ spirans penetrantissimum. *Pluk. alm.* 401. t. 325. f. 5.

Cedronella canariensis viscosa, foliis plerumque ex eodem pedicello ternis. *Comm. hort.* 2. p. 81. t. 41.

*Habitat in Canariis. ♂*

*pinnatum.* 3. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis cordatis pinnato-sinuatis.

Dracocephalum foliis pinnato-sinuatis obtusis, floralibus spicatis villosis coloratis. *Hort. ups.* 165. \*

*Habitat ad Jerkatsch. Steller, D. Gmelin.*

Caules fruticosi, decumbentes. Folia cordata, transversim pinnatifida, obtusa lobis remotis, longe petiolata. Spica Melampyri arvensis: bracteis lanceolatis, dentato-setaceis, rubris sæpe. Corollæ parvæ; Styli floribus duplo longiores.

4. DRA

4. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bra- ~~achyriacum~~  
cteisque linearibus partitis spinosis.  
Hyslopus spicis interruptis. *Hort. cliff.* 364.  
Hyslopus austriacus, magno flore, folio chamæpithyos.  
*Herm. lugdb.* 330.  
Ruyfchiana hirsuta, foliis laciniatis. *Amm. ruth.* 50.  
Chamæpithys cærulea austriaca. *Bauh. pin.* 250.  
Chamæpithys austriaca. *Clus. hist.* 2. p. 185.  
*Habitat in Austria.* 2
5. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bra- *Ruyfchiana*.  
cteisque lanceolatis indivisis muticis.  
Dracocephalum foliis linearibus indivisis integerrimis,  
floribus spicatis, *Hort. upf.* 165. \*  
Ruyfchiana glabra, foliis integris. *Amm. ruth.* 50.  
Ruyfchiana flore cæruleo magno. *Boerb. lugdb.* 1 p. 172.  
PseudoChamæpithys austriaca. *Riv. mon.* 106.  
Prunella hyslopi folio viridi, amplo flore cæruleo. *Mor-*  
*ris. hist.* 3. p. 364. f. 11. t. 5. f. 9.  
*Habitat in Sibiria, Suecia.* 2  
\* *Verticillata.*
6. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, foliis *grandiflo-*  
ovatis inciso-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis. *ram.*  
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis oblongis ob-  
tusis sinuato-crenatis, bracteis oblongis. *Gmel. mss.*  
*Habitat in Sibiria.* ☉  
Folia ovata f. ovalia, profunde 3 obtuse serrata, nuda:  
caulina trinervia, floralia integerrima. Bractæ lan-  
ceolatae, integerrimæ, parvæ, pilis adpersæ. Corol-  
la maxima, cærulea.
7. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis *Moldavica*,  
lanceolatis: serraturis capillaceis. *Hort. upf.* 166. \*  
*Mat. med.* 292.  
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lan-  
ceolatis. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 312.  
Melissa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.  
Melissa moldavica. *Cam. epit.* 576.  
*Habitat in Moldavia.* ☉
8. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis *caneſcent*.  
is oblongis: serraturis spinosis, foliis subtomentosis.  
*Hort. upf.* 166. \*  
Dracocephalum floribus verticillatis, foliis lanceolatis,  
floribus oblongis. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 312.  
Moldavica orientalis, betonicæ folio, flore magno vio-  
laceo. *Tournef. cor.* 11. *Comm. rar.* 28. t. 28.  
P p 2 Si-

*Sideritis annua*, flore luteo, utriculis & foliis longioribus. *Morif. hist.* 3. p. 389. f. 11. t. 8. f. 18.  
*Habitat in Oriente.* ☉

- peltatum.* 9. **DRACOCEPHALUM** floribus verticillatis, bracteis orbiculatis serrato-ciliatis. *Hort. upf.* 166. \*  
*Dracocephalum* floribus verticillatis, foliis floralibus orbiculatis. *Hort. cliff.* 309. \* *Roy lugdb.* 312.  
*Moldavica orientalis*, salicis folio, parvo flore cæruleo.  
*Tournef. cor.* 11.  
*Habitat in Oriente.* ☉

- montans.* 10. **DRACOCEPHALUM** floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nuntantibus. *Hort. upf.* 167. n. 6. \*  
*Moldavica betonica* folio, floribus minoribus cæruleis pendulis. *Amm. ruth.* 44.  
*Habitat in Sibiria.* ☉

- thyrisiflorum.* 11. **DRACOCEPHALUM** floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Hort. upf.* 167. \*  
*Cedronella tatarica* perennis, urticæ foliis, flosculis minoribus ex cæruleo rubentibus. *Roy. lugdb.* 537.  
*Moldavica betonica* folio, floribus minimis pallide cæruleis. *Amm. ruth.* 46.  
*Habitat in Sibiria.* ☉

## HORMINUM.

- pyrenaicum.* 1. **HORMINUM** foliis cordatis obtusis, caule nudo.  
*Horminum.* *Hort. cliff.* 309.  
*Gallitrichum* folio rotundo, flore magno violaceo. *Bauh. hist.* 3. p. 313. *Morif. hist.* 3. p. 395. *Raj. hist.* 546.  
*Melissa pyrenaica*, caule brevi, plantaginis folio. *T. Magn. hort.* 133. t. 133. (c.). rar. n. 847.  
*Habitat in altis montium Tyrolensium, Pyrenæorum.* 2
- virginicum.* 2. **HORMINUM** foliis cuneiformi-oblongis, caule bifolio.  
*Melissa atrorubens*, bugulæ folio. *Dill. elth.* 219. t. 175. f. 216.  
*Sideritis*, bugulæ folio, mariana, floribus purpureis longo tubulo donatis. *Pluk. mant.* 171.  
*Habitat in Virginia, Carolina.*

MELIT-



MELITTIS.

1. MELITTIS. *Hort. cliff.* 390. *Roy. lugdb.* 319. *Sauv. melissophyl-  
monsp.* 150. *Melissa fuchsi.* *Cam. hort.* 99. 30.  
*Lamium montanum*, *melissæ folio.* *Bauh. pin.* 231.  
*Habitat in subalpinis* Germaniæ, Helvetiæ, Angliæ,  
Monspeli. 2

OCIMUM.

1. OCIMUM racemis secundis lateralibus, caule erecto. *frutescens.*  
*Ocimum foliis lanceolato-ovatis, radice perenni.* *Hort.  
cliff.* 315. *Fl. zeyl.* 228. \* *Roy. lugdb.* 222.  
*Ocimum zeylanicum* perenne odoratissimum latifoli-  
um. *Burm. zeyl.* 174. t. 80. f. 1.  
*Cottam. Rheed. mal.* 10. p. 153. t. 77.  
*Habitat in India* ☉  
*Habet & hoc Stamina propria generi.*
2. OCIMUM foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. Basilicum.*  
*cliff.* 315. *Hort. upf.* 168. *Roy. lugdb.* 322.  
*Ocimum caryophyllum majus.* *Bauh. pin.* 226.  
*Ocimum.* *Cam. epit.* 308.
3. *Ocimum caryophyllum maximum.* *Bauh. pin.* 226.
4. *Ocimum latifolium maculatum* f. *crispum.* *Bauh. pin.* 226.
5. *Ocimum viride*, foliis bullatis. *Bauh. pin.* 225.  
*Habitat in India, Persia.* ☉
3. OCIMUM foliis ovatis integerrimis. *Hort. upf.* 169. *minimum.*  
*Ocimum foliis ovatis incanis.* *Hort. cliff.* 315. *Roy.  
lugdb.* 322  
*Ocimum minimum.* *Bauh. pin.* 226. *Morif. hist.* 3.  
p. 407. f. 11. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Zeylona.* ☉
4. OCIMUM foliis ovato-oblongis serratis, bracteis cor-*tenuiflorum.*  
datis reflexis concavis.  
*Habitat in Malabar.* ☉-h -  
*Caulis pedalis* f. *bipedalis*, teretiusculus, purpurascens,  
*brachiatus*, pilis adpersus patulis; *Rami breviores.* Fo-  
*lia ovato-oblonga*, obtuse serrata, mollia, longe petiola-  
*ta.* *Spicæ terminales*, ternæ, longæ, angustæ, peduncu-  
*lata.* *Bracteis oppositis*, glabris, cordatis, concavis, ar-  
*cte reflexis.* *Flores tres ex singula bractea*, subsessiles.  
*Calyces glabri* 5fidi: *labio superiore plano*, *majori*, *re-*  
*niformi*, *acuto.* *Corolla parva*, purpurascens: *Labio*  
P p 3 supe-

598 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

*superiore 4fida; Labio inferiore simplici. Stamina 4, quorum 2 basi appendiculata. Stylus flore longior, bifidus. Flores tam parvi, ut vix nudis oculis conspiciantur, qui incipiunt florere ab apice spicarum.*

*menthoides.* 5. OCIMUM foliis lineari-lanceolatis ferratis. *Fl. zeyl.* 229.

*Mentha zeylanica, angustissimo folio dentata. Raj. suppl.* 284.

*Habitat in Zeylona.*

6. v. app. 1197. TRICHOSTEMA.

*dichotomum* 1. TRICHOSTEMA staminibus longissimis exsertis. *Trichostema. Hort. cliff.* 493. *Gron. virg.* 64. *Raj. lugdb.* 310.

*Scutellaria carulea, majoranæ folio, americana. Raj. suppl.* 311.

*Cassida mariana, majoranæ folio. Pet. ficc.* 243.

*Habitat in Virginia, Pennsylvania. ☉*

*brachiatum.* 2. TRICHOSTEMA staminibus brevibus inclusis. *Teucrium virginianum, origani folio. Dill. elch.* 380. *t.* 285. *f.* 369.

*Habitat in America septentrionali.*

SCUTELLARIA.

*orientalis.* 1. SCUTELLARIA foliis incis. subtus tomentosis. *Hort. ups.* 173.

*Scutellaria foliis pinnatifidis. Hort. cliff.* 316. \* *Raj. lugdb.* 310.

*Cassida orientalis, folio chamædryos, flore luteo. Tournef. cor.* 11. *itin.* 3. *p.* 306. *t.* 306. *Comm. rar.* 30. *t.* 30. *Mart. cent.* 18. *t.* 18.

β. *Scutellaria orientalis incana, foliis laciniatis, flore luteo. Tournef. cor.* 11.

*Habitat in Armenia circa Tephlin. & Armenia.*

*supina.* 2. SCUTELLARIA foliis inciso-ferratis utrinque glabris, spica rotundato-tetragona. *Hort. ups.* 173. \* *Cassida alpina supina, magno flore albido. Tournef. inst.* 182.

*Habitat in Sibirja, Tataria. 2*

*lateriflora.* 3. SCUTELLARIA foliis levibus carina scabris, racemis lateralibus foliosis. + *folij* *Scutellaria foliis cordato-lanceolatis ferratis, pedunculis multifloris. Raj. lugdb.* 311. *Scu-*

*Scutellaria* foliis ovato-lanceolatis petiolatis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 67.

*Scutellaria* palustris repens virginiana major, flore minore. *Morif. hist.* 3. p. 416.

*Habitat in* Canada, virginia. 2

Racemi laterales Foliis minoribus, lanceolatis, serratis; insuper singuli pedicelli seta utrinque notati sunt, ut in *S. galericulata* & peregrina.

4. **SCUTELLARIA** foliis cordato-lanceolatis crenatis, *galericulata*. floribus axillaribus. *Fl. lapp.* 239. *Fl. succ.* 499. *Hort. cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 310.

*Lysimachia* cærulea *galericulata* f. *Gratiola* cærulea. *Baub. pin.* 246.

*Lysimachia galericulata.* *Dalech. hist.* 1060.

*Habitat in* Europæ littoribus. 2

5. **SCUTELLARIA** foliis integerrimis: inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. *It. gotl.* 212. *Fl. succ.* 500. \*

*Scutellaria* folio non serrato. *Riv. mon.* 77.

*Habitat ad littora* Sueciæ rarius. 2

*An varietas precedentis? certe maxime affinis.*

6. **SCUTELLARIA** foliis sessilibus ovatis: inferioribus *integrifolia*. obsolete serratis; superioribus integerrimis.

*Scutellaria* foliis integerrimis. *Gron. virg.* 67.

*Scutellaria* cærulea virginiana, lamii aut potius *teucris* folio, minor. *Pluk. alm.* 338. t. 313. f. 4.

*Scutellaria*, *teucris* folio, marilandica. *Raj. suppl.* 310.

*Habitat in* Virginia, Canada.

7. **SCUTELLARIA** foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 167. *hyssopifolia*. *Cassida* mariana *hyssopifolia.* *Pet. act. angl.*

*Habitat in* Virginia.

8. **SCUTELLARIA** foliis subcordatis serratis, spicis *peregrina*. interruptis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. upf.* 172. *Roy. lugdb.* 311.

*Cassida.* *Colum. ecphr.* 1. p. 187. t. 189.

*Lamium peregrinum* f. *Scutellaria* *Baub. pin.* 231.

*Habitat in nemoribus* Florentiæ, Liburni.

Alia hinc simillima Calycibus lanatis, pilis griseis, Corollæ galea apice pilosa. Bracteis ovatis, brevibus.

9. **SCUTELLARIA** foliis ovatis crenatis, spicis imbricatis. *Hort. cliff.* 317. *Hort. upf.* 173. *Roy. lugdb.* 311.

*Teucrium alpinum inodorum, magno flore. Baub. pin. 247. prodr. 116. Burf.*  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ. 2*

*indica.*

10. SCUTELLARIA foliis subovatis crenatis petiolatis, florum racemis nudiusculis.

*Habitat in China.*

*Planta minor; Folia suborbiculata, subovata, obsolete serrata, petiolata. Racemus terminalis. Bracteis linearibus, brevissimis. Calyces brevissimi absque tubo oris. Corollæ angustæ, longiusculæ.*

*altissima.*

11. SCUTELLARIA foliis cordato-oblongis acuminatis ferratis, spicis subnudis.

*Scutellaria orientalis altissima, urticæ folio. Tournef. cor. 11*

*Habitat in Oriente.*

*cretica.*

12. SCUTELLARIA foliis cordatis obtusis obtuseque ferratis, spicis foliosis. *Roy. lugdb. 311.*

*Cassida cretica fruticosa, folio catariæ, flore albo. Tournef. cor. 11.*

*Habitat in Creta:*

## PRUNELLA.

*vulgaris.*

1. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis.

*Prunella bracteis cordatis. Hort. cliff. 316. Fl. suec. 498. Mat. med. 309. Roy. lugdb. 314.*

*Brunella major, folio non dissecto. Baub. pin. 260.*

*Brunella. Dod. pempt. 136.*

- grandiflora.* β. *Brunella cærulea, magno flore. Baub. pin. 261. It. gotl. 219. 228.*

*Brunella 1. non vulgaris. Clas. hist. 2. p. 42.*

*laciniata.*

- γ. *Brunella folio laciniato. Baub. pin. 261.*

*Brunella 11. non vulgaris. Clas. hist. 2. p. 43.*

- δ. *Brunella minor alba laciniata. Baub. pin. 261.*

- ε. *Brunella verbenulæ folio, flore cæruleo. Vaill. paris. 22. t. 5. f. 1.*

*Habitat in Europæ pascuis. 2*

*Planta 2 in apricis procumbens, pollicaris; in nemoribus erecta pedalis. β grandiflora in rupium fissuris plerumque nascitur; γ Laciniata tam multa habet in justificatione communia, ut vix videatur distincta.*

- byssopifolia.* 2. PRUNELLA foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessilibus. *Sauv. monsp. 141.*

Bru-

*Brunella hyssopifolia. Baub. pin. 261.*  
*Brunella angustifolia integra hirsutior. Moris. hist. 3.*  
*p. 364. f. 11. t. 5. f. 7.*  
*Habitat Monspeli. 2*

3. PRUNELLA bracteis pinnato-dentatis ciliatis. *Læst. lusitanica. descr. 31.*

*Prumella odorata lusitanica, flore violaceo. Barr. ic. 561.*  
*Clinopodium lusitanicum spicatum & verticillatum.*  
*Tournef. inst. 195.*  
*Bugula odorata lusitanica. Comm. canad. 46. Moris. hist.*  
*3. p. 391. f. 11. t. 5. f. 4.*  
*Habitat in Lusitania, Hispania.*

PRASIUM.

1. PRASIUM foliis ovato-oblongis ferratis. *Hort. cliff. majus. 309. Hort. upf. 173.*

*Lamium arboreum perenne creticum. Zan. hist. 112.*  
*t. 46. Raj. hist. 561.*

*Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucris facie, flore albo. Moris. hist. 3. p. 408. f. 11. t. 21. f. 3.*

*Teucrium fruticans, amplo & albo flore, italicum. Barr. ic. 895.*

*Habitat in Sicilia, Romæ & in agro Tingitano. 5*

2. PRASIUM foliis ovatis crena utrinque duplici. *Hort. minus. cliff. 309. \**

*Lamium fruticans, teucris folio lucido, calyce & flore magno candido: tantilla purpura varie notato. Cyp. catbol. 106.*

*Habitat in Sicilia. 5*

*An hæc sufficiens specie a priori distincta ulterius indagandum.*

PHRYMA.

1. PHRYMA. *Gen. nov. 1092.*

*Leptostachya*

*Leptostachya. Mitch. gen. 9.*

*Verbena racemo simplicissimo, floribus sessilibus, calycibus fructus reflexis racemoque appressis. Gron. virg.*

*7. Roy. lugdb. 536.*

*Habitat in America septentrionali.*

## ANGIOSPERMIA.

## BARTSIA.

- coccinea.* 1. *BARTSIA* foliis alternis linearibus utrinque bidentatis.  
*Bartsia* foliis alternis. *Hort. cliff.* 235. *Gron. virg.* 68.  
*Amæn. acad.* 1. p. 160.  
*Pedicularis* f. cristæ galli affinis virginiana, ajugæ multifo-  
 lio: apicibus coccineo, floribus pallidis in spi-  
 cam congestis. *Pluk. alm.* 283. t. 102. f. 5. *Raj.*  
*suppl.* 400.  
*Horminum*, tenui coronopi folio, virginianum. *Morif.*  
*hist.* 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 28.  
*Habitat in* Virginia, Noveboraco. 2
- pallida.* 2. *BARTSIA* foliis alternis lanceolatis integerrimis, flo-  
 ralius ovatis dentatis.  
*Bartsia* foliis alternis bidentatis. *Amæn. acad.* 2. p. 356. \*  
*Habitat in* Sibiria *D. Gmelin. Demidoff.*
- viscosa.* 3. *BARTSIA* foliis superioribus alternis serratis, floribus  
 lateralibus.  
*Euphrasia latifolia* viscata ferrata. *Morif. blas.* 264.  
*Euphrasia major* lutea latifolia palustris. *Raj. hist.* 772.  
*angl.* 3. p. 285.  
*Euphrasia lutea* palustris. *Pluk. alm.* 142. t. 27. f. 5.  
*Euphrasia lutea latifolia* palustris. *Morif. hist.* 3. p. 437.  
*Alectorolophos italica* luteo-pallida. *Burr. rar.* 209. t.  
 665.  
*Habitat in* Angliæ, Galliæ, Italiæ paludibus ad rivulos. ☉
- alpina.* 4. *BARTSIA* foliis oppositis cordatis obtuse serratis. *Hort.*  
*cliff.* 325. *Fl. suec.* 515. *Roy. lngdb.* 298.  
*Euphrasia caule simplici*, foliis cordatis sessilibus obtuse  
 serratis. *Fl. lapp.* 246.  
*Clinopodium alpinum* hirsutum. *Bauh. pin.* 225. *Pluk.*  
*alm.* 110. t. 163. f. 5.  
*Clinopodium alpinum*. *Pon. bald.* 343.  
*Teucrium alpinum*, coma purpureo-cærulea. *Bauh. pin.*  
 247.  
*Stachelina.* *Hall. helv.* 624.  
*Habitat in* Alpibus Lapponicis, Helveticis, Allobrogi-  
 cis, Baldo, Vallicis. 2
- Trixago.* 5. *BARTSIA* foliis oppositis lanceolatis obtuse serratis.  
*Trixago apula* unicaulis. *Colum. ecphr.* 1. p. 199. *Mo.*  
*ris. hist.* 3. p. 427. f. 11. t. 2. 4. f. 8.  
 Chamæ-

*Chamædrys unicaulis spicata. Bauh. pin. 248.*

*Antirrhinum folio dissecto. Bauh. pin. 211.*

*Habitat in Italiæ maritimis, humentibus. ☉*

## RHINANTHUS.

1. RHINANTHUS corollis labio superiore subulato *orientalis*, incurvo

*Elephas orientalis, flore magno probosceide incurva.*

*Tournef. cor. 48. itin. 2. p. 299. t. 299.*

*Habitat in Oriente.*

*Calyx quadrifidus: lacinia prima (sub rostro corollæ) ovataq; lateralibus utrinque reflexis; quarta, recta obtusa.*

2. RHINANTHUS corollis labio superiore subulato re- *Elephas*,  
cto. *Roy. lugdb. 298.*

*Elephas italica, flore magno probosceide surrecta. Tournef. cor. 48.*

*Elephas campoclarensum. Col. ecphr. 1. p. 186. t. 188.*

*Euphrasia lutea, floribus elephantis caput cum probosceide referentibus. Moris. hist. 3. p. 432. f. 11. t. 24. f. 14.*

*Scordio affinis Elephas ob florem. Bauh. pin. 248.*

3. *Elephas orientalis, flore parvo, probosceide surrecta.*

*Tournef. cor. 48. itin. 3. p. 54. \**

*Habitat in umbrosis Italiæ. ☉*

*Habitus precedentis, at Flos diversus calyce trifido: lacinii duabus reflexis: tertia majore erecta, plicata, acuta.*

3. RHINANTHUS corollarum labio superiore com- *Crista galli*,  
presso brevior. *Fl. lapp. 248. Fl. suec. 503. Hort. cliff. 325. Roy. lugdb. 298.*

*Pedicularis pratensis lutea f. Crista galli. Bauh. pin. 163.*

- β. *Crista galli angustifolia montana. Bauh. pin. 163. prodr. 86.*

- γ. *Crista galli mas. Bauh. hist. 3. p. 436.*

*Habitat in Europæ pratis. ☉*

4. RHINANTHUS foliis substanceolatis pilosis integer- *indica*,  
rimis. *Fl. zeyl. 238,*

*Hyslopus zeylanicus tenellus pratensis. Burm. zeyl. 122.*

*Habitat in Zeylona.*

5. RHINANTHUS corollis fauce patente, foliis sinua- *virginica*,  
to dentatis. *Gron. virg. 168. †*

*Habitat in Virginia.*

EU.

## EUPHRASIA.

- latifolia.* 1. EUPHRASIA foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis.  
 Euphrasia foliis ovatis, floribus spicatis. *Sauv. monsp.* 139.  
 Euphrasia purpurea minor. *Bauh. pin.* 111. *Magn. monsp.* 95. t. 94.  
 Euphrasia pratensis latifolia italica. *Bauh. pin.* 234.  
*Morif. hist.* 3. p. 430. f. 11. t. 24. f. 8.  
 Euphrasia tertia latifolia pratensis. *Col. ecphr.* 200. t. 202. f. 2.  
*Habitat in Apulia, Italia, Monspeli.* ☉
- officinalis.* 2. EUPHRASIA foliis ovatis argute dentatis. *Fl. lapp.* 247. *Fl. suec.* 516. *Mat. med.* 315. *Roy. lugdb.* 299. *Hall. belv.* 628.  
 Euphrasia caule ramoso, foliis ovatis acute dentatis. *Hort. cliff.* 325.  
 Euphrasia officinarum. *Bauh. pin.* 233.  
 Euphrasia minor. *Dill. app.* 53.  
 Euphrasia. *Cam. epit.* 767.  
*Habitat in Europæ pascuis aridis.* ☉
- tricuspidata* 3. EUPHRASIA foliis linearibus\*tricuspidatis.  
 Euphrasia angustis & tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis. *Pluk. alm.* 142. t. 177. f. 1. *Zan. hist.* 110. t. 76.  
*Habitat in Italia.* ☉
- Odontites.* 4. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus ferratis. *Hort. cliff.* 346. *Fl. suec.* 517. *Roy. lugdb.* 299.  
 Euphrasia pratensis rubra. *Bauh. pin.* 234.  
 Euphrasia altera. *Dod. pempt.* 55.  
 β. Euphrasia sylvestris major purpurea latifolia. *Col. ecphr.* 1. p. 201. t. 202. f. 1.  
*Habitat in Europæ arvis pascuisque sterilibus.* ☉
- Intea.* 5. EUPHRASIA foliis linearibus ferratis: superioribus integerrimis.  
 Euphrasia pratensis lutea. *Bauh. pin.* 234. *Morif. hist.* 3. p. 432. f. 11. t. 24. f. 16.  
 Euphrasia lutea montana angustifolia major altera. *Col. ecphr.* 1. p. 204. t. 203.  
*Habitat in Europa australi.* ☉
- finifolia.* 6. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus integerrimis.  
 Euphrasia foliis linearibus. *Sauv. monsp.* 138.

Eu-



*Euphrasia foliis lini angustioribus. Bauh. pin. 234.*

*Euphrasia linifolia. Col. ecphr. 2. p. 68. t. 69.*

*Habitat in Italia, Helvetia, Gallia. ☉*

## MELAMPYRUM.

1. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus compa-*cristatum.*  
ctis obtusis imbricatis. *Fl. suec. 510.*

*Melampyrum luteum angustifolium. Bauh. pin. 234.*

*Melampyrum luteum, linearæ folio. Bauh. prodr. 112.*

*Melampyrum angustifolium cristatum. Pluk. alm.*

*249. t. 99. f. 2.*

*Habitat in Europæ borealis pratis asperis. ☉*

2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis laceris. *Fl. suec. arvense.*  
*511.*

*Melampyrum foliis laciniatis laxè spicatis. Roy. lugdb.*

*298.*

*Melampyrum purpurascens coma. Bauh. pin. 234.*

*Triticum vaccinum. Dod. pempt 541.*

*Melampyrum lanuginosum bæticum. Bauh. pin. 234.*

*Habitat in Europæ agris. ☉*

3. MELAMPYRUM bracteis cordato-lanceolatis: sum-*nemorosum.*  
mis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Fl. suec. 512.*

*Melampyrum coma cærulea. Bauh. pin. 234.*

*Parietaria sylvestris 1. Clus. hist. 2. p. 44.*

*Habitat in Europæ borealis nemoribus. ☉*

4. MELAMPYRUM florum conjugationibus remotis, *pratense.*  
corollis clausis. *Fl. suec. 513.*

*Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis.*

*Fl. lapp. 240.*

*Melampyrum luteum latifolium. Bauh. pin. 243.*

*Habitat in Europæ borealis pratis ficcis. ☉*

5. MELAMPYRUM corollis hiantibus. *Fl. suec. 514. sylvaticum.*

*Melampyrum floribus spartis sessilibus binatis, foliis om-  
nibus indivisis. Hall. helv. 627.*

*Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis. Cels.*

*aps. 32. Fl. lapp. 240.*

*Habitat in Europæ borealis sylvis. ☉*

*Differt a præcedente corollis dimidio brevioribus, limbo  
hiantibus.*

## LATHRÆA.

1. LATHRÆA caule ramoso subterrestri, floribus ere-*Clandestina.*  
ctis. *La-*

*Lathræa* foliis cordatis, floribus fasciculatis. *Guett. stamp.* 454. *Dalib. parif.* 191.

*Clandestina* flore subcæruleo. *Tournef. inst.* 652.

*Dentaria* aphyllis, flore purpureo. *Raj. hist.* 1230.

*Orobanche montana*. *Rudb. elyf.* 2. p. 233. f. 14.

*Orobanche* flore majore ex cæruleo-purpurafcente.

*Bauh. pin.* 87. *prodr.* 31. *Burs. III:* 155. *Rudb. elyf.* 2. p. 229. f. 2. *Raj. hist.* 1227. *Morif. hist.* 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 15.

*Orobanche* f. *Dentaria* aphyllis purpurea, cespite denso.

*Morif. hist.* 3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 15.

*Planta clandestina*, f. *Madrona*. *Dalech. hist.* 960.

β. *Clandestina*, *Madronna*, *Occulta*. *Borel. obs.* 38.

*Habitat in umbrosis* Galliæ, *Pyrenæorum*, *Italiae*. &

*Caulis infra terram corymbosus, ut fructificationes solæ supra terram emineant solitarie in singulo ramo.*

*Phelypæa*. 2. *LATHRÆA* corollis campanulato-patentibus.

*Phælypæa lusitanica*, flore luteo. *Tournef. cor.* 47.

*Orobanche* elegantissima verna, flore luteo. *Griff. inst.*

*Morif. hist.* 3. p. 502. \*

β. *Orobanche* orientalis, flore coccineo. *Tournef. cor.* 47.

*Habitat in Lusitaniæ umbrosis*. &

*Anblatum*. 3. *LATHRÆA* corollarum labiis indivisis. †

*Anblatum* orientale, flore purpurafcente. *Tournef. cor.* 48.

*Habitat in Oriente*. &

*Squamaria*. 4. *LATHRÆA* caule simplicissimo, corollis pendulis:

labio inferiore trifido. *Fl. succ.* 518. *Dalib. parif.* 191.

*Orobanche*, radice dentata, major. *Bauh. pin.* 88.

*Orobanche* radice squamata, foliis rotundis, flore pendente & suave rubente, fundboensis. *Rudb. elyf.* 2. p. 234. f. 17.

*Orobanche* radice dentata altius radicata, foliis & floribus albo purpureis. *Mentz. pug.* 1. 3. f. 3. *Morif. hist.* 3. p. 503. f. 12. t. 16. f. 14.

*Habitat in Europæ frigidioris umbrosissimis*. &

## \* SCHWALBEA.

*AMERICANA*. 1. *SCHWALBEA*. *Gron. virg.* 71. \*

*Euphrasia* major mariana, floribus spicatis amplis: tubis longioribus: summis oris profunde incis. *Pluk. mant.*

73. t. 348. f. 2. ?

*Habitat in America septentrionali.*

TOZ-

TOZZIA.

1. TOZZIA.

Tozzia alpina lutea, alfine folio, radice squamata. <sup>alpina.</sup>  
*Mich. gen.* 20. t. 16.

Euphrasia lutea alfinefolia, radice squamata. *Bauh. pin.*  
 234. *prodr.* 111. *Schz. fl.* 14.

Dentaria buguloides, radice globosa: squamulis myon-  
 toideis, alpina. *Mentz. pug.* t. 9. f. 3. 4.

Orobanche buglossoides, radice rotunda, squamulis  
 myontoideis, alpina. *Morif. hist.* 3. f. 12. t. 16. f. an-  
 tepenult.

Anonyma f. gregorii, radice dentariæ. *Col. ecphr.* 2. p.  
 49. t. 50.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Italicis, Py-  
 renæis, locis asperis, humidis. &*

PEDICULARIS.

\* *Caule ramoso.*

1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus calloso-<sup>palustris.</sup>  
 punctatis, corollis labio obliquis. *It. w-goth.* 40. *Mat.*  
*med.* 314.

Pedicularis caule ramoso erecto, calycibus bifidis cre-  
 natis. *Hall. belv.* 621. *Fl. suec.* 505.

Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist.* 700.

Pedicularis danica maxima. *Lob. illust.* 147.

*Habitat in Europæ septentrionalis paludibus. ☉*

2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis <sup>sylvatica.</sup>  
 angulatis lævibus, corollis labio cordato. *It. w-goth.*  
 40.

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, calycibus  
 quinquefidis. *Fl. suec.* 504.

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Fl.*  
*lapp.* 241. *Hort. cliff.* 326.

Pedicularis pratensis purpurea. *Bauh. pin.* 163.

Fistularia. *Dod. pempt.* 556.

*Habitat in Europæ sylvis paludosis. ☉*

3. PEDICULARIS caule subramoso, corollis galea ro-<sup>rostrata.</sup>  
 strato-acuminatis, calycibus subhirsutis.

Pedicularis alpina, foliis alternis: pinnulis incisis, flori-  
 bus sparsis rostratis purpureis. *Hall. belv.* 621. t. 16.  
 f. 1.

Pedicularis alpina, filicis folio, minor. *Bauh. pin.* 163.  
 Ale-

*Alectorolophus alpina* 3 minor. *Clus. hist.* 2. p. 210.  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ.*

\* *Caule simplicissimo.*

*Sceptrum  
 Carolin.*

4. *PEDICULARIS* caule simplici, floribus terno-verticillatis, corollis clausis, calycibus crenatis, capsulis regularibus. *Fl. suec.* 506.

*Pedicularis capsulis subrotundis regularibus. Roy. lugdb.* 299.

*Pedicularis alpina*, folio ceterach. *Helv. flor.* 39. t. 39.

*Sceptrum carolinum. Rndb. it.* 1. p. 1. *Fl. lupp.* 243. t. 4. f. 4. *Hort. cliff.* 326.

*Habitat in Sueciæ, Borussia, Rutheni spongiosis, sylvaticis, riguis. &*

*Scapus nudus. Spica interrupta ex Verticillis trifloris, foliolo exceptis. Corolla non bians. Folia pinnatifida, crenata.*

*verticillata.*

5. *PEDICULARIS* caule simplici, foliis quaternis.

*Pedicularis alpina*, floribus purpureis spicatis, foliis pinnatis verticillatis. *Hall. belv.* 623. t. 17. f. 1.

*Alectorolophus alpina* 2, floribus purpureis. *Clus. hist.* 2. p. 210.

*Filipendula montana altera. Bauh. pin.* 163:

*Habitat in Sibiria, Helvetia, Austria. &*

*resupinata.*

6. *PEDICULARIS* caule simplici, foliis lanceolatis serratis crenulatis, floribus resupinatis.

*Habitat in Sibiria D. Gmelin, D. Demidoff.*

*Caulis pedalis, levis, simplicissimus. Folia lanceolata, indivisa, profunde serrata serraturis crenulatis, alterna. Flores ex alis superioribus solitarii, sessiles. Calyx levis, obtusus, bifidus, integer. Corolla saturatissime purpurea, resupinata: Galea adunca, compressa; Vexillum amplum, rotundatum.*

*recutita.*

7. *PEDICULARIS* caule simplici, staminibus floris galea longioribus.

*Pedicularis alpina*, foliis alternis pinnatis, floribus ex atrorubentibus in spicam densam congestis. *Hall. belv.* 623. t. 16. f. 2.

*Habitat in Helvetiæ summis Alpibus.*

*trifida.*

8. *PEDICULARIS* caule simplici, corollarum galeis margine villosis.

*Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis: pinnulis obtusis acute serratis. Gmelin.*

*Habitat in Sibiria.*

Cau-

*Caulis simplicissimus, spithameus. Folia alterna, pinnatifida, serrulata. Flores in spicam s. capitulum congesti. Corollæ obtusa, flavæ; galea parum incurva, margine villosa.*

9. **PEDICULARIS** caule simplici, foliis pinnatis retro-flammæ imbricatis.

*Pedicularis caule simplici, foliis semipinnatis obtusis: lacinii imbricatis crenatis.. Fl. lapp. 244. t. 14. f. 2. Fl. succ. 509.*

*Pedicularis caule erecto non ramoso, pinnis foliorum retroversis imbricatis. Hall. helv. 622.*

*Pedicularis alpina, folio ceterach. Bauh. pin. 163.*

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. 2*

10. **PEDICULARIS** caule simplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calycibus hirsutis.

*Pedicularis caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. Fl. lapp. 245. t. 4. f. 3. Fl. succ. 508.*

*Habitat in Lapponiæ Alpibus.*

11. **PEDICULARIS** caule simplici, foliis pinnatis serratis, calycibus rotundatis glabris, corollis galea uncinatis acutis.

*Habitat in Sibiria.*

*Folia Radicali apinnata, pedalia; pinnis pinnatifidis, serratis. Caulina pinnatifida fere ad basin, serrata. Caulis levis, plusquam pedalis, Foliis alternis. Spica nuda, Calycibus semiglobosis, quinquedentatis, glabris. Corolla incarnata: Galea falcata & uncinata, acuta, valde adunca.*

12. **PEDICULARIS** caule simplici, foliis pinnatifidis lapponica serratis, calycibus bifidis obtusis.

*Pedicularis caule simplici, foliis lanceolatis semipinnatis serratis acutis. Fl. lapp. 242. t. 4. f. 1. Fl. succ. 507. Hort. cliff. 326. Roy. Ingdb. 299.*

*Habitat in Alpibus Lapponicis frequens. 2*

13. **PEDICULARIS** caule simplici, spica foliosa, corollis galea acutis emarginatis, calycibus quinquedentatis.

*Pedicularis foliis alternis: pinnis pinnatis, foliis ex spica florigera longe eminentibus. Hall. helv. 623. t. 17 f. 2*

*Pedicularis alpina, filicis folio, major. Bauh. pin. 163.*

*Habitat in Alpibus Helveticis. 2*

*Calyx 5dentatus, tubulosus, integerrimus, parum pilosus.*

Corolla labio superiore acuto, sed emarginato: dentibus duobus, acutis, nutantibus.

*tuberosa.*

14. PEDICULARIS caule simplici, calycibus crenatis corollis galea rostrato-aduncis.

Pedicularis alpina, foliis alternis pinnatis: pinnulis pinnatis, floribus ochroleucis rostratis in spicam congestis Hall. helv. 620. t. 15. Sauv. monsp. 247.

Filipendula montana, flore pediculariæ. Baub. pin. 163.

Alectorolophus montana, flore luteo. Barr. ic. 469.

Bocc. masf. 315. t. 8.

Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis. 2

### GERARDIA.

*tuberosa.*

1. GERARDIA foliis subovatis tomentosis repandis, longitudine caulis.

Gerardia humilis, bugulæ foliis, asphodeli radice. Plum gen. 31.

Habitat in America calidiore.

*purpurea.*

2. GERARDIA foliis linearibus, Digitalis foliis linearibus, floribus remotis. Gron. virg. 169.

Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis angustis. Banist. virg. 1926. Gron. virg. 72. \*

Digitalis virginiana rubra, foliis & facie antirrhini vulgaris. Pluk. mant. 65. t. 388. f. 1.

Habitat in Virginia, Canada. ☉

Caules pedales, filiformes, simplicissimi aut brachiati læves. Folia linearia, integerrima, opposita, sæpe & alterna. Flores oppositi: Pedunculis unifloris, filiformibus, aut sessiles. Calyces læves, parvi, campanulati, quinquedentati. Corollæ saturatissime purpureæ aut rotatæ aut campanulatæ aut tubulosæ. Sic variat corollæ figura.

*flava.*

3. GERARDIA foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule simplicissimo.

Anonymos floribus flavis speciosis digitali æqualibus Gron. virg. 74.

Digitalis lutea elatior, jaceæ nigræ foliis. Banist. virg. 1926. Pluk. mant. 64. t. 368.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis pedalis s. altior. Folia opposita, lanceolata, subpetiolata (Lycopi aut jaceæ), basi incisapinnatisimibus patulis. Spica terminalis, laxa, ex Florib. oppo

# DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 611

*oppositis, magnis, flavis. Antheræ in duas spinas deorsum tendentes. Stamen quintum deest.*

4. GERARDIA foliis oblongis duplicato-ferratis, caule *pedicularia* paniculato, calycibus exenatis.

*Pedicularis* foliis lanceolatis pinnatifidis ferratis, floribus pedunculatis. *Gron. virg.* 68.

*Digitalis*, verbesinæ foliis e regione binis, americana, capsularum apicibus longissimis filamentis donata. *Pluk. mant.* 64.

*Digitalis mariana*, filipendulæ folio. *Raj. suppl.* 397.

*Habitat in* Virginia, Canada.

Corollæ extus pubescentes, oblongæ. Calycis dentes crenati; exsiccatione nigra evadit, ut *Pedicularis*; sed folia opposita & corollæ patulæ.

5. GERARDIA foliis ovatis ferratis, bracteis linearibus *glutinosa*, hispidis.

*Habitat in* China

Caulis teretiusculus, erectus; ramis brevioribus. Folia opposita, petiolata, ovata, acuta, pollice latiora, profunde ferrata, subvillosa. Racemi terminales, solitarii ex floribus oppositis brevissime pedunculatis. Calycēs acuti, 5 partiti, lacinia superiore majore. Bractea filiformis una alterave calyci adjacet ejusdem longitudo, pilis glutinosis, uti calyx hispida.

## CHELONE.

1. CHELONE foliis lanceolatis ferratis: summis opposi-*glabratis*. *Hort. cliff.* 493. *Gron. virg.* 70.

*Chelone acadiensis*, flore albo. *Tournef. act.* 1706.

- β. *Digitalis mariana*, persicæ folio. *Raj. suppl.* 397.

*Digitalis mariana*, ferratis densioribus rigidis & angustis foliis, femine fegopyri triquetro. *Pluk. mant.* 64. s: 348. f. 3.

*Habitat in* Virginia, Canada. &

2. CHELONE caule foliisque hirsutis:

*Anonymos* flore pallide cæruleo digitalis instar in summis caulibus disposito; foliis villosis acuminatis. *Gron. virg.* 71.

*Digitalis virginiana*, panacis colonii foliis, flore amplo pallescente. *Pluk. mant.* 64.

*Digitalis* flore pallido transparenti; foliis & caule molli hirsutie imbutis. *Banist. virg.* 1928.

*Habitat in* Virginia.

*Huic stamen quintum longum cum Anthera villosissima*  
*D. Jussieu.*

*Pentstemon.* 3. CHELONE foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma.

*Pentstemon. Mitch. gen. 14.*

*Habitat in Virginia.*

*Caulis herbaceus, brachiatus. Folia ovato-lanceolata, opposita, amplexicaulia, denticulata, acuminata, utrinque viridia. Caules et Ramuli terminantur pedunculo dichotomo. Calyces quinquepartiti. In prima dichotomia flores communiter bini, propriis pedicellis.*

### GESNERIA.

*humilis.* 1. GESNERIA foliis lanceolatis serratis sessilibus, pedunculis ramosis multifloris.

*Gesneria humilis, flore flavescente. Plum. gen. 27.*

*Habitat in America australi.*

*tomentosa.* 2. GESNERIA foliis lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Hort. cliff. 318.*

*Gesneria amplo digitalis folio tomentoso. Plum. gen. 27.*

*Digitalis folio oblongo serrato, ad foliorum alas florida.*

*Sloan. jam. 60. hist. 1. p. 162. t. 104. f. 2. Raj. suppl. 396.*

*Habitat ad Jamaicæ ripas. b*

### ANTIRRHINUM.

*\* Foliis angulatis.*

*Asarina.* 1. ANTIRRHINUM foliis oppositis cordatis crenatis. *Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 295.*

*Hedera saxatilis, magno flore. Bauh. pin. 306.*

*Asarina f. Hederula saxatilis. Lob. ic. 601.*

*Habitat in rupibus Vegano conterminis Genevæ.*

*Cymbalaria.* 2. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis. *Hort. cliff. 32. Hort. ups. 175. Roy. lugdb. 295. Guett. stamp. 2. p. 210. Gort. gelr. 358.*

*Cymbalaria. Bauh. pin. 306. Cam. epit. 860. Dalech. hist. 1322.*

*Habitat in rupibus & muris antiquis Basileæ, Parisiis, Harlemi. ☉*

*Elatine.* 3. ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caule flacido. *Hort. cliff. 323. Hort. ups. 175. Gron. virg. 68. Roy. lugdb. 295.*

*Elati-*



Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo.

*Bauh. pin.* 253.

Elatine. *Cam. epit.* 754.

β. Elatine folio acuminato, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 253.

*Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis.* ☉

4. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caule flacci-<sup>*spurius*</sup>

do. *Hort. upf.* 175. *Hort. cliff.* 323. *Roy. lugdb.* 295.

Elatine folio subrotundo. *Bauh. pin.* 253.

Veronica femina. *Dod. pempt.* 42.

*Habitat in Germaniæ, Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis.* ☉

5. ANTIRRHINUM foliis hastatis, caule erecto ramo-<sup>*egyptiacum*</sup>

fissimo.

Linaria memphitica pumila, hastato folio tricuspidi, flore luteo. *Lipp.*

*Habitat in Ægypto.*

\* *Foliis oppositis.*

6. ANTIRRHINUM foliis ternis ovatis. *Hort. cliff.* <sup>*triphyllum*</sup>  
324. *Hort. upf.* 174. *Roy. lugdb.* 295. *Sauv. monsp.*  
165.

Linaria triphylla minor lutea. *Bauh. pin.* 212.

Linaria hispanica. *Clus. hist.* 1. p. 320.

β. Linaria triphylla cærulea. *Bauh. pin.* 312.

*Habitat in umbris montibus Valentinis & Hyblæis circa*

Syracusas. ☉

7. ANTIRRHINUM foliis quaternis lanceolatis, caule <sup>*erionitho-*</sup>  
erecto ramoso, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 324. <sup>*phorum*</sup>  
*Roy. lugdb.* 296.

Linaria americana maxima, purpureo flore. *Herm. lugdb.*

376. *Raj. bist.* 1884.

Linaria, flore purpureo, americana. *Riv. mon.* 81.

*Habitat in Lusitania, America.*

8. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis sparsis: inferioribus <sup>*triste*</sup>  
oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus.

*Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 296.

Linaria tristis hispanica. *Dill. clth.* 201. t. 164. f. 199.

*Habitat in Gibraltariæ.*

9. ANTIRRHINUM foliis quaternis linearilanceolatis. <sup>*purpureum*</sup>

Antirrhinum foliis quaternis linearilanceolatis, caule florifero erecto spicato. *Hort. upf.* 174.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis, nectariis subulatis recurvis, floribus laxè spicatis. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 296.

Li-

*Linaria purpurea major odorata. Bauh. pin. 213.*

*Linaria altera purpurea. Dod. pempt. 183.*

*Habitat ad radices Vesuvii.*

*bipunctatum* 10. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, floribus in summitate caulis confertis parvis. *Guet. stamp. 2. p. 205?*

Antirrhinum erectum, foliis linearibus: imis verticillatis, pauciflorum. *Sauv. monsp. 165.*

*Linaria lutea parva annua. Bauh. hist. 3. p. 457.*

*Habitat in Hispania. Læsing.*

*Caulis spithameus, Ramis strictis ad angulum rectum excurrentibus. Folia lanceolata, sessilia, plana, patentia, vix carnosa, fere levia: inferiora quaternis. Flores subspicati, pauci, sessiles. Corollæ flavæ, punctis duobus fulvis in palato glabro versus labium superius; Labium superius bipartitum, replicatum, lanceolatum, erectum.*

*repens.*

11. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferne quaternis, calycibus capsulæ æqualibus.

Antirrhinum foliis linearibus alternis sæpius oppositis acuminatis, floribus laxè spicatis. *Roy. lugdb. 296.*

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycinis laciniis capsulæ æqualibus. *Guet. stamp. 2. p. 204. Dalib. parif. 186.*

*Linaria angustifolia, flore cinereo striato. Dill. elth. 198. t. 163. f. 197.*

*Habitat in Anglia, Gallia. &*

*arvensis.*

12. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus: inferioribus verticillatis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto, *Hort. ups. 174.*

Antirrhinum foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. *Roy. lugdb. 297.*

*Linaria arvensis cerulea. Bauh. pin. 213. prodr. 107. Dill. elth. 199. t. 163. f. 198.*

β. *Linaria pumila, foliolis carnosis, flosculis minimis flavis. Bauh. pin. 213.*

γ. *Linaria quadrifolia lutea. Bauh. pin. 213.*

*Linaria tetraphylla lutea. Col. ecphr. 1. p. 299. t. 300. f. 1.*

*Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ arvis. ☉*

*Flores spicati sunt.*

13. ANTHIRRHINUM foliis caulinis lanceolato-linearibus, radicalibus rotundis ternis. *Gnest. num stamp. 2. p. 204. Dalib. parif. 186.*  
 Anthirrhinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis sæpe ternis. *Sauv. monsp. 166.*  
 Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Vaill. parif. 118. Magn. monsp. 159.*  
 Linaria cærulea minor. *Lob. illustr. 103.*  
 Linaria cærulea calcaribus longis. *Bauh. hist. 3. p. 461.*  
*Habitat in Gallia.*
14. ANTIRRHINUM foliis oppositis lanceolatis, floribus laxè racemosis. *Roy. lugdb. 297. origanifolia. um.*  
 Anthirrhinum saxatile, foliis terpilli. *Bauh. pin. 212. prodr. 106. Burf. X: 7.*  
 Linaria folio crasso origani minore, floribus variegatis ex pallido & cæruleo rubefcente. *Borrh. lugdb. 1. p. 232.?*  
*Habitat Massiliæ in muris vetustis, inque Pyrenæis major. ☉*  
*An hoc varietas A. minoris?*
15. ANTIRRHINUM foliis quinis linearibus. *Hort. multicaule. cliff. 324. Roy. lugdb. 296.*  
 Linaria ficula multicaulis, molliginis folio. *Bocc. sic. 38. t. 19. f. 1.*  
*Habitat in Sicilia. 2*  
 Caules jancei, laxi, debiles. Folia linearia, obtusa.
16. ANTIRRHINUM foliis subquaternis linearibus, *alpinum.* caule diffuso, floribus racemosis. *Roy. lugdb. 297. Sauv. monsp. 165.*  
 Linaria quadrifolia supina. *Bauh. pin. 213.*  
 Linaria 3 stiriacæ. *Clus. hist. 1. p. 322.*  
 β. Linaria cærulea repens. *Bauh. pin. 213.*  
 γ. Linaria foliis carnosis cinereis. *Bauh. pin. 213. ex Hall.*  
*Habitat in Helvetia, Austria, Baldo.*
- \* Foliis alternis.
17. ANTIRRHINUM foliis linearibus acuminatis 2'-supinum. ternis, floribus racemosis, caule diffuso. *Roy. lugdb. 296. Dalib. parif. 186. Sauv. monsp. 48.*  
 Linaria pumila supina lutea. *Bauh. pin. 213.*  
 Linaria hispanica 5. *Clus. hist. 1. p. 321.*  
*Habitat in Gallia, Hispaniæ arenosis.*

*dalmaticum.* 18. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis alternis, caule fruticoso.

*Linaria latifolia dalmatica*, magno flore. *Baub. pin.* 212. *prodr.* 106.

*Linaria maxima*, folio lauri. *Baub. hist.* 3. p. 458.

*Habitat in Creta.* 5

*hirtum.* 19. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis hirtis alternis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo. *Læfl.*

*Habitat in Hispania.* ☉

Caules aliquot simplices, *spithamæ*, non ramosi. Folia lanceolata (*Lavendule*), alterna. Flores dense spicati, colore & magnitudine *A. Linariæ*. Calycis foliolum superius duplo majus quam reliqua. Capsulæ subrotundæ.

*genistifolium* 20. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata.

*Linaria genistæ* folio glauco, flore luteo. *Herm. par. app.* 9. *Dili. elth.* 202.

*Habitat in Sibiria.* *D. Gmelin.* 2

Caules subdecumbentes vel erectiusculi. Folia alterna, lanceolata, glabra, acuminata, omnino *Genistæ tinctoriæ*. Racemi longi, in paniculam dispositi: Floribus alternis, distantibus, pedicellis longitudine calycis. Calyx quinquepartitus, glaber, acutus, longitudine capsulæ. Corollæ luteæ, magnitudine *A. Linariæ*.

*Linaria.* 21. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 501. *Mat. med.* 313. *Roy. lugdb.* 297.

*Antirrhinum* foliis linearibus sparsis. *Hort. cliff.* 325.

*Antirrhinum* foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. *Guett. stamp.* 2.

p. 203.

*Linaria vulgaris* lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212.

*Oxyris.* *Fachf. hist.* 543. *Cam. epit.* 930.

*Habitat in Europæ ruderatis.* 2

*Palatum villosum fulvum.*

*monsessula-nun.* 22. ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Roy. lugdb.* 297. *Sauv. monsp.* 47.

*Linaria*, capillaceo folio, odora. *Baub. pin.* 213. *prodr.* 106. n. 4.

Li-

*Linaria odorata monspessulana. Bauh. hist. 3. p. 459.*  
*Habitat in Gallia.*

23. ANTIRRHINUM foliis linearilanceolatis alternis, ~~chalepensis~~  
 floribus racemosis, calycibus corolla longioribus,  
 caule erecto. *Roy. lugdb. 296. Hort. upf. 174.*  
*Linaria chalepensis minor erecta, flore albo lineis vio-*  
*laceis. Moris. hist. 3. p. 502. f. 5. t. 35. f. 9.*  
*Linaria annua angustifolia, flosculis albis longis cauda-*  
*tis. Triumf. obs. 87. t. 87. f. 2. Raj. hist. 1884.*  
*Habitat in Italia. ☉*

24. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis alter-  
 nis, caule ramosissimo diffuso. *Hort. cliff. 324. Fl.*  
*lucc. 502. Roy. lugdb. 295.*  
*Antirrhinum arvense minus. Bauh. pin. 212.*  
*Antirrhinum tertium. Cam. epit. 922.*  
*Habitat in glareosis Europæ ☉*

\* *Corollis biantibus aut ecaudatis, foliis alternis*  
*integris.*

25. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus majus.  
 rotundatis. *Hort. upf. 175. Mat. med. 312.*  
*Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus bre-*  
*vissimis, racemo terminali. Vir. cliff. 61. Hort. cliff.*  
*324. n. 4. Roy. lugdb. 294.*  
*Antirrhinum majus alterum, folio longiore. Bauh. pin.*  
*211.*

*Antirrhinum luteo flore. Bauh. pin. 211.*  
*Antirrhinum. Dod. pempt. 182. Lob. ic. 404.*  
*Habitat in Europæ australis maceris, sepibus. ☿*

26. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus co-  
 rolla longioribus. *Hort. upf. 176.*  
*Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flo-*  
*res superantibus. Hort. cliff. 324. Roy. lugdb. 294.*  
*Antirrhinum arvense majus. Bauh. pin. 212.*  
*Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. Dod. pempt. 212.*  
*Habitat in Europæ agris ☿ arvis. ☉*

27. ANTIRRHINUM foliis ovatis serratis, corollis bellidifolium  
 patulis. *Hort. cliff. 498. Roy. lugdb. 295.*  
*Antirrhinum foliis imis spathulatis, summis digitatis.*  
*Sauv. monsp. 67.*  
*Linaria bellidis folio. Bauh. pin. 212. prodr. 106. t.*  
*106.*

*Linaria odorata. Dod. pempt. 184.*

*Habitat in agris inter Lugdunum & Viennam, inter-  
que Lugdunum et Gratianopolin. 2*

- canadense.* 28. ANFIRRHINUM foliis linearibus alternis, corollis hiantibus: labio inferiore explanato.

Antirrhinum caule simplicissimo longissimo, foliis caulinis linearibus; stolonum procumbentium lanceolatis minimis. *Gron. virg. 67.*

*Habitat in Virginia, Canada. ☉*

Radix fibrosa. Caulis erectus, filiformis, pedalis, vix ramosus. Folia alterna, remota, linearia, glabra. Racemus terminalis, rarior: floribus alternis, pedicellatis. Calyx quinquepartitus, acutus. Corollae labium superius breve, reflexum. Lab. inferius magnum, patens, dependens.

29. v. *app. 1197.* CYMBARIA.

- daurica.* 1. CYMBARIA.

Cymbaria daurica pumila incana, linariae folio, magno flore luteo guttato. *Amm. ruth. 47. t. 1. f. 2.*

*Habitat in Dauriae montanis, apricis, saxosis.*

### CRANIOLARIA.

- arctica.* 1. CRANIOLARIA foliis cordatis angulatis. Martynia annua villosa & viscosa, aceris folio, flore albo tubo longissimo. *Ehret. pict. 1. f. 2.*  
*Habitat in America. ☉*

- fruticosa.* 2. CRANIOLARIA foliis lanceolatis dentatis. Gesnera arborescens, amplo flore fimbriato & maculoso. *Plum. gen. 27.*

*Habitat in America calidiore.*

Folia lanceolata, serrata. Pedunculi laterales multiflori. Corolla ablonga, interne punctata margine ciliato.

### MARTYNIA.

- perennis.* 1. MARTYNIA caule simplici, foliis serratis. Martynia foliis serratis. *Hort. cliff. 322. t. 18. \**  
*Habitat in America. 2* *Ups. 176.*

- arctica.* 2. MARTYNIA caule ramoso, foliis angulatis. Martynia foliis dentatis. *Hort. cliff. 312.*  
Martynia annua villosa & viscosa, folio subrotundo, flore magno rubro. *Mart. cent. 42. t. 42. Ehret. pict. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Americae Verae Cruce. ☉*

TO-

TORENIA.

1. TORENIA. *Gen. nov.* 1108. *asiatica.*  
*Hederæ terrestris species. Com. mal.* 35.  
*Kaka-pu. Rheed. mal.* 9, p. 103. t. 53.  
*Habitat in India. Toren.*  
*Variat Foliis glabris & villosis: Floribus majoribus & minoribus.*

BESLERIA.

1. BESLERIA pedunculis ramosis, foliis ovatis, *Mellicifolia.*  
*Besleria melissæ tragi folio. Plum. gen.* 29.  
*Habitat in America.*
2. BESLERIA pedunculis simplicibus confertis, foliis lan- *luteo,*  
*ceolatis.*  
*Besleria, virgæ aureæ foliis, flore luteo, minor. Plum.*  
*gen.* 29.
3. BESLERIA, virgæ aureæ foliis, flore luteo, major. *Plum.*  
*gen.* 29.  
*Habitat in America.*
3. BESLERIA pedunculis simplicibus solitariis, involu- *cristata.*  
*cris pentaphyllis propriis.*  
*Besleria scandens cristata, fructu nigro. Plum. gen.* 29.  
*Habitat in America.*  
*Radix repens. Folia ovata, serrata, petiolata. Peduncu-*  
*li laterales, uniflori, terminati Involucro pentaphyl-*  
*lo: foliolis cordatis, dentatis, sessilibus. Corolla solita-*  
*ria, externe hirsuta. Stamina & Pistilla mire imple-*  
*xa, forte aut Martinicæ aut distincti generis planta.*

SCROPHULARIA.

1. SCROPHULARIA foliis cordatis serratis acutis basi *marilandica,*  
*rotundatis, caule obtusangulo. Hort. nps.* 177.  
*Scrophularia foliis cordatis oppositis, racemo termina-*  
*li. Gron. virg.* 71.  
*Scrophularia marilandica, longo profunde serrato erti-*  
*cæ folio. Raj. suppl.* 396.  
*Habitat in Virginia. &*  
*Affinis maxime sequentis, ut vix distingui mereatur.*
2. SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, *nodosa,*  
*caule obtusangulo.*  
*Scrophularia foliis cordatis, racemo terminali. Hort.*  
*cliff.* 322. *Fl. succ.* 520. *Mat. med.* 310. *Roy. lugdb.*  
*293. Gron. virg.* 71. *Dalib. paris.* 191.

Scro-

*Scrophularia nodosa foetida. Bauh. pin. 235.*

*Scrophularia. Cam. epit. 866.*

*Habitat in Europæ succulentis. 2*

*aquatica.*

3. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. ups. 177. Mat. med. 311.*

*Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus. Guett. stamp. 2. p. 201.*

*Scrophularia aquatica major. Bauh. pin. 235. caule fimbriato. Læf. pruss. 248. t. 73.*

*Scrophularia femina. Cam. epit. 867.*

*Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ humidis. 3*

*auriculata.*

4. SCROPHULARIA foliis cordato-oblongis basi appendiculatis, racemis terminalibus. *Læf.*

*Scrophularia betonica folio. Tournef. inst. 166.*

*Scrophularia aquatica montana mollior. Barr. rar. 189. t. 274.*

*Betonica aquatica septentrionalium. Lob. ic. 533. fig.*

*Habitat in Hispania,*

*Caules vix ramosi, acute tetragoni, nudi. Folia opposita, petiolata, cordata, oblonga, serrata, subtus villosa; infra basin auriculata utrinque Foliolo ovato, parvo, sessili. Racemus terminalis.*

- Scorodonia.* 5. SCROPHULARIA foliis cordatis duplicato-ferratis, racemo composito. *Roy. lugdb. 296.*

*Scrophularia melissæ folio. Tournef. inst. 166.*

*Scrophularia scorodoniæ folio. Pluk. alm. 338. t. 59. f. 5. Raj. hist. 766.*

*Habitat in Lusitania & Jersea insula Angliæ.*

*orientalis.*

6. SCROPHULARIA foliis lanceolato-linearibus acute-ferratis: inferne inciliis, racemo composito. *Roy. lugdb. 294.*

*Scrophularia orientalis, foliis cannabinis. Tournef. cor. 9.*

*Habitat in Oriente.*

*vernalis.*

7. SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. *Hort. cliff. 322. Hort. ups. 177. Roy. lugdb. 293.*

*Scrophularia flore luteo Bauh. pin. 236. prodr. 112. t. 112.*

*Lamium pannonicum 2 exoticum. Clus. hist. 2. p. 38.*

*Habitat in Italia, Helvetia. 3*

- fimbriifolia* 8. SCROPHULARIA foliis difformibus, pedunculis axillaribus aggregatis. *Roy. lugdb. 292.* SCRO-



- Scrophularia foliis laciniatis. Bauh. pin. 236. prodr. 173.*  
*Scrophularia sambucifolia, flore rubro luteo vario pul-*  
*chro. Pluk. alm. 338. t. 313. f. 6.*  
*Scrophularia sambuci foliis, capsulis maximis. Moris.*  
*hist. 2. p. 483. f. 5. t. 8. f. 6.*  
 β. *Scrophularia lusitanica, maximo flore, foliis dissectis.*  
*Raj. suppl. 396.*  
*Habitat in Hispania, Lusitania. ☉*
9. *SCROPHULARIA foliis pinnatis, racemo termina-*  
*li nudo, pedunculis bifidis. Vir. cliff. 61. Hort. cliff.*  
*322. Roy. lugdb. 294. Sauv. monsp. 247.*  
*Scrophularia Ruta canina dicta. Bauh. pin. 236.*  
*Ruta canina. Clus. hist. 2. p. 209. Lob. ic. 2. p. 55.*  
*Habitat in Helvetia, Narbona, Italia. ☉*
10. *SCROPHULARIA foliis cordatis: superioribus al-*  
*ternis, pedunculis axillaribus bifloris. Hort. cliff. 322.*  
*Roy. lugdb. 293. Wuj. 177.*  
*Scrophularia urticæ folio. Bauh. pin. 236.*  
*Scrophularia peregrina. Cam. hort. 157. t. 43.*  
*Habitat in Italia. ☉*
11. *SCROPHULARIA foliis lanceolatis obtusis ferra-*  
*to-dentatis, pedunculis bifidis. Roy. lugdb. 294.*  
*Scrophularia lusitanica frutescens, verbenacæ foliis.*  
*Tournef. inst. 167. Raj. suppl. 396.*  
*Habitat in Lusitania.*
12. *SCROPHULARIA foliis quaternis ovatis, floribus*  
*verticillatis spicatis. Roy. lugdb. 294.*  
*Scrophularia flore coccineo, foliis urticæ quaternis cau-*  
*lem ambientibus. Houst. mss.*  
*Habitat in Vera Cruce.*

### CELSIA.

1. *CELSIA foliis duplicato-pinnatis. Hort. cliff. 321. orientalis.*  
*Hort. upf. 179. t. 11. Roy. lugdb. 301.*  
*Verbascum orientale, sophiæ folio. Tournef. cor. 8. Buxb.*  
*cent. 5. p. 17.*  
*Blattaria orientalis, agrimonix folio. Buxb. cent. 1. p.*  
*14. t. 20.*  
*Habitat in Cappadocia, Armenia. ☉*

### DIGITALIS.

1. *DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis purpurea.*  
*obtusis: labio superiore integro. Hort. upf. 178.*

Di-

## 622 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

*Digitalis foliolis calycinis ovatis. Hort. cliff. 318. Dalib. parif. 192. acuminatis. Roy. lugdb. 292. Gort. gelr. 371.*

*Digitalis purpurea, folio aspero. Bauh. pin. 243.*

*Digitalis purpurea. Dod. pempt. 168.*

β. *Digitalis alba, folio aspero. Bauh. pin. 229.*

*Habitat in Europa australiore. 8*

*lutea.*

2. *DIGITALIS calycinis foliolis lanceolatis, corollis 2-  
cutis: labio superiore bifido. Hort. upf. 178.*

*Digitalis foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis.  
Hort. cliff. 318. Roy. lugdb. 293. Dalib. parif. 192.*

*Digitalis major lutea f. pallida, parvo flore. Bauh. pin. 224.*

*Digitalis lutea, minore flore. Morif. hist. 2. p. 479. f. 5. t. 8. f. 5.*

*Habitat in Galliæ, Italiæ sabulosis. 2*

*ferruginea.*

3. *DIGITALIS calycinis foliolis ovatis obtusis, corollæ labio inferiore longitudine floris.*

*Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis, corollis villosis: labio longissimo. Buttn. canon. 226.*

*Digitalis foliolis calycinis ovatis obtusis. Roy. lugdb. 292.*

*Digitalis angustifolia, flore ferrugineo. Bauh. pin. 244. Riv. mon. 98.*

*Digitalis latifolia, flore ferrugineo. Morif. hist. 2. p. 478. f. 5. t. 8. f. 2. 3.*

*Digitalis lutea non ramosa, scorzonæræ folio. Buxb. cent. 5. p. 25. t. 49.*

*Habitat in Italia, Constantinopoli. 2*

*canariensis.*

4. *DIGITALIS calycinis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso.*

*Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo terminali laxè spicato. Hort. cliff. 318.*

*Digitalis acanthoides canariensis frutescens, flore aureo. Comm. hort. 2. p. 105. t. 53.*

*Digitali affinis canariensis, solidaginis acutis foliis leviter pilosis, flore aureo cucullato. Pluk. alm. 400. t. 325. f. 2.*

*Habitat in Canariis. 5*

## BIGNONIA.

*Catalpa.*

1. *BIGNONIA foliis simplicibus cordatis, caule erecto, floribus diandris.*

*Bignonia foliis simplicibus cordatis. Hort. cliff. 317. Roy. lugdb. 289.*

*Bigno-*

*Bignonia urucu* foliis, flore sordide albo intus maculis purpureis & luteis adperso, siliqua longissima & angustissima. *Catesb. car.* 1. p. 49. t. 49.

Kawara Filagi. *Kämpf. jap.* 841. t. 842.

*Habitat in* Japonia, Carolina. 5

Arbor erecta. Folia terna. Cirrhi nulli. Flores dianthi: staminibus duobus antheriferis; reliquis tribus castratis.

2. *BIGNONIA* foliis simplicibus lanceolatis, caule vov-  
lubili. sempervirens.

*Bignonia* foliis ovato-lanceolatis conjugatis integer-  
mis. *Roy. lugdb.* 291.

Gelsemium f. *Jasminum* luteum odoratum virginia-  
num scandens sempervirens. *Catesb. car.* 1. p. 53.  
t. 53. *Raj. hist.* 1769.

*Syringa* volubilis virginiana, myrti majoris folio, alato  
semine, floribus odoratis luteis. *Pluk. alm.* 359. t.  
112. f. 5.

*Habitat in* Virginia.

Folia opposita. Siliquæ cordatæ, simplices.

3. *BIGNONIA* foliis conjugatis: cirrho brevissimo arcu-  
ato tripartito. angvis cati.

*Bignonia americana*, capreolis aduncis donata, siliqua  
longissima. *Tournef. inst.* 164.

Gelsemium indicum hederaceum tetraphyllum, folio  
subrotundo acuminato. *Sloan. jam.* 90. *hist.* 1. p. 208.

*Clematis* quadrifolia, flore digitalis luteo, claviculis a-  
duncis. *Plum. amer.* 80. t. 94.

*Clematis* myrsinites, amplioribus foliis, americana te-  
traphyllos. *Pluk. alm.* 109. t. 163. f. 2.

*Habitat in* Barbados, Domingo.

4. *BIGNONIA* foliis conjugatis cirrhosis: foliolis ova-  
to-lanceolatis, pedunculis bifloris, siliquis linearibus. aquinoctia-  
lis.

*Bignonia* bifolia scandens, siliquis latis & longioribus,  
semine lato. *Plum. spec.* 5.

*Habitat in* Cayenna.

5. *BIGNONIA* foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cor-  
dato-ovatis, floribus racemoso-paniculatis. paniculata.

*Bignonia* bifolia scandens, flore violaceo odore, fructu  
ovato duro. *Plum. spec.* 5.

- β. *Bignonia* bifolia scandens, flore e luteo purpurascente  
inodoro, fructu ovato duro. *Plum. spec.* 5.

*Habitat in* America calidiore.

6. *BIG-*

- crucigera.* 6. *BIGNONIA* foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordatis; foliis imis ternatis. *Vir. cliff.* 60. *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 289.  
*Bignonia* scandens, flore atro flavo minori subtus albicante. *Gron. virg.* 73.  
*PseudoApocynum* folliculis maximis obtusis, seminibus amplissimis alis membranaceis. *Morif. hist.* 3. p. 672. f. 15. t. 3. f. 16.  
*Habitat in Virginia & australiori America.*  
*Caulis volubilis, scaber, transversim dissectus crucem representat.*
- capreolata.* 7. *BIGNONIA* foliis conjugatis cirrhosis: foliolis cordato-lanceolatis; foliis imis simplicibus. *Vir. cliff.* 59. *Hort. cliff.* 317. *Roy. lugdb.* 289.  
*Bignonia* americana capreolis donata, siliqua brevior. *T. Breyn. ic.* 33. t. 25.  
*Clematis* americana siliquosa tetraphyllos. *Dod. act.* 71.  
*Clematis* tetraphylla americana. *Bocc. sic.* 31. t. 15. f. 31. *Zan. hist.* 74. t. 2. *Raj. hist.* 1329.  
*Habitat in America.*
- Leucoxylon.* 8. *BIGNONIA* foliis digitatis integerrimis. *Hort. cliff.* 497.  
*Bignonia* arbor pentaphylla, flore roseo, major & minor, siliquis planis. *Plum. spec.* 5. *Catesb. car.* 1. p. 37. t. 37.  
*Leucoxylon* arbor siliquosa, quinque foliis, floribus neriis, alato semine. *Plum. alm.* 215. t. 200. f. 4.  
*Nerio* affinis arbor siliquosa, folio palmato s. digitato, flore albo. *Sloan. jam.* 154. *hist.* 2. p. 62. *Raj. deadr.* 114.  
*Habitat in Jamaica, Caribæis, agris humidioribus, & ad ripas. h.*
- radiata.* 9. *BIGNONIA* foliis digitatis pinnatifidis.  
*Bignonia* flore luteo, foliis radiatis & elegantissime dissectis. *Feuv. peruv.* 1. p. 731. t. 22. *Roy. lugdb.* 289.  
*Habitat in Peru.*
- radicans.* 10. *BIGNONIA* foliis pinnatis, foliolis incis, geniculis radicatis. *Hort. cliff.* 217. *Hort. upf.* 178. *Gron. virg.* 73.  
*PseudoGelseminum* siliquosum. *Riv. mon.* 101.  
*PseudoApocynum* hederaceum americanum, tubuloso flore phæniceo, fraxini folio. *Morif. hist.* 3. p. 612. f. 15. t. 3. f. 1.

Gelse-

## DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 625

*Gelsemium hederaceum indicum. Corn. can. 102. t. 103.*

β. *Bignonia fraxini foliis, coccineo flore minore. Catesb. car. 1. p. 65. t. 65.*

*Habitat in America. b*

11. *BIGNONIA* foliis decompositis: foliolis incis, *ge-peruviana*,  
miculis cirrhosis. *Hort. cliff. 317. Roy. lugdb. 290.*

*Bignonia arbor, flore luteo, fraxini folio. Plum. spec. 5.*

*Clematis peruana, digitalis flore, folio fraxini. Pluk. alm. 108. t. 162. f. 4.*

*Habitat in Peru.*

12. *BIGNONIA* foliis bipinnatis: foliolis integris sub-indica;  
cordatis acutis. *Fl. zeyl. 236,*

*Arbor filiquosa malabarica, cordato folio, fructu maxi-  
mo oblongo plano. Raj. hist. 1741.*

*Palega pajanelli. Rheed. mal. 1. p. 177. t. 43.*

β. *Arbor filiquosa malabarica, folio majore mucronato,  
fructu maximo oblongo plano. Raj. hist. 1741.*

*Pajanelli. Rheed. mal. 1. p. 79. t. 45.*

*Habitat in India.*

13. *BIGNONIA* foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis in-  
tegris.

*Arbor guajaci latiore folio, bignoniæ flore cæruleo,  
fructu duro in duas partes diffiliente, seminibus alatis  
imbricatim positis. Catesb. car. 1. p. 42. t. 42.*

*Habitat in Carolina. b*

## CITHAREXYLUM.

1. *CITHAREXYLUM. Amon. acad. 1. p. 406. spinosum,*

*Citharexylon americanum alterum, foliis ad marginem  
dentatis. Pluk. alm. 108. t. 161. f. 5.*

*Habitat in Barbados. b*

## HALLERIA.

1. *HALLERIA. Hort. cliff. 323:*

*Halleria foliis ovatis longitudinaliter serratis. Roy. lugdb. incis.*

289.

*Lonicera foliis lucidis acuminatis dentatis, fructu rotun-  
do. Burm. afr. 244. t. 89. f. 2.*

*Solanum flore periclymeni. Amm. herb. 591.*

2. *Halleria foliis lanceolato-ovatis superne serratis. Roy.  
lugdb. 289.*

R f

Lonic

*Lonicera folio acuto ferrato, flore pendulo, fructu oblongo. Burm. afr. 243. t. 89. f. 1.*

*Habitat in Æthiopia.*

## CRESCENTIA.

*Cujete.*

## 1. CRESCENTIA.

*Crescentia foliis lanceolatis utrinque attenuatis. Hort. cliff. 327.*

*Cujete foliis oblongis & angustis, magno fructu ovato.*

*Plum. gen. 23.*

*Arbor americana cucurbitifera, folio longo mucronato, fructu oblongo. Comm. hort. 1. p. 137. t. 71.*

β. *Cujete angustifolia, fructu minori globoso aut ovato.*

*Plum. gen. 23.*

γ. *Cujete minima, fructu duro. Plum. gen. 23.*δ. *Cujete latifolia, fructu putamine fragili. Plum. gen. 23.*

*Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali. Pluk. alm. 124. t. 171. f. 2.*

*Arbor cucurbitifera americana, folio subrotundo. Sloan. jam. 206. hist. 2. p. 172. Raj. hist. 1667.*

*Habitat in Virginiae, Jamaicae, Brasiliae apricis. b*

## GMELINA.

*asiatica.*

1. GMELINA. *Fl. zeyl. 230. \**

*Michelia spinosa, floribus luteis. Amm. act. petrop. 8. p. 218. t. 18.*

*Lycium maderaspatanum indici alpino putati æmulum, foliis minoribus & majoribus bijugis, & grandioribus aculeis horridum. Pluk. alm. 234. t. 303. f. 3. & t. 97. f. 2.*

*Habitat in India. b*

## PETREA.

*volubilis.*

1. PETREA. *Hort. cliff. 319. \**

*Habitat in America. b*

*Periit egregius Petreus 1742. ætatis 32. variolis correptus, longiori vita dignissimus, utpote qui Floræ indicæ domicilia exstruxit in Europa omnium splendidissima.*

## LANTANA.

*trifolia.*

## 1. LANTANA foliis ternis, spicis oblongis imbricatis.

*Camara trifolia, purpurascente flore. Plum. gen. 32.*

*Myrobatindum spicatum, viburni foliis ex adverso ternis. Vaill. act. 1722. p. 277.*

*Ha-*

*Habitat in America calidiore.*

*An sequentis sola varietas?*

2. LANTANA foliis oppositis, caule inermi, spicis ob-*annua*, longis. *Hort. nps.* 380.  
Periclymenum rectum humilius, salviæ folio rugosiore, flore purpureo, fructu oblongo esculento purpureo. *Sloan. jam.* 164. *bist.* 2. p. 82. t. 195. *Raj. dendr.* 30.
- β. Viburnum americanum odoratum, folio parvo orbiculato, floribus & baccis folio interceptis. *Pluk. alm.* 386. t. 114. f. 5. *Herm. par.* 384.  
*Habitat in America calidiore.* ☉
3. LANTANA foliis oppositis, caule inermi ramoso, flo-*Canara*, ribus capitato-umbellatis.  
Lantana foliis oppositis petiolatis, floribus capitatis. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 290.  
Viburnum americanum non spinosum, melissæ foliis, floribus coccineis. *Pluk. alm.* 385. t. 114. f. 4.  
Viburnum americanum, urticæ foliis, samii odore, floribus miniatis. *Comm. hort.* 1. p. 151. t. 78.
- β. Periclymenum rectum, urticæ folio hirsuto majore, flore flavo. *Sloan. jam.* 163.  
*Habitat in America calidiore.* ☿
4. LANTANA foliis oppositis, caule aculeato ramoso, *aculeata*, floribus capitato-umbellatis.  
Lantana foliis oppositis petiolatis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 498. *Hort. nps.* 380. *Roy. lugdb.* 290.  
Myrobatindum viburnifolium spinosum, floribus coccineis. *Vaill. act.* 1722. p. 276.  
Viburnum americanum odoratum, urticæ foliis latioribus, spinosum, floribus miniatis. *Pluk. alm.* 285. t. 223. f. 5.  
*Habitat in America calidiore.* ☿
5. LANTANA foliis alternis, spicis oblongis. *bullata*.  
Salvia barbadensis dicta, spica florum compactiori. *Pluk. alm.* 329. t. 221. f. 3.  
Periclymenum rectum, salviæ folio rugoso majore oblongo bullato, flore albo, fructu longiore. *Sloan. jam.* 163. *bist.* 2. p. 81. *Raj. dendr.* 31.
- β. Periclymenum rectum, salviæ folio rugoso majore subrotundo bullato. *Sloan. jam.* 163. *bist.* 2. p. 81. t. 195. f. 1. *Raj. dendr.* 31.  
*Habitat in Jamaica.* ☿

- corymbosa.* 6. LANTANA foliis alternis, floribus corymbosis †  
 Periclymenum rectum, salviæ foliis majoribus oblongis  
 mucronatis subtus villosis alternatim sitis, flore & fru-  
 ctu minoribus. *Sloan. jam.* 164. *hist.* 2. p. 83. t.  
 194. f. 3. *Raj. dendr.* 30.  
 Ulmi angustifoliæ facie baccifera jamaicensis, foliis su-  
 perne scabris, subtus villosis alternatim sitis, floribus  
 parvis perpatillis, fructu botryoide monospermo. *Pluk.*  
*alm.* 393. t. 329. f. 5.  
*Habitat in Jamaica.* †  
*Refertur ex fide Sloanei; De floris structura nul-*  
*la mihi certitudo.*
- africana.* 7. LANTANA foliis alternis sessilibus, floribus solitariis.  
*Hort. cliff.* 320. *Roy. lugdb.* 290.  
 Lantana floribus solitariis. *Gen. plant.* 632.  
 Jasminum africanum, ilicis folio, flore solitario ex alis  
 foliorum proveniente. *Comm. rar.* 6. t. 6.  
*Habitat in Æthiopia.* †

### CORNUTIA.

- pyramidata.* 1. CORNUTIA. *Hort. cliff.* 319.  
 Cornutia flore pyramidato, foliis incanis. *Plum. gen.* 32.  
 Agnanthus viburni folio. *Vaill. act.* 1722. p. 273.  
*Habitat in Caribæis, Campechia.* †

### LOESELIA.

- ciliata.* 1. LOESELIA. *Roy. lugdb.* 299.  
 Royena foliis acute dentatis & veluti spinosis, flore luteo.  
*Houfl. mss.*  
*Habitat in Vera Cruce.*

### CAPRARIA.

- biflora.* 1. CAPRARIA.  
 Capraria foliis alternis, corollis quinquefidis *Hort. cliff.*  
 320. *Roy. lugdb.* 301.  
 Capraria curassavica. *Herm. parad.* 110. t. 110.  
 Gratiolæ affinis frutescens americana, foliis agerati f. ve-  
 ronica erectæ majoris. *Comm. hort.* 1. p. 79. t. 40.  
 Lysimachia peruviana affinis americana procumbens  
 ononidis vernæ frutescentis folio singulari glabro. *Pluk.*  
*alm.* 237. t. 98. f. 4.  
*Habitat in Curassao.* †  
 Conferatur Capraria peruviana, agerati foliis absque pe-  
 diculis. *Fewill. per.* 1. p. 764. t. 48. SE



## SELAGO.

1. SELAGO corymbo multiplici. *corymbosa.*  
*Selago caule erecto, corymbo terminali. Hort. cliff. 321. Roy. lugdb. 300.*  
*Camphorata africana umbellata frutescens. Comm. hort. 2. p. 79. t. 40. Raj. suppl. 130.*  
*Millefolio affinis maderaspatana, camphoratae foliis radiatim nascentibus. Moris. hist. 3. p. 39. Raj. suppl. 219.*  
*Habitat in Æthiopia. 2*
2. SELAGO spicis imbricatis. † *spuria.*  
*Melampyrum africanum spicatum, foliis angustissimis. Burm. afric. 115. t. 42. f. 3.*  
*Habitat in Æthiopia. 5*  
*Caulis suffrutex. Folia linearia, alterna. Spica ovato-oblonga, obtusa, arte imbricata; bracteis subovatis, membranaceis. Fructificatio hodie ignota.*
3. SELAGO racemo simplici. † *dubia.*  
*Thymelæa foliis angustissimis linearibus, flosculis spicatis. Burm. afr. 130. t. 47. f. 3.*  
*Thymelæa æthiopica spicata glabra, foliis longioribus angustis. Pluk. mant. 180. t. 445. f. 6*  
*Valerianoides parva, foliis in caule raris, spica in summo caule oblonga ex foliolis & flosculis confertis composita. Raj. suppl. 245.*  
*Habitat in Æthiopia.*  
*Caulis erectus. Folia conferta, linearia. Racemus simplex, terminalis, longissimus, erectus. Corollæ tubus filiformis, longissimus. Stamina modo 2 intra tubum corollæ; antheris incumbentibus, linearibus. Fructus ignotus; hinc genere dubio.*

## HEBENSTRETIA.

1. HEBENSTRETIA foliis dentatis. *Hort. cliff. 497. dentata, 326. Roy. lugdb. 300.*  
*Valerianella africana, foliis angustis, flore macula rubicante notato. Comm. hort. 2. p. 247. t. 109.*  
*Valerianoides flore monopetalo, semine unico oblongo. Raj. suppl. 245.*  
*Pedicularis foliis angustissimis dentatis, floribus spicatis. Burm. afric. 114. t. 42. f. 2*  
*Habitat in Æthiopia.*
2. HEBENSTRETIA foliis integerrimis. *Hort. cliff. 497. integerrima. Roy. lugdb. 300.*  
*Habitat in Æthiopia.*

ERI-

## ERINUS.

- alpinus.* 1. ERINUS floribus racemosis.  
 Erinus. *Sauv. monsp.* 116.  
 Ageratum ferratum alpinum. *Bauh. pin.* 221.  
 Ageratum purpureum. *Dalech. hist.* 1184.  
 β. Ageratum minus saxatile, flore albo. *Barr. rar.* 23. t. 1192.  
*Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Montpelii.* 2
- africanus.* 2. ERINUS floribus lateralibus sessilibus, foliis lanceolatis subdentatis.  
 Buchnera foliis obtusis serratis. *Hort. cliff.* 501. \* *Roy. lugdb.* 300.  
 Lychnidea villosa, foliis ex alis floriferis, florum petalis cordatis. *Burm. afric.* 139. t. 50. f. 1.  
 Euphrasia æthiopica, drabæ foliis, summi oris flosculorum altius divisis. *Pluk. mant.* 73. *Raj. suppl.* 401.  
 β. Buchnera foliis acutis dentatis. *Hort. cliff.* 501. \* *Roy. lugdb.* 300.  
*Habitat in Æthiopia.*
- peruvianus.* 3. ERINUS foliis lanceolato-ovatis serratis.  
 Lychnidea veronicæ folio, flore coccineo. *Few. peruv.* 3. p. 25. f. 3.  
*Habitat in Peru.*
- laciniatus.* 4. ERINUS foliis laciniatis.  
 Lychnidea verbena tenuitoliæ folio. *Few. peruv.* 3. p. 35. t. 25.  
*Habitat in Peru.*

## BUCHNERA.

- americana.* 1. BUCHNERA foliis dentatis oppositis.  
 Cortusæ f. Verbafei species, caule non ramoso, floribus violaceis. *Gron. virg.* 74. \*  
*Habitat in Virginia, Canada.*
- afatica.* 2. BUCHNERA foliis integerrimis alternis.  
*Habitat in Zeylona, China.*  
 Caulis ramis alternis, habitu Euphrasie, obtuse tetragonus. Folia lineari-lanceolata, scabra, integerrima, alternâ, vâsus basin opposita. Spicæ longæ floribus alternis remotis. Calyces quinquepartiti, scabri: Tubus corollæ filiformis, calyce duplo longior, cervice incurvato, stamina 4 includente; Limbus quinquesidus, purpureus; laciniis 2 superioribus brevissimis reflexis; triens reliquis obovatis subæqualibus.

BRO-

BROWALLIA.

1. BROWALLIA. *Hort. cliff.* 318. *t.* 17. *Hort. ups. americana.* 179. \*.  
*Habitat in America australi.* ☉

LINNÆA.

1. LINNÆA floribus geminatis. *Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f. borealis.*  
4. *Hort. cliff.* 320. *Fl. succ.* 522. *t.* 1. *Mat. med.*  
517. *Roy. Ingdb.* 236. *Hall. belv.* 608. *Segu. veron.*  
183. *Sauv. meth.* 137.  
*Serpillifolia.* *Buxb. act.* 2. *p.* 346. *t.* 21.  
*Campanula serpillifolia.* *Bauh. pin.* 93. *prodr.* 35. *Act.*  
*ups.* 1720. *p.* 96. *t.* 1.  
*Nummularia norvegica,* flore purpureo, *Kyll. act. dan.*  
2. *p.* 346. *f.* C.  
*Habitat in Succia, Sibiria, Helvetia, Canada sylvis an-*  
*tiquis, muscosis, acerosis, sterilibus, umbrosis.* ☿

SIBTHORPIA.

1. SIBTHORPIA foliis reniformi-subpeltatis crenatis. *europæa.*  
*Gen. nov.* 1099.  
*Chrysosplenium cornubiense.* *Pet. herb.* *t.* 6. *f.* 11.  
*Alliisporia pusilla repens,* foliis saxifragiæ aureæ. *Raj.*  
*angl.* 3. *p.* 352. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 6.  
*Habitat in Cornubiæ, Devonix, Lusitaniæ undis aggeribus.*  
2. SIBTHORPIA foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis solitariis. *africana.*  
*Gen. nov.* 1099.  
*Chrysosplenii foliis* planta aquatica, flore flavo pentapetalo. *Shaw. afric.* 149. *f.* 149.  
*Habitat in Africa.*  
3. SIBTHORPIA foliis reniformibus crenatis, pedunculis geminis. *peregrina.*  
*Gen. nov.* 1099.  
*Planta.* *Pluk. phyt.* 257. *f.* 5.  
*Habitat - - -*

LIMOSELLA.

1. LIMOSELLA. *Fl. lapp.* 249. *Fl. succ.* 521. *Hall. aquatica.*  
*belv.* 609. *Dalib. parif.* 193.  
*Limosella annua.* *Lind. alf.* 156. *t.* 5.  
*Plantaginella.* *Hall. jen.* 23. *t.* 6. *f.* 2.  
*Plantaginella palustris.* *Bauh. pin.* 190. *Morif. bist.* 3.  
*p.* 605. *f.* 15. *t.* 2. *f.* 1

*Spergula perpusilla*, lanceolatis foliis. *Loef. pruss.* 261. t. 81.

*Alune palustris repens*, foliis lanceolatis. *Pluk. alm.* 20. t. 74. f. 4.

*Alsine palustris exigua*, foliis lanceolatis. *Mentz. pag.* 2. t. 7. f. 6.

*Habitat in Europæ septentrionalis inundatis.* ☉

## ÆGINETIA.

*indica,*

## 1. ÆGINETIA.

*Tienn-cumulu.* *Rheed. mal.* 11. p. 97. t. 47.

*Habitat in Malabar.*

*Folia nulla.* Caules simplicissimi, teretes, stricti venis tribus, uniflori. Flos examinandus.

## OBOLARIA.

*virginica,*

1. OBOLARIA. *Hort. cliff.* 523. *Gron. virg.* 74.

*Orobanche virginiana*, radice coralloide summo caule foliis subrotundis. *Morif. hist.* 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 23. *Pluk. alm.* 273. t. 209. f. 6. *Raj. suppl.* 595.

*Habitat in Virginia.*

## OROBANCHE.

*lævis,*

## 1. OROBANCHE caule simplicissimo lævi, staminibus exsertis.

*Orobanche caule simplici cæruleo, bracteis brevibus.* *Sauv. monsp.* 4.

*Orobanche majore flore.* *Baub. pin.* 88. *Morif. hist.* 3. f. 12. t. 16. f. 2.

*Orobanche magna purpurea monspessulana.* *Baub. hist.* 2. p. 782.

*Habitat Monspelii.*

*major,*

## 2. OROBANCHE caule simplicissimo pubescente, staminibus inclusis.

*Orobanche caule simplicissimo.* *Hort. cliff.* 321. *Fl. suec.* 519. *Roy. lugdb.* 299. *Dalib. paris.* 190. *Gort. gêtr.* 368.

*Orobanche caule simplici, bracteis longioribus.* *Sauv. monsp.* 5.

*Orobanche major garyophyllum olens.* *Baub. pin.* 87.

*Orobanche 1.* *Clus. hist.* 1. p. 270.

*Rapum genistæ.* *Lob. ic.* 2. p. 89.

*Habitat in Europæ agris, pratis siccis.*

3. OROBANCHE caule ramoso, corollis quinquefidis. *ramosa*,  
 Orobanche caule ramoso. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.*  
 299. *Hall. belv.* 610. *Dalib. paris.* 191. *Gort. gelr.*  
 369.  
 Orobanche ramosa. *Baub. pin.* 88.  
 Orobanche. *Cam. epit.* 311.  
*Habitat in Europæ ficcis.*
4. OROBANCHE caule ramoso, corollis quadridentatis. *virginiana*.  
 Orobanche caule ramoso, floribus distantibus. *Gron. virg.*  
 168.  
 Orobanche minor virginiana lignosior, per totum cau-  
 lem floribus minoribus onusta. *Morif. hist.* 3. p. 502.  
*f. 12. t. 16. f. 9. Raj. suppl.* 595.  
*Habitat in Virginia.*
5. OROBANCHE caule uniflora. *uniflora*.  
 Orobanche aut Helieborine affinis marilandica, caule  
 nudo, unico in summitate flore. *Raj. suppl.* 595.  
 Dentariæ f. Anblato cordi affinis, flore pallide cæruleo.  
*Gron. virg.* 70.  
 Gentiana minor aurea, flore simplici amplo deflexo pal-  
 lide flavescente. *Pluk. mant.* 89. t. 348. f. 3.  
 Aphyllon. *Mitch.* 25.  
*Habitat in Virginia.*

## DODARTIA.

1. DODARTIA foliis linearibus integerrimis glabris. *orientalis*.  
 Dodartia *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 297.  
 Dodartia orientalis, flore purpurascēte. *Tournef. cor.*  
 47. *itin.* 3. p. 208. t. 208.  
*Habitat in monte Ararat, Tataria. &*
2. DODARTIA foliis ovatis ferratis villosis. *indica*.  
*Habitat in India*,  
 Caules teretiusculi, villosi, subramosi. Folia ovata, pe-  
 tiolata, obtuse ferrata, villosa, pollicis extimo latiora.  
 Racemus terminalis foliis minoribus. Flores oppositi,  
 secundi, subsessiles. Calyx obtusus, villosus. Corolla  
 flava, labio exteriorē recto brevi.

## LIPPIA.

1. LIPPIA. *americana*.  
*Habitat in Vera Cruce. &*  
*Frutex Caulibus teretibus, pallidis, ad genicula com-*  
*pressis. Folia lanceolato-ovata, extra medium serrata,*  
*R r 5 petio-*

*petiolota, scabra, opposita. Pedunculi axillares, oppositi, brevissimi, capitati. Capitula retrosum imbricata squamis innumeris, tetragona, ovata, magnitudine pisi, flosculo inter singulam squamam.*

## SESAMUM.

- orientale.* 1. SESAMUM foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Fl. zeyl.* 318. 1737.  
*Sesamum* pedunculo inter duas glandulas. *Vir. cliff.* 60.  
*Roy. lugdb.* 292.  
*Digitalis orientalis Sesamum dicta. T. Burm. zeyl.* 87.  
*t.* 38. *f.* 1.  
*Schitt. elu. Rheed. mal.* 9. *p.* 105. *t.* 54.  
*Habitat in Zeylona, Malabaria.* ☉
- indicum.* 2. SESAMUM foliis inferioribus trifidis. *Roy. lugdb.* 292.  
*Sesamum alterum, foliis trifidis, orientale, semine obscuro. Pluk. alm.* 344. *t.* 109. *f.* 4.  
*Habitat in India.* ☉

## MIMULUS

- ringens.* 1. MIMULUS. *Hort. upf.* 176. *t.* 1. \* *Act. upf.* 1741.  
*p.* 82.  
*Lythymachia galericulata* f. *Gratiola elatior* non ramosa.  
*Gron. virg.* 69.  
*Gratiola canadensis latifolia, flore magno cæruleo. Barb. lugdb.* 2. *p.* 265.  
*Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. Moris. hist.* 2. *p.* 479. *f.* 5. *t.* 8. *f.* 6. *Raj. hist.* 769.  
*Habitat in Virginia, Canada.* 2

## RUELLIA.

- strepens.* 1. RUELLIA foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus. *Hort. upf.* 178.  
*Ruellia* foliis petiolatis, fructu sessili conferto. *Hort. cliff.* 318. *Gron. virg.* 73. *Roy. lugdb.* 291.  
*Ruellia strepens, capitulis comosis. Dill. elsb.* 300. *t.* 249. *f.* 321.  
*Habitat in Virginia, Carolina.* 2
- clandestina.* 2. RUELLIA foliis petiolatis, pedunculis longis subdivi-  
 lis nudis. *Hort. upf.* 179. \*  
*Ruellia* foliis sessilibus, pedunculis trifloris. *Hort. cliff.* 308. *Roy. lugdb.* 291.

Ruel-

*Ruellia capsulis teretibus. Dill. elth. 328. t. 248. f. 320.*  
*Habitat in Barbados.*

3. *RUELLIA* foliis petiolatis, pedunculis dichotomis pa-paniculata.  
 niculatis.

*Ruellia pedunculis multifloris dichotomis folio longioribus. Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 292.*

*Speculum veneris inajus impatiens. Sloan. jam. 59. hist.*

*1. p. 158. t. 100. f. 2. Raj. suppl. 389.*

*Habitat in Jamaica. 2*

4. *RUELLIA* foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. *tuberosa.*

*Ruellia capsulis angulosis. Dill. elth. 328.*

*Ruellia humilis, flore cæruleo, asphodeli radice. Plum. gen. 12.*

*Gentianella flore cæruleo, integro vasculo seminali ex humidi contactu impatiens. Sloan. jam. 52. hist. 1.*

*p. 149. t. 95. f. 1. Raj. suppl. 370.*

*Habitat in Jamaica. 2*

5. *RUELLIA* floribus geminis.

*Ruellia minore folio, floribus gemellis. Dill. elth. 331.*

*biflora.*

*Habitat in Carolina.*

6. *RUELLIA* foliis subcrenatis lanceolato-ovatis, capicrispa.  
 tulis ovatis foliosis hispidis.

*Achatoda luzanensis, spica plana. Pet. gaz. t. 73. f. 6.?*

*Habitat in India. Osbeck. 2*

*Radix lignosa, repens. Caules digitales, simplicissimi, articulati, teretiusculi. Folia lanceolato-ovata, subpetiolata, pilis adpersa, margine reflexo undulato crispas. crenata. Capitula ad genicula lateraliter, solitaria, ovata, imbricata Foliis ovatis, acuminatis, piloso-scabris, intra quæ flores Calyce 5-partito hirsuto lineari. Corolla flava. Stamina. 4.*

7. *RUELLIA* foliis oblongis integerrimis, floribus solivirgens.  
 tariis sessilibus, caule procumbente. *Fl. zeyl. 234. \**

*Urdali. Rheed. mal. 10. p. 125. t. 64.*

*Habitat in India.*

8. *RUELLIA* foliis mucronato-ferratis, caule repente, antipoda.  
 tribus subspicatis terminalibus quinis ternisve. *Fl.*

*z. d. 235. \**

*Gentianella utriusque Indiæ impatiens, foliis agerati Snop g als barbadensibus. Pluk. mant. 167. t. 186. f. 2.*

*Pectyanga pulpani. Rheed. mal. 9. p. 115. t. 59.*

*Habitat in Indiis. ☉*

BAR-

## BARLERIA.

- salicifolia.* 1. BARLERIA spinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis.  
Barleria aculeata, folani folio angustiore, flore caeruleo.  
*Plum. gen.* 31.  
*Habitat in America australi.*
- Prionitis.* 2. BARLERIA spinis axillaribus quaternis foliis integerrimis.  
Barleria foliis integerrimis, spinis lateralibus. *Roy. lugdb.* 231. *Fl. zeyl.* 231. \*  
*Prionitis. Hort. cliff.* 486.  
Lycium indicum, spinis quaternis ad foliorum singulorum exortum. *Seb. thes.* 1. p. 21. t. 13. f. 1.  
Melampyro cognata maderaspatana, spinis horrida. *Pluk. alm.* 243. t. 119. f. 5.  
Coletta-Vectla. *Rheed. mal.* 9. p. 77. t. 41.  
*Habitat in India.* 2
- buxifolia.* 3. BARLERIA spinis axillaribus oppositis solitariis, foliis subrotundis integerrimis.  
Barleria americana spinosissima frutescens, buxi folio parvo. *Amm. herb.* 104.  
Caraschulli. *Rheed. mal.* 2. p. 91. t. 47.  
*Habitat in Indiis.*
- cristata.* 4. BARLERIA foliis oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobusque linearibus acutis.  
*Habitat in India.*  
Caulis teres. Folia oblongo-ovata, utrinque acuta, integerrima. Flores axillares, sessiles. Calyx quadripartitus foliolis 2 ovatis, acuminatis, serrato-spinosis; 2 alternis brevioribus, linearibus, acutis, integerrimis, patentibus. Corolla caerulea, monopetala, erecta, infundibuliformis, patens, quinquefida: lobis ovatis subequalibus: quinto profundius diviso. Stam. filamenta 4, quorum 2 tubo corollae longiora, filiformia: Antheris oblongis; 2 brevissima in fundo corollae: Antheris emarcidis. Pistilli Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine majorum staminum. Stigma obtusum. Capitula longitudine calycis, compressa, acuta, bilocularis, bivalvis; valvulis cymbiformibus diffinito longitudinali, margine altero spina elastica. Semina in singulo loculo 2, compressa.

5. BAR-



5. *BARLERIA inermis*, foliis ovatis denticulatis petio-  
latis. *coccinea*.

*Barleria solani* folio, flore coccineo. *Plum. gen.* 31.  
*Habitat in America meridionali.*

## DURANTA.

1. *DURANTA spinosa*. *repens*

*Castorea repens spinosa*. *Plum. gen.* 30.

*Habitat in America.*

2. *DURANTA inermis*. *erecta*.

*Castorea racemosa*, flore cæruleo, fructu amaro. *Plum. gen.* 30.

*Habitat in America*

*Caulis erectus, ramosus. Folia oblonga: inferiora opposita, suprema quaterna s. cruciatim posita.*

## OVIDEA.

1. *OVIDEA*. *spinosa*.

*Valdia cardui* folio, fructu subcæruleo. *Plum. gen.* 14.

*Habitat in America meridionali.*

*Folia opposita, petiolata, oblonga, dentata. Flores cor-  
ymbosi.*

## VOLKAMERIA.

1. *VOLKAMERIA spinis petiolorum rudimentis*. *aculeata*.

*Ligultroides. Hort. cliff.* 489. *upr.* 181.

*Duglaffia spinosa*, ligultri folio. *Amm. herb.* 576.

*Ligultrum aculeatum*, fructu testiculato. *Plum. spec.* 489.

*Paliuro affinis ligultrifolia spinosa*, flore monopetalo dif-  
formi. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. p. 137. t. 166. f.

2. 3. *Raj. dendr.* 95.

*Habitat in Jamaica, Barbados. h*

2. *VOLKAMERIA ramis inermibus. Fl. zeyl.* 231. \* *inermis*.

*Periclymeni similis myrtifolia arbor maderaspatensis.*

*Pluk. alm.* 287. t. 211. f. 4.

*Habitat in India. h*

## CLERODENDRUM.

1. *CLERODENDRUM foliis simplicibus cordatis to-  
mentosis. Fl. zeyl.* 232. \* *infortunata*.

*Peragu. Rheed. mal.* 2. p. 41. t. 25. *Raj. hist.* 1571.

- β. *Clerodendrum folio lato, & acuminato. Burm. zeyl.* 66.  
t. 29.

*Habitat in India,*

VI.

## VITEX.

- Agnus Castus.* 1. VITEX foliis digitatis, spicis verticillatis.  
*Vitex. Cam. epit.* 105. *Hort. cliff.* 327. *Roy. lugdb.* 291. *Gron. virg.* 169. *Mat. med.* 319.  
*Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis. Baub. pin.* 475.
2. *Vitex latiore folio. Baub. pin.* 475.  
*Vitex folio serrato. Baub. hist.* 1. p. 205.  
*Habitat in Sicilia et Neapolis paludosis. h*
- trifolia.* 2. VITEX foliis ternatis quinatisque, paniculis dichotomis.  
*Vitex trifolia minor indica. Pluk. alm.* 390. t. 206. f. 5. *Fl. zeyl.* 413.  
*Piperi similis, fructus striatus, semina. Baub. pin.* 412.  
*Caranoli. Rheed. mal.* 2. p. 13. t. 10. *Raj. hist.* 1575.  
*Habitat in India.*  
*Foliola ovata, acuta, integerrima, subtus tomentosa.*
- Negundo.* 3. VITEX foliis quinatis ternatisque serratis, floribus racemoso-paniculatis.  
*Vitex trifolia minor indica serrata. Pluk. alm.* 390. *Fl. zeyl.* 414.  
*Negundo arbor mas. Baub. hist.* 1. p. 189.  
*Bernnosi. Rheed. mal.* 2. p. 15. t. 11. *Raj. hist.* 1575.  
*Habitat in India. h*  
*Foliola 3. f. 5, ovato-lanceolata, sinuato-serrata, subtus nuda venosa.*
- pinnata.* 4. VITEX foliis pinnatis, paniculis trichotomis.  
*Pistacio-vitex. Fl. zeyl.* 415. \*  
*Habitat in Zeylona. h*

## BONTIA.

- daphnoides.* 1. BONTIA.  
*Bontia arborescens, thymelææ facie. Plum. gen.* 32.  
*Bontia laureolæ facie. Dill. elth.* 57. t. 49. f. 57.  
*Olea sylvestris barbadensis, folio angusto pingui leviter crenato. Pluk. alm.* 269. t. 209. f. 3. *Raj. dendr.* 47.  
*Habitat in Barbados. h*

## COLUMNEA.

- scandens.* 1. COLUMNEA.  
*Columnnea scandens, phœnicco flore, fructu albo. Plum. gen.* 28.
2. *Columnnea scandens, flore lutescente, fructu albo. Plum. Ha-*

*Habitat in Gallia æquinoctiali.*

*Canlis, Folia, Corollæ villosa. Folia ovata, serrata, petiolata.*

## ACANTHUS.

1. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. *Hort. cliff. mollis.*  
326. *Hort. upf.* 181. *Mat. med.* 318. *Roy. lugdb.*  
304. *Sauv. monsp.* 278.  
Acanthus sativus f. mollis virgillii. *Bauh. pin.* 383.  
Carduus Acanthus f. Branca ursi. *Bauh. hist.* 3. p. 75.  
*Habitat in Italiæ, Siciliæ humentibus, duris. &*
2. ACANTHUS foliis pinnatifidis spinosis. *Hort. cliff. spinosus,*  
326. *Roy. lugdb.* 304.  
Acanthus aculeatus. *Bauh. pin.* 383.  
Acanthus sylvestris. *Dod. pempt.* 719.  
*Habitat in Italiæ humentibus. &*
3. ACANTHUS caule fruticoso aculeato. *ilicifolius.*  
Acanthus malabaricus, agrifolii folio. *Pet. ficc.* 10. gaz.  
t. 94. f. 15.  
Frutex indicus spinosus, foliis agrifolii, filiqua geminata brevi. *Raj. hist.* 1766. *Pluk. phyt.* 261. f. 4.  
Carduus aquaticus f. indorum Dilivaria. *Camell. luz.*  
6. n. 16.  
Paina schylli. *Rheed. mal.* 2. p. 93. t. 48.  
*Habitat in India. &*
4. ACANTHUS foliis quaternis obsolete dentatis inermibus, calycibus ciliatis. *maderaspatis.*  
Adhatoda maderaspatis, calyce barbato, foliis subtus villosis. *Pet. mus.* 23.  
*Habitat in India.*

## MELIANTHUS.

1. MELIANTHUS stipulis solitariis petiolo adnatis. *major.*  
*Hort. cliff.* 492. *Hort. upf.* 181. *Roy. lugdb.* 402.  
Melianthus africanus. *Herm. lugdb.* 414. t. 415.  
*Habitat in Æthiopiæ succulentis. &*
2. MELIANTHUS stipulis geminis distinctis. *Hort. minor.*  
*cliff.* 492. *Roy. lugdb.* 402.  
Melianthus africanus minor foetidus. *Comm. rar.* 4. t. 4.  
*Habitat in Æthiopia. &*

Clas-

## TETRADYNAMIA.

## SILICULOSA.

## MYAGRUM.

- perenne.* 1. MYAGRUM siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis. *Hort. ups.* 182. \*  
 Crainbe foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 329. *Gort. gelr.* 404.  
 Rapisitrum monospermum. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. t. 37. *Mapp. alsat.* 266. t. 266.  
*Habitat in Alsatia.* ☉
- orientale.* 2. MYAGRUM siliculis sulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-sinuatis. *Hort. ups.* 182. \*  
 Rapisitrum orientale, folio raphani, capsulis rugosis. *Barb. lugdb.* 2. p. 2.  
*Habitat in Oriente.* ☉
- rugosum.* 3. MYAGRUM siliculis sulcatis pilosis rugosis, foliis oblongis obtusis dentatis. *Hort. ups.* 183. \*  
*Habitat in Europa australi.* ☉
- hispanicum.* 4. MYAGRUM siliculis lævibus subtorosis, foliis lyratis.  
 Sinapi hispanicum minus, raphani folio. *Tournef. inst.* 227?  
*Habitat in Hispania.* ♂  
*Caulis pilis raris reflexis scaber. Racemi virgati, longi. Folia lyrata, dentata, petiolata, oblonga. Siliculæ cylindricæ, leves, nec sulcatæ rugosæ aut striatæ; constantes Corpore oblongo, pedicellato, cylindrico, sterili, cu; Silicula ovata insidet collo angustiore: articulo inferiori, biloculari inani, superiore monospermo. Corollæ luteæ.*
- perfoliatum.* 5. MYAGRUM siliculis cordatis subsessilibus, foliis, amplexicaulibus. *Hort. ups.* 182. \* *Hort. cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 330. *Sauv. monsp.* 77.  
 Myagrums monospermum latifolium. *Bauh. pin.* 105. *prodr.* 52. t. 51. *Morif. hist.* 2. p. 267. f. 3. t. 21. J  
*antepennult.*  
*Habitat inter Galliarum segetes.* ☉

Silicul

# TETRADYNAMIA SILICULOSA 64i

*Siliculæ triloculares sed monospermæ, s. in medio loculo tantum semine fixæ.*

6. MYAGRUM filiculis ovatis pedunculatis polyspermis. *fativum*.  
*Hort. cliff.* 328. *Fl. succ.* 197. *Roy. lugdb.* 330.  
*Dalib. paris.* 193.  
*Myagrurn sylvestre. Baub. pin.* 109.
- β. *Myagrurn fativum. Baub. pin.* 109.  
*Camelina s. Myagrion. Dod. pempt.* 532.  
*Habitat in Europa inter linum.* ☉
7. MYAGRUM filiculis globosis compressis punctato-paniculatum  
 rugosis. *Hort. cliff.* 328. *Fl. succ.* 542. *Roy. lugdb.*  
 330. *Hall. belv.* 536. *Dalib. paris.* 193.  
*Myagrurn monospermum hirsutum, filiquis rotundis*  
*Læs. pruss.* 174. t. 56.  
*Myagro similis filiqua rotunda. Baub. pin.* 109. *prodr.*  
 52. t. 52.  
*Habitat in Europa, juxta agros.* ☉
8. MYAGRUM filiculis angulatis, foliis tripartitis. *Hasselq. ægyptium*.  
*Habitat in Ægypto.*  
*Caulis divaricatus, Racemis virgatis. Folia petiolata,*  
*tripartita vel quinquenpartita, dentata. Capsulæ duobus*  
*articulis tetragonis. Flores lutei. An potius Bunias?*

## VELLA.

1. VELLA foliis pinnatifidis, filiculis pendulis, *anna*.  
*Vella. Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 186. *Roy. lugdb.* 331.  
*Nasturtium sylvestre, crucæ facie. Baub. pin.* 105.  
*Nasturtium sylvestre valentinum. Clus. hist.* 2. p. 130.  
*Habitat in Hispania.* ☉
2. VELLA foliis integris, filiculis erectis. *PseudoCytisus*.  
*PseudoCytisus flore leucoji luteo. Baub. pin.* 230.  
*Cytisii facie Alysson fruticans quorundam. Lob. ic.* 2.  
 p. 49. *Baub. hist.* 1. p. 374.  
*Habitat in Hispania circa oppidum Aranjuez. D. Mi-*  
*nuart.* 5  
*Planta frutescens, Foliis integris, sessilibus, hirtis, obverse*  
*ovatis, Folliculis erectis. Minuart.*

## ANASTATICA.

1. ANASTATICA. *Hort. cliff.* 328. *Hort. upf.* 183. *hierocuntica*.  
*Roy. lugdb.* 331.

S s

Thlaspi

- Thlaspi Rosa de Hiericho dictum. Moris. hist. 2. p. 228.*  
*f. 5. t. 25. f. 2. 3.*  
*Rosa hierochuntea vulgo dicta Bauh. pin. 484.*  
*Rosa hierochuntica. Com. hort. t. 41.*  
*Habitat in littoribus maris rubri. ☉*

## SUBULARIA.

- aquatica.* 1. SUBULARIA. *Fl. lapp. 253. Fl. suec. 527.*  
*Alyssum palustre, folio junci. Buxb. act. 2. p. 369. t.*  
*23. f. 1.*  
*Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis: sepi-*  
*mento siliculam dirimente. Pluk. alm. 180. t. 188. f. 5.*  
*Habitat in Europæ borealis inundatis lacustribus flu-*  
*viis. ☉*

## DRABA.

- alpina.* 1. DRABA scapo nudo simplici, foliis lanceolatis integer-  
 rimis. *Fl. lapp. 255. Fl. suec. 524. Hort. cliff. 333.*  
*Roy. lugdb. 333. Dalib. parif. 197.*  
*Sedum alpinum hirsutum luteum. Bauh. pin. 284.*  
*Leucojum luteum aizooides montanum. Col. ecph. 2.*  
*p. 62.*  
*Bursa pastoris alpina rosea lutea. Moris. hist. 2. p. 306.*  
*f. 3. t. 20. f. 6.*  
*Habitat in Alpibus Europæ. 2*
- verna.* 2. DRABA caulibus nudis, foliis incis. *Hort. cliff. 333.*  
*Fl. suec. 523. Roy. lugdb. 333. Hall. belw. 538.*  
*Gron. virg. 76.*  
*Bursa pastoris minor, loculo oblongo. Bauh. pin. 108.*  
*Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo T. Segu.*  
*veron. 1. p. 575. t. 4. f. 3.*  
*Pilosella minor. Thal. harc. 84. t. 7. f. E.*  
*Habitat in Europæ aridis. ☉*
- pyrenaica.* 3. DRABA caule nudo, foliis pinnatis ternatisque. *Last.*  
*Alysson pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis.*  
*Tournef. inst. 217.*  
*Habitat in Pyrenæis. 2*
- muralis.* 4. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexi-  
 caulibus. *Roy. lugdb. 33. It. gotl. 192. \* Fl. suec.*  
*525. Hall. belw. 539.*  
*Bursa pastoris major loculo oblongo. Bauh. pin. 108*  
*prodr. 50. t. 50.*  
*Habitat in Europæ nemoribus. ☉*

5. DRA

5. DRABA caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis. *nemorosa*.  
Bursa pastoris alpina hirsuta. *Baub. pin.* 108. *prodr.*  
51. t. 51?

Draba minima muralis discoides. *Col. ceph.* 1. p. 274.  
t. 272.

Habitat in Sueciæ nemoribus. ☉.

Præcedenti simillima, sed folia majora, minus acuta,  
magis hirsuta, sessilia nec amplexicaulia. Flores lutei,  
nec ut in præcedenti albi.

6. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, filiculis ob-  
liquis. *Fl. suec.* 526. *It. gotl.* 192. \*

Draba caule ramoso folioso, foliis dentatis. *Fl. lapp.* 254.

*Hort. cliff.* 334.

Leucojum f. Lunaria vasculo oblongo intorto. *Pluk.*  
*alm.* 215. t. 42. f. 1.

Habitat in Alpibus & alpinis Europæ. ☿

## LEPIDIDIUM.

1. LEPIDIDIUM foliis caulinis pinnato-multifidis, rami-  
perfoliatum, teris cordatis amplexicaulibus integris. *Hort. cliff.* 331.

*Hort. ups.* 183. *Roy. lugdb.* 335.

Nasturtium spicatum persicum perfoliatum maximum.

*Morif. hist.* 2. p. 294. f. 3. t. 25. f. 17.

Thlaspi verum dioscoridis 1. *Zan. hist.* 193.

Habitat in Persia, Syria. ☉

2. LEPIDIDIUM caulium geniculis inflatis.

Lepidium orientale, nasturtii folio, caule vesicario. *Tour-*  
*nef. cor.* 15. *Buxb. cent.* 1. p. 17. t. 26.

Habitat in Iberiæ, Mediæ aridis. ☉

3. LEPIDIDIUM scapo nudo simplicissimo, floribus te-  
trandris.

Lepidium foliis filiformibus apice pinnatifidis, caule nu-  
do. *Sauv. monsp.* 228. 281.

Nasturtium minimum vernalium, foliis tantum circa radi-  
cem. *Magn. monsp.* 187. t. 186.

Habitat Monspeli. ☉

Folia radicalia multa, linearia, apice pinnatifida vel den-  
tata. Siliculæ emarginatæ. Petala æqualia. Stamina. 4.

4. LEPIDIDIUM foliis pinnatis: impari majore, caule pro-  
cumbente. *Sauv. monsp.* 228.

Nasturtium foliis omnibus alternatim pinnatis. *Dalib.*  
*parif.* 194.

644 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

*Nasturtium pumilum supinum vernal. Magn. monsp.*  
185. t. 184.

*Habitat* Montpellii. ☉

*petraeum.*

5. *LEPIDIUM* foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *It. æl.* 52. *Fl. succ.* 535.  
*Nasturtium alpinum tenuissime divisum. Baub. pin.* 105.  
*Nasturtium petraeum annuum nostras. Pluk. alm.* 262.  
t. 206. f. 4. *mal.*

*Cardamine pusilla saxatilis montana discoides. Col. ecphr.* 1. p. 274. t. 273. *bon.*

*Nasturtium pumilum vernal. Baub. pin.* 105.

*Habitat in Lapidosis Oelandiæ, Angliæ.* ☉

*fruticum.*

6. *LEPIDIUM* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Vir. cliff.* 63. *Hort. ups.* 183. *Mat. med.* 322. *Roy. lugdb.* 335.

*Lepidium foliis varie divisis incisisque. Hort. cliff.* 331.

*Nasturtium sylvestre vulgatum. Baub. pin.* 103.

*Nasturtium hortense. Dod. pempt.* 771.

- β. *Nasturtium hortense crispum. Baub. pin.* 104. *prodr.*

44. t. 43.

*Habitat* - - - ☉

*lyratum.*

7. *LEPIDIUM* foliis lyratis crispis.

*Lepidium orientale, nasturtii crispi folio. Tournef. cor.*

15. *itin.* 339. t. 339.

*Habitat in Oriente.*

*latifolium.*

8. *LEPIDIUM* foliis ovato-lanceotatis integris serratis.  
*Hort. cliff.* 330. *Fl. succ.* 533. *Roy. lugdb.* 334. *Dalib. parif.* 194.

*Lepidium latifolium. Baub. pin.* 97.

*Lepidium plinii. Dod. pempt.* 716.

*Habitat in Galliæ, Angliæ umbrosis, succulentis.* &

*subulatum.*

9. *LEPIDIUM* foliis subulatis indivisis sparsis, caule suffruticoso.

*Lepidium, capillaceo folio, fruticosum hispanicum. Tournef. inst.* 216.

*Habitat in Hispania. Læfl.* &

*Radix perennis, cespitem promens foliorum & ramulorum persistentium. Caules vix spithamæ, simplices, plures. Folia sparsa, subulata, linearia, acuta, supra plana, subtus semiteretia. Racemi terminales & ex alis supremis foliorum, simplices. Petala alba. Siliculæ omnino L. ruderalis. Stamina sex.*

10. LE.



10. **LEPIDIUM** floribus diandris apetalis, foliis radicali-*rudera-*  
bus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis.  
*Fl. succ.* 534. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb.* 335.  
*Nasturtium sylvestre*, osyridis folio. *Bauh. pin.* 105.  
*Nasturtium angustifolium.* *Fuchf. hist.* 307.  
*Habitat in Europæ ruderalis & ad vias.* ☉
11. **LEPIDIUM** floribus subtriandris tetrapetalis, foliis li-*Virgini-*  
nearibus pinnatis. *cum.*  
*Lepidium foliis lanceolato-linearibus ferratis.* *Gron. virg.*  
76.  
*Lepidium foliis omnibus lineari-lanceolatis ferratis.* *Roy.*  
*lugdb.* 334.  
*Iberis humilior annua virginiana ramosior.* *Morif. hist.*  
2. p. 311. f. 3. t. 21. f. 2. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1.  
p. 195. t. 123. f. 3. *Raj. hist.* 827.  
*Iberis virginiana latifolia ramosa.* *Morif. præl.* 277.  
*Habitat in Virginia. Jamaicæ glareosis.* ☉
12. **LEPIDIUM** floribus diandris tetrapetalis, foliis in-*Iberis-*  
ferioribus lanceolatis ferratis; superioribus linearibus  
integerrimis. *Roy. lugdb.* 334.  
*Lepidium foliis lanceolato-linearibus ferratis.* *Hort. cliff.*  
331.  
*Iberis latiore folio.* *Bauh. pin.* 97.  
*Iberis.* *Dod: pempt.* 714.  
*Habitat in Germania, Gallia, Italia, Sicilia secus vias.* ☉
13. **LEPIDIUM** floribus diandris tetrapetalis, foliis o-*bonariense.*  
mnibus pinnato-multifidis.  
*Lepidium foliis pinnatifidis incis. Roy. lugdb.* 335.  
*Thlaspi bonariense multifidum, flore invisibili.* *Dill.*  
*elth.* 281. t. 286. f. 370.  
*Habitat in Bonaria.* ☉
14. **LEPIDIUM** foliis lanceolatis amplexicaulibus denta-*Draba.*  
tis. *Hort. cliff.* 331. *Sauv. monsp.* 78. 120.  
*Draba umbellata f. Draba major capitulis donata.* *Bauh.*  
*pin.* 109. *Morif. hist.* 2. p. 313. t. 21. f. 1.  
*Draba 1. vulgaris.* *Clus. hist.* 2. p. 123.  
3. *Draba chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis*  
*& quasi viridibus.* *Morif. hist.* 2. p. 314.  
*Habitat in Germania, præsertim Austria, Gallia, Ita-*  
*lia.* 2

### THLASPI.

1. **THLASPI** siliculis tuberculatis, foliis lanceolatis *peregrinum.*  
integerrimis. *Hort. cliff.* 330. \* *Roy. lugdb.* 334.  
S s 3 Thla-

Thlaspi, capsula cordata, peregrinum. *Bauh. hist.* 2. p. 927. *Morif. hist.* 2. p. 297. f. 3. t. 18. f. 30.  
*Habitat* - - - -

- arvense.* 2. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. lapp.* 251. *Fl. suec.* 530. *Hort. cliff.* 330. *Mat. med.* 323. *Roy. lugdb.* 333.  
 Thlaspi arvense, siliquis latis. *Bauh. pin.* 105.  
 Thlaspi latius. *Dod. pempt.* 712.  
*Habitat in Europæ agris.* ☉

- alliaceum.* 3. THLASPI siliculis subovatis ventricosis, foliis oblongis obtusis dentatis glabris. *Roy. lugdb.* 334.  
 Thlaspi allium redolens. *Morif. hist.* 2. p. 297. f. 3. t. 18. f. 28.  
 Scorodo-Thlaspi ulyssis aldrovandi. *Bauh. hist.* 2. p. 932.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Antecedenti similis, sed Siliculæ ovato-ventricosæ, marginæ minore.*

- saxatiles* 4. THLASPI siliculis ellipticis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. *Sauv. monsp.* 53. 71. †  
 Thlaspi parvum saxatile, flore rubente. *Bauh. pin.* 107.  
 Lithonthlaspi quartum, carnosio rotundo folio. *Col. ecphr.* 1. p. 279. t. 277. f. 2  
*Habitat in Italiæ, G. Narbonensis, Provinciæ saxosis.*

- perfoliatum.* 5. THLASPI siliculis subrotundis, foliis amplexicaulibus cordatis subserratis.  
 Thlaspi foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis. *Guett. stamp.* 142. *Dalib. paris.* 196.  
 Thlaspi arvense perfoliatum majus. *Bauh. pin.* 106.  
 Thlaspi oleraceum. *Tabern. ic.* 462.  
 β. Thlaspi perfoliatum minus. *Bauh. pin.* 106.  
 Thlaspi 3. pumilum. *Clus. hist.* 2. p. 131.  
*Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ apricis, agris*

- hirtum.* 6. THLASPI siliculis subrotundis pilosis, foliis caulinis sagittatis hirsutis. *Roy. lugdb.* 333. *Sauv. monsp.* 120.  
 Thlaspi capsulis hirsutis. *Bauh. hist.* 2. p. 922.  
 Thlaspi villosum, capsulis hirsutis. *Bauh. pin.* 106.  
*prodr.* 212. t. 212.  
*Habitat in Italia, Narbona.*

- campestre.* 7. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Hort. cliff.* 330. *Fl. suec.* 531. *Roy. lugdb.* 333. *Hall. helv.* 544. *Dalib. paris.* 196.

Thla-

*Thlaspi arvense*, vaccariæ incano folio, majus. *Bauh. pin.* 106.

*Thlaspi latifolium*. *Fuchf. hist.* 306.

*Habitat in Europæ arvis, viis argillofis, apricis.* ♂

8. **THLASPI** filiculis obcordatis, foliis radicalibus reniformibus integerrimis. *eu-montanum*.

*Thlaspi* filiculis obverse cordatis, foliis imis spathulatis; summis amplexicaulibus sagittatis. *Sauv. monsp.* 121.

*Thlaspi alpinum*, bellidis cæruleæ folio. *Bauh. pin.* 106.

*Thlaspi montanum*, bursæ pastoris folio. *Col. exphr.* 1. p. 275. t. 276.

*Thlaspi montanum* 2. *Clus. hist.* 2. p. 131.

*Habitat in Helvetiæ, Austriæ, Italiæ, Monspelii petrosis.*

9. **THLASPI** filiculis obcordatis, foliis radicalibus pin-natifidis. *Bursa pastoris*. *Fl. lapp.* 252. *Fl. suec.* 532. *Hort. cliff.* 330. *Mat. med.* 324. *Roy. lugdb.* 334. *Hall. belv.* 545. *Dalib. paris.* 196.

*Bursa pastoris* major, folio sinuato. *Bauh. pin.* 108.

*Bursa pastoris*. *Fuchf. hist.* 611.

- β. *Bursa pastoris* media. *Bauh. pin.* 108.

*Habitat in Europæ cultis ruderatis.* ☉

## COCHLEARIA.

1. **COCHLEARIA** foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *cau-officinalis*. *Fl. lapp.* 256. *Fl. suec.* 537.

*Hort. cliff.* 332. *Mat. med.* 320. *Roy. lugdb.* 335.

*Cochlearia* folio subrotundo. *Bauh. pin.* 110.

*Cochlearia*. *Dod. pempt.* 594.

*Habitat in Europæ borealis littoribus marinis.* ☉

2. **COCHLEARIA** foliis hastatis angulatis. *Fl. succ.* 196. *danica*.

*Cochlearia aremorica*. *Tournes. inst.* 215.

*Thlaspi hederaceum*. *Lob. ic.* 615.

- β. *Cochlearia danica* repens. *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.

- γ. *Cochlearia minor* erecta. *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.

*Habitat in Daniæ, Sueciæ litoribus marinis.* ☉

3. **COCHLEARIA** foliis reniformibus integris. *Hort. grænlantica*. *cliff.* 498. \* *Roy. lugdb.* 335.

*Cochlearia minima* repens insulæ alholmiæ. *Barth. act.*

3. p. 143. t. 144.

*Cochlearia minima*. *Boerb. lugdb.* 2. p. 10.

*Habitat in Norvegia, Islandia, Grœnlandia.* ☉

# 648 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

*saxatilis.*

4. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis serratis; caulinis linearibus. *Sauv. monsp.* 122.

Cochlearia perennis saxatilis minima. *Magn. hort.* 59.

Thlaspi alpinum minus, capitulo rotundo. *Baub. pin.* 107. *prodr.* 48. *t.* 48.

Thlaspi tertium saxatile. *Cam. epit.* 338.

- β. Thlaspi alpinum majus, capitulis rotundis. *Baub. prodr.* 49. *t.* 49. *pin.* 106. *n.* 6. *my* 232

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Monspelii. &

*Coronopus.*

5. COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 331. *Fl. succ.* 539. *Roy. lugdb.* 335. *Dalib. parif.* 195. *Sauv. monsp.* 254.

Ambrosia campestris repens. *Baub. pin.* 138.

PseudoAmbrosia. *Cam. epit.* 596.

Habitat in Europæ apricis, nudis. ☉

*Armoracia.*

6. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Hort. cliff.* 332. *Fl. succ.* 540. *Mat. med.* 321. *Roy. lugdb.* 336.

Raphanus rusticanus. *Baub. pin.* 96.

Raphanis magna. *Dod. pempt.* 678.

Habitat in Europæ fossis & ad rivulos. &

*glaustifolia.*

7. COCHLEARIA foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 332. *Hort. ups.* 184. *Roy. lugdb.* 335.

Lepidium glaustifolium. *Baub. pin.* 97. *Morif. hist.* 2. p. 312. *f.* 3. *t.* 21. *f.* 3.

Lepidium annuum. *Dalech. hist.* 1297.

Habitat - - - - - ♂

## IBERIS.

*semperflo-  
vens.*

1. IBERIS frutescens, foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. *Hort. cliff.* 330. *Hort. ups.* 184. *Roy. lugdb.* 336.

Leucosium fruticosum umbellatum persicum, foliis leucoji instar sempervirentibus. *Morif. hist.* 2. p. 296.

Thlaspi latifolium polycarpon, leucoji foliis. *Bocc. sic.* 55. *t.* 22. *f.* a--1.

Thlaspi fruticosum, folio leucoji, semperflorens. *Seb. thes.* 1. p. 2. *t.* 13. *f.* 4.

Habitat in Sicilia, Persia. ♀

2. IBERIS frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 336.

Thla-

*Thlaspi montanum sempervirens. Baub. pin. 106.*  
*Thlaspi montanum candidum. Dalech. hist. 1180.*  
*Thlaspi creticum perenne, flore albo. Barr. ic. 214. &*  
 734.

*Habitat in Cretæ rupestribus. h*

3. *IBERIS frutescens foliis apice dentatis. gibraltarica.*  
*Thlaspidium hispanicum, ampliore flore, folio crasso*  
*dentato. Dill. elth. 382. t. 287. f. 37.*  
*Habitat ad Gibraltariam Hispaniæ. h*

4. *IBERIS foliis subrotundis crenatis. Roy. rotundifolia.*  
*Thlaspi montanum, serrato cepeæ folio, flore purpura-*  
*scente umbellato. Barr. ic. 848.*  
*Thlaspi alpinum, folio rotundiore carnosio, flore pur-*  
*purascente. Tournef. inst. 212. Scheuch. alp. 50. 143.*  
*Lepidium caule repente, foliis ovatis amplexicaulibus.*  
*Hall. helv. 546.*  
*Habitat in Helvetia. 2*

5. *IBERIS foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus ser- umbellata.*  
*ratis; superioribus integerrimis. Hort. cliff. 330. Hort.*  
*ups. 184. Roy. lugdb. 336.*  
*Thlaspi umbellatum creticum, iberidis folio. Baub. pin.*  
 106.  
*Draba f. Arabis f. Thlaspi candiæ. Dod. pempt. 713.*  
*Habitat in Hetruria, Creta. ☉*  
*Fructus hujus corymbosus hemisphæricus persistit, f. a-*  
*maræ vero racemosus evadit.*

6. *IBERIS foliis lanceolatis indivisis, corymbis hemisphæ- cretica.*  
*ricis. Sauv. monsp. 72. †*  
*Thlaspi creticum, foliis indivisis, f. lini, amarum. Baub.*  
*hist. 2. p. 924.*  
*Habitat Monspelii. ☉*

7. *IBERIS foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus amara.*  
*racemosis. Hort. ups. 184.*  
*Iberis foliis obverse lanceolatis, floribus umbellatis.*  
*Gnest. stamp. 2. p. 146.*  
*Thlaspi umbellatum arvense, iberidis folio. Baub. pin.*  
 106.  
*Thlaspidium folio iberidis. Riv. tetr. 112.*  
*Habitat in Helvetia ☉*

8. *IBERIS foliis linearibus superne dilatatis serratis. Roy. odorata.*  
*lugdb. 336. Hort. cliff. 330.*  
*Thlaspi umbellatum creticum, flore albo odoro, minus.*  
*Baub. pin. 106. Thla-*

*Thlaspi parvum* 4, odorato flore. *Clus. hist.* 2. p. 132.  
*Habitat in Alpibus Allobrogicis.* ☉

- nudicaulis.* 9. *IBERIS* foliis sinuatis, caule nudo simplici. *Hort. cliff.* 328. *Fl. suec.* 536. *It. æl.* 139. *Roy. lugdb.* 336.  
*Bursa pastoris minor*, foliis incis. *Bauh. pin.* 108.  
*Bursa pastoris minor.* *Dod. pempt.* 103.  
*Nasturtium petræum.* *Tabern. ic.* 451.  
*Habitat in Europæ arenosis, sylvaticis, nudis, sterilissimis.* ☉

### ALYSSUM.

\* *Suffruticosa.*

- spinosum.* 1. *ALYSSUM* ramis senilibus spiniformibus nudis.  
*Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331. *Dalib. parif.* 197.  
*Thlaspi fraticolum spinosum.* *Bauh. pin.* 108.  
*Leucojum* f. *Thlaspi spinosum.* *Bauh. hist.* 2. p. 931.  
*Thlaspi spinosum hispanicum.* *Barr. ic.* 808.  
*Habitat in Hispaniæ, Galliæ caulis.* ☿
- montanum.* 2. *ALYSSUM* ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato echinatis. *Hort. ups.* 185.  
*Alyssum foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni.* *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 331.  
*Thlaspi montanum lateum.* *Bauh. hist.* 2. p. 928. t. 929.  
*Habitat in Helvetia.* ☿
- halimifolium.* 3. *ALYSSUM* foliis lanceolato-linearibus acutis integerimis, caulibus procumbentibus perennantibus. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 331.  
*Thlaspi, halimi folio, sempervirens.* *Herm. lugdb.* 594. t. 595.  
 β. *Thlaspi parvum, halimi angusto incano folio.* *Bocc. mus.* 2. p. 45. t. 39.  
*Habitat in Europæ australis aridis.* ☿
- saxatile.* 4. *ALYSSUM* caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis undulatis integris. *Roy. lugdb.* 331. n. 6.  
*Alysson folio leucoji incano, flore luteo.* *Boerb. lugdb.* 2. p. 3.  
*Alyssum creticum saxatile, foliis undulatis incanis.* *Tournef. cor.* 15.  
*Habitat in Creta.* ☿

\* *Herbacea.*

- incanum.* 5. *ALYSSUM* caule erecto, foliis lanceolatis incanis integris.

# TETRADYNAMIA SILICULOSA. 651

tergerrimis, floribus corymbosis. *Hort. cliff.* 332. *Fl. suec.* 528. *Roy. lugdb.* 331.

*Thlaspi fruticosum incanum. Bauh. pin.* 108.

*Thlaspi incanum machliniense. Clus. hist.* 2. p. 132.

*Habitat in Europæ septentrionalioris arenosis, apricis. & ♂*

6. ALYSSUM caulis herbaceis diffusis, foliis linearibus *minimum*,  
bus tomentosis, siliculis compressis.

*Alyssum procumbens annuum, foliis linearibus lanceolatis  
subtomentosis. Sauv. meth.* 70.

*Lunaria annua minima hispanica, folio leucoji maritimi. Barb. lugdb.* 2. p. 6.

*Habitat in Hispania. ☉*

7. ALYSSUM caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus *clypeatum*,  
ovalibus compresso-planis, petalis acuminatis.

*Lunaria siliculis subsessilibus incanis lateralibus. Roy. lugdb.* 333.

*Lunaria leucoji folio, siliqua oblonga majori. Tournef. inst.* 218.

*Leucojum alyssoides clypeatum majus. Bauh. pin.* 201.

*Alysson dioecoris. Dod. pempt.* 89.

*Habitat in Europa australi. ☉*

8. ALYSSUM caule herbaceo, foliis lanceolatis *dentato-sinuatis*,  
tis, siliculis inflatis

*Alyssum foliis lanceolatis repando-dentatis. Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 332.

*Alyssoides incanum, foliis sinuatis. Tournef. inst.* 213.

*Leucojum incanum, siliquis rotundis. Bauh. pin.* 201.

*Erica peregrina. Clus. hist.* 2. p. 134.

*Habitat in Hispaniæ incultis, ad vias. ☉ ♂*

*Petala bifida. Filamenta lateralibus obsolete dentata.*

9. ALYSSUM caule herbaceo erecto, foliis incanis *lan-*  
ceolatis integerrimis, siliculis inflatis. *creticum*.

*Alyssoides fruticosum creticum, leucoji folio incano. Tournef. cor.* 15.

*Leucojum luteum, utriculato semine. Alp. exot.* 117. t. 118.

*Habitat in Creta.*

10. ALYSSUM foliis linearibus dentatis, siliculis inflatis *Vesicaria*,  
angularis acutis.

*Vesicaria orientalis, foliis dentatis. Tournef. cor.* 49. *itin.* 2. p. 97. t. 14.

*Habitat in Oriente.*

11. ALYSSUM foliis incanis dentatis, flaminibus quatuor *hyperboreum*  
bifurcatis. *Lu-*

## 652 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

*Lunaria foliis ellipticis incondite dentatis. Kraschen. act. petr. 1747. p. 381. t. 15. f. 1.*

*Habitat in America septentrionali. D. Krascheninnikof. Stamina 2 breviora ungue acuto notata, reliqua 4 ad basin squama emarginata.*

### CLYPEOLA.

*Jonthlaspi.* 1. CLYPEOLA filiculis unilocularibus monospermis.

*Hort. cliff. 329. Hort. upf. 185. Roy. lugdb. 332.*

*Thlaspi clypeatum, serpilli folio. Bauh. pin. 107.*

*Jonthlaspi minimum spicatum lunatum. Col. ecphr. 1. p. 281. t. 284.*

*Habitat in Italiæ, Narbonæ sabulosis. ☉*

*Alyssoides.* 2. CLYPEOLA filiculis bilocularibus tetraspermis. *Hort. cliff. 329. Roy. lugdb. 332.*

*Thlaspi Alysson dictum campestre majus. Bauh. pin. 107.*

*Alysson minimum. Clus. hist. 2. p. 133.*

*Habitat in Austria, Gallia. ☉*

*campestre.* 3. CLYPEOLA annua, filiculis bilocularibus dispermis, calycibus persistentibus. *Sauv. monsp. 71. †*

*Thlaspi Alysson dictum campestre minus. Bauh. pin. 107.*

*Habitat in Gallia. ☉*

*maritima.* 4. CLYPEOLA perennis, filiculis bilocularibus ovatis dispermis. *Sauv. monsp. 71. †*

*Thlaspi Alysson dictum maritimum. Bauh. pin. 107.*

*Thlaspi narbonense, centunculi angusto folio. Tabern. ic. 461.*

*Habitat in G. Narbonensi. &*

### BISCUTELLA.

*auriculata.* 1. BISCUTELLA calycibus nectario utrinque gibbis, filiculis in stylum coeuntibus. *Hort. cliff. 329. Hort. upf. 185. Roy. lugdb. 336.*

*Thlaspidium biseutatum villosum, flore calcari donato. Bauh. pin. 107. prodr. 49.*

*Leucojum montanum, flore pedato. Col. ecphr. 2. p. 59. t. 61.*

*JonDraba alyssoides lutea angustifolia. Barr. ic. 230.*

*Habitat in Italia, Galloprovincia. ☉*

2. BI-



## TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 653

2. BISCUTELLA filiculis orbiculato-didymis a stylo *didym.*  
divergentibus. *Hort. cliff.* 329. *Hort. upf.* 185. *Roy. lugdb.* 337. *Sauv. monsp.* 72. 282.  
Thlaspi bitcutatum asperum hieracifolium majus. *Bauh. pin.* 107.  
Thlaspi clypeatum. *Clus. hist.* 2. p. 133.
- β. Jon Draba alyssoides apula spicata. *Col. ecphr.* 1. p. 283.  
1. 285.  
*Habitat in* Germania, Gallia, Italia. ☉  
*Vulgaris fructu majori: disco glabro; Rarior minori fructu: disco scabro.*

## LUNARIA.

1. LUNARIA filiculis oblongis. *rediviva.*  
Lunaria foliis cordatis. *Hort. cliff.* 333. *Fl. suec.* 529.  
*Roy. lugdb.* 332.  
Viola lunaria major, filiqua oblonga. *Bauh. pin.* 203.  
Viola latifolia. Lunaria odorata. *Clus. hist.* 1. p. 297.  
*Habitat in* Europa septentrionaliore. 2
2. LUNARIA filiculis subrotundis. *anina.*  
Lunaria major, filiqua rotundiore. *Bauh. hist.* 2. p. 881.  
Viola latifolia. *Dod. pempt.* 161. *Dalech. hist.* 805.  
*Habitat in* Germania.  
*Ita affinis precedenti, ut etiamnum dubium utram vere distincta.*

## SILIQUOSA.

### DENTARIA.

1. DENTARIA foliis ternis ternatis. *enneaphyllos*  
Dentaria foliis omnibus ternatis. *Roy. lugdb.* 340.  
Dentaria triphyllos. *Bauh. pin.* 322. *Clus. hist.* 2. p. 121. n. 5  
*Ceratia plinii. Col. ecphr.* 1. p. 308. 1. 307.  
*Habitat in* Austria, Italia. 2
2. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. *bulbifera.*  
*Hort. cliff.* 335. *Fl. suec.* 565. *Roy. lugdb.* 340. *Hall. helv.* 557.  
Dentaria heptaphyllos baccifera. *Bauh. pin.* 322.  
Dentaria heptaphyllos baccifera. *Clus. hist.* 2. p. 121.
- β. Dentaria baccifera, foliis ptarmicæ. *Bauh. pin.* 322.  
*Habitat in* Europa australi ad radices montium umbrosas. 2
3. DEN-

654 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- pentaphyllos* 3. DENTARIA foliis summis digitatis.  
 α. Dentaria foliis septenis, superioribus quinatis *Hall. helv.* 556.  
 Dentaria heptaphyllos. *Baub. pin.* 322.  
 Dentaria 8. heptaphyllos. *Clus. hist.* 2. p. 123.  
 β. Dentaria pentaphyllos, foliis molliibus. *Garid. prov.* 152. t. 29.  
 Dentaria pentaphyllos. *Baub. pin.* 322.  
 γ. Dentaria pentaphyllos, foliis asperis. *Tournef. inst.* 225.  
 Dentaria 6. pentaphyllos 1. *Clus. hist.* 2. p. 122.  
*Habitat in Alpibus* Helveticis, Allobrogicis, aliisque. &

CARDAMINE.

\* *Foliis simplicibus.*

- bellidisfolia* 1. CARDAMINE foliis simplicibus ovatis integerrimis: petiolis longis. *Fl. lapp.* 208. t. 9. f. 2. *Fl. suec.* 564. *Hall. helv.* 568.  
 Nasturtium alpinum, bellidis folio, minus. *Baub. pin.* 105.  
 Plantula cardamines æmula. *Clus. hist.* 2. p. 129.  
*Habitat in Alpibus* Lapponiæ, Helvetiæ, Britannicæ. &  
*asarifolia* 2. CARDAMINE foliis simplicibus subcordatis.  
 Nasturtium montanum, asari folio. *Bocc. sic.* 5. t. 3. *Herm. par.* 203. t. 203. *Raj. hist.* 816.  
 Nasturtium alpinum palustre rotundifolium, radice repens. *Morif. hist.* 2. p. 224.  
 Nasturtium alpinum, bellidis folio, majus. *Baub. pin.* 105. *prodr.* 46?  
*Habitat in Alpibus* Italicis.  
*nudicaulis* 3. CARDAMINE foliis simplicibus lanceolatis sinuato-dentatis, caulibus nudis.  
*Habitat in* Sibiria. *D. Gmelin.*  
*petræa* 4. CARDAMINE foliis simplicibus oblongis dentatis.  
 Cardamine petræa cambrica, nasturtii facie. *Dill. eltb.* 70. t. 61. f. 71.  
 Nasturtium petræum. *Pluk. alm.* 261. t. 101. f. 3. *Pet. herb.* 50. f. 3.  
*Habitat in* Angliæ, Arvonix, Merviniæ, Sueciæ rupibus excelsis.

\* *Foliis ternatis.*

- trifolia* 5. CARDAMINE foliis ternatis obtusis, caule subnudo.

Car

# TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 655

Cardamine foliis ternatis. *Hall. belv.* 559. *Fl. succ.* 563.

Cardamine foliis ternatis crenatis, caule simplici. *Fl.*

*lapp.* 259. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 346.

Cardamine alpina trifolia. *Clus. hist.* 2. p. 127.

Nasturtium alpinum trifolium. *Bauh. pin.* 104.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis.*

## 6. CARDAMINE foliis ternatis acuminatis, caule ramuloso.

Nasturtium africanum, foliis ternis, facie christophorianæ. *Herm. par.* 202. t. 202.

Nasturtium africanum, floribus albis spicatis, foliis ternis christophorianæ facie. *Pluk. alm.* 152. t. 101. f.

5. *Raj. suppl.* 414.

*Habitat in Africa.*

\* *Foliis pinnatis.*

## 7. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis quinis incis. (*Chelidonia*).

Cardamine glabra, chelidonii folio. *T. Barr. ic.* 156.

Nasturtium pyrenæorum aquaticum latifolium, purpurascens flore. *Herm. par.* 203. t. 204.

*Habitat in Sibiria, Italia.*

## 8. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus apetalis. *It. impatiens.*

*Wgoth.* 26.

Cardamine foliis pinnatis: pinnis laciniatis. *Hort. cliff.*

336. *Fl. succ.* 561. *Roy. lugdb.* 345. *Hall. belv.* 557.

*Sauv. monsp.* 255.

Sisymbrium cardamines species quædam insipida. *Bauh. hist.* 2. p. 886.

*Habitat in Europæ nemoribus ad radices montium.* ☉

## 9. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *græca.*

Nasturtium montanum nanum, rotundo thalictri folio,

cyrenæum. *Bocc. mus.* 2. p. 171. t. 166.

Sio minimo prosperi alpini affinis, filieulis latis. *Bocc. sic.* 84. t. 44. f. 2.

*Habitat in Sicilia, Corsica, insulis Græciæ.* ☉

## 10. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *bisfuta.*

*Hort. cliff.* 336. *Fl. succ.* 562. *Roy. lugdb.* 345.

*virg.* 77.

Nasturtium aquaticum minus. *Bauh. pin.* 104.

Sisymbrium aquaticum alterum. *Cam. epit.* 270.

*Habitat in Europæ arcis, hortis, arvis.*

## 11. CAR-

*pratensis.*

11. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; caulinis lanceolatis.

Cardamine foliis pinnatis: foliolis subrotundis integris.

*Fl. succ.* 559. *Dalib. parif.* 198.

- Cardamine foliis pinnatis, caule erecto. *Fl. lapp.* 258.

*Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 345.

Nasturtium pratense, magno flore. *Bauh. pin.* 104.

Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.

- β. Nasturtium pratense, folio rotundiore, flore majore.

*Bauh. pin.* 104.

*Habitat in Europæ pascuis agnoscis.* 2

*stylata.*

12. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *It. W. goth.* 76. \*

Cardamine foliis pinnatis, foliolis subrotundis angulosis.

*Hall. belv.* 558. *Fl. succ.* 560. *Dalib. parif.* 199.

Nasturtium aquaticum majus & amarum. *Bauh. pin.* 104.

*Habitat in Europæ septentrionalioris nemoribus.* 2

*resedifolia.*

13. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis decurrentibus confluentibus.

Nasturtium alpinum minus, resedæ folio. *Bauh. pin.*

104. *prodr.* 45. t. 45. *Bocc. mus.* 2. p. 41. t. 46.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis.*

*Virginica.*

14. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis lanceolatis basi unidentatis,

Alyssum foliis radicalibus pinnatis in orbem positis; cau-

linis lanceolatis, siliculis compressis. *Gron. virg.*

170.

Nasturtium, bursæ pastoris folio, virginianum, flore albo, siliqua compressa. *Pluk. alm.* 251. t. 101, f. 4.

*Habitat in Virginia.*

Folia radicalia in orbem digesta, pinnata: foliolis numerosis, fere imbricatis, sub lanceolatis, a latere postico denticulo uno brevi juxta basin. Caulis minus foliosus: foliis raris, sæpius linearibus integris. Habitus Bursæ pastoris

\* Foliis supradecompositis.

*Lunaria.*

15. CARDAMINE foliis supradecompositis, siliquis unilocularibus pendulis,

*Habitat in Ægypto. D. B. Jussiens.*

Folia supradecomposita. Siliquæ latæ, membranaceo-compressæ, fere Lunariæ. Semina orbiculata, emarginata.

SISYM-

## SISYMBRIUM.

\* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. **SISYMBRIUM** siliquis declinatis, foliis pinnatis; fo-  
liolis subcordatis. *Hort. cliff.* 336. *Fl. succ.* 552. *It.* *Nasturtium*  
*Scam.* 278. \* *Mat. med.* 331. *Roy. lugdb.* 340. *Gron.*  
*virg.* 170. *Dalib. paris.* 203.  
Sisymbria Cardamine. *Fuchf. hist.* 723.  
Nasturtium aquaticum supinum. *Bauh. pin.* 104.  
*Habitat in Europa & America septentrionali ad fontes*

2. **SISYMBRIUM** siliquis declinatis, foliis pinnatis: fo-  
liolis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.*  
341. *Dalib. paris.* 204. *Sauv. monsp.* 228. *Bœhm.*  
*lipf.* 118. *Gort. gelr.* 399.  
Eruca palustris, nasturtii folio, siliqua oblonga. *Bauh.*  
*pin.* 98.  
Eruca quibusdam sylvestris repens, flosculo luteo. *Bauh.*  
*hist.* 2. p. 866.  
Eruca sylvestris minor, luteo parvoque flore. *Bauh. pin.*  
98.  
Eruca sylvestris *Fuchf. hist.* 263.  
*Habitat in Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ ruderalis. &*

3. **SISYMBRIUM** siliquis, declinatis, oblongo-ovatis, *amphibium*.  
foliis pinnatifidis serratis.  
a. Sisymbrium foliis pinnatifidis serratis. *Fl. succ.* 551. palustre.  
Sisymbrium foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis.  
*Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. paris.* 203.  
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis.  
*Bauh. pin.* 97. *prodr.* 38. t. 38. *Fl. lapp.* 262.  
β. Sisymbrium foliis simplicibus dentatis serratis. *Hort. aquaticum.*  
*cliff.* 336. *Fl. succ.* 350. *Roy. lugdb.* 341. *Hall. helv.*  
548.  
Raphanus aquaticus, rapistri folio. *Bauh. pin.* 97.  
Raphanus aquaticus alter. *Bauh. prodr.* 38. t. 38.  
♂ Sisymbrium aquaticum, foliis variis. *Vaill. paris.* 185. terrestre.  
Sisymbrium foliis imis integris ovatis serratis, superio-  
ribus pinnatis. *Hall. helv.* 548.  
*Habitat in Europæ septentrionalioris aquosis.*

\* *Siliquis sessilibus axillaribus.*

4. **SISYMBRIUM** siliquis axillaribus subsessilibus solita-  
riis, foliis dentato-angustatis. *Hort. nuss.* 192.  
Erysimum caule decumbente, siliqua laterali subsessili.  
*Roy. lugdb.* 343. *Dalib. paris.* 201.

T t

Eruca

## 658 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

*Eruca supina alba*, siliqua singulari e foliorum alis erumpente. *Isnard. act.* 1724. p. 295. t. 18.

*Habitat* Parisiis ad agrorum margines, inque Hispania.

*polyceratum* 5. **SISYMBRIUM** siliquis axillaribus sessilibus subulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Hort. ups.* 193. *Sauv. monsp.* 283.

*Erysimum* siliquis in alis foliorum sessilibus. *Hort. cliff.* 337.

*Erysimum polyceratum* f. *corniculatum*. *Bauh. pin.* 101.

*Iris altera*. *Dalech. hist.* 653.

*Habitat* in Helvetiæ, Italiæ *ruderatis*. ☉

*minrale,* 6. **SISYMBRIUM** foliis lyratis denticulatis, siliquis sessilibus.

*Sisymbrium* foliis sinuato-pinnatis. *Guetz. stamp.* 150.

*Dalib. parif.* 205.

*Eruca sylvestris minor lutea*, bursæ pastoris folio. *Bauh. pin.* 98. *prodr.* 39. *Barr. ic.* 1016.

*Eruca ficula*, bursæ pastoris folio. *Bocc. sic.* 18.

*Habitat* in Gallia, Sicilia.

\* *Caule nudo.*

*vimineum.* 7. **SISYMBRIUM** foliis lanceolatis sinuato-ferratis, caule subnudo erectiusculo. *Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341. *Dalib. parif.* 204.

*Eruca*, minimo flore, monspeliensis. *Bauh. hist.* 2. p. 862.

*Bellis viminea*, ibiridis folio, luteo flore. *Barr. ic.* 131.

*Habitat* Parisiis & ad Tyberis margines, inque Moravia.

*arenosum.* 8. **SISYMBRIUM** foliis lyrato-ferratis scabris radicalibus, caule subnudo ramofo.

*Eruca cærulea* in arenosis proveniens. *Bauh. pin.* 99. *prodr.* 40. *fig. mal.*

*Eruca sylvestris major minorque*, foliis subasperis in orbem sparsis. *Læf. pruss.* 68. t. 13. *bon.*

*Habitat* in Germania, Helvetia.

*monense.* 9. **SISYMBRIUM** foliis pinnatifidis integerrimis, caulibus subnudis simplicibus procumbentibus.

*Eruca monensis laciniata*, flore luteo majore. *Dill. elsh.* 135. t. III. f. 135.

*Habitat* in Mona, insula Angliæ.

\* *Bipin-*

\* *Foliis bipinnatis.*

10. **SISYMBRIUM** siliquis scabris, foliis pinnatifidis: *asperum.*  
pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calyce  
longioribus. *Sauv. monsp.* 283. †  
*Sisymbrium* foliis pinnatifidis subdentatis angustissimis.  
*Sauv. monsp.* 255.  
*Sinapi parvum*, siliqua aspera. *Bauh. pin.* 99. *prodr.* 41.  
*Sinapi monspellanum*, siliqua aspera hirsuta. *Bauh. hist.*  
2. p. 857.  
*Habitat* Monspelii.
11. **SISYMBRIUM** petalis calyce minoribus, foliis de *Sophia,*  
composito-pinnatis. *Fl. suec.* 553. *Dalib. paris.* 204.  
*Mat. med.* 332.  
*Sisymbrium* corolla calyce minore, foliis multifidis line-  
aribus. *Fl. lapp.* 261. *Hall. helv.* 337. *Roy. lugdb.* 341.  
*Descurea.* *Guet. stamp.* 2. p. 164.  
*Nasturtium sylvestre tenuissime divilum.* *Bauh. pin.* 105.  
*Scriphium Absinthium.* *Fuch. hist.* 2.  
*Habitat* in Europæ maceris, muris, tectis. ☉
12. **SISYMBRIUM** foliis pinnatis: foliolis lanceolatis *tanacetifo-*  
pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 342. *lium.*  
*Eruca fruticosa*, foliis tanacetii, indica. *Zan. hist.* 86. t.  
33.  
*Eruca tanacetii* foliis. *Morif. hist.* 2. p. 231. f. 2. t.  
6. f. 19.  
*Habitat* in Sabaudia?
13. **SISYMBRIUM** foliis pinnato-hastatis flaccidis: foli- *atriginum.*  
olis sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Hort.*  
*ups.* 193. \* *Sauv. monsp.* 229.  
*Erythimum* siliquis laxis, foliis hastato-pinnatis. *Hort. cliff.*  
338. *Sauv. monsp.* 284.  
*Rapistrum italicum*, siliquis longissimis. *Bauh. pin.* 95.  
*Rapistrum montanum* f. *sylvestre*, irionis folio. *Col.*  
*ecphr.* 1. p. 266. t. 268.  
*Erythimum monspellanum*, sinapios folio. *Walt. hort.*  
55. t. 22.  
*Habitat* in Italia, Gallia, Sibiria. ☉
14. **SISYMBRIUM** foliis pinnato-hastatis dentatis, sili- *lrio.*  
quis erectis.  
*Erythimum* foliis lyrato-pinnatis: extimo hastato. *Fl. suec.*  
556. *Dalib. paris.* 201. *Sauv. monsp.* 284.  
*Erythimum latifolium majus glabrum.* *Bauh. pin.* 101.  
*lrio lævis apulus*, erucæ folio. *Col. ecphr.* 1. p. 264. t. 265.  
T t 2 *Habi-*

*Habitat in Europæ cultis.*

*Differt ab S. altissimo Foliis summis non in pinnas lineares longissimas sectis; Foliis omnibus magis dentatis, Caule brevior, minus glabro; Siliquis magis erectis nec laxis subpendulis.*

\* *Foliis lanceolatis integris.*

*strictissimum* 15. **SISYMBRIUM** foliis lanceolatis dentato-ferratis caulinis. *Hort. cliff.* 337. *Hort. upf.* 192. *Roy. lugdb.* 341.

*Draba lutea, siliquis strictissimis. Bauh. pin.* 110.

*Arabis quibusdam dicta planta. Cam. epit.* 342.

*Habitat in Helvetiæ montibus. &*

*integrifolium* 16. **SISYMBRIUM** foliis linearibus integerrimis, pedunculis glutinoso-hispidis.

*Hesperis caule ramolissimo, foliis linearibus, pedunculis hispidis. Gmel.*

*Habitat in Sibiria.*

*Caulis digiti longitudine. Folia linearia, glabra, obtusiuscula. Racemi terminales, pubescentes, visciidi. Flores mascululi, albi. Siliquæ lineares.*

## ERYSIMUM.

*officinale.* 1. **ERYSIMUM** siliquis spicæ adpressis. *Hort. cliff.* 337. *Fl. suec.* 554. *Mat. med.* 333. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. parif.* 200.

*Erysimum vulgare. Bauh. pin.* 100.

*Verbena mas. Fuchf. hist.* 592.

*Habitat in Europæ ruderatis. ☉*

*Barbarea.* 2. **ERYSIMUM** foliis lyratis extimo subrotundo. *Fl. suec.* 557. *Mat. med.*

*Erysimum foliis basi pinnato-dentatis apice subrotundis.*

*Fl. lapp.* 264; *Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 342.

*Dalib. parif.* 202.

*Eruca lutea latifolia f. Barbarea. Bauh. pin.* 98.

β. *Sisymbrium, erucæ folio glabro, minus & procerius.*

*Tournef. inst.* 226.

γ. *Sisymbrium orientale, barbæræ facie, folio rotundo.*

*Tournef. cor.* 16.

*Habitat in Europa.*

*Alliaria.* 3. **ERYSIMUM** foliis cordatis. *Hort. cliff.* 338. *Fl. suec.* 558. *Mat. med.* 334. *Roy. lugdb.* 342. *Dalib. parif.* 201.

Alliaria



*Alliaria. Baub. pin. 110. Fuchf. hist. 104. Cam. epit. 589.*

*Habitat in Europæ sepibus, cultis, umbrosis. ♂*

4. **ERYSIMUM** foliis integris lanceolatis. *Fl. lapp. 263. cheiranthoides. Hort. cliff. 337. Fl. Junc. 555. Roy. lugdb. 342. Dalib. parif. 202.*

*Turritis foliis integris lanceolatis. Guett. stamp. 2. p. 165.*

*Myagrum siliqua longa. Baub. pin. 109.*

5. *Camelina, Myagrum alterum thlaspi effigie. Lob. ic. 225.*

*Habitat ubique in Europæ arvis. ☉*

*Habitus simillimus Cheirantho Erysimoidæ præter flores minores & siliquas magis patulas. Stigmata in hac parte vix divisa, in sequenti quasi ex nodis duobus divaricatis constricta.*

### CHEIRANTHUS.

1. **CHEIRANTHUS** foliis lanceolatis dentatis, caule re-*erysimoides.*  
cto, siliquis tetragonis,

*Erysimum foliis integris lanceolatis margine repando-dentatis. Hort. upf. 192.*

*Leucojum luteum sylvestre angustifolium. Baub. pin. 202.*

*Leucojum sylvestre. Clus. hist. 1. p. 299. Baub. hist. 2. p. 873.*

*Habitat in Hungaria, Gallia. ♂*

2. **CHEIRANTHUS** foliis lanceolatis acutis glabris. *Cheiri.*

*Hort. cliff. 334. Hort. upf. 187. Mat. med. 335.*

*Roy. lugdb. 337. Guett. stamp. 2. p. 156. Dalib.*

*parif. 197. Gort. gelr. 382.*

*Leucojum luteum vulgare. Baub. pin. 202.*

*Leucojum luteum. Dod. pempt. 160.*

3. *Leucojum luteum, magno flore. Baub. pin. 202.*

4. *Leucojum luteum, serrato folio, flore grandiore. Baub. pin. 202. prodr. 102.*

5. *Leucojum luteum, pleno flore, majus. Baub. pin. 202.*

6. *Leucojum, pleno flore, minus. Baub. pin. 202.*

*Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Galliæ, Hispaniæ muris, testis. ♂. 2. b.*

3. **CHEIRANTHUS** foliis lanceolatis subdentatis retu-*ebius,*  
tis, siliquis apice subulatis. *Hort. upf. 187.*

*Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis dentatis.*

*Hort. cliff. 335. n. 3. Roy. lugdb. 337. n. 3.*

T t 3

Hesperis

Hesperis siliquis hirsutis, flore parvo rubello. *Dill. elth.*  
180. t. 147. f. 178.

Leucojum thlaspeos facie, flore albo. *Herm. par.* 192.  
t. 193.

*Habitat in Chio.* ☉

*incanus.*

4. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Hort. ups.* 187. *Hort. cliff.* 334.

Leucojum, incano folio, hortense. *Bauh. pin.* 200. n.  
1. 2. 4. 5. 6. 7.

Viola alba & purpurea. *Lob. ic.* 329.

*Habitat in Hispaniæ maritimis.* 2. b.

*annuus.*

5. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo.

Leucojum incanum minus. *Bauh. pin.* 200.

*Habitat in Europæ australis maritimis.* ☉

*Forte sola varietas antecedentis?*

- fruticulosus.* 6. CHEIRANTHUS foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus petalis undatis, caule suffruticoso. *Læff.*

Leucojum maritimum angustifolium. *Bauh. pin.* 201.

Leucojum minus, breviori folio, obsoleto flore. *Barr.*  
*ic.* 99. n. 2.

Leucojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore. *Bocc.*  
*mus.* 148. t. 111.

*Habitat in Hispania, Italia, Mœnspeii.* b

*trilobus.*

7. CHEIRANTHUS foliis dentatis obtusis, calycibus lævibus, siliquis nodosis mucronatis.

Leucojum martinum minimum hispanicum vernum, foliis erucæ. *Tournef. inst.* 221?

Leucojum maritimum minimum. *Bauh. pin.* *Burf.*  
XI. 28.

*Habitat in Hispania & prope insulas Stœchadum.* ☉

Caules ramosi, patuli, spithamei, incani. Folia lanceolata, obtusa, unico vel duobus utrinque dentibus profundioribus. Calyces non pilosi. Corolla purpurea, majuscula. Siliquæ lineares, teretiusculæ, suturis carinatae, lateribus torulis nodosæ, apice longo subulato acuminatæ.

*lacernus.*

8. CHEIRANTHUS foliis lacero-dentatis acuminatis, calycibus pilosis, siliquis nodosis mucronatis.

Leu-

*Leucojum lusitanicum purpureum*, foliis eleganter dentatis. *Herm. parad.* 193. t. 193.

*Habitat in Lusitania.* ☉

9. CHEIRANTHUS siliquarum apicibus tridentatis. *tricuspidatus*  
*Hort. cliff.* 335. *Roy. lugdb.* 338.

*Leucojum marinum.* *Cam. hort.* 87. t. 24. *Morif. hist.* 2. p. 242. f. 3. t. 8. f. 13.

*Habitat in Europæ australis maritimis?* ☉

10. v. *asp.* 1198. HESPERIS.

1. HESPERIS caule hispido ramoso patente. *Hort. ups.* 187. *triflis.*

*Hesperis caule hispido procumbente.* *Hort. cliff.* 335.  
*Roy. lugdb.* 338.

*Hesperis montana pallida odoratissima.* *Bauh. pin.* 202.

*Hesperis pannonica.* *Com. hort.* t. 18.

*Habitat in Hungaria.* ♂

2. HESPERIS caule simplici erecto, foliis ovato-lanceo-*matronalis.*  
latis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Hort.*

*cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 338. *Dalib. paris.* 197. *Ups.* 188.

*Hesperis hortensis.* *Bauh. pin.* 202.

*Viola matronalis.* *Dod. pempt.* 161.

*Habitat in Italia.* ♂

3. HESPERIS caule simplici, foliis lanceolatis dentato-*sibirica.*  
ternatis, petalis obtusissimis integris.

*Habitat in Sibiria.* ♀

Habitus omnibus partibus *H. matronalis*, ut facile pro varietate haberem; Differt vero Caule duplo altiore; Corollis purpureis nec albidis; Unguibus petalorum calyce duplo longioribus; Petalorum bracteis obtusis vix ac ne vix emarginatis, cum præcedentis emarginatæ ungue intermedio parvo prominulo. Folia longiora, angustiora, magis serrata. Cæterum Sibiria producit varias plantas majores: *Ononidem*, *Polemonium*, *Serratulam*.

4. HESPERIS caule ramosissimo diffuso, foliis lanceola-*africana.*  
tis serratis scabris, siliquis sessilibus.

*Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis sæpius dentatis.* *Hort. cliff.* 335. *Roy. lugdb.* 338.

*Hesperis africana, hieracii folio hirsuto, flore minimo purpurascente.* *Niss. act.*

*Hesperis sylvestris, parvo flore.* *Bauh. pin.* 202. *prodr.* 103. *Burf.*

*Habitat in Africa.* ☉

T t 4

5. HESPE-

*provincialis.* 5. HESPERIS caule ramoso diffuso, siliquis teretibus.  
*Hort. ups.* 188.

Cheiranthus foliis lanceolato-linearibus acutis glabris utrinque dentatis. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb.* 337.

Leucojum minus, lavendulæ folio, obsoleto flore, angustifolium. *Bocc. mus.* 2. p. 148. *p.* 111. *Barr. ic* 803.

*Habitat in* Galloprovincia. 2

*dentata.* 6. HESPERIS foliis dentato-pinnatifidis, caule lævi.

Hesperis foliis multifidis. *Roy. lugdb.* 338.

Hesperis flore albo minimo, siliqua longa, folio profunde dentato. *Dill. elth.* 179. *t.* 148. *f.* 177.

*Habitat in* Sicilia. ☉

*verna.* 7. HESPERIS caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus ferratis villosis.

Turritis annua verna, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 224.

Leucojum minus rotundifolium, flore purpureo. *Barr. ic.* 876.

Leucojum maritimum latifolium. *Morif. hist.* 2. p. 241. *f.* 3. *z.* 8. *f.* 5.

Leucojum marinum alterum latifolium purpuro-violaceum. *Lob. ic.* 333.

Leucojum maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 201.

Rapistrum floribus leucoji marini. *Bauh. pin.* 95. *prodr.* 37. *Burf. IV.* 47.

*Habitat in* Galloprovinciae maritimis.

## ARABIS.

*alpina.* 1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Hort. cliff.* 335.

α. Arabis foliis amplexicaulibus dentatis, caule erecto simplici. *Roy. lugdb.* 338. *Hall. belv.* 561.

Arabis caule simplici, foliis ovatis utrinque dentatis. *Fl. lap.* 257.

Draba alba siliquosa repens. *Bauh. pin.* 109.

Draba 3, succulento folio. *Clus. hist.* 2. p. 125.

β. Draba foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuso ramoso. *Roy. lugdb.* 339.

Draba alba siliquosa. *Bauh. pin.* 109.

γ. Draba 2: *Clus. hist.* 2. p. 24.

*Habitat in* Alpibus Helveticis, Lapponicis.

*Mire varians ex loco planta. α. brevis erecta alpina; β altera, inferne procumbens magna; hinc facie diversissima.*

2. ARA-

2. ARABIS caule nudo. *Amæn. acad.* 358. t. 4. f. 20. \* *grandiflora.*  
*Habitat in Sibiria.* ☉
3. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Vir. thaliana.*  
*cliff.* 64. *Fl. suec.* 567. *Roy. lugdb.* 339. *Dalib. paris.*  
200.  
Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exor-  
tum ramorum solitaris. *Hort. cliff.* 339.  
Bursæ pastoris similis siliquosa major. *Bauh. pin.*  
108.  
Pilosella siliquosa minor. *Thal. harc.* 84. t. 7. f. D.  
*Habitat in Europæ septentrionalioris subulosis.* ☉
4. ARABIS foliis glabris radicalibus lyratis: caulinis li-  
nearibus. *lyrata.*  
Cheiranthus caule filiformi lævi, foliis lanceolatis: infi-  
mis incis. *Gron. virg.* 76.  
*Habitat in Canada.* D. Kalm. ☉  
*Statura & habitus A. thalianæ, præter quod folia radi-*  
*calia lyrata, glabra, & flores majores.*
5. ARABIS foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris. *canadensis.*  
Eruca virginiana, bellidis majoris folio. *Pluk. alm.* 136.  
t. 86. f. 8.  
Turritis foliis lanceolatis dentatis: radicalibus maximis,  
siliquis compressis sulcatis. *Gron. virg.* 77?  
Planta erecta, pedalis bipedalis, lævis. Folia lato-lanceo-  
lata, 4 vel 5 denticulis crassis remotis serrata utrinque.  
Racemus terminalis nudus, & ex summis alis duæ  
vel tres laterales racemi.
6. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis ancipitibus li-  
nearibus, calycibus subpilosis. *Hort. ups.* 191. \*  
Turritis latifolia hirsuta, siliquis pendulis. *Amn. ruth.*  
58.  
*Habitat in Sibiria.* ☉
7. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis pla-  
nis linearibus, calycibus subrugosis. *Turrita.*  
*Hort. ups.* 192.  
Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis gla-  
bris. *Sauv. monsp.* 73.  
Turritis perraro ramifera, foliis lanceolatis obscure den-  
tatis. *Gnett. stamp.* 2. p. 162. *Dalib. paris.* 202.  
Leucojum heperidis folio. *Tournef. inst.* 221.  
Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *Bocc.*  
*mus.* 2. p. 81. t. 72.

*Turrita major, plateau-Clus. hist. 2. p. 126.*

*Habitat in Helvetia, Hungaria, Gallia, Sicilia. ☉*

### TURRITIS.

*glabra.*

1. **TURRITIS** foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Hort. cliff. 339. Fl. succ. 544. Roy. lugdb. 339. Hall. belv. 560. Dalib. parif. 203.*

*Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. Baub. pin. 112.*

*Habitat in Europæ pascuis siccis apricis.*

*hirsuta.*

2. **TURRITIS** foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Hort. cliff. 339. Fl. succ. 545. Roy. lugdb. 339. Dalib. parif. 62.*

*Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Baub. pin. 101. prodr. 42. t. 42.*

*Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Angliæ pascuis sylvaticis.*

### BRASSICA.

*orientalis.*

1. **BRASSICA** foliis cordatis amplexicaulibus glabris: radicalibus scabris integerrimis, filiquis tetragonis. *Hort. upf. 190.*

*Brassica orientalis perfoliata, flore albo, filiqua quadrangula. Tournef. cor. 16.*

*Habitat in Oriente. ☉*

*campestris.*

2. **BRASSICA** radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Hort. cliff. 339. Fl. succ. 546. Roy. lugdb. 344.*

*Brassica campestris perfoliata, flore luteo. Læs. pruss. 29. Fl. lapp. 265.*

*Habitat in agris non argillofis Europæ. ☉*

*Napus.*

- 3 **BRASSICA** radice caulescente fusiformi. *Hort. cliff. 339. Fl. succ. 547. Mat. med. 328. Roy. lugdb. 344. Dalib. parif. 199.*

*Napus sylvestris. Baub. pin. 95.*

*Napus. Dod. pempt. 674.*

- β. *Napus sativa. Baub. pin. 95.*

*Habitat in arenosis maritimis Gotlandiæ, Belgii, Angliæ. ♂*

*Rapa.*

4. **BRASSICA** radice caulescente orbiculari depressa carōsa. *Hort. cliff. 339. Hort. upf. 190. Mat. med. 329. Roy. lugdb. 344.*

*Ra-*

Rapa sylvestris. *Raj. hist.* 800.

Rapa sativa rotunda. *Bauh. pin.* 89.

Rapum. *Cam. epit.* 218.

β. Rapa sativa oblonga f. femina. *Bauh. pin.* 89.

*Habitat in arvis Angliæ, Belgii. ♂*

5. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. *Hort. oleracea, cliff.* 338. *Hort. upf.* 189. *Mat. med.* 327. *Roy. lugdb.* 342.

Brassica maritima arborea f. procerior ramosa. *Morif. sylvestris. hist.* 2. p. 208. *Raj. hist.* 796.

β. Brassica alba vel viridis. *Bauh. pin.* 111.

viridis.

γ. Brassica capitata rubra. *Bauh. pin.* 111.

rubra.

δ. Brassica capitata alba. *Bauh. pin.* 111.

capitata.

ε. Brassica alba crispa. *Bauh. pin.* 111.

fabauda.

Brassica undulata. *Renealm. spec.* 113.

ζ. Brassica laciniata rubra. *Bauh. hist.* 2. p. 832.

laciniata.

η. Brassica angusto apii folio. *Bauh. pin.* 112.

selenisia.

θ. Brassica fimbriata. *Bauh. pin.* 112.

fabellica.

Brassica fabellica. *Renealm. spec.* 134. t. 133.

ι. Brassica caulitlora. *Bauh. pin.* 111. *Renealm. spec.* 131 botrytis.

t. 133. *Cam. epit.* 253.

κ. Brassica radice napiformi. *Tournef. inst.* 219.

Napobrassica.

Napo-Brassica. *Bauh. pin.* 111. *prodr.* 54.

gongylodes

λ. Brassica gongylodes. *Bauh. pin.* 111.

Brassica cauloRapa. *Bauh. hist.* 2. p. 829.

Caulo-Rapum. *Cam. epit.* 251.

*Habitat in maritimis Angliæ. ♂*

6. BRASSICA foliis lanceolato-ovatis glabris indivisis *violacea.*  
dentatis. *Hort. upf.* 191.

*Habitat in China. ♂*

\* *Eruca filiquis stylo ensiformi.*

7. BRASSICA foliis dentato pinnatifidis, caule hispido, *Erucastrum.*  
filiquis lævibus.

Sisymbrium foliis pinnato-dentatis. *Hort. cliff.* 337.

*Roy. lugdb.* 341. *Dalib. parij.* 205. sub Sisymbrio.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Bauh. pin.*

98.

Eruca sativa. *Fuchs. hist.* 262.

*Habitat in Europæ australioris rudertis. ☉*

8. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, foliis glabris. *Eruca.*

*Hort. upf.* 190. *Mat. med.* 330. + *Sisymbrium*

Sisymbrium foliis pinnatifidis: laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. *Hort. cliff.* 337.

Eru-

*Eruca latifolia alba. Bauh. pin. 98.*

*Sinapi alterum genus. Fuchs. hist. 539.*

*Habitat in Helvetia. ☉*

*vesicaria.*

9. *BRASSICA* foliis dentato-pinnatifidis, siliquis hispidis, testis calyce tumido.

*Brassica foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis retrorsum hispidis. Hort. ups. 191.*

*Eruca chalepensis, caulibus & siliquis hirsutis. Moris. hist. 2. p. 228.*

*Habitat in Hispania. Læssing. ☉*

*Radix fusiformis. Folia lanceolata, pinnatifido-dentata, supra glabra. Caulis pilosus, ramosus. Racemi erecti, terminales. Corollæ flavae venis saturatioribus. Calyx floris cylindricus, in fructu vero ventricosus inflatus persistens evadit. Siliquæ venter calyce non longior pistillum remanens lanceolatum. Differt itaque ab *eruca* calyce, sub fructu, inflato vesicario, foliis non lyratis sed lanceolatis; siliquis hispidis retrorsum nec glabris; Calyceibus persistentibus ad maturitatem fructus nec deciduis*

### SINAPIS.

*arvensis.*

1. *SINAPIS* siliquis multangulis toroso-turgidis rostro longioribus. *Hort. cliff. 338. Fl. succ. 548. Roy. lugdb. 343. Hall. belv. 554. Dalib. parif. 200.*

*Rapistrum flore luteo. Bauh. pin. 95.*

*Irion. Fuchs. hist. 257.*

*Habitat in agris Europæ. ☉*

*alba.*

2. *SINAPIS* siliquis hispidis: rostro obliquo longissimo. *Hort. cliff. 338. Hort. ups. 191. Roy. lugdb. 343. Dalib. parif. 200.*

*Sinapi apii folio. Bauh. pin. 99.*

*Sinapi sativum alterum. Dod. pempt. 707.*

*Habitat in agris Belgii, Angliæ, Galliæ. ☉*

*nigra.*

3. *SINAPIS* siliquis glabris tetragonis. *Hort. cliff. 338. Fl. succ. 549. Mat. med. 326. Roy. lugdb. 343. Dalib. parif. 199.*

*Sinapi rapi folio. Bauh. pin. 99.*

*Habitat in aggeribus ruderatis Europæ septentrionalioris. ☉*

*juncea.*

4. *SINAPIS* ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis. *Hort. ups. 191. \**

Si-



Sinapi indicum maximum, lactucae folio. *Herm. par.*  
230. t. 230.

*Habitat in Asia.* ☉

5. SINAPIS foliis duplicato-pinnatis; laciniis linearibus. *hispanica.*

*Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.

Sinapi hispanicum, nasturtii folio. *Tournef. inst.* 227.

*Habitat in Hispania.*

## RAPHANUS.

1. RAPHANUS filiquis teretibus torosis bilocularibus. *sativus.*

*Hort. cliff.* 340. *Hort. ups.* 188. *Mat. med.* 325. *Roy.*

*lugdb.* 344.

Raphanus minor oblongus. *Bauh. pin.* 96.

Raphanus major orbicularis f. rotundus. *Bauh. pin.* 96.

β. Raphanus niger. *Bauh. pin.* 96.

*Habitat.* - - - ☉ δ

2. RAPHANUS filiquis teretibus articulatis laevibus n. *Raphani-*

*nilocularibus Hort. cliff.* 340. *Fl. fræc.* 568. *Roy. lugdb. Strum.*

344. *Hall. belv.* 555. *Dalib. paris.* 198. *Sauv. mbonp.*

285.

Rapistrum flore albo, filiqua articulata. *Bauh. pin.* 95.

Rapistrum flore albo striato. *Bauh. hist.* 2. p. 851.

*Habitat inter segetes Europæ.*

3. RAPHANUS filiquis teretibus torulosis villosis, foliis *sibiricus.*

linearibus pinnatifidis.

Raphanus foliis pinnatis: pinnis confluentibus, filiquis  
teretibus articulatis unilocularibus. *Gmel.*

*Habitat in Sibiria.*

*Habitus Erucæ; planta pygmaea. Caules maxime ex parte  
nudi. Folia radicalia et caulina pinnatifida, linear-  
ria. Corollæ magnæ, flavae. Legumina teretia, pedi-  
cellata, moniliformia, uti caulis villosa, rostro oblon-  
go: Figura Cardamines alpine insipide. Col. cephr.*  
2. p. 69. *hanc refert.*

## BUNIAS.

1. BUNIAS filiculis bicornibus divaricatis basi spinosis. *cornuta.*

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin.*

Planta maxime singularis: Silicula transversim ovalis,  
utrinque desinens in cornu s. spicam longissimam vali-  
dissimam, ut referat silicula duo cornua in medio sili-  
cule spinæ parvæ 4 undique directæ.

2. BU-

- Erucago.* 2. **BUNIAS** filiculis tetragonis: angulis bicristatis.  
*Bunias* foliis antrorsum sinuatis. *Hort. ups.* 186. *Sauv. monsp.* 285.  
 • *Bunias.* *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344.  
*Erucago* monspeliaca, siliqua quadrangula echinata.  
*Baub. pin.* 99. *prodr.* 41. t. 41.  
*Habitat* Monspelli in agris humidiusculis. ☉
- orientalis.* 3. **BUNIAS** filiculis ovatis gibbis verrucosis.  
*Bunias* foliis retrorsum sinuatis. *Hort. ups.* 186.  
*Crambe* foliis pinnato-hastatis. *Roy. lugdb.* 330.  
*Crambe* orientalis, dentis leonis folio, erucaginis facie.  
*Tournef. cor.* 14.  
*Habitat* in Russia. ☿
- Cakile.* 4. **BUNIAS** filiculis ovatis lævibus ancipitibus.  
*Crambe* foliis succulentis linearibus pinnato-dentatis.  
*Sauv. monsp.* 280.  
*Raphanus* siliquis ovatis angulatis monospermis. *Hort. cliff.* 340. *Fl. suec.* 569. *Roy. lugdb.* 344. *Gron. virg.* 170. *Sauv. monsp.* 285.  
*Eruca* maritima italica, siliqua hastæ cuspidi simili. *Baub. pin.* 99.  
*Cakile* serapiouis. *Lob. ic.* 223.  
*Habitat* in Europæ, Africa, Americæ maritimis. ☉

## ISATIS.

- tinctoria.* 1. **ISATIS** foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, filiculis oblongis. *Fl. suec.* 543. *Dalib. parif.* 205.  
*Isatis.* *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 330.  
*Isatis* sylvestris f. angustifolia. *Baub. pin.* 113.  
*Isatis* sylvestris. *Fuchs. hist.* 330.  
 β. *Isatis* lativa f. latifolia. *Baub. pin.* 113.  
*Habitat* ad littora maris Balthici & Oceani Europæ. ♂
- hispanica.* 2. *Isatis* foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, pedunculis subtomentosis.  
*Isatis* sylvestris minor lusitanica. *Herm. lugdb.* 678.  
*Isatis* orientalis maritima canescens. *Tournef. cor.* 14.  
*Buxb. cent.* 1. p. 4. t. 5.  
*Habitat* in Hispania & Oriente. ☉  
*Vix a præcedente sufficienter distincta, sed annua et minor.*
- armena.* 3. **ISATIS** foliis integerrimis cordatis pollice obtusis, filiculis cordatis.

Isa-

*Isatis armena*, foliis brassicæ perfoliatæ, fructu cordiformi canescente. *Tournef. cor. 14. Buxb. cent. 1. p. 3. t. 4.*  
*Habitat in Armeniæ pratis ficcioribus ad rivulos.*

4. ISATIS foliis omnibus dentatis.  
*Habitat in Ægypto.*

*ægyptica.*

## CRAMBE.

1. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Fl. succ. 570. maritima.*  
*Crambe foliis cordatis crispis carnosis. Hort. cliff. 340.*  
*Roy. lugdb. 329.*

*Brassica maritima monospermos. Banb. pin. 112.*

*Brassica marina sylvestris multiflora monospermos.*

*Lob. ic. 245.*

*Habitat ad littora Oceani septentrionalis. &*

2. CRAMBE foliis scabris, caule glabro. *orientalis.*

*Crambe foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. Roy.*

*lugdb. 330.*

*Rapistrum orientale, acanthi folio. Tournef. cor. 14.*

*Habitat in Oriente.*

3. CRAMBE foliis cauleque scabris. *Hort. upf. 193. hispanica.*

*Crambe foliis subcordatis crenatis scabris. Hort. cliff.*

*340. Roy. lugdb. 329.*

*Rapistrum maximum rotundifolium monospermum.*

*Corn. canad. 147. t. 148. Moris. hist. 2. p. 266. f.*

*3. t. 13. f. 1.*

*Habitat in Hispania. ☉*

## CLEOME.

1. CLEOME floribus gynandris, foliis simplicibus. *fruticosa.*

*Habitat in India. ☿*

*Caulis frutescens, teres, ramosus. Folia ovali oblonga, integerrima, glabra, petiolata, alterna. Racemi terminales, simplices. Calyces tetraphylli, patentes, ovato-lanceolati. Petala 4, unguibus oblongis, subrotunda, adscendentia. Germen pedicello longissimo, in cujus medio stamina 4, sæpe duo inferiora basi coalita. Antheræ ovales. Siliqua oblonga.*

2. CLEOME floribus gynandris, foliis digitatis. *Hort. cliff. gynandra.*

*341. Hort. upf. 193. Fl. zeyl. 239. \* Roy. lugdb. 339.*

*Quinquæfolium lupini folio. Banb. pin. 326.*

*Cara-veela. Rheed. mal. 9. p. 43. t. 24.*

*Habitat in Asiæ, Africæ, Americæ calidissimis. ☉*

3. CLE-

- icosandra.* 3. CLEOME floribus icosi-tetrandris, foliis quinatis. *Fl. zeyl.* 240. \*  
Sinapisitrum zeylanicum pentaphyllum viscosum, flore flavo. *Burm. zeyl.* 215. t. 99.  
*Habitat in Zeylona.* ☉
- viscosa.* 4. CLEOME floribus dodecandris, foliis quinatis ternatisque. *Fl. zeyl.* 241. \*  
Sinapisitrum zeylanicum triphyllum & pentaphyllum viscosum, flore flavo. *Mart. cent.* 25. t. 25.  
Aria-veela. *Rheed. mal.* 9. p. 41. t. 23.  
*Habitat in Zeylona, Malabar.* ☉
- dodecandra.* 5. CLEOME floribus dodecandris, foliis ternatis. *Fl. zeyl.* 242. \*  
Sinapisitrum triphyllum pumilum glabrum, flosculo purpureo, siliqua membranacea. *Burm. zeyl.* 246. t. 100. f. 1.  
Sinapisitrum indicum triphyllum, flore carneo, non spinosum. *Sloan. jam.* 80. *hist.* 1. p. 194. t. 124. f. 1.  
*Habitat in India.* ☉
- ornithopodioides.* 6. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis ovali-lanceolatis.  
Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, siliquis teretibus torosis. *Hort. cliff.* 341. \* *Hort. ups.* 194.  
*Roy. lugdb.* 340.  
Sinapisitrum orientale triphyllum, ornithopodii siliquis. *T. Dill. elsb.* 359. t. 206. f. 345. *Barr.* cent. 1. p. 6. t. 9. f. 24.  
*Habitat circa Peram in agris.* ☉
- violacea.* 7. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis solitariisque: foliolis lineari-lanceolatis.  
Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, siliquis subulatis. *Hort. cliff.* 341. *Roy. lugdb.* 340.  
Trifolium siliquosum, flore violaceo, lusitanicum. *Barr.* ic. 866.  
β. Sinapisitrum peregrinum alterum, flore luteo. *Barr.* ic. 865. *melior.*  
*Habitat in Lusitania.* ☉
- monophylla.* 8. CLEOME floribus hexandris, foliis simplicibus ovali-lanceolatis. *Fl. zeyl.* 243. \*  
Sinapisitrum zeylanicum viscosum, folio solitario, flore flavo, siliqua tenui. *Burm. zeyl.* 217. t. 100. f. 2.  
Tiera-veela. *Rheed. mal.* 9. p. 63. t. 34.  
*Habitat in India.* ☉

Class.

*Classis XVI.*

# MONADELPHIA.

## PENTANDRIA.

### WALTHERIA.

1. WALTHERIA foliis planis serrato dentatis. *americana.*  
*Waltheria foliis cordato-ovatis serratis. Hort. cliff.*  
*342. Roy. lugdb. 348.*  
*Monosperm-Althea arborescens villosa, folio majore.*  
*Isnard. act. 1721. p. 362. t. 14.*  
*Althææ similis americana, flore luteo. Herm. lugdb.*  
*1. p. 267. \**  
*Betonica arborescens, foliis amplioribus. Pluk. alm. 67.*  
*t. 150. f. 6.*  
*Althæa americana pumila, flore luteo spicato. Breyn.*  
*cent. 1. t. 157.*  
*Habitat in Bahama, Barbiches, Surinamo. b*

2. WALTHERIA foliis ovatis serratis undulatis. *Roy. indica.*  
*lugdb. 348. n. 1. Fl. zeyl. 244. \**  
*Melochia foliis oblongis obtusis serratis tomentosis, flo-*  
*ribus confertis. Hort. cliff. 343.*  
*Betonica arborescens madefaspatana villosa, foliis pro-*  
*funde venosis. Pluk. alm. 67. t. 50. f. 5.*  
*Habitat in India. b*

### HERMANNIA.

1. HERMANNIA foliis ovatis plicatis crenatis tomen- *althææfolia.*  
*tolis. Hort. cliff. 343. Roy. lugdb. 347.*  
*Hermannia capensis, althææ folio. Pet. gaz. 53. t. 34.*  
*f. 2.*  
*Kermia africana frutescens, foliis mollibus & incanis.*  
*Comm. hort. 2. p. 151. t. 79.*  
*Habitat in Æthiopia. b*  
*Peduncululi ex axillis foliorum, sæpius terni, apice flo-*  
*res in singulo duos, sub foliulis tribus lanceolatis pro-*  
*ferentes.*

2. HERMANNIA foliis obovatis acute-incisis, pedun- *grosulativifo-*  
*culis bifloris. Roy. lugdb. 347.* *lia.*

U u

Ket-

*Ketmia africana vesicaria*, uvæ crispæ foliis. *Comm. rar.*  
7. t. 7.

*Habitat in Æthiopia.* b

*alnifolia.*

3. *HERMANNIA* foliis cuneiformibus plicatis crenato-emarginatis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

*Ketmia africana vesicaria* fruticans & erecta, alni foliis latioribus & majoribus, *Comm. hort.* 2. p. 155. t. 78.

*Habitat in Æthiopia.* b

*Hyssopifolia.*

4. *HERMANNIA* foliis lanceolatis obtusis serratis. *Hort. cliff.* 342. *Hort. ups.* 195. *Roy. lugdb.* 347.

*Althæa africana* frutescens, floribus aureis cochleatis pendulis minoribus. *Volk. norib.* 24. t. 24.

*Habitat in Æthiopia.* b

*lavendulifolia.*

5. *HERMANNIA* foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

*Hermannia* frutescens, folio lavendulæ latiore & obtuso, flore parvo aureo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 273.

*Habitat in Æthiopia.* b

*trifoliata.*

6. *HERMANNIA* foliis ternatis sessilibus. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 347.

*Hermannia* frutescens, folio oblongo molli cordato hirsuto. *Boerb. lugdb.* 1. p. 273.

*Habitat in Æthiopia.* b

*pinnata.*

7. *HERMANNIA* foliis pinnatifidis linearibus. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 348.

*Hermannia* frutescens, folio multifido tenui, caule rubro. *Boerb. lugdb.* 1. p. 273.

*Cistoides frutex æthiopicus*, parvis coronopi foliis, ad nodos caulem radiatim ambientibus. *Pluk. mant.* 50. t. 46. f. 3.

*Habitat in Æthiopia.* b

## MELOCHIA.

*pyramidata.*

1. *MELOCHIA* floribus solitariis, capsulis pyramidalis pentagonis: angulis acutis. *Hort. cliff.* 343. *Fl. zeyl.* 245.

*Althæa brasiliensis* frutescens, incarnato flore, fagopyri semine. *Pluk. alm.* 25. t. 131. f. 3.

*Habitat in Brasilia.* 2

*depressa.*

2. *MELOCHIA* floribus solitariis, capsulis depressis pentagonis: angulis obtusis. *Roy. lugdb.* 348.

Abu-

*Abutilon americanum*, ribesii foliis, flore carneo, fructu pentagono aspero. *Houst. mss.*

*Habitat in Havana.*

3. MELOCHIA racemis confertis terminalibus, capsu-concatenata, lis globosis sessilibus. *Fl. zeyl.* 247. \*

*Alcea indica*, flosculis parvis, fasciculatim ramulis adfixis. *Pluk. alm.* 26. t. 9. f. 5.

*Habitat in India utraque. 2*

4. MELOCHIA floribus capitatis sessilibus, capsulis sub-corchorifolia rotundis. *Fl. zeyl.* 246.

*Melochia corchori folio.* *Dill. elzb.* 221. t. 176. f. 217.

*Althæa peregrina*, longiore betonicæ folio, floribus albis perexiguus, capitulis arcte conglomeratis. *Pluk. alm.* 25. t. 44. f. 5.

*Tieru-ureu.* *Rheed. mal.* 9. p. 143. t. 73.

*Habitat in India.*

5. MELOCHIA floribus capitatis, foliis ovatis serratis, *supina*, caulibus procumbentibus.

*Alcea supina pusilla*, geranii exigui maritimi folio & facie, maderaspatensis, fructu in summo caule glomerato, pericarpio duro. *Pluk. alm.* 14. t. 132. f. 4.

*Habitat in India.*

## DECANDRIA.

### CONNARUS.

1. CONNARUS. *Fl. zeyl.* 248. \*

*Rhus zeylonicus trifoliatus*, phaseoli facie, floribus copiosis spicatis. *Burm. zeyl.* 199. t. 89.

*Phaseolus arborefcens zeylanicus monocarpus.* *Raj. suppl.* 438.

*Habitat in India. b*

### HUGONIA.

1. HUGONIA spinis oppositis revolutis. *Fl. zeyl.* 249. *Myxstax.*

*Ægoceros arbor zeylanica*, lauri fructu, cortice costum olente. *Raj. dendr.* 45.

*Myxstax frutex baccifer malabaricus*, fructu calyculato rotundo monopyreno. *Raj. hist.* 1570.

*Modira-canni.* *Rheed. mal.* 2. p. 29. t. 19.

*Habitat in India.*

## GERANIUM.

\* *Staminibus 7 fertilibus.*

- 1182.* 1. GERANIUM calycibus monophyllis: tubis longissimis subfessilibus, radice subrotunda. *Hort. cliff.* 344. *Hort. upf.* 197.  
 Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis subfessilibus, radice subrotunda, foliis lobatis. *Roy. lugdb.* 352.  
 Geranium africanum noctu olens tuberosum, vitis foliis hirsutis. *Comm. hort.* 2. p. 123. t. 62.  
 β. Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis subfessilibus, radice subrotunda, foliis pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 352.  
 Geranium triste. *Corn. canad.* 109. t. 110.  
 γ. Geranium noctu olens æthiopicum, radice tuberosa, foliis myrrhidis latioribus & angustioribus. *Breyn. cent.* 126. t. 58.  
*Habitat in Æthiopia & forte in India.* 2
- fulgidum.* 2. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis tripartitis incis: intermedia majore, pedunculis umbelliferis geminis, caule carnosio. *Vir. cliff.* 67. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 353.  
 Geranium africanum, folio alceæ, flore coccineo fulgidissimo. *Dill. elth.* 156. t. 130. f. 137.  
 Geranium surinamense, chelidonii folio, flore coccineo, petalis æqualibus. *Till. pis.* 68. t. 26.  
*Habitat in Æthiopia.* 5
- inquinant.* 3. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis. *Hort. upf.* 195.  
 Geranium calycibus monophyllis, foliis florentibus erectis, foliis subcordatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.  
 Geranium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo. *Dill. elth.* 151. t. 125. f. 151. 152.  
 Geranium africanum arborescens, malvæ folio plano lucido, flore elegantissimo kermesino. *Mart. cent.* 3. f. 3.  
*Habitat in Africa.* 5  
*Folia digitis tacta inquinant colore ferrugineo.*
- papilionaceum.* 4. GERANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: vexillo dipetalo maximo, foliis angulatis. *Hort. cliff.* 345. *Hort. upf.* 197. *Roy. lugdb.* 353.  
 Gera-



*Geranium africanum* arborefcens, flore veluti dipetalo eleganter variegato. *Dill. elth.* 154. t. 128. f. 155.

*Geranium africanum* arborefcens, malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix confpicuis. *Mart. cent.* 15. t. 15.

*Habitat in Africa.* 5

5. GERANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis, vexillo dipetalo, foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353. *myrrhifolium.*

*Geranium africanum*, coriandri folio, floribus incarnatis, majus. *Herm. lugdb.* 279. t. 280.

6. *Geranium africanum* tuberosum, anemones folio, incarnato flore. *Herm. par.* 178. t. 178.

*Geranium africanum*, myrrhidis folio, flore albicante, radice rapacea. *Comm. hort.* 2. p. 125. t. 63.

*Habitat in Africa.* 2

6. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis pinnatis: pinnatis. foliolis ovatis.

*Geranium africanum*, astragali folio. *Comm. pr. cl.* 53. t. 53.

*Habitat in Africa.*

7. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis. *Hort. cliff.* 345. *Hort. upf.* 196. *Roy. ingdb.* 353. *cucullatum.*

*Geranium africanum* arborefcens, foliis cucullatis angulosis. *Dill. elth.* 155. t. 129. f. 156.

*Geranium africanum* arborefcens, ibifci folio rotundo, carlinæ odore. *Herm. lugdb.* 274. t. 275.

*Geranium africanum* arborefcens, ibifci folio anguloso, floribus amplis purpureis. *Mart. cent.* 28. t. 28.

*Habitat in Africa.*

8. GERANIUM calycibus monophyllis, caule carnofo gibbofo, foliis fubpinnatis.

*Geranium calycibus* monophyllis geniculis nodoso, foliis duplicato pinnatifidis. *Hort. upf.* 345. *Roy. lugdb.* 354.

*Geranium africanum* carnofum, petalis anguftis albicantibus. *Dill. elth.* 153. t. 127. f. 154.

*Geranium calycibus* monophyllis, caule carnofo nodoso: internodiis filiformibus, foliis lobato-pinnatifidis.

*Roy. lugdb.* 354.

*Geranium africanum* noctu olens tuberosum & nodosum, aquilegiæ foliis. *Herm. lugdb.* 284. t. 285.

*Stiff. bot.* III. t. III.

*Habitat in Africa.*

- peltatum*. 9. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis quinquelobis integerrimis glabris peltatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352.  
Geranium africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agricæ maculatis splendentibus & acetosæ sapore. *Comm. præl.* 52. t. 2.  
*Habitat in Africa.* b
- acetosum*. 10. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis glabris subovatis carnosis crenatis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 352.  
Geranium africanum frutescens, folio crasso & glauco, acetosæ sapore. *Comm. præl.* 54. t. 4.  
*Habitat in Africa.* b
- Zonae*. 11. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato orbiculatis incisissimis zona notatis. *Hort. upf.* 196.  
Geranium africanum arborescens, alchemillæ hirsuto folio, floribus rubicundis. *Comm. præl.* 51. t. 1.  
*Habitat in Africa.* b
- vitifolium*. 12. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus. *Hort. upf.* 196.  
Geranium africanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth.* 152. t. 126. f. 153.  
*Habitat in Africa.*
- capitatum*. 13. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis. *Hort. upf.* 196.  
Geranium calycibus monophyllis, floribus capitatis, foliis cordatis lobatis crenatis pilosis. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 353.  
Geranium africanum frutescens, malvæ folio laciniato odorato. *Herm. lugdb.* 277. t. 278.  
Geranium americanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth.* 152. t. 126. f. 153.  
*Habitat in Africa.*
- alchimillifolium*. 14. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis incisissimis pilosis, caule herbaceo. *Vir. cliff.* 345. *Hort. upf.* 197. \* *Roy. lugdb.* 354.  
Geranium calycibus monophyllis longissimis sessilibus, fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. *Hort. cliff.* 345.  
Geranium africanum, alchemillæ hirsuto folio, floribus albidis. *Herm. lugdb.* 282. t. 283. *Stiff. bot.* 107. t. 107  
*Habitat in Africa.*

15. GERANIUM calycibus monophyllis, caule carno-odoratissimo brevissimo, ramis longis, foliis cordatis. *Hort. cliff. num.*  
345. *Roy. lugdb.* 354.  
Geranium africanum humile, folio fragrantissimo molli. *Dill. elth.* 157. t. 131. f. 138.  
*Habitat in Africa.* 2
16. GERANIUM calycibus monophyllis, pedunculis multifloris, foliis cordatis subrotundis lobatis crenatis. *grossularioides.*  
Geranium pedunculis bifloris, foliis cordatis incis glabris, caulibus filiformibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 351.  
Geranium africanum, uvæ crispæ folio, calycibus procumbentibus, floribus exiguis rubellis. *Herm. lugdb.* 287. t. 289.  
*Habitat in Africa.*  
Caulis filiformis, procumbens. Folia cordata, glabra, incisa. Pedunculi biflori cum calycibus monophyllis.
17. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis oblongis integris tripartitisque, pedunculis radicalibus. *auritum.*  
Geranium africanum, foliis plerumque auritis, floribus ex rubro purpurascens. *Comm. hort.* 2. p. 121. t. 61.  
*Habitat in Africa.* 2
18. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis cordato-ovatis crenatis petiolo brevioribus, caule herbaceo. *glaucophyllum.*  
*Roy. lugdb.* 354.  
Geranium ægyptium glaucophyllum, rostris longissimis plumosis. *Dill. elth.* 150. t. 124. f. 150.  
*Habitat in Ægypto.* 2
19. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis ovatis sinuatis crenatis, caule filiformi. *althæoides.*  
*Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 354.  
Geranium, folio althææ, africanum, odore melissæ. *Boerb. lugdb.* 1. p. 263.  
*Habitat in Africa.* 2
- 20 GERANIUM calycibus monophyllis, foliis ovatis inæqualiter serratis planis. *betulinum.*  
Geranium frutescens, folio lato dentato, flore magno rubente. *Burm. afric.* 92. t. 33. f. 1.  
Geranium frutescens, folio subrotundo dentato, flore purpureo. *Burm. afric.* 93. t. 33. f. 2.  
*Habitat in Africa.* 5

\* *Staminibus quinque fertilibus.*

- oicnatiatum.* 21. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incilis obtusis. *Hort. cliff.* 334. *Fl. succ.* 579. *Mat. med.* 337. *Roy. lugdb.* 352. *Hall. belv.* 369. *Dalib. paris.* 208. Geranium, cicutæ folio, minus & lupinum. *Bauh. pin.* 319. Geranium lupinum. *Dod. pempt.* 63.
- moschatum.* 2. Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319. *Habitat in Europæ sterilibus cultis.* ☉

- malacoides.* 22. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 352. *Sauv. monsp.* 154. Geranium folio althææ. *Bauh. pin.* 318. Geranium malacoides. *Lob. ic.* 662. Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis hirsutis crenato-incis obtusis, caulibus procumbentibus. *Roy. lugdb.* 391. *Habitat in Italiæ G. narbonensis, Angliæ maritimis.* ☉

- gruinum.* 23. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis acutis sinuatis. Geranium pedunculis multifloris pentandris. *Hort. cliff.* 498. Geranium pedunculis bifloris pentandris, radice annua. *Vir. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 352. Geranium acu longissima. *Bauh. pin.* 319. *prodr.* 138. Geranium speciosum annuum, longissimis rostris, creticum. *Bauh. hist.* 3. p. 479. *Habitat in Creta.* ☉
- Docet Fructificatio & habitus tres ultimas plantas ab initio unam fuisse, ortas procul dubio ex miscela diversarum, ut pro eadem haberi possent, at vero posse etiam distingui distinctas arbitrium videtur.

\* *Staminibus decem fertilibus.*

- tuberosum* 24. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis linearibus subdivisis obtusis. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. Geranium tuberosum majus. *Bauh. pin.* 318. *Habitat in Angliæ?* 2
- macrorrhizum.* 25. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus inflatis, pitillo longissimo. *Hort. cliff.* 343. \* *Roy. lugdb.* 350. Geranium batrachioides odoratum. *Bauh. pin.* 318. *Habitat* - - - 2

26. GE-

26. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque alternis, *phæn.*  
calycibus subaristatis, caule erecto.  
Geranium pedunculis bifloris alternatim cauli integro  
superne nudiusculo insidentibus. *Hort. cliff.* 343. \*  
*Hort. ups.* 198. *Roy. lugdb.* 350.  
Geranium montanum fuscum. *Baub. pin.* 318.
- β. Geranium batrachioides hirsutum, flore atro-rubente.  
*Baub. pin.* 318.  
Geranium 1, pullo flore. *Clus. hist.* 2. p. 99.  
*Habitat in Alpibus Pannonicis, Helveticis, Styriacis.* 2
27. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis caulinis tri- *nodosum.*  
lobis integris serratis: summis subsessilibus *Hort. cliff.*  
343. *Roy. lugdb.* 350.  
Geranium nodosum. *Baub. pin.* 318.  
*Habitat in Delphinatu.*
28. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis in- *sylvaticum.*  
ciso-serratis, caule erecto. *Fl. lapp.* 266. *Fl. suec.* 572.  
*Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351.  
Geranium batrachioides, folio aconiti. *Baub. pin.* 317.  
Geranium 2. batrachioides minus. *Clus. hist.* 2. p. 99.  
*Habitat in Europæ borealis sylvis.* 2
29. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis mul- *pratense.*  
tipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Hort. cliff.*  
344. *Fl. suec.* 573. *Roy. lugdb.* 350. *Hall. helv.* 367.  
Geranium batrachioides, Gratia dei germanorum. *Baub.*  
*pin.* 318.  
Geranium 3 batrachioides majus. *Clus. hist.* 2. p. 100.  
*Habitat in Europæ borealis pratis.* 2
30. GERANIUM pedunculis bifloris, caule dichoto- *maculatum.*  
mo erecto, foliis quinquepartitis incis: summis sessi-  
libus. *Gron. virg.* 78.  
Geranium batrachioides americanum maculatum, flori-  
bus obsolete cæruleis. *Dill. elth.* 158. t. 132. f. 159.  
*Habitat in Carolina, Virginia, Sibiria.* 2
31. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis *robertianum*  
decem-angulatis.  
Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-trive-par-  
titis, lobis pinnatifidis, calycibus hirsutis. *Hort. cliff.*  
344. *Fl. suec.* 578. *Mat. med.* 336. *Dalib paris.*  
207. *Roy. lugdb.* 351.  
Geranium robertianum primum. *Baub. pin.* 319.

*Geranium* 3. *Fuchs, hist.* 206.

*Habitat in Europæ borealis rupibus. 2*

*Calyx pilosus, decem carinatus, ex foliolis 1. 3. exterioribus tricarinatis, 2. 5. unicarinatis, 4. bicarinato.*

*Petala integra.*

- lucidum.* 32. *GERANIUM* pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *It. goetl.* 228. \* *Fl. suec.* 574. *Dalib. parif.* 208. *Sauv. monsp.* 207.

*Geranium lucidum saxatile. Bauh. pin.* 318.

*Geranium saxatile. Thal. herb.* 44. t. 5.

*Geranium rotundifolium saxatile montanum. Col. espbr.*

*1. p.* 138. t. 137.

*Habitat in Europæ rupibus umbrosis. ☉*

- melle.* 33. *GERANIUM* pedunculis bifloris, foliisque rameis alternis, caule ramoso diffuso, calycibus muticis. *Geranium* pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis rotundatis: laciniis obtusiusculis, capsulis hirtis. *Fl. suec.* 577. *Dalib. parif.* 206. *Geranium* pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus semiquinquefidis mollibus & latissimis. *Hall. belv.* 366. \* *Sauv. monsp.* 207. *Geranium columbinum minus, majori flore & foliis bifidis. Magn. monsp.* *Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. Vaill. parif.* 79. t. 15. f. 3. *Habitat in Europa ad plateas. ☉*

- carolinianum.* 34. *GERANIUM* pedunculis bifloris, calycibus aristatis, foliis multifidis, pericarpis hirsutis. *Roy. lugdb.* 351. *Gron. virg.* 78. *Geranium columbinum carolinum, capsulis nigris hirsutis. Dill. elch.* 162. t. 135. f. 162. *Habitat in Carolina, Virginia. ☉*

- columbinum.* 35. *GERANIUM* pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis angulatis: laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *Fl. suec.* 576. *Dalib. parif.* 207. *Geranium columbinum, foliis dissectis, pediculis florum longissimis. Vaill. parif.* 79. t. 15. f. 4. *Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculo longissimo, caule prostrato. Hall. belv.* 367. *Habitat in Gallia, Helvetia, Germania.*

36. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis. rotundifolium.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 344. *Fl. suec.* 575. *Roy. lugdb.* 351. *Hall. helv.* 365. *Dalib. paris.* 206.

Geranium folio malvæ rotundo. *Bauh. pin.* 318.

Geranium alterum. *Fuchf. hist.* 205.

Geranium columbinum majus, flore minore caruleo.

*Vaill. paris.* 79. t. 15. f. 1.

*Habitat in Europæ cultis.* ☉

37. GERANIUM pedunculis subunifloris, foliis quinquepartitis acutis: foliolis pinnatifidis. sibiricum.

*Habitat in Sibiria.*

Caules pedales diffusi, divaricati. Folia quinquepartita: lobis pinnatifidis. Pedunculus e singula bifurcatura.

Caulis longus, uniflorus, in medio geniculatus bracteis 2, oppositis subulatis. Corolla alba striis purpureis petalis vix emarginatis. Calyx 5-phyllus, aristatus. Capsula subvillosa.

38. GERANIUM pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. sangvineum.

Geranium pedunculis simplicibus unifloris. *Hort. cliff.* 343. *Fl. suec.* 571. *Roy. lugdb.* 350. *Hall. helv.* 365. *Dalib. paris.* 206.

Geranium sangvineum, maximo flore. *Bauh. pin.* 318.

Geranium VII hæmatodes. *Clus. hist.* 2. p. 202.

3. Geranium hæmatodes lancastriense, flore eleganter striato.

*Dill. elth.* 163. t. 136. f. 163.

*Habitat in Europæ pratis ficcis umbrosis.* ♀

39. GERANIUM pedunculis simplicibus unifloris, foliis tripartito-multifidis linearibus, caule arboreo. grandiflorum.

Geranium frutescens incanum, flore magno luteo dentato. *Burm. afric.* 88. t. 34. f. 1.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

## POLYANDRIA.

### SIDA.

1. SIDA foliis cordato-ovatis serratis, stipulis setaceis, axillis subspinosis. spinosa.  
*Hort. nps.* 199. *Fl. zeyl.* 254. \*  
*Roy. lugdb.* 349.

*Sida*

*Sida* foliis cordato-ovatis ferratis, capsulis quinis bicuspidatis. *Hort. cliff.* 346.

*Alcea*, carpinii folio, americana frutescens, flosculis luteis, semine duplici rostro. *Comm. hort.* 1. p. 3. t. 2.

*Althæa* carpinii folio, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. t. 2.

*Althæa virginiana* bidens, pimpinellæ majoris acutiore folio, flosculis minimis luteis. *Pluk. alm.* 25. t. 9. f. 6.

β. *Malvinda* bicornis, sanguisorbæ folio villosa & glabro. *Dill. elth.* 214. t. 171. f. 210.

*Althæa* rostrata cormandelienfis, pimpinellæ majoris folio subrotundo, semine bicorni. *Pluk. alm.* 26. t. 9. f. 3.

*Habitat in India utraque.* ☉

rhombifolia. 2. *SIDA* foliis lanceolato-rhomboidibus ferratis. *Vir. cliff.* 68. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upf.* 199. *Fl. zeyl.* 252. \* *Gron. virg.* 78. *Roy. lugdb.* 349.

*Malvinda* unicornis, folio rhomboide, perennis. *Dill. elth.* 216. t. 172. f. 212.

β. *Althæa* carpinii folio, flosculis luteis. *Bocc. sic.* 11. t. 6. f. 2.

*Alcea* pernambucana, carpinii folio, flosculis minimis. *Morif. hist.* 2. p. 528. f. 5. t. 19. f. *alt. mat.*

*Habitat in India utraque.* b ☉

alnifolia. 3. *SIDA* foliis orbiculatis plicatis ferratis. *Hort. cliff.* 346. *Hort. upf.* 200. *Fl. zeyl.* 253. \* *Roy. lugdb.* 349.

*Malvinda* stellata alnifolia. *Dill. elth.* 215. t. 172. f. 211.

β. *Althæa* indica, latiori folio cordiformi ad summum sinuato. *Pluk. alm.* 26. t. 9. f. 2.

*Habitat in India.* ☉

cordifolia. 4. *SIDA* foliis cordatis subangulatis ferratis villosis.

*Malva* bicornis, ballotes folio molli. *Dill. elth.* 211. t. 171. f. 209.

*Althæa maderaspathana*, subrotundo folio molli & hirsuto, multipilis. *Pluk. alm.* 25. t. 131. f. 2.

*Habitat in India.* ☉

*Radix annua.* Calyx simplex. Seminum rostra decedente corolla, in fasciculum longitudine calycis prominentia. Calyx pilosus.

periploosifolia 5. *SIDA* foliis cordato-lanceolatis integerrimis. *Fl. zeyl.* 251.

*Sida* foliis ovato-lanceolatis, caule paniculato. *Roy. lugdb.* 349.

Abi



MONADELPHIA POLYANDRIA. 685

*Abutilon periplocæ acutioris folio, fructu stellato. Dill. elth. 4. t. 3. f. 3.*

*Alcea orientalis, scammonia folio, major, floribus albis.*

*Pluk. alm. 17. t. 74. f. 7.*

*Habitat in Zeylona. b. ☉*

6. *SIDA* foliis subrotundo-cordatis acuminatis integer-*amplissima*.  
rimis. *Roy. lugdb. 350.*

*Abutilon amplissimo folio, caule villosa. Plum. spec. 2.*

*Habitat in America calidiore.*

7. *SIDA* foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis. *Abutilon.*

*Roy. lugdb. 349. Hort. cliff. 346. Hort. upf. 198.*

*Gron. virg. 78.*

*Althæa theophrasti, flore luteo. Baub. pin. 316.*

*Althæa altera f. Abutilon. Cam. epit. 668.*

β. *Abutilon indicum, flore luteo minore. Fl. zeyl. 520.*

*Alcea affinis indica Abutilon dicta, flore flavo, foliis mollibus profunde venosis, filiculis lanuginosis. Pluk.*

*phys. 126. f. 5.*

*Habitat in Indiis. ☉*

8. *SIDA* foliis cordatis subrotundis crenatis tomentosis, *crispa*.

*pericarpis inflatis multilocularibus crenatis repandis.*

*Abutilon vesicarium crispum, floribus melinis parvis.*

*Dill. elth. 6 t. 5. f. 5.*

*Abutilon americanum, fructu subrotundo pendulo e capsulis vesicariis crispis confato. Mart. cent. 29.*

*t. 29.*

*Habitat in Carolina, Providentia, Bahama.*

9. *SIDA* foliis angulatis: inferioribus cordatis, superiori-*cristata*.  
bus panduriformibus

*Sida* foliis crenatis: inferioribus dentatis obtusis, superioribus acuminatis. *Roy. lugdb. 349.*

*Sida* foliis cordatis obsolete serratis. *Hort. cliff. 346.*

*Abutilon lavateræ flore, fructu cristato. Dill. elth. 3.*

*t. 2. f. 2.*

β. *Sida* foliis inferioribus cordato-angulatis, superioribus hastatis, petalis integerrimis. *Roy. lugdb. 349. Hort. upf. 199.*

*Habitat in Mexico. ☉*

10. *SIDA* capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris. *capitata*.

*Linu. ac. upf. 1743. p. 137. t. 2.*

*Malva caule erecto hispido, foliis erectis crenatis difformibus. Roy. lugdb. 357.*

Mal-

*Malva aspera* major aquatica ex hortensium rosarum genere, flore minore luteo, femine aculeato. *Sloan. jam. 96. bist. 1. p. 217. Raj. suppl. 320.*  
*Habitat in Caribæis, locis paludosis. 2*

## NAPÆA.

- hermaphro- dita.* 1. NAPÆA pedunculis nudis lævibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. *Gen. nov. 1089. \**  
*Sida* foliis palmatis: laciniis lanceolato attenuatis. *Hort. cliff. 346. Hort. upf. 198: Roy. lugdb. 348.*  
*Malva virginiana*, ricini folio. *Herm. lugdb. 22. t. 23.*  
*Habitat in Virginia. 2*
- dioica.* 2. NAPÆA pedunculis involucreis angulatis, foliis scabris, floribus dioicis. *Gen. nov. 1089. \**  
*Abutilon* folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, mas. *Ehret. pict. 8. f. distincta.*  
*Abutilon* folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, femina. *Ehret. pict. 7. f. 1.*  
*Althæa magna* aceris folio, cortice cannabino, floribus parvis, femina rotatim in summitate caulium, singula singulis cuticulis rostratis cooperta ferens. *Banist. 1928.*  
*Habitat in Virginia. 2*  
*Flores feminae gaudent etiam staminibus, at antheræ minimæ, effatæ & steriles sunt.*

## ALTHÆA.

- officinale.* 1. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Hort. cliff. 348. Hort. upf. 204. Mat. med. 338. Roy. lugdb. 357. Dalib. parif. 210. Gort. gelr. 410.*  
*Althæa diofcoridis & plinii. Baub. pin. 315.*  
*Althæa. Fuchf. bist. 15. Cam. epit. 667.*  
 β. *Althæa laciniato folio. Baub. pin. 316.*  
*Habitat in Hollandiæ, Angliæ, Galliæ, Sibiria subhumidis. 2*
- cannabina.* 2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule fruticoso. *Hort. upf. 205. Sauv. monsp. 200.*  
*Althæa* foliis compositis scabris. *Hort. cliff. 349. Roy lugdb. 357.*  
*Alcea cannabina. Baub. pin. 316.*  
*Alcea fruticosa*, cannabino folio. *Clus. bist. 2. p. 25*  
*Habitat in Hungaria, Italia, G. Narbonensi. 5*

3. AL

3. *ALTHÆA* foliis trifidis piloso-hispidis. *Hort. cliff. hirsuta.*  
349. *Roy. lugdb.* 357. *Dalib. parif.* 210. *Sanv.*  
*monsp.* 200.

*Alcea hirsuta. Bauh. pin.* 317.

*Alcea hirsuta minima, flore cælio, hispanica. Barr. ic.* 1169.

*Alcea villosa. Dalech. hist.* 594.

*Habitat in Gallia, Italia, Hispania.*

### ALCEA.

1. *ALCEA* foliis sinuato angulosis. *Hort. cliff.* 348. *rosa,*  
*Hort. upf.* 204. *Mat. med.* 340. *Roy. lugdb.* 357.

*Malva rosea, folio subrotundo. Bauh. pin.* 315.

*Malva hortenfis. Dod. pempt.* 652.

*Habitat - - - - -* ♂

2. *ALCEA* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 348. *Hort. upf. ficifolia,*  
*204. Roy. lugdb.* 357.

*Malva rosea, folio ficus. Bauh. pin.* 315.

*Malva rosea simplex peregrina. Tabern. hist.* 315.

*Habitat - - - - -* ♂

*Vix sufficienter a precedente distincta.*

### MALVA.

\* *Foliis indivisis.*

1. *MALVA* foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus *tomentosa.*  
lateralibus congestis, caule fruticoso. *Fl. zeyl.* 255. \*

*Malva foliis cordatis crenatis villosis. Hort. cliff.* 347.  
*Roy. lugdb.* 357.

*Althæa orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus par-*  
*vis luteis. Pluk. amalb.* 11. t. 356. f. 1?

*Habitat in India.* ♀

*Caulis frutescens, tomentosus. Folia sine lobis cordata, to-*  
*mentosa. Calyx inferior triphyllus. Seminum rostra,*  
*deciduo flore, brevissima, angulos fructus retusi consti-*  
*tuentia.*

*Confer. Althæa indica, abutili subrotundo folio, flore lu-*  
*teo spicato. Pluk. phyt.* 74. f. 6.

2. *MALVA* foliis ovato-oblongis acute serratis, capsulis *coromande-*  
tricuspidatis. *Hort. cliff.* 346. \* *Hort. upf.* 201. *liana.*

*Althæa coromandeliana, angustis prælongis foliis, semine*  
*bicorni. Pluk. mant.* 10. t. 334. f. 2.

*Habitat in America?* ☉

3. *MALVA* foliis cordatis crenatis, floribus lateralibus so- *americana.*  
litariis terminalibus spicatis. *Roy. lugdb.* 359.

Al-

*Althæa americana pumila*, flore luteo spicato. *Breyn. cent.* 124. t. 57.

*Habitat in America.* ☉

\* *Foliis angulatis.*

*peruviana.* 4. *MALVA* caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis secundis axillaribus.

*Habitat in Peru. D. Jussieu.* ☉

*Caulis erectus, tripedalis, pilis rarioribus sæpius geminis. Folia septemlobata, plicata, glabra, venosa, acute serrata; petioli longitudine folii. Stipulæ ovato-lanceolatæ. Pedunculus axillaris, nudus, longus. Spica secunda, sursum versa, recurvata ante florescentiam. Corollæ parvæ purpureæ. Semina 10, supra exasperata dentibus alternis plurimis.*

*bryonifolia.* 5. *MALVA* foliis palmatis scabris, caule tomentoso fruticoso, pedunculis multitoris. *Roy. lugdb.* 356.  
*Althæa frutescens, bryoniæ folio. Bauh. pin.* 316. *pr.* 138.  
*Althæa profunde serrato f. dentato folio. Bauh. hist.* 2. p. 955.

*Habitat in Hispania.* ☿

*Planta belle echinata per discum foliorum.*

*capensis.* 6. *MALVA* foliis subcordatis laciniatis glabris, caule arborescente. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 201.  
*Malva capensis frutescens, grossulariæ folio minori glabro. Dill. elib.* 208. t. 169. f. 206.

β. *Malva capensis frutescens, grossulariæ folio majore hirsuto. Dill. elib.* 209. t. 169. f. 207.

γ. *Malva africana frutescens, flore rubro. Comm. hort.* 2. p. 171. t. 86.

*Malva africana frutescens, flore parvo carneo unguiculis atrorubentibus. Pluk. amalb.* 140. t. 431. f. 5.

*Habitat in Æthiopia.* ☿

*caroliniana.* 7. *MALVA* caule repente, foliis multifidis. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 201.

*Abutilon repens, alceæ foliis, flore helvulo. Dill. elib.* 5. t. 4. f. 4.

*Abutilon carolinianum repens, alceæ foliis, gilvo flore. Mart. cent.* 34. t. 34.

*Habitat in Carolina.* ☉

*rotundifolia.* 8. *MALVA* caule repente, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis. *Hort. cliff.* 347. *Fl. Jucc.* 580

*Mat*

*Mat. med.* 339. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. belv.* 363. *Gron. virg.* 79. *Dalib. paris.* 209.

Malva sylvestris, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 314.

Malva sylvestris pumila. *Fuchs. hist.* 508.

*Habitat in Europæ ruderatis, viis, plateis.* ☉

9. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, *sylvestris*, pedunculis petiolisque pilosis.

Malva caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 347.

*Fl. suec.* 581. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. belv.* 362. *Dalib. paris.* 208.

Malva sylvestris, folio sinuato. *Bauh. pin.* 314.

Malva sylvestris recta. *Cord. hist.* 114.

*Habitat in Europæ campestribus.*

10. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, pedunculis petiolisque glabris. *mauritiana.*

Malva hederaceo folio. *Bauh. pin.* 315. *Hort. ups.* 200.

Malva major tertia. *Dalech. hist.* 586.

β. Malva folio ficus altera. *Bauh. pin.* 315. *prodr.* 137.

*Habitat in Italia, Lusitania, Hispania.* ☉

11. MALVA caule erecto, foliis semiobicularis crenatis, calyce exteriore diphylo. *hispanica.*

Malva rotundifolia glabra ex hispania, flore amplo rubello. *Pluk. alm.* 238. t. 44. f. 3.

*Habitat in Hispania.*

12. MALVA caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis. *Vir. cliff.* 356. *Hort. cliff.* 502.

*Hort. ups.* 200. *Roy. lugdb.* 356.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentaphyllis verticillatim genicula ambientibus.

*Morif. hist.* 2. p. 521. *Raj. hist.* 598.

3. Malva foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Hort. cliff.* 347. *Hort. ups.* 200.

Malva foliis crispis. *Bauh. pin.* 315.

Malva crispa. *Dod. pempt.* 653.

*Habitat in China, Syria* ☉

3. MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Alcea.*

*Hort. cliff.* 347. *Fl. suec.* 582. *Roy. lugdb.* 356.

*Hall. belv.* 363. *Dalib. paris.* 209.

Alcea vulgaris major. *Bauh. pin.* 316.

Alcea vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 25.

*Habitat in Germania, Anglia, Gallia.* ☉

- moschata.* 14. MALVA foliis radicalibus reniformibus incisfis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Hort. upf.* 202.  
*Malva montana* f. *Alcea rotundifolia laciniata.* *Col. ecphr.* 1. p. 148. t. 147.  
*Alcea folio rotundo laciniato.* *Bauh. pin.* 316.  
*Habitat in Italia, Gallia. & Helv.*

- ægyptia.* 15. MALVA foliis palmatis dentatis, corollis calyce minoribus.  
*Alcea ægyptia, geranii folio.* *Lipp. ægypt. mss.*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Habitus antecedentis sed tenerior.* Caules filiformes, debiliores, scabri. Folia radicalia quinqueloba subdentata obtusa; superiora tripartita linearia dentata. Flores axillares solitarii, pedunculis longitudine petiolorum. Calyx exterior setis 3; interior latius, semiquinquesfidus, acutus, Corollæ carnescentes.

## LAVATERA.

\* *Caule fruticoso.*

- arborea.* 1. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangulibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Hort. upf.* 202.  
*Lavatera foliis septemangularibus obtusis plicatis villosis, caule fruticoso, floribus ad alas confertis.* *Hort. cliff.* 348. *Roy. lugdb.* 355.  
*Malva arborea veneta dicta, parvo flore.* *Bauh. pin.* 315.  
*Malva arborefcens.* *Dod. pempt.* 653.  
*Habitat inter Pisas & Liburnum. δ*
- micans.* 2. LAVATERA caule arboreo, foliis septemangularibus acutis crenatis plicatis tomentosis, racemis terminalibus. *Roy. lugdb.* 356.  
*Malva foliis mollibus undulatis: in margine superius micis sulphureis ad solem splendentibus donatis.* *Morif. hist.* 1. p. 523. f. 5. t. 17. f. 9.  
*Malva hispanica.* *Morif. præl.* 285.  
*Habitat in Hispania, Lusitania. b*
- olbia.* 3. LAVATERA caule fruticoso, foliis quinquelobo-hastatis. *Hort. upf.* 202.  
*Lavatera foliis quinquangularibus acutis crenatis: lacinia media productiore.* *Hort. cliff.* 348. *Roy. lugdb.* 355.  
*Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore.* *Bauh. pin.* 316.

Althæa

*Althæa arborea* olbia in galloprovincia. *Lob. ic.* 653.

*Habitat in Olbia insula* Galloprovinciæ. ♀

4. **LAVATERA** caule fruticoso, foliis subcordatis sub-trilobis. trilobis rotundatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis unifloris.

*Lavatera* foliis subcordatis emarginatis obsolete trilobis crenatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. *Roy. lugdb.* 355.

*Malva* foliis subcordatis trilobis obtusis serratis villosis. *Hort. cliff.* 347.

*Althæa frutescens*, folio rotundiore incano. *Bauh. pin.* 316.

*Althæa fruticans* hispanica, aceris monspeßulani incanis foliis, grandiflora saponem spirans. *Pluk. alm.* 24. t. 8. f. 3.

*Althæa frutex* 1. *Clus. hist.* 2. p. 24.

*Habitat in Hispania.* ♀

*Planta tomentosa*: tota pilis minimis glutiniferis; eisque immixtis aliis pilis majoribus apice stellatis. Pedunculi tres pluresve ex alis petiolorum, uniflori. Flos magnus, pallide purpurascens.

5. **LAVATERA** caule fruticoso, foliis septemangulatis tomentosis plicatis, racemis terminalibus. *lufitanica.* *Roy. lugdb.* 355.

*Althæa frutescens* lufitanica, folio ampliore minus incano. *Tournef. inst.* 97.

*Habitat in Lusitania.* ♀

\* *Caule herbaceo.*

6. **LAVATERA** caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis. *thuringiaca.* *Hort. upf.* 203.

*Lavatera* foliis inferioribus cordato-subrotundis, superioribus lobatis crenatis, calycibus utrinque incis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.

*Althæa thuringiaca.* *Cam. hort.* 12. t. 6.

*Althæa thuringiaca* grandiflora. *Dill. elth.* 9. t. 8. f. 8.

*Althæa* flore majore. *Bauh. pin.* 316.

*Habitat in Pannonia, Thuringia, Tataria ad sepes.* ♀

7. **LAVATERA** caule erecto, ramis inferioribus diffusis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Hort. upf.* 202. \*

*Malva cretica* annua, flore parvo ad alas umbellato. *Tournef. cor.* 2.

*Habitat in Creta.* ☉

*trinestris.* 3. LAVATERA foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. *Hort. upf.* 203.

Lavatera foliis trilobis: lacinia media productiore, caule herbaceo. *Hort. cliff.* 348.

Lavatera foliis ovato-lanceolatis: inferne angulatis, pedunculis unifloris, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355. *Sauv. monsp.* 101.

Malva folio vario. *Bauh. pin.* 315, *prodr.* 137. t. 137.

β. Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis serratis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 355.

*Habitat in Syria, Hispania, G. Narbonensi.*

### MALOPE.

*Malacoides.* 1. MALOPE foliis ovatis crenatis glabris. *Hort. cliff.* 347. *Hort. upf.* 206. *Roy. lugdb.* 357.

Malva betonica folio. *Morif. hist.* 2. p. 522. f. 5. t. 17. f. 11. *Bocc. sic.* 15. t. 8. f. 2.

Alcea betonica folio, flore purpureo-violaceo. *Barr. ic.* 1189.

*Habitat in Hetruriæ pratis.*

### URENA.

*lobata.* 1. URENA foliis angulatis. *Hort. cliff.* 348. *Hort. upf.* 200. *Fl. zeyl.* 256. *Roy. lugdb.* 358.

Urena sinica, xanthii facie. *Dill. elth.* 340. t. 319. f. 412.

Trifolio adfinis indiæ orientalis, xanthii facie. *Breyn. cent.* 82. t. 35.

*Habitat in China. b*

*sinuata.* 2. URENA foliis sinuato multifidis villosis. *Fl. zeyl.* 257. Alcea indica frutescens, foliis in lacinias varie dissectis. *Pluk. alm.* 15. t. 74. f. 1.

Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus incisis, flore solitario. *Burm. zeyl.* 150. t. 69. f. 2.

*Habitat in India. b*

*procumbens.* 3. URENA foliis hastato-subcordatis indivisis serratis, caule procumbente.

*Habitat in Chinæ monticulis. Osbeck. b*

Caulis frutescens, procumbens, repens, ramosissimus. Folia magnitudine origani, subcordata, integra nec lobata, lævia, argute serrata. Flores foliis majores sunt.

1. GOS-



GOSSYPIUM.

1. GOSSYPIUM foliis quinquelobis, caule herbaceo. *herbaceum*.  
*Hort. ups.* 203. *Mat. med.* 341.  
*Gossypium* caule decumbente. *Hort. cliff.* 350. *Roy. lugdb.* 359.  
*Gossypium* frutescens, semine albo. *Baub. pin.* 430.  
*Gossypium*. *Cam. epit.* 203.  
*Habitat in America.* ☉
2. GOSSYPIUM foliis trilobis integerrimis. *Hort. ups. barbadense.*  
204.  
*Gossypium* frutescens annuum, folio trilobo, barbadense. *Pluk. alm.* 172. *t.* 188. *f.* 1.  
*Habitat in Barbados.* ♂. ♀
3. GOSSYPIUM foliis palmatis: lobis lanceolatis, cau- *arboresc.*  
le fruticoso..  
*Gossypium* caule erecto. *Hort. cliff.* 350. *Roy. lugdb.* 359.  
*Gossypium* arborescens, caule lævi. *Baub. pin.* 430.  
*Gossypium* herbaceum f. *Xylon maderaspatense*, rubicundo flore, pentaphyllum. *Pluk. alm.* 172. *t.* 188. *f.* 3.  
*Cudupariti.* *Rheed. mal.* 1. *p.* 55. *t.* 31.  
*Habitat in Indiæ arenosis.* ♀

HIBISCUS.

1. HIBISCUS foliis ovatis acuminatis serratis, caule sim- *Moscheutos.*  
plicissimo, petiolis floriferis. *Hort ups.* 205.  
*Hibiscus* foliis ovatis crenatis: angulis lateralibus obsolete.  
*Hort. cliff.* 349. *Gron. virg.* 79. *Roy. lugdb.* 358.  
*Alcea rosea peregrina*, forte *Rosa moscheutos plinii*.  
*Corn. canad.* 144. *t.* 145. *Morif. hist.* 2. *p.* 532. *f.* 5.  
*t.* 19. *f.* 6.  
*Habitat in Canada, Virginia.* 2
2. HIBISCUS caule herbaceo simplicissimo, foliis ova- *palustris.*  
tis subtrilobis subtus tomentosis, floribus axillaribus.  
*Althæa palustris.* *Baub. pin.* 316. (*ex horto C.B. Burserus*).  
*Althæa hortensis* f. *peregrina.* *Dod. pempt.* 655.  
*Habitat in Virginia.* *Gronov.* *Canada.* *Kalm.* 2  
*Habitus H. Moscheutos.* Caules sesquipedales, non ramosi, annui. Folia lato-ovata, obtuse serrata, trinervia, acuminata, subtus tomentosa. Pedunculi ex axillis

*lis foliorum superiorum solitarii, petiolo longiores, unisflori, non e petiolo enati, geniculati. Flos maximus.*

*populneus.*

3. HIBISCUS foliis cordatis integerrimis. *Fl. zeyl.* 258. \*  
Alcea malabaricensis, abutili folio, flore majore ex albo  
flavescente. *Raj. hist.* 1069.

Bupariti. *Rheed. mal.* 1. p. 51. t. 29.

*Habitat in India.* ♀

Calyx exterior, in hac & sequente, monophyllus, decedentatus.

Conferatur *Ketmia amplissimo tiliae folio subtus argenteo.* *Gatesb. car.* 2. p. 90. t. 90.

*tiliaceus.*

4. HIBISCUS foliis cordato-subrotundis acuminatis crenatis, caule arboreo. *Roy. lugdb.* 532. *Fl. zeyl.* 259. \*

Alcea malabarica, abutili folio, flore minore ex albo flavescente exterius aspero. *Raj. hist.* 1070.

Pariti f. Tali-pariti. *Rheed. mal.* 1. p. 53. t. 30.

*Habitat in India.* ♀

*Rosa sinensis.*

5. HIBISCUS foliis ovatis acuminatis serratis glabris, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 260. \*

Alcea javanica arborefcens, flore pleno rubicundo. *Breyn. cent.* 121. t. 56.

Scheru-pariti. *Rheed. mal.* 2. p. 25. t. 16.

*Habitat in India.* ♀

*hirtus.*

6. HIBISCUS foliis lanceolato-ovatis acuminatis serratis, ramis scabris, caule herbaceo.

*Habitat in India.*

Planta parva. Caulis & praesertim Pedunculi, nec non Folia et Calyces subtus pilis rigidiusculis hirti. Folia lato-lanceolata, argute serrata. Corolla purpurea.

*mutabilis.*

7. HIBISCUS foliis cordato-quinquangularibus obsolete serratis, caule arboreo. *Hort. upf.* 205. *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358.

Althaea arborea Rosa sinensis. *Morif. hist.* 2. p. 530. f. 5. t. 18. f. 2.

Rosa sinensis. *Ferr. flor.* 493. t. 497. *Mer. sur.* 31. t. 31.

Hina-pariti. *Rheed. mal.* 6. p. 66. t. 38. 39. 40. 41.

*Habitat in India.* ♀

*Malvavifens.*

8. HIBISCUS foliis cordatis crenatis: angulis lateralibus extimis parvis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 1349. *Roy. lugdb.* 358.

Mal-

# MONADELPHIA POLYANDRIA. 695

*Malvaviscus* arborefcens, flore miniato claufo. *Dill. elth.* 210. *t.* 170. *f.* 208.

*Alcea indica* arborea, folio molli, flore amplo eleganter coccineo. *Pluk. alm.* 14. *t.* 257. *f.* 1.

*Habitat in Mexico.* h

9. *HIBISCUS* foliis ovato-lanceolatis: fuperne incifo-fer-*fyriacus.*  
ratis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 350. *Hort. upf.* 205.

*Alcea arborefcens* fyriaca. *Baub. pin.* 316.

*Alcea arborefcens.* *Cam. hort.* *t.* 3. 4.

*Habitat in Syria.* h

10. *HIBISCUS* foliis quinquefido-palmatis, caule acu-*fcutneus.*  
leato. *Hort. cliff.* 498. *Roy. lugdb.* 359. *Fl. zeyl.* 263\*

*Kermia zeylanica*, fici folio, perianthio oblongo integro.

*Dill. elth.* 190. *t.* 157. *f.* 190.

*Habitat in Zeylona.*

11. *HIBISCUS* foliis ferratis: inferioribus ovatis indivi-*Sabdariffa.*  
fis; fuperioribus tripartitis, caule aculeato.

*Hibifcus inermis*, foliis ferratis: inferioribus ovatis integris; fuperioribus trilobis. *Hort. cliff.* 350. *Fl. zeyl.* 262. *Roy. lugdb.* 359.

*Althæa indica*, goffypii folio, acetofæ fapore. *Raj. hift.* 1900.

*Alcæa acetofa indica* mitis, foliis fuperioribus goffypii in modum tripartito-divifis. *Pluk. alm.* 15. *t.* 6. *f.* 2.

β. *Hibifcus inermis*, foliis ferratis: infimis indivifis; mediis tripartitis; fummis quinquepartitis. *Roy. lugdb.* 359.

*Alcea indica*, magno flore. *Baub. pin.* 317.

*Alcea americana.* *Cluf. hift.* 2. *p.* 26.

γ. *Hibifcus* foliis palmato-digitatis quinquepartitis: laciniis lanceolatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 264.

*Alcea spinofa maderas.* faporis acidi, foliis profunde laciniatis cannabis in modum pentaphyllea. *Pluk. alm.* 15. *t.* 5. *f.* 4.

*Narinam-poulli.* *Rheed. mzl.* 6. *p.* 75. *t.* 44.

δ. *Alcea benghalenfis* spinofiffima, acetofæ fapore, flore luteo pallido: umbone purpurafcente. *Comm. hort.* 1. *p.* 35. *t.* 18.

*Ketmia indica*, foliis digitatis, flore magno fulphureo: umbone atro-purpureo, petiolis spinofis. *Ehret.* *t.* 6. *f.* 1.

*Habitat in India,* ☉

γ. *A reliquis diverfa foliis magis palmatis; at Color florum,*  
X x 4 *Aculei*

*Aculei erecti, Locus, Sapor & omnia indicant has vel loco, vel hybrido partu degenerasse.*

- surattensis.* 12. HIBISCUS recurvato-aculeata, foliis trilobis, calycibus exterioribus appendiculatis, stipulis semicordatis. *Habitat in India.*

*Habitus & statura antecedentis. Folia inferiora ovato-subtriloba, acuta, serrata: superiora hastato-triloba, latiora fere quam longa. Aculei recurvi & pili recti sparsi per caulem, ramos, petiolos, pedunculos. Stipulae dimidiato-cordatae s. paria stipularum cordata. Calyx pilis strigosus: exterior valde singularis, cujus radii in media extrorsum aucti foliolo parvo ovato.*

- Manihot.* 13. HIBISCUS foliis palmato-digitatis septempartitis. *Hort. cliff. 350. Hort. ups. 206. Roy. lugdb. 358. Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulphureo. Dill. elsb. 189. t. 156. f. 189.*

*Alcea sinica, manihot stellato folio, capsula longa pilosa pyramidata quinquefariam divisa. Pluk. amaltb. 7. p. 355. f. 2.*

*Habitat in Indiis. b*

- Abelmoschus* 14. HIBISCUS foliis subpeltato-cordatis septemangulatis serratis hispidis. *Hort. cliff. 349. Hort. ups. 206. Fl. zeyl. 261. \* Mat. med. 342. Roy. lugdb. 358.*

*Alcea hirsuta, flore flavo, semine molchato. Margr. bras. 45. t. 45.*

*Alcea ægyptiaca villosa. Baux. pin. 317.*

*Flos molchatus. Mer. surin. 42. t. 42.*

*Cattu-gatturi. Rheed. mal. 2. p. 71. t. 38.*

*Habitat in Indiis. b*

- esculentus.* 15. HIBISCUS foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus.

*Alcea americana annua, flore albo (flavo potius) maximo, fructu pyramidalis sulcato. Comm. hort. 1. p. 37. t. 19. Raj. suppl. 518.*

*Alcea maxima, malvæ rosæ folio, fructu decagono recto crassiore brevior esculento, Sloan. jam. 98. hist. 1. p. 223. t. 133. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

- vitisfolius.* 16. HIBISCUS foliis quinquangularibus acutis serratis, caule inermi, floribus pendulis. *Fl. zeyl. 265. \**

*Althæa indica, vitis folio, flore amplo flavo pendente. Herm. lugdb. 26. t. 28.*

Katou-

Katou-Beloeren. *Rheed. mal.* 6. p. 79. t. 46.

*Habitat in India.* ☉

17. HIBISCUS foliis cordato-hastatis, pedunculis alter-*zeylonicus.*  
nis unifloris geniculatis. *Fl. zeyl.* 266. \*

*Habitat in Zeylona.* ☉

18. HIBISCUS foliis inferioribus cordatis acuminatis ser-*virginicus.*  
ratis; superioribus hastatis. *Gron. virg.* 171.

*Alcea maderaspatana*, trilobis f. hastatis foliis glabris, pe-  
ricarpio tantummodo villosa. *Pluk. alm.* 15. t. 127.  
f. 2. *forte?*

*Habitat in Virginiae paludosis salis.*

Caulis viridis, erectus, angustior. Folia caulina corda-  
to-oblonga, demum hastata, viridia, subtomentosa, tri-  
nervia, tenuissime serrata. Pedunculi uniflori: ex alis  
solitarii, in summitate subracemosi, nudi.

19. HIBISCUS foliis inferioribus cordatis angulatis, su-*Pentacarpus.*  
perioribus subhastatis, floribus subnutantibus, pistillo  
cernuo.

Hibiscus foliis cordatis angulatis serratis, stipulis setace-  
is divaricatis. *Hort. cliff.* 350. *Roy. lugdb.* 359.

*Ketmia palustris* minor, folio angusto, flore parvo pur-  
purascente, fructu depresso pentagono. *Zanpich. venet.*  
155. t. 91.

*Habitat in paludosis Venetiae.* 2

Planta antecedenti simillima; sed fructu diversa. Caulis  
tripedalis, angustus. Folia caulina cordato-oblonga;  
superiora hastata, viridia, subtrinervia, subtus tomen-  
tosa, tenuissime serrata. Pedunculi axillares in sum-  
mitate plantae, solitarii, nudi, petiolo longiores, uniflo-  
ri. Calyx inferior patens, radiis subulatis, vix longitu-  
dine interioris. Corolla patens, dilute rubra, subnu-  
tans. Stamina lutea tota; Anthera saturatius. Stylus  
cernuus cum staminibus, albus; Stigmata 5, capitata,  
incarnata.

20. HIBISCUS foliis tripartitis incis, calycibus inflatis, *Trionum.*  
*Hort. nps.* 206.

*Trionum.* *Hort. cliff.* 349. *Roy. lugdb.* 358.

*Alcea vesicaria.* *Banb. pin.* 317.

*Alcea peregrina* foliolequa. *Lob. ic* 656.

2. *Ketmia vesicaria* africana. *Tournef. inst.* 101.

*Alcea vesicaria* capitis b. *spei. Moris. pracl.* 227. *bist.*  
2. p. 533.

*Habitat in Italia, Africa.* ☉

X x 5

PEN-

## PENTAPETES.

- phœnicea*. 1. PENTAPETES foliis hastato-lanceolatis serratis.  
 Blattaria zeylonica, flore amplo coccineo. *Comm. hort.*  
 1. p. 11. t. 6.  
 Alcea indica, lucido hastato folio, flore blattariæ phœ-  
 niceo. *Raj. suppl.* 523. *Pluk. phyt.* t. 255. f. 3.  
 Alcea fruticosa pentaphylloides æmula, floribus amœ-  
 nissime rubellis, calyce producto. *Pluk. alm.* t. 126.  
 f. 4. mala.  
*Habitat in India.* ☉  
 Involucrum uniflorum deciduum. Stamina 15. inter  
 singula tria Filamentum petaloideum lanceolatum, co-  
 loratum, longitudine corollæ. Cotyledones bipartiti, u-  
 ti in *Convolvulis*. Pedunculi biflori.
- suberifolia*. 2. PENTAPETES foliis ovatis repandis. *Amœn. acad.*  
 1. p. 407.  
 Pentapetes. *Fl. zeyl.* 250.  
 Pterospermadendrum suberis folio anguloso subtus inca-  
 no, floribus albis, *Amm. act.* 8. p. 215. t. 14.  
*Habitat in India.* ☿
- acerifolia*. 3. PENTAPETES foliis cordatis repandis. *Amœn. acad.*  
 1. p. 407.  
 Pterospermadendron foliis aceris, flore fructuque ma-  
 jore. *Amm. act.* 8. p. 216. t. 16. 17.  
*Habitat in India.*

## STEWARTIA.

- Malacoden-*  
*dron.* 1. STEWARTIA. *Act. upf.* 1741. p. 79. t. 2. *Catesb.*  
*car.* 3. p. 13. t. 13.  
 Malacodendron. *Mitch. gen.* 16.  
*Habitat in Virginia.* ☿  
 Folia *Cerasi*, acutissime serrata, subtus villosa.

## CAMELLIA.

- japonica*. 1. CAMELLIA.  
 Tsubakki montanus s. sylvestris, flore roseo simplici.  
*Kempf. amœn.* 850. t. 851.  
 2. Tsubakki hortensis, flore pleno maximo rosæ hortensis.  
*Kempf. amœn.* 852.  
*Habitat in Japonia, China.* ☿

Clas-

*Classis XVII.*

# DIADELPHIA.

## HEXANDRIA.

### FUMARIA.

*\* Corollis bicalcaratis.*

1. FUMARIA scapo nudo. *Hort. cliff.* 351. \* *Gron. Cucullaria.*  
*virg.* 171. *Roy. lugdb.* 393.  
*Fumaria tuberosa insipida. Corn. canad.* 127.  
*Fumaria filiquosa, radice grumosa, flore bicorporeo ad*  
*labia conjuncto, virginiana. Pluk. alm.* 162. t. 90. f.  
3. *Raj. suppl.* 475.  
*Cucullaria. Juss. act. paris.* 1743.  
*Habitat in Virginia, Canada.* 2  
*Radix tuberosa. Folium radicale tricompositum. Scapus*  
*nudus, Racemo simplici; bractæ. c. vix ullæ; Nectarium*  
*duplex corollam basi bicornem efficiens.*

2. FUMARIA floribus postice bilobis, caule folioso. *Spektabiltz,*  
*Habitat in Sibiria. D. Demidoff.*  
*Planta eximia floribus speciosissimis, maximis. Habitus*  
*Fumariæ bulbosæ, sed majora omnia. Rami ex alis ra-*  
*riores. Caulis erectus. Racemus absque bracteis. Co-*  
*rollæ magnitudine extimi articuli pollicis, pone in du-*  
*os lobos æquales, rotundatos divisæ.*

*\* Corollis unicalcaratis.*

3. FUMARIA caule simplici, bracteis longitudine flo-*bulbosa,*  
*rum.*  
*Fumaria caule simplicissimo diphylo, floribus calyce de-*  
*stitutis. Hort. cliff.* 351. *Vir. cliff.* 70. *Fl. succ.* 585.  
*Mat. med.* 344. *Roy. lugdb.* 394. \*  
4. *Fumaria bulbosa, radice cava, major. Banb. pin.* 142. cava.  
*Pistolochia. Fuchs. hist.* 91.  
5. *Fumaria bulbosa, radice non cava, minor. Banb. pin. [intermedia.*  
244.  
7. *Fumaria bulbosa, radice non cava, major. Banb. pin. solida.*  
144.  
*Habitat in Europæ nemoribus & umbrosis.* 2  
*Conjungunt has plantas specic: Radix carnosæ, simplex;*  
*Gcm-*

*Gemmæ radicales duæ, trivalves; Caulis simplex, subangulatus, unico ramo; Foliorum structura decomposita; Racemus bracteis immixtus, terminalis, solitarius; Corolla, Calyx minimus, Semina, Stamina Siliquæ structura; Tempus vernum. Species reliquæ propriis natis distinctissima.*

*sempervirens.*

4. FUMARIA siliquis linearibus paniculatis, caule erecto. *Hort. ups.* 207.

Fumaria caule erecto ramoso, siliquis filiformibus corymbosis. *Hort. cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394.

Fumaria siliquosa sempervirens. *Corn. canad.* 57. t. 57.

*Morif. hist.* 2. p. 259. f. 3. t. 12. f. 1.

*Habitat in* Canada, Virginia. ☉

*capnoides.*

5. FUMARIA siliquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis.

Fumaria caule ramoso diffuso, siliquis oblongis, radice perenni. *Hort. cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394.

Fumaria lutea. *Bauh. pin.* 143.

Fumaria lutea montana. *Dalech. hist.* 1294.

Fumaria tingitana, radice fibrosa, perennis, flore ex albo flavescente, siliquis curtis. *Pluk. alm.* 262. t. 90. f. 2.

*Habitat in* Gallia, Italia, Mauritania. ☉

*enneaphylla.*

6. FUMARIA foliis triternatis: foliolis cordatis.

Fumaria hispanica saxatilis, foliis amplioribus cordiformibus, semine compresso. *Tournef. inst.* 422.

Fumaria henneaphyllos hispanica saxatilis. *Bocc. mus.* 2. p. 83. t. 73. *Raj. suppl.* 475. *Barr. ic.* 42.

Fumaria radice fibrosa, foliis ad petiolum sinuatis crassioribus. *Pluk. alm.* 162.

*Habitat in* Hispaniæ, Siciliæ saxosis.

*officinalis.*

7. FUMARIA pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso.

Fumaria pericarpis monospermis. *Hort. cliff.* 252. *Fl. suec.* 584. *Mat. med.* 343. *Roy. lugdb.* 394. *Hall. belv.* 605.

Fumaria officinarum & dioscoridis. *Bauh. pin.* 143.

Fumaria. *Fuchf. hist.* 338. *Cam. epit.* 890.

*Habitat in* Europæ agris, cultis. ☉

*spicata.*

8. FUMARIA pericarpis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sauv. monsp.* 263.

Fumaria minor tenuifolia. *Bauh. pin.* 143. *Segu. ver.* 2. p. 111.

Fuma



*Fumaria tenuifolia erecta hispanica purpurea. Barr. ic. 41.*  
*Fumaria minor tenuifolia præcox, semine lini. Moris. hist. 2. p. 262. f. 3. t. 12. f. 13.*  
*Capnos tenuifolia. Clus. hist. 2. p. 208.*  
*Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Veronæ ad agros, vias.*  
*Varietates, qui statuat hanc cum sequente esse Fumariæ officinalis vix erret, delitante fructu. An hybridæ?*  
*Spica ex flosculis arcte congestis est.*

9. *FUMARIA* pericarpiis monospermis racemosis, foliis *capreolata*. scandentibus subcirrhosis.

*Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens.*  
*Bauh. pin. 143.*

*Fumaria major scandens, flore pallidiore. Raj. hist. 405.*

*Habitat in G. Narbonensi. Anglia. ☉*

*Pedunculi partiales recurvati sunt, & Foliola extrema in cirrhos transeunt.*

10. *FUMARIA* filiquis linearibus, foliis cirrhiferis. *claviculata*.

*Fumaria foliis cirrhiferis, floribus spicatis. Hort. cliff.*

*351. \* Roy. lugdb. 394. Gort. gelr. 413.*

*Fumaria claviculis donata. Bauh. pin. 143. Moris. hist.*

*2. p. 266. f. 3. t. 12. f. 3.*

*Fumaria alba latifolia. Raj. angl. 3. p. 335.*

*Habitat in Angliæ locis uliginosis saxosis.*

11. *FUMARIA* filiquis globosis inflatis. *Hort. ups. 207. vesicaria.*

*Fumaria foliis cirrhiferis, filiquis ovatis inflatis pendulis. Hort. cliff. 351. Roy. lugdb. 394.*

*Fumaria alba vesicaria, capreolis donata, sub exitum autumnii florens, æthiopica. Pluk. alm. 400. t. 355. f. 3.*

*Cyslicapnos africana scandens. Boerb. lugdb. 1. p. 310. t. 310.*

*Habitat in Æthiopia. ☉*

## OCTANDRIA.

### POLYGALA.

\* *Cristati (flores appendice penicelliformi.)*

*POLYGALA* floribus cristatis spicatis, caule herbaceo *incarnata*. ramoso erecto, foliis alternis subulatis.

*Polygala marilandica, foliis tenuissimis, spica parva compacta in summo caule flosculis carneis. Raj. suppl. 639.*

*Habitat in Virginia, Canada. ☉*

*Cauli spithameus, pedalis, erectus, filiformis, angulatus. Rami communiter tres, in alis summis, longi, angusti. Folia subulata, plana, acutissima, remota, sæpius vix in caule octo.*

*octo. Spicæ terminales, solitariae, oblongæ, vividissime incarnatæ; Corollæ, quam alæ calycinæ triplo longiores, instructæ Penicillo multifido, dilatato, incarnato, uti corollæ erecto.*

*vulgaris.*

2. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Amœn. acad. 2. p. 136.*

*Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffusis herbaceis. Vir. cliff. 70. Hort. cliff. 352. Fl. suec. 586. Roy. lugdb. 393.*

*Polygala major. Baub. pin. 215.*

*Polygala vulgaris major. Clus. hist. 1. p. 324. Vaill. parif. 161. t. 32. f. 1.*

- β. *Polygala vulgaris. Baub. pin. 215.*

*Polygala foliis imis subrotundis, superioribus angustis acutis. Hall. helv. 606.*

- γ. *Polygala minor, foliis circa radicem rotundiusculis. Vaill. parif. 161. t. 32. f. 2.*

*Habitat in Europæ pratis, & pascuis siccis. 2*

*monspeliensis.*

3. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Sauv. monsp. 53.*

*Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti carnis lineis virgatis. Magn. monsp. 208.*

*Polygala vulgaris coloris obsoleti, foliis angustissimis. Baub. hist. 3. p. 388. Raj. hist. 1336.*

*Habitat Monspelii in collibus sterilibus. ☉*

*sibirica.*

4. POLYGALA floribus cristatis, racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis.

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin.*

*Habitus antecedentis. Folia inferiora ovata, superiora lanceolata. Racemus unus (raro duo), lateralis, laxus, absque bracteis, ad exortum pedicellorum partialium.*

*bracteolata.*

5. POLYGALA floribus cristatis, racemo laterali, bracteis triphyllis, foliis lanceolatis, caule suffruticoso.

*Polygala floribus cristatis racemosis, carina cristis longiore, caule suffruticoso, foliis lineari-lanceolatis. Amœn. acad. 2. p. 137.*

*Polygala africana glabra, florum galea binis cristis fibratis ornata, ex involucri magno dipetalo erumpente. Pluk. alm. 300. t. 53. f. 2.*

*Polygala frutescens angustifolia ramosa, floribus in summitate velut umbellatis. Raj. suppl. 640.*

β. Pol

6. *Polygala floribus cristatis racemosis; carina cristis brevior, caule suffruticoso, foliis lineari-subulatis.* *Amæn. acad. 2. p. 137.*  
*Polygala foliis lineari-subulatis.* *Hort. cliff. 353.*  
*Polygala frutescens, foliis linearibus, flore majore purpureo.* *Burm. afric. 202. t. 73. f.*
7. *Polygala floribus cristatis racemosis, caule erecto suffruticoso simplicissimo, foliis subulatis.* *Amæn. acad. 2. p. 137.*  
*Polygala foliis linearibus acutis, flore purpureo minore.* *Burm. afric. 203. t. 73. f. 3.*  
*Habitat Æthiopia. h*
6. **POLYGALA** floribus cristatis alternis, caule erecto *scabra*, suffruticoso ramoso, foliis linearibus obtusis *scabris.* *Amæn. acad. 2. p. 138.*  
*Polygala æthiopica, angustis hirsutis foliis, flore obsolete purpureo.* *Pluk. mant. 153. t. 404. f. 6.*  
*Polygala folio lineari-obtusio, flore albente minimo.* *Burm. afric. 204. t. 73. f. 4.*  
*Habitat in Æthiopia. h*
7. **POLYGALA** floribus cristatis carina lunulata, caule *myrtifolia*, fruticoso, foliis lævibus oblongis obtusis. *Amæn. acad. 2. p. 138.*  
*Polygala foliis lanceolatis obtusis, caule frutescente.* *Hort. cliff. 353.*  
*Polygala arborea myrtifolia, floribus albis: intus purpureis.* *Com. hort. 1. p. 87. t. 46. Raj. suppl. 640.*  
*Polygala arborea, myrtilli subrotundis foliis, fructu magno tordylii.* *Pluk. mant. 153. t. 437. f. 4.*  
*Polygala frutescens, foliis oblongis glabris, flore purpureo.* *Burm. afric. 200. t. 13. f. 1.*  
*Habitat in Æthiopia. h*  

\* *Imberbes (flores absque penicillo carinati)*  
*frutescentes.*
8. **POLYGALA** floribus imberbibus lateralibus solitariis, *Penæa*, caule arboreo, foliis obtusis petiolatis. *Amæn. acad. 2. p. 140.*  
*Penæa arborescens, buxi folio aspero.* *Plum. spec. 22.*  
*Habitat in America meridionali h*
9. **POLYGALA** floribus imberbibus racemosis, caule *ar-diversifolia*, boreo, foliis senioribus oblongo-ovatis, recentibus sub-ovatis. *Amæn. acad. 140.*  
*Polygala foliis ramorum provectiorum oblongo-ovatis,*

tis, tenellorum subovatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 353. \*

*Habitat in America calidiore.* ♀

- chinensis.* 10. POLYGALA floribus imberbibus spicatis axillaribus, caulibus suffruticosis, foliis ovalibus.

*Habitat in India.* ♀

*Caules pedales, decumbentes, lignosi, non glabri. Folia ovalia, integerrima, magnitudine extimi pollicis, subpetiolata, nuda, obtusa cum mucrone. Rami laterales, rarissimi. Spicæ laterales, foliis sæpe longiores, virides.*

- Chamæbuxus.* 11. POLYGALA floribus imberbibus sparsis: carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Amæn. acad.* 2. p. 140.

*Chamæbuxus flore coluteæ. Bauh. pin.* 471.

*Anonymos flore coluteæ. Clus. hist.* 1. p. 105.

*Habitat in Austriæ, Helvetiæ, Alsatæ montanis.* ♀

- spinosa.* 12. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule arboreo spinoso, foliis ovalibus mucronatis. *Amæn. acad.* 2. p. 141. \*

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- Heisteria.* 13. POLYGALA floribus imberbibus lateralibus, caule arborecente, foliis triquetris mucronatis.

*Polygala astragaloides frutescens. Breyn. prodr.* 2. p. 85. *Suffrutex ericæformis, flore rubro elegantissimo. Seb. thes.* 2. p. 63. t. 62. f. 8.

*Thymbra capensis, nepetæ theophrasti foliis aculeatis, flore parvo purpureo. Pluk. alm.* 366. t. 229. f. 5. *Heisteria. Hort. cliff.* 352. \* *Roy. lugdb.* 393.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

\* *Imberbes herbaceæ, caule simplicissimo.*

- Senega.* 14. POLYGALA floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-lanceolatis. *Amæn. acad.* 2. p. 139.

*Polygala caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis alternis integerrimis, racemo terminali erecto. Gron. virg.* 80. \* *Mat. med.* 345.

*Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari e flosculis albis composita. Raj. suppl.* 640.

*Habitat in Virginia, Pensylvania, Marilandia, &*

15. **POLYGALA** floribus imberbibus oblongo-capitatis, *lutea*,  
caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis  
acutis, *Amæn. acad. 2. p. 140.*  
Polygala f. Flos Ambervalis floribus luteis in capitu-  
lum oblongum congestis. *Pluk. alm. 301. Raj. suppl.*  
639.  
Polygala virginiana, flore luteo capitato. *Pet. ficc. 58.*  
*Habitat in Virginia. ☉*
16. **POLYGALA** floribus imberbibus globoso-capitatis, *viridescens*,  
caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis  
obtusiusculis. *Amæn. acad. 2. p. 140.*  
Polygala foliis lanceolatis alternis, caule simplicissimo,  
corymbo terminali capitato. *Gron. virg. 80?*  
*Habitat in Virginia ☉*  
Caulis *spithameus* f. *pedalis, angulatus, absque ramis,*  
*erectus.* Folia *alterna, linearia* f. *lineari-lanceolata,*  
*laxa, integerrima.* Capitulum terminale, *subglobosum,*  
*ex albo viride, cum obsolete rubri mixtura in alis flo-*  
*rum.*
17. **POLYGALA** floribus imberbibus, caule herbaceo *triflora*,  
erecto, foliis linearibus alternis, pedunculis subtriflo-  
ris. *Fl. zeyl. 269.*  
*Habitat in Zeylona. ☉*
18. **POLYGALA** floribus imberbibus, pedunculis multi-*glaucoideis.*  
floris lateralibus, caulibus diffusis herbaceis, foliis acu-  
tis. *Fl. zeyl. 270. \**  
*Habitat in Zeylona. ☿*

\* *Imberbes herbaceæ ramosæ.*

19. **POLYGALA** floribus imberbibus, capsulis ciliato-*ciliata.*  
dentatis, caule herbaceo erecto. *Fl. zeyl. 268.*  
*Habitat in India. ☉*  
Variat *Foliis cordatis, Caulibus semipedalibus, ramosis.*
20. **POLYGALA** floribus imberbibus, pedunculis squar-*sanguinea.*  
rosis, caule herbaceo ramoso erecto.  
*Habitat in Virginia Kalm. ☉*  
Caulis *spithameus* f. *pedalis, firmus, angulatus, ramo-*  
*sus, erectus, ramis caule ultioribus.* Folia *alterna, an-*  
*gusto-lanceolata.* Spicæ terminales, *laxæ, sanguineæ, o-*  
*vatae, decidunt enim flosculi inferiores maturi, dum*  
*novelli accrescunt unde, Pedunculus lacerus* f. *squar-*  
*rosus.*

- verticillata.* 21. *POLYGALA* floribus imberbibus, spicis floribus remotis, foliis linearibus verticillatis, caule herbaceo ramoso.  
*Polygala* caulibus filiformibus, foliis linearibus alternis, pedunculis spicatis. *Gron. virg.* 172.  
*Polygala* foliis imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo filiformi ramoso, foliis linearibus. *Amæn. acad.* 2. p. 159.  
*Polygala* mariana quadrifolia minor, spica parva albicante. *Pluk. mant.* 153. t. 438. f. 4.  
*Polygala* quadrifolia minima marilandica, spicis florum parvis albescentibus. *Raj. suppl.* 639.  
*Habitat in Virginia.* ☉  
 Folia sæpius quina ad genicula, interdum alterna. Spicæ albæ, angustissimæ flosculis remotis.
- cruciata.* 22. *POLYGALA* floribus imberbibus, foliis quaternis. *Amæn. acad.* 2. p. 138.  
*Polygala* foliis quaternis. *Gron. virg.* 80.  
*Polygala* quadrifolia f. *cruciata*, floribus ex viridi rubentibus in globum compactis. *Pluk. alm.* 301.  
*Habitat in Virginia.*

## DECANDRIA.

## ERYTHRINA.

- herbacea.* 1. *ERYTHRINA* foliis ternatis, caule simplicissimo infermi. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 373.  
*Coral carolinensis*, hastato folio. *Dill. elth.* 107. t. 90. f. 106.  
*Corallodendron humile*, spica florum longissima, radice crassissima. *Catesb. car.* 49. t. 49.  
*Habitat in Carolina, Missipi.* 2
- corallodendrum.* 2. *ERYTHRINA* foliis ternatis, caule arboreo aculeato. *Hort. cliff.* 354. *Hort. ups.* 207. *Fl. zeyl.* 275. *Roy. lugdb.* 373.
- occidentalis* *Ceratia* f. *Siliqua sylvestris* spinosa arbor indica. *Bauhin.* 402.  
*Coral arbor americana.* *Comm. hort.* 1. p. 211. t. 10.
- orientalis.* 3. *Mouricou.* *Rheed. mal.* 6. p. 13. t. 7.  
*Habitat in Indiis.* 5  
*Est quedam differentia inter occidentalem & orientalem, sed vix videtur sufficiens pro specie distincta; culei enim in orientali nigricantes sunt.*

3. ER

3. *ERYTHRINA* foliis pinnatis, leguminibus membra- *Pisepula*  
naceo-tetragonis. †

Coral arbor polyphylla non spinosa, fraxini folio, siliqua  
alis foliaceis exstantibus rotæ molendinariæ fluviali-  
lis aucta. *Sloan. jam.* 143. *hist.* 2. p. 39. t. 176. f.  
45. *Raj. dendr.* 108.

*Habitat in America calidiore.* †

## SECURIDACA.

1. *SECURIDACA.*

*Sparteum* scandens, citri foliis, floribus albis ad nodos  
confertim nascentibus. *Plum. spec.* 19.

*Habitat in America meridionali.* †

## BORBONIA.

1. *BORBONIA* foliis lanceolatis trinerviis integerrimis. *trinervia.*

*Borbonia* foliis lanceolatis acuminatis trinerviis. *Hort.*

*cliff.* 494.

Frutex æthiopicus, rusci angusto & minore folio. *Pluk.*

*alm.* 158. t. 414. f. 1.

*Habitat in Æthiopia.* †

2. *BORBONIA* foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. *lanceolata.*

Frutex æthiopicus, rusci angusto & minore folio. *Pluk.*

*alm.* 158. t. 297. f. 4.

*Genista* africana frutescens, rusci nervosis foliis. *Raj.*

*dendr.* 107.

*Habitat in Æthiopia.* †

3. *BORBONIA* foliis cordatis multinerviis integerrimis. *cordata.*

*Borbonia* foliis cordatis acuminatis integerrimis multi-  
nerviis. *Hort. cliff.* 494. *Roy. lugdb.* 372.

*Sparteum* africanum frutescens, rusci folio caulem am-  
plexante. *Comm. hort.* 2. p. 195. t. 18. *Raj. dendr.* 107.

*Genista* africana frutescens, rusci foliis nervosis, flore  
luteo. *Seb. thes.* 1. p. 38. t. 24. f. 3.

Frutex æthiopicus, foliis rusci, floribus papilionaceis se-  
rica lanugine fusca villosis. *Pluk. alm.* 159. t. 297. f. 3.

*Habitat in Æthiopia.* †

4. *BORBONIA* foliis ovatis tomentosis.

*tomentosa.*

*Genista* africana tomentosa, folio cochleariformi, flore  
luteo. *Seb. thes.* 1. p. 38. t. 24. f. 1.

5. *Genista* africana arborescens, folio argentea lanugine ve-  
stito. *Seb. thes.* 1. p. 38. t. 24. f. 2.

*Habitat in Æthiopia.* †

*crenata.*

5. **BORBONIA** foliis cordatis multinerviis crenatis.  
 Frutex æthiopicus leguminosus, foliis rusci majoribus in  
 ambitu spinulis fimbriatis. *Pluk. alm.* 159.  
 Planta leguminosa æthiopica, foliis rusci. *Breyn. cent.*  
*69. t. 28.*  
*Habitat in Æthiopia. 5*

## SPARTIUM.

\* *Foliis simplicibus.**intecum.*

1. **SPARTIUM** ramis oppositis teretibus apice floriferis,  
 foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 356. *Hort. ups.* 208.  
*Roy. lugdb.* 370. *Sauv. monsp.* 60.  
 Spartium arboreescens, feminibus lenti similibus. *Bauh.*  
*pin.* 396.  
 Spartium maculobium. *Renealm. spec.* 34. *t.* 33.  
*Habitat in G. Narbonensi, Italia, Sicilia, Turcia. 5.*

*radiatum.*

2. **SPARTIUM** ramis oppositis angulatis, foliis opposi-  
 tis subulatis.  
 Spartium æquicolorum minimum montanum triphyllon.  
*Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294.  
 Genista radiata f. stellaris. *Bauh. hist.* 1. *p.* 399.  
*Habitat in Italia. 5*

*monosper-  
mum.*

3. **SPARTIUM** ramis angulatis, racemis lateralibus, fo-  
 liis lanceolatis, *Hort. cliff.* 356. *Roy. lugdb.* 370.  
*Sauv. monsp.* 60.  
 Spartium alterum monospermum, semine reni simili.  
*Bauh. pin.* 396.  
 Spartium hyposphærolobium. *Ren. spec.* 35. *t.* 33.  
 β. Spartium tertium, flore albo. *Bauh. pin.* 396.  
 Spartium 3. hispanicum. *Clus. hist.* 1. *p.* 103.  
*Habitat in Hispaniæ sterilioribus. 5*

*Scorpium.*

4. **SPARTIUM** ramis spinosis patentibus, foliis ovatis.  
 Genista-spartium spinosum majus, flore luteo. *Bauh.*  
*pin.* 394.  
 Aspalathus secunda monspeliensis. *Bauh. hist.* 1. *p.* 402.  
 β. Genista-spartium spinosum majus secundum, flore pal-  
 lido. *Bauh. pin.* 394.  
 γ. Genista-spartium spinosum majus tertium hirsutum.  
*Bauh. pin.* 394.  
 Aspalathus alter 111. *Clus. hist.* 1. *p.* 106.  
*Habitat in Hispania, G. Narbonensi. 5*

\* *Foliis*



\* *Foliis alternis.*

6. SPARTIUM foliis solitariis ternatisque, ramis sexan-  
gularibus apice floriferis.  
Spartium orientale, filiqua compressa glabra & annula-  
ta. *Tournef. cor.* 44.  
*Habitat in Oriente.* 5  
*Anguli tres decurrunt per ramos a singulo folio.*
6. SPARTIUM foliis ternatis: foliolis involutis, cauli-  
bus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris.  
Cytisus ramis humifusis albidis, floribus capitatis termi-  
nallibus, foliolis ovalibus glabris aggestis. *Sauv. monsp.*  
190  
Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis. *Bauh.*  
*pin.* 390. *Guet. stamp.* 2. p. 417.  
Cytisus montis calcaris. *Bauh. hist.* 1. p. 370.  
Cytisus 11. *Clus. hist.* 1. p. 94.  
*Habitat in Hispania, Gallia australiore.* 5
7. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis iner-  
mibus angulatis. *Hort. cliff.* 356. *Fl. suec.* 589. *Roy.*  
*lugdb.* 370. *Gort. gelr.* 415.  
Genista angulosa & scoparia. *Bauh. pin.* 395.  
Genista. *Dod. pempt.* 761.  
*Habitat in Europæ australioris arenosis.* 5
8. SPARTIUM foliis ternatis, ramis angulatis spinosis. *Spinosum.*  
*Hort. cliff.* 356. *Hort. nps.* 208. *Roy. lugdb.* 370.  
*Sauv. monsp.* 191.  
Acacia trifolia. *Bauh. pin.* 392.  
Aspalathus secunda trifolia. *Bauh. hist.* 1. p. 375.  
*Habitat in Europæ australis asperis maritimis.* 5

GENISTA.

\* *Inermes.*

1. GENISTA foliis ternatis. *Hort. cliff.* 355. *Mat. med. canariensis*  
347. *Roy. lugdb.* 371.  
Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. *Bauh.*  
*pin.* 390.  
Cytisus 1. *Clus. hist.* 1. p. 94.  
β. Cytisus canariensis sempervirens & incanus. *Comm.*  
*hort.* 2. p. 103. t. 52.  
Cytisus canariensis, flore candido & citrino. *Seb. thes.*  
2. p. 6. t. 4. f. 6. 7.

Y y 3

Cy-

*Cytisus canariensis* microphyllus angustifolius prorsus incanus. *Pluk. alm.* 128. t. 277. f. 6.

*Habitat in Hispania, Canariis.* b

*sagittalis.* 2. GENISTA ramis ancipitibus articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371.

Genista herbacea s. Chamæ-iptartium. *Baub. hist.* 1. p. 395.

Chamæ-Genista sagittalis. *Baub. pin.* 395.

Chamæ-Genista sagittalis pannonica. *Cam. hort.* t. 13.

*Habitat in Germania, Gallia.* 2

*tridentata.* 3. GENISTA ramis triquetris subarticulatis, foliis tricuspidatis.

Genistella fruticosa lusitanica latifolia. *Tournef. inst.* 646.

β. Genista fruticosa lusitanica angustifolia. *Tournef. inst.* 646.

*Habitat in Lusitania.* Læß. b

*Præcedenti valde affinis, at majora omnia & articuli ramorum in solum laterale terminati, non integrised tricuspidati.*

*tinctoria.* 4. GENISTA foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis. *Hort. cliff.* 355. *Fl. suoc.* 587. *Mat. med.* 347. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 416.

Genista tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

Genista tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* 1. p. 101.

*Habitat in Germania, Anglia.* b

*pilosa.* 5. GENISTA foliis lanceolatis obtulis, caule tuberculato, decumbente. *Hort. cliff.* 355. *Fl. succ.* 588. *Roy. lugdb.* 371.

Genista ramosa, foliis hyperici. *Baub. pin.* 395.

Chamægenista prima. *Clus. hist.* 1. p. 103.

*Habitat in Pannonia, G. Narbonensi, Germania.*

\* *Spinæ laterales.*

*anglica.* 6. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371.

Genista minor asphaltoides. *Baub. pin.* 395. *prodr.* 157.

Genistella. *Dod. prompt.* 670.

*Habitat in Angliæ ericetis humidiusculis.* b.

*germanica.* 7. GENISTA spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 371. *Gort. gelr.* 417.

Geni-

*Genista spinosa minor germanica. Baub. pin. 395.*

*Genistella spinosa. Riv. tetr. 67.*

*Habitat in Germania. b*

8. GENISTA spinis decompositis, ramis floriferis iner- *hispanica.*  
mibus: foliis linearibus pilosis.

*Genista spinosa minor hispanica villosissima. Baub. pin.*  
*395.*

*Genistella monspeliaca spinosa. Baub. prodr. 157.*

*Genistella, montis ventosi, spinosa. Baub. hist. 1. p.*  
*400.*

*Habitat in Hispania, G. Narbonensi. b*

*Vix a precedente sufficienter distincta.*

9. GENISTA caule aphylo, spinis decussatis. *lusitanica.*

*Genista-spartium spinosum minus. Baub. pin. 394.*

*Scorpius secundus. Clnf. hist. 1. p. 107. Baub. hist. 1.*  
*p. 403.*

*Habitat in Lusitania, Hispania. b*

## ASPALATHUS.

1. ASPALATHUS foliis confertis subulatis mucronatis *astroites.*  
glabris, caule villosa, floribus sparsis.

*Genista astroites, juniperinis pungentibus foliis, æthio-*  
*pica, floribus saturate luteis. Pluk. mant. 88. t. 413.*  
*f. 3. Raj. dendr. 104.*

*Habitat in Æthiopia. b*

2. ASPALATHUS foliis confertis subulatis mucrona- *chenopoda.*  
tis hispidis, floribus capitatis.

*Genista africana lutea, floribus hirsutis in capitula lanu-*  
*ginosa conglobatis, foliis corrudæ aculeatis sabhirsu-*  
*tis. Herm. afr. 11.*

*Chamælaix 1. Chenopoda monomapatensis. Breyn. cent.*  
*23. t. 11.*

*Habitat in Æthiopia. b*

- 3 ASPALATHUS foliis confertis subulatis inermibus *thymifolia,*  
glabris brevissimis, floribus alternis.

*Genista minima æthiopica, foliis thymi confertis splen-*  
*dentibus glabris. Pluk. mant. 88. t. 413. f. 1.*

*Habitat in Æthiopia. b*

4. ASPALATHUS foliis confertis subulatis inermibus *ericifolia.*  
hirsutis, floribus alternis, calycibus linearibus.

*Genista æthiopica non spinosa, foliis ericæ villosis, flo-*

ribus parvis spicatis luteis: calycibus longioribus im-  
mersis. *Pluk. mant.* 88. t. 413. f. 6.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- verrucosa.* 5. *ASPALATHUS* foliis confertis subulatis, gemmis  
verruca tomentosa prominentibus nudis.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- retroflexa.* 6. *ASPALATHUS* foliis confertis subulatis glabris mi-  
nimis, ramis filiformibus reflexis, floribus solitariis  
terminalibus.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- uniflora.* 7. *ASPALATHUS* foliis confertis setaceis inermibus  
glabris, stipulis acutis persistentibus, floribus solitariis,  
calycibus ovatis.

*Genista æthiopica* glabra, longioribus foliis ex uno pun-  
cto plurimis, flore majore luteo. *Pluk. mant.* 88. t.  
414. f. 7.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- arancosa.* 8. *ASPALATHUS* foliis confertis setaceis inermibus  
hispidis, floribus capitatis.

*Genista æthiopica*, flore flavo, foliolis inflexis & ara-  
neosa lanugine fimbriatis: summo ramulo circa flo-  
res glomeratis. *Pluk. mant.* 88. t. 414. f. 4. *Seb.*  
*thes.* 1. p. 38. t. 23. f. 6.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- indica.* 9. *ASPALATHUS* foliis quinatis sessilibus.

*Genista* foliis quinatis sessilibus, pedunculis axillaribus  
capillaribus unifloris, floribus minimis. *Fl. zeyl.* 271. \*  
*Lotus tenuifolius maderaspatanus*, filiqua singulari gla-  
bra. *Pluk. alm.* 225. t. 201. f. 2.

*Doryenium indicum*, floribus singularibus rubris in pe-  
dicellis oblongis, filiquis perexiguis. *Raj. suppl.* 471.  
*Manelli. Rheed. mal.* 9. p. 69. t. 37.

*Habitat in India.* ♀

- cretica.* 10. *ASPALATHUS* foliis trinis cuneiformibus glabris:  
lateralibus brevioribus, stipulis obsoletis, floribus con-  
gestis.

*Genista arborea cretica*, foliis sempervirentibus. *Zan.*  
*hist.* 99. t. 39.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

- tridentata.* 11. *ASPALATHUS* foliis trinis lanceolatis glabris,  
stipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis.

*Habitat in Æthiopia.* ♀

12. **ASPALATHUS** foliis trinis linearibus sericeis, sti- *argentea*,  
pulis simplicibus mucronatis, floribus sparsis tomen-  
tosis.

*Cytisus africanus angustifolius*, sericea lanugine argen-  
tatus, spica lagopoide. *Pluk. mant.* 63.

*Habitat in Æthiopia.* b

13. **ASPALATHUS** foliis trinis subulatis æqualibus, sti- *callosa*,  
pulis subrotundis callosis, floribus spicatis glabris.

*Cytisus trifolius*, juniperinis foliis, floribus luteis in  
spicam densiorem adactis. *Pluk. mant.* 63. t. 345. f. 4.

*Habitat in Æthiopia.* b. *D. Royenus plurimas has A-*  
*chyronias amicissime communicavit.*

### AMORPHA.

1. **AMORPHA.** *Hort. cliff.* 353. t. 19. *Hort. upf.* 208. *fruticosa.*  
*Roy. lugdb.* 393.

Barba jovis americana, pseudo-acaciæ foliis, flosculis  
purpureis minimis. *Anglic. hort.* 11. t. 4.

*Habitat in Carolina.* b

### ÆSCHYNOMENE.

1. **ÆSCHYNOMENE** caule scabro, leguminum arti- *astora*.  
culis medio scabris.

*Æschynomene* caule scabro, folio infimo quadripinni.

*Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 233. *Fl. zeyl.* 298. \* *Roy.*  
*lugdb.* 384.

Mimosa non spinosa major zeylanica. *Breyn. cent.* 51.  
t. 52. *Raj. hist.* 982.

*Habitat in India.* ☉

2. **ÆSCHYNOMENE** caule hispido foliolis acumina- *americana*.  
tis, leguminum articulis suborbiculatis. *Roy. lugdb.*  
384.

*Hedyсарum* caule hirsuto, mimosæ foliis alatis: pinnis a-  
cutis minime gramineis. *Sloan. jam.* 74. *hist.* 1. p.  
186. f. 3.

*Habitat in Jamaica.*

3. **ÆSCHYNOMENE** caule lævi arboreo, leguminum *arborea*.  
articulis semicordatis glabris. *Roy. lugdb.* 384.

*Habitat - - - b*

4. **ÆSCHYNOMENE** caule lævi herbaceo, foliolis ob- *indica*.  
tusis, leguminibus lævibus hinc obtusis torotlis. *Roy.*  
*lugdb.* 385.

Y y 5

Neli-

714      **DIADELPHIA DECANDRIA.**

Neli-tali. *Rheed. mal.* 9. p. 31. t. 18.

*Habitat in India.*

*Seiban.* 5. **ÆSCHYNOMENE** leguminibus subæqualibus læyibus

*Galega ægyptiaca*, siliquis articulatis. *Bauh. pin.* 352.

*Seiban. Alp. ægypt.* 81. t. 82.

*Habitat in Ægypti sepibus. D. Hasselquist.*

*Legumina non articulata, sed lævia & æqualia sunt. Calyces campanulati, æquales, quinque-dentati, patentes.*

**GALEGA.**

*officinalis.* 1. **GALEGA.** *Hort. cliff.* 362. *Hort. nps.* 208. *Mat. med.* 349. *Roy. lugdb.* 386.

*Galega vulgaris. Bauh. pin.* 352. *Morif. hist.* 2. p. 91. f. 2. t. 7. f. 9.

*Habitat in Italia, Hispania, Africa, ad margines agrorum. 2*

**CROTALARIA,**

\* *Foliis simplicibus.*

*perfoliata.* 1. **CROTALARIA** foliis cordato-ovatis perfoliatis. *Crotalaria perfoliatæ folio. Dill. clth.* 122. t. 102. f. 122.

*Habitat in Carolina.*

*sagittalis.* 2. **CROTALARIA** foliis simplicibus lanceolatis, petiolis decurrentibus foliatis. *Hort. cliff.* 357. \* *Gron. virg.* 81. *Roy. lugdb.* 374.

*Crotalaria americana*, caule alato, foliis pilosis, floribus in thyrsis luteis. *Mart. cent.* 43. t. 43.

*Crotalaria hirsuta minor americana* herbacea, caule ad summum sagittato. *Herm. lugdb.* 202. t. 203. *Pluk. alm.* 122. t. 269. f. 6.

β. *Crotalaria sagittalis* glabra, longioribus foliis, americana, *Pluk. alm.* 122. t. 277. f. 2.

*Habitat in Brasilia, Virginia. ☉*

*juncæa.* 3. **CROTALARIA** foliis simplicibus lanceolatis petiolato-fessilibus, caule striato. *Hort. cliff.* 357. \* *Hort. nps.* 210. *Roy. lugdb.* 374.

*Crotalaria benghalensis*, foliis genistæ hirsutis. *Pluk. alm.* 122. t. 169. f. 5.

*Habitat in India. ☉*

4. CRO-

4. CROTALARIA foliis simplicibus oblongis cuneiformibus retusis. *Fl. zeyl.* 276. \*  
*Crotalaria asiatica*, floribus luteis, folio singulari cordiformi. *Herm. lugdb.* 200. t. 201.  
*Tandale-Cotti. Rheed. mal.* 9. p. 45. t. 25.  
*Habitat in India.* ☉
5. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis sessilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *triflora.*  
*Habitat in Asia. D. Royen.*
6. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis villosis, petiolis simplicissimis, ramis teretibus. *Hort. cliff.* 357. \*  
*Roy. lugdb.* 374.  
*Crotalaria arbor africana*, styracis folio molli incano. *Pluk. alm.* 122. t. 185. f. 2,  
*Genista arborescens africana*, styracis folio. *Herm. lugdb.* 170. t. 271.  
*Habitat in Æthiopia.* ☿
7. CROTALARIA foliis simplicibus ovatis, stipulis semicordatis, ramis tetragonis. *Fl. zeyl.* 277. \*  
*Crotalaria foliis ovatis*, petiolis duplici stipula auctis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 357. \*  
*Crotalaria asiatica*, folio singulari verrucoso, floribus caeruleis. *Herm. lugdb.* 199. t. 199. *Raj. hist.* 1893.  
*Pee-tandale-cotti. Rheed. mal.* 9. p. 53. t. 29.  
*Habitat in India.*
- \* *foliis compositis.*
8. CROTALARIA foliis ternatis obovatis, floribus lateralibus subracemosis. *latifolia.*  
*Crotalaria loti folio*, flore parvo variegato. *Dill. elth.* 121. t. 102. f. 121.  
*Crotalaria trifolia fruticosa*, foliis glabris, flore e luteo viridi minore. *Sloan. jam.* 114. *hist.* 2. p. 33. t. 176. f. 1. 2.  
*Habitat in Jamaica.*
9. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acutis, stipulis semicordatis lunatis. *lunaris.*  
*Crotalaria foliis ternatis*, foliolis sessilibus, petiolis stipula duplici auctis. *Hort. cliff.* 357. \*  
*Habitat in Africa.*
10. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis nullis, leguminibus pedicellatis. *Fl. zeyl.* 278. \*  
*Crota.*

*Crotalaria asiatica frutescens, foliis luteis amplis, trifolia.*  
*Herm. lugdb. 196. t. 197. Raj. hist. 1893.*  
*Nella-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 49. t. 27.*  
*Habitat in Asia.*

incana

11. CROTALARIA foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis nullis, leguminibus hirsutis.

*Crotalaria foliis ternatis, petiolis nudis. Hort. cliff. 358.*  
*\* Hort. ups. 210. Roy. lugdb. 375.*

*Crotalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente. Sloan. jam. 141. hist. 2. p. 34. t. 179. f. 1. Raj. suppl. 466.*  
*Habitat in Jamaica & Caribæis.*

alba.

12. CROTALARIA foliis ternatis lanceolato-ovatis, caule lævi herbaceo, racemo terminali. *Hort. cliff. 499.\**  
*Roy. lugdb. 375.*

*Anonis caroliniana perennis non spinosa, foliorum marginibus integris, floribus in thyrso candidis. Mart. cent. 44. t. 44.*

*Habitat in Carolina. 2*

- quinquefolia 13. CROTALARIA foliis quinatis.

*Wellia-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28.*  
*Habitat in India.*

*Foliola angusto-lanceolata, obtusa, sæpe retusa.*

## ONONIS.

\* *Floribus sessilibus.*

spinosa.

1. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis spinosis.

*Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, caule spinoso. Hort. cliff. 359. Fl. succ. 623. Mat. med. 357. Roy. lugdb. 375.*

*Anonis spinosa, flore purpureo. Baub. pin. 389.*

*Anonis. Fuchs. hist. 60.*

2. Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, ramis inermibus. *Hort. cliff. 359. Fl. succ. 622. Roy. lugdb. 375.*

*Anonis spinis carens purpurea. Baub. pin. 389.*

*Anonis mitior 1. Clus. hist. 99.*

*Habitat in aridis Europæ. 2*

*Hec levis 3. est prima æstate, post aculeos a contrahit.*  
*Lesf. pruss. 17.*

*Folia in caule ternata; Floralia vero simplicia. Flores duo propriis pedunculis exeunt simul ex foliorum ala; Ramuli inferiores spina terminati.*

2. O.



2. ONONIS caulibus diffusis, ramis erectis, foliis caulinis ternatis.

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutis pubescentibus. *Pluk. alm.* 33. *Dill. elth.* 29. t. 25. f. 28.

*Habitat in Angliæ littoribus maris.* 2

*Affinis admodum præcedenti, differt caulibus-procumbentibus undique diffusis, & quod minor; Flores ex alis solitarii (quorum non memor) speciem determinabunt.*

3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus minutissima. ternatis petiolatisque, stipulis setaceis.

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis & stipulis longas setas exerentibus. *Sauv. monsp.* 190.

Ononis floribus lateralibus sessilibus solitariis, petiolis longissimis. *Roy. lugdb.* 375.

Ononis lutea sylvestris minima. *Col. ecphr.* 1. p. 304. t. 301

Anonis spinosa lutea minor. *Bauh. pin.* 389.

Anonis lutea montana non spinosa minima. *Barr. ic.* 1107.

*Habitat in Italia, Monspeli.*

4. ONONIS stipulis floralibus ovatis membranaceis integerrimis. *Roy. lugdb.* 376. *Ups.* 210.

Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. *Dill. elth.* 28. t. 24. f. 27.

Anonis purpurea spicata erecta annua latifolia, filiquis rectis latiformibus. *Morif. hist.* 2. p. 169. f. 2. t. 17. f. 4.

*Habitat in Barbados, Lusitania.* ☉

5. ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis. *alopecuroides*

Ononis floribus spicatis. *Hort. cliff.* 358. *Roy. lugdb.* 376.

Anonis sicula alopecuroides. *Tournef. inst.* 408.

Anonis purpurea spicata alopecuroides major. *Boerb. lugdb.* 2. p. 33.

*Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania.* ☉

6. ONONIS stipulis bracteisque acute ferratis. *Roy. lugdb.* variegata. 376. \*

Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia maritima. *Tournef. inst.* 409.

*Habitat in Europæ australis maritimis.*

\* *Floribus pedunculatis.*

7. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis *Natrix.* ternatis

- ternatis. *Hort. cliff.* 358. \* *Roy. lugdb.* 375. *Sauv. monsp.* 189.  
*Anonis viscosa spinis carens lutea major.* *Baub. pin.* 389.  
*Ononis lutea.* *Cam. epit.* 445.  
*Natrix.* *Riv. tetr.* 68.  
**β.** *Anonis viscosa, spinis carens, lutea minor.* *Baub. pin.* 389.  
*Anonis viscosa minor, flore pendulo.* *Baub. prodr.* 156.  
**γ.** *Anonis lutea mitis oxitriphylla ad florum petiolos capreolata.* *Pluk. alm.* 33. t. 135. f. 5.  
*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, inter segetes.* *z*  
*viscosa.* **8.** *ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis simplicibus.*  
*Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis simplicibusque.* *Sauv. monsp.* 189?  
*Anonis lutea viscosa latifolia minor, flore pallido.* *Barr. rar.* 840. t. 1239.  
*Anonis viscosa, spinis carens lutea latifolia annua.* *Magn. monsp.* 21?  
*Habitat Montpelii.* ☉  
*Differt ab O. Natrice foliis simplicibus & radice annua.*  
*ornithopodi-* **9.** *ONONIS pedunculis bifloris filo terminatis.* *Roy. lugdb.* 376.  
*oides.* *Anonis siliquis ornithopodii.* *Bærb. lugdb.* 2. p. 34.  
*Fœnum græcum siculum, siliquis ornithopodii.* *Tournef. inst.* 409.  
*Habitat in Sicilia ad Capo passaro.*  
*tridentata.* **10.** *ONONIS foliis ternatis carnosissimis sublinearibus tridentatis.*  
*Anonis hispanica frutescens, folio tridentato carnosissimo.* *Tournef. inst.* 408. *Magn. monsp.* 17. t. 17. *Raj. suppl.* 466.  
*Habitat in Hispania.* ☿  
*fruticosa.* **11.** *ONONIS floribus paniculatis, pedunculis subtrifloris, stipulis vaginalibus, foliis ternatis.* *Hort. cliff.* 358. \* *Roy. lugdb.* 376.  
*Anonis montana præcox purpurea frutescens.* *Dodart. act.* 4. p. 249. t. 249.  
*Anonis purpurea frutescens non spinosa.* *Dodart. mem.* 57. t. 57.  
*Anonis purpurea verna præcox frutescens, flore rubro amplo.* *Morif. hist.* 2. p. 170.  
*Habitat in montibus Delphinatus.* ♀

12. ONONIS pedunculis axillaribus trifloris nudis, foliis *rotundifolia* ternatis. *Hort. cliff.* 358. \* *Roy. lugdb.* 376.  
Cicer sylvestre latifolium triphyllum. *Bauh. pin.* 347.  
Cicer sylvestre tertium. *Dod. pempt.* 525.  
Cicer sylvestre verius. *Lob. ic.* 2. p. 73.  
*Habitat in Alpibus Helveticis.*

# ANTHYLLIS.

\* *Herbacea.*

1. ANTHYLLIS herbacea, foliis quaterno-pinnatis, flo- *tetraphylla*. ribus lateralibus. *Hort. ups.* 221. \* *Sauv. monsp.* 237.  
Anthyllis foliis quinato-pinnatis inæqualibus, floribus lateralibus. *Hort. cliff.* 371. *Roy. lugdb.* 389.  
Lotus pentaphyllos vesicaria. *Bauh. pin.* 332.  
Trifolium haliacabum. *Cam. hort.* 171. t. 47.  
*Habitat in Italia, Sicilia.* ☉  
*Folium pinnatum tetraphyllum loco pentaphylli, cum foliolum infimum opposito caret.*
2. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, *Vulneraria*. capitulo duplicato.  
Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus: terminali majore. *Hort. cliff.* 371. *Fl. succ.* 594. *Roy. lugdb.* 389.  
Loto affinis Vulneraria pratensis. *Bauh. pin.* 332.  
Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.
- β. Vulneraria supina, flore coccineo. *Dill. elth.* 431. t. 320. f. 413.  
*Habitat in pratis Europæ borealioris.* 2
3. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis æqualibus, ca *montana*. pitulo terminali.  
Vulneraria foliis pinnatis æqualibus: sub umbella palmatis. *Hall. helv.* 569. *Sauv. monsp.* 237.  
Astragalus villosus, floribus globosis. *Bauh. pin.* 351.  
Astragalus purpureus. *Dalech. hist.* 1347.  
*Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galliovincia.* 2
4. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, *cornicina*. capitulis solitariis.  
*Habitat in Hispania.* *Læf.* ☉  
Caulis ramosus, spithameus. Folia pinnata: foliolis 5. f. 7, ovali-lanceolatis, impari paulo majore. Pedunculi axillares, pilosi, longituzine foliorum. Capitula lateralialia & terminalia pedunculata ex 10 a 12 floribus, rotunda, pilosa, folio ternato aut pinnato excepta. Calyces subrotundi, inflati.

5. AN-

*Lotoides.*

5. ANTHYLLIS herbacea, foliis tripartitis, calycibus prismaticis fasciculatis longitudine leguminum.

*Habitat in Hispania. Læf. 5*

Planta pilosa, procumbens. Folia caulinaternata, lateralibus basi coadunatis in unum cuneiforme, intermedio subseffili. Stipulæ magnitudine & figura foliorum. Folia floralia ternata, sessilia, absque stipulis. Capitulum ex 5. s. 6. floribus, Calycibus admodum oblongis ratione plantæ, angustis, prismaticis, parallelis, pilosis. Flores lutei. Legumina cylindrica, longitudine calycis, eoque vestita. Stamen decimum distinctum. Habitus ita antecedentium, ut facies ætat genere distinguere.

\* *Fruticosa.*

- Barba jovis.* 6. ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis æqualibus, floribus capitatis. *Hort. cliff. 371. Hort. upf. 221. Roy. lugdb. 379. Sauv. monsp. 237.*

*Barba jovis. Baub. pin. 397.*

*Barba jovis pulchre lucens. Baub. hist. 1. p. 385.*

*Habitat in Helvetia. h an? s. Helvetia.*

*Cytoides.*

7. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, calycibus lanatis lateralibus

*Anthyllis fruticosa, foliis ternatis: intermedio produtiore. Hort. upf. 221.*

*Cytisus foliis ovatis acutis nitidis, floribus lateralibus. Roy. lugdb. 370.*

*Cytisus incanus, folio medio longiore. Baub. pin. 390.*

*Cytisus VI. Clus. hist. 1. p. 96.*

*Spartium latifolium, parvo flore. Barr. ic. 1182.*

*Habitat in Hispania. h*

*Bermannia.*

8. ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis sessilibus, calycibus nudis.

*Dorycnium foliis solitariis, floribus ad alas confertis.*

*Hort. cliff. 370. \**

*Habitat in Græcia. h*

*Calyces in hac vix ventricosi, at Habitus cum precedenti idem.*

*Erinacea.*

9. ANTHYLLIS fruticosa spinosa, foliis simplicibus.

*Genista-spartium spinosum, foliis lenticulæ, floribus ex cæruleo purpurascens. Baub. pin. 394.*

*Erinacea. Clus. hist. 1. p. 107.*

*Habitat in Hispania. h*

*Tora*

*Tota constat spinis; ad ramorum exortum squama ovata;  
Folia oblongo ovata, tomentosa, ad flores posita sepius  
terna.*

LUPINUS.

1. LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis: labio perennis.  
superiore emarginato, inferiore integro.  
Lupinus calycibus alternis, radice perenni repente. *Gron.  
virg.* 172.  
Lupinus radice reptatrice perenni. *Roy. lugdb.* 531.  
Lupinus caeruleus minor perennis virginianus repens.  
*Morsf. hist.* 2. p. 87. f. 2. t. 7. j. 6.  
*Habitat in Virginia.* 2  
Folia ex foliolis 8, lanceolatis, obtusis, glabris. Racemi  
longissimi floribus alternis, sepius 2 ex singulo alterno  
puncto, pedicellis propriis insidentibus.
2. LUPINUS calycibus alternis inappendiculatis: labio su- albus.  
periore integro, inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499.  
*Hort. nys.* 209. *Mat. mea.* 350. *Roy. lugab.* 306.  
Lupinus caule composito. *Hort. cliff.* 359.  
Lupinus sativus, flore albo. *Bauh. pin.* 347. *Clas. hist.*  
2. p. 228.  
Lupinus flore albo. *Riv. tetr.*  
*Habitat* - - - - - ☉
3. LUPINUS calycibus semiverticillatis appendiculatis: varius.  
labio superiore bifido, inferiore lustridentato. *Hort.  
cliff.* 499. *Hort. nys.* 209. *Roy. lugdb.* 367.  
Lupinus sylvestris, flore caeruleo. *Bauh. pin.* 348.  
Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine rotundo va-  
rio. *Bauh. hist.* 2. p. 291.  
*Habitat* Messanæ, Montpelii inter segetes. ☉
4. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio hirsutus.  
superiore inferioreque integris *Hort. cliff.* 499. *Hort.  
nys.* 209. *Roy. lugdb.* 367.  
Lupinus peregrinus major i. villosus caeruleus major,  
*Bauh. pin.* 348. *prodr.* 148.  
Lupinus exoticus hirsutissimus. *Bauh. hist.* 2. p. 280.  
*Habitat* - - - - - ☉
5. LUPINUS calycibus alternis appendiculatis: labio su- angustifolius  
periore bipartito, inferiore integro.  
Lupinus angustifolius caeruleus elatior. *Raj. hist.* 908.  
Lupinus flore caeruleo minore. *Riv. tetr.*  
*Habitat* - - - - - ☉

*Intens.*

6. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio superiore bipartito, inferiore tridentato. *Hort. cliff.* 499. *Hort. nps.* 209. *Roy. lugdb.* 367. *Sanv. monsp.* 215.

Lupinus sylvestris, flore luteo. *Bauh. pin.* 348. *Riv. setr.*

Lupinus flore luteo, semine compresso vario. *Bauh. bist.* 2. p. 291.

*Habitat in Sicilia arenosis.* ☉

*Hinc flores subsessiles, bracteis ovatis.*

## ROBINIA.

*PseudoAcacia,*

1. ROBINIA pedunculis racemosis, foliis impari-pinnatis. *Hort. nps.* 212.

Robinia aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 354. *Gron. virg.* 82. *Roy. lugdb.* 372.

Acacia americana, filiquis glabris. *Raj. bist.* 1719.

Acacia affinis virginiana spinosa, filiqua membranacea plana. *Pluk. alm.* 6. p. 73. t. 4.

*Habitat in Virginia.* ♀

*Conf.* Pseudo-Acacia hispida, floribus roseis. *Catesb. car.* 3. p. 20. t. 20.

*grandiflora.*

2. ROBINIA pedunculis subdivisis, foliis pinnatis, floribus foliolo majoribus.

Galega affinis malabarica arborescens, filiquis majoribus articulatis. *Raj. bist.* 1734.

Sesban affinis arbor indiae orientalis. *Breyn. prodr.* 1. p. 47. *Comm. mal.* 244.

*Agaty. Rheed. mal.* 1. p. 95. t. 51.

*Habitat in India.* ♀

Arbor crassa, inermis. Folia pinnata: Foliola obtusa. Flores inter papilionaceos maximi, magnitudine ovi galinacei. Vexillum ovatum, patens. Alae ovato-oblongae, versus apicem sursum falcatae. Carina alis conformis. Stamina ad basin valde sursum flexa & reflexa. Stamina diadelphica. Stigma obtusum.

*Caragana.*

3. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis abrupte pinnatis. *Hort. nps.* 212.

Aspalathus arborescens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis. *Amm. ruth.* 285.

Caragana sibirica. *Roy. lugdb.* 537.

*Habitat in Sibiria.* ♀

4. ROBI-

4. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quater-  
natis petiolatis. *Hort. upf.* 212.  
*Aspalathus frutescens major latifolius, cortice aureo.*  
*Amm. ruth.* 283.  
*Habitat in Sibiria, Tataria. v*
5. ROBINIA pedunculis simplicissimis, foliis quaterna-  
tis sessilibus. *Hort. upf.* 212.  
*Aspalathus frutescens minor angustifolius, cortice aureo.*  
*Amm. ruth.* 282. t. 35.  
*Habitat in Sibiria. v*  
*Vix hæc sufficiens, a priori, distincta.*

COLUTEA.

1. COLUTEA arborea, foliolis obcordatis. *Hort. cliff. arborescens,*  
365. *Hort. upf.* 228. *Roy. lugdb.* 374. *Sauv. monsp.* 238.  
*Colutea vesicaria. Baub. pin.* 396.  
*Colutea. Dod. pempt.* 784.
- β. Colutea africana, sennæ foliis, flore sanguineo. *Comm.*  
*rar. II. t. II.*  
*Habitat in Austria, G. Narbonensi, Italia præcipue ad*  
*Vesuvium. v*
2. COLUTEA fruticosa, foliolis ovato-oblongis. *Hort. frutescens,*  
*cliff.* 366. *Hort. upf.* 228. *Roy. lugdb.* 374.  
*Colutea æthiopica, flore purpureo. Breyn. cent.* 70. t. 29.  
*Habitat in Æthiopia. 2. v*
3. COLUTEA herbacea, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 366. *herbacea.*  
*Roy. lugdb.* 374.  
*Colutea africana annua, foliolis parvis mucronatis, vesti-*  
*culis compressis. Comm. hort.* 2. p. 87. t. 44.  
*Habitat in africa. ☉*

PHASEOLUS.

\* Scandentes.

1. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis ge-  
minis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis.  
*Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pen-*  
*dulis compressis torosis. Roy. lugdb.* 367. *Hort. upf.*  
213. *Mat. med.* 351.  
*Phaseolus vulgaris. Lob. ic.* 59. *Hort. cliff.* 359.  
*Smilax hortensis f. Phaseolus major. Baub. pin.* 339.  
*Habitat in India. ☉*

*coccineus.*

2. PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis. *W. 215.*

Phaseolus puniceo flore. *Cornut. canad.* 184.

Phaseolus indicus, flore coccineo f. puniceo. *Morif. hist.*

2. p. 69.

*Habitat* - - - - - ☉

*lunatus.*

3. PHASEOLUS caule volubili, leguminibus acinaciformibus sublunatis lævibus.

Phaseolus benghalensis scandens, siliqua acinaciformis, semine ovato compresso striato. *Berg. viadr.* 99.

*Habitat in* Benghala. ☉

Foliola lateralibus exteriori latere duplo latiora. Flores minimi, virides: alis albis concavis, dein flavescentibus; carina spirali.

*inamannus.*

4. PHASEOLUS caule volubili, florum vexillo revoluta, calycibus concolore. *Hort. cliff.* 359. \*

*Habitat in* Africa. ☉

*farinosus.*

5. PHASEOLUS caule volubili, pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Hort. wps.* 214.

Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso.

*Niss. act.* 1730. p. 577. t. 42.

Phaseolus indicus, hederæ folio anguloso, semine oblongo lanuginoso. *Raj. suppl.* 348.

*Habitat in* India.

*vexillatus.*

6. PHASEOLUS caule volubili, vexillis revolutis patulis, leguminibus linearibus strictis.

Phaseolus radice annua, leguminibus strictis erectis torosis linearibus, caule hirtuto. *Roy. lugdb.* 367.

Phaseolus flore odorato, vexillo amplo patulo. *Dill. eltb.* 313. t. 234. f. 302.

*Habitat in* Havana. ☉

*helveticus.*

7. PHASEOLUS caule volubili, floribus capitatis, calycibus bracteis, vexillis brevibus, alis expansis maximis.

Phaseolus radice annua, leguminibus erectis linearibus teretibus glabris. *Roy. lugdb.* 368.

Phaseolus flore helvulo, alis amplis patulis. *Dill. eltb.* 312. t. 233. f. 300.

*Habitat in* Carolina. ☉

8. AHA-



8. PHASEOLUS caule volubili, floribus laxè spicatis, *alatus*.  
 alis longitudine vexilli.

Phaseolus flore purpureo, alis amplis longe protensis. *Dill.*

*elth.* 314. t. 235. f. 303

*Habitat* - - - - -

9. PHASEOLUS caule volubili, vexillis carinaque spiriter convolutis. *Caracalla.*

Phaseolus radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus teretiusculis glabris. *Roy. lugdb.* 367.

Phaseolus indicus, cochleato flore. *Tournef. obs.* 93, t.

94. *Raj. hist.* 1890.

*Habitat in India.*

\* *erecti.*

10. PHASEOLUS caule erecto tereti, floribus capitatis, radiatis.  
 leguminibus cylindricis horizontalibus. *Act. stockh.*

1742. p. 202. t. 7. f. 2. *Hort. ups.* 213. *Fl. zeyl.* 281.

Phaseolus zeylanicus, siliquis radiatim digestis. *Dill. elth.*

315. t. 235. f. 304.

*Habitat in China, Zeylona.* ☉

11. PHASEOLUS caule erecto anguloso hispido, leguminibus pendulis hirtis. *Hort. cliff.* 499. *Roy. lugdb.*

367. *Fl. zeyl.* 280.

Phaseolus orthocaulis, Mungo persarum. *Herm. mex.*

887.

*Habitat in India.* ☉

## DOLICHOS.

\* *Volubiles.*

1. DOLICHOS leguminibus ovato-acinaciformibus, seminibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem. *Roy. lugdb.* 368. *Hort. ups.* 214.

Phaseolus ægyptius, nigro semine, *Baub. pin.* 341.

Phaseolus niger Lablab. *Alp. ægypt.* 74. t. 75. *Vest.*

*ægypt.* 27.

*Habitat in Ægypto.* ☉

Legumina dorso scabra. Caules ramique teretes, retrorsum scabri. Pedunculi semiverticillati.

2. DOLICHOS leguminibus capitatis subcylindraccis: unguiculatus apice recurvo concavo. *Hort. ups.* 214.

*Habitat in Barbados.*

3. DOLICHOS leguminibus gladiatis dorso sulcatis, seminibus arillatis. *Hort. ups.* 360. *Sauv. meth.* 192.

*Z. t. 3*

Phaseo-

*Phaseolus maximus*, filiqua ensiformi nervis insignita & semine albo membranula incluso. *Sloan. hist.* 1. p. 177. t. 114. f. 1. 2. 4.

*Habitat in Jamaica.*

*minimus.*

4. **DOLICHOS** leguminibus racemosis compressis tetraspermis, foliis rhombæis.

*Dolichos minimus*, floribus luteis. *Hort. cliff.* 360. t. 21. \* *Hort. ups.* 214.

*Phaseolus minimus foetidus*, floribus spicatis e viridi luteis, semine maculato. *Sloan. hist.* 1. p. 182. f. 115. f. 1.

*Habitat in Jamaica.*

*scarabæoides*

5. **DOLICHOS** caule volubili, foliis ovatis tomentosis, notibus solitariis, seminibus bicornibus. *Fl. zeyl.* 282. \*

*Phaseolus minimus binagaricus*, foliis argenteo-villosis, filiquis torosis brevibus spadicea hirsutæ pubescentibus, fructu parvoscarabæoide nigro. *Pluk. alm.* 290. t. 52. f. 3.

*Habitat in India.*

*erosus.*

6. **DOLICHOS** caule volubili, foliis glabris multangulis dentatis.

*Phaseolus nervicensis*, foliis multangulis, tuberosa radice. *Pluk alm.* 292. t. 54. f. 4.

*Habitat in America.* ☉

*trilobus.*

7. **DOLICHOS** foliolis lateralibus extrorsum gibbis: intermedio trilobo. *Hort. cliff.* 360. \*

*Phaseolus maderaspatanus*, foliis glabris trilobis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto geminis. *Pluk. alm.* 292. t. 214. f. 3.

*Habitat in India.*

*regularis.*

8. **DOLICHOS** foliis ovatis obtusis, pedunculis multifloris, petalis æqualis magnitudinis figuræque. *Gorn. virg.* 82.

*Habitat in Virginia.*

*lignosus.*

9. **DOLICHOS** caule perenni, pedunculis capitatis, leguminibus strictis linearibus.

*Dolichos caule perenni lignoso.* *Hort. cliff.* 360. t. 20.

*Phaseolus indicus perennis*, floribus purpurascensibus.

*Eichr. carol.* 36.

*Habitat* - - - b

*polystachios.*

10. **DOLICHOS** caule perenni, spicis longissimis, pedicellis geminis, leguminibus acuminatis compressis.

*Dolichos caule lignoto*, pedunculis ex ala plurimis, floribus

ribus spicatis, legumine longo apice sursum acuminato. *Gron. virg.* 172.

*Habitat in Virginia.*

\* *Erecti.*

11. DOLICHOS caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Fl. zeyl.* 534. *Mat. med.* 363.

Phaseolus erectus, siliquis lupini, fructu pisi majoris candido. *Kempf. amœn.* 837. t. 838.

*Habitat in India.*

12. DOLICHOS caule perenni lævi, pedunculis bisfloris, leguminibus erectis. *Roy. lugdb.* 368.

*Habitat in India.*

### PISUM.

1. PISUM stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *Hort. upf.* 215.

Pisum stipulis crenatis. *Hort. cliff.* 369. *Mat. med.* 352.

Pisum. *Cam. epit.* 213.

6. Pisum hortense majus. *Bauh. pin.* 342.

7. Pisum sine cortice durior. *Bauh. pin.* 343.

8. Pisum umbellatum. *Bauh. pin.* 344.

umbellatum  
quadratum.

9. Pisum majus quadratum. *Bauh. pin.* 342.

*Habitat in Europæ agris.* ☉

2. PISUM petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *It. Wgoth.* 107. \*

Pisum pulchrum, folio anguloso. *Bauh. bist.* 2. p. 297.

*Morif. bist.* 2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 4.

*Habitat inter Europæ segetes.* ☉

3. PISUM petiolis supra planiusculis, caule angulato, stipulis sagittatis, pedunculis multifloris. *Fl. suec.* 608.

*It. Wgoth.* 190. \*

Pisum stipulis integerrimis. *Hort. cliff.* 368.

Pisum marinum. *Raj. bist.* 892. *Fl. lapp.* 272.

Pisum spontaneum perenne repens humile. *Morif. bist.*

2. p. 47. f. 2. t. 1. f. 5.

*Habitat in Europæ borealis littoribus maris arenosis.* ☉

4. PISUM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 370. *Hort. upf.* 215.

Ochrus folio integro capreolos emittente. *Bauh. pin.* 343.

*Ervilia sylvestris.* *Dod. pempt.* 522.

*Habitat inter segetes* Cretæ, Italiæ. ☉

L 2 4

ORO-

## OROBUS.

- Lathyroides*. 1. OROBUS foliis conjugatis subseffilibus, stipulis dentatis. *Hort. ups.* 220.  
*Lathyroides erecta*, folio ovato acuminato, cæruleis vicis floribus & siliquis, sibirica. *Amm. ruth.* 151.  
*t.* 7. f. 2.  
*Habitat in Sibiria.* 2
- hirtus*. 2. OROBUS foliis conjugatis petiolatis, stipulis integris. Orob. caule simplicissimo, foliolis binis ovatis. *Hort. cliff.* 366. \*  
 Orob. latifolius repens, flore cæruleo, foliis & siliquis hirtutis. *Boerb. lugdb.* 2. p. 46.  
 Orob. sylvaticus, foliis circa caulem auriculatis. *Buxb. cent.* 3. p. 22. *t.* 41.  
*Habitat in Thracia.* 2
- luteus*. 3. OROBUS foliis pinnatis ovato oblongis, stipulis rotundato-lunatis dentatis, caule simplici.  
*Habitat in Sibiria.* 2  
*Habitus Orob. verni, sed altior, crassior, major.* Folia pinnata 4. f. 5. paribus, ovato-oblonga. Stipulæ latæ, subrotundo-lunares, dentatæ. Caulis simplex. Racemi axillares, secundi, floribus numerosis majoribus.
- serotus*. 4. OROBUS foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici.  
 Orob. caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. *Hort. cliff.* 366. *Fl. suec.* 595. *Roy. lugdb.* 366. *Hall. herb.* 602.  
 Orob. sylvaticus purpureus vernus. *Baub. pin.* 351.  
*Thal. herb.* 80. *t.* 6  
*Habitat in Europæ borealis nemoribus.* 2
- tuberosus*. 5. OROBUS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici.  
 Orob. caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 366. *Fl. suec.* 596. *Roy. lugdb.* 366.  
 Altragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris. *Baub. pin.* 351.  
 Altragalus sylvaticus. *Thal. herb.* 7. *t.* 1.  
 Lathyrus angustifolius, radice tuberosa. *Loef pruss.* 138. *t.* 37.  
*Habitat in Europæ borealis pratis & sylvis.* 2

6. ORO-

6. OROBUS foliis quaterno-pinnatis linearibus, stipulis angustifoliis subulatis, caule simplici.

*Habitat in Sibiria. 2*

*Habitus antecedentis, sed Folia linearia, angustissima & pinnata ex 2 oppositionibus, absque cirrho. Racemi floribus paucis luteis.*

7. OROBUS caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis. *Hort. cliff. 366. Fl. suec. 597. Roy. lugdb. 366. Hall. helv. 603.*

*Orobis sylvaticus, vicie foliis. Bauh. pin. 352.*

*Orobis pannonicus 2. Clus. hist. 2. p. 230.*

*Habitat in Europæ borealis montosis. 2*

8. OROBUS caule ramoso, foliis trijugis lanceolatis, pyrenaicus, nervosis. *Sauv. monsp. 235. †*

*Orobis pyrenaicus, foliis nervosis. Tournes. inst. 235. 393.*

*Orobis pyrenaicus latifolius nervosus. Pluk. phyt. 210.*

*f. 2.*

*Habitat in Pyrenæis.*

## LATHYRUS.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, *Aphaca*. stipulis sagittato-cordatis.

*Lathyrus cirrhis aphyllis. Hort. cliff. 367. Hort. ups.*

*218. Roy. lugdb. 362. Dalib. paris. 217.*

*Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Bauh. pin. 345.*

*Aphaca. Lob. ic. 2. p. 70.*

*Habitat in Italia, Gallia, Anglia inter segetes. ☉*

*Cirrhus interdum aliquis gerit Foliola conjugata, 2, lanceolata, reliquis Lathyris simillima, at hoc rarissime.*

2. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus, *Nissolia*. stipulis subulatis.

*Lathyrus foliis solitariis lentiformibus. Vir. cliff. 74.*

*Hort. cliff. 366. Roy. lugdb. 263. Dalib. paris. 218.*

*Lathyrus sylvestris minor. Bauh. pin. 344.*

*Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari, sine capreolis, nissoli. Magn. hort. 112. t. 112.*

*Habitat in Gallia. ☉*

*Cirrhii nulli. Caulis erectus. Stipulæ minimæ, subulatae.*

3. LATHYRUS pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. *amphicarpus*

*Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radicibus*

*2 2 5*

*etiam*

etiam sub terra fructificantibus. *Hort. cliff.* 367. \*  
*Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 262. *Sauv. monsp.* 192.  
 Vicinæ similibus supra & infra terram siliquas gerens. *Baub.*  
*pin.* 345.

*Arachidna* f. *Arachoides honorii belli.* *Baub. hist.* 2. p.  
 323.

*Habitat in Syria.* ☉

*Cicera.*

4. **LATHYRUS** pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis: dorso canaliculatis.

*Lathyrus* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. monsp.* 193.

*Lathyrus sativus* flore purpureo. *Baub. pin.* 344.

*Aracus* f. *Cicera.* *Dod. pempt.* 523.

*Habitat in Hispania.* ☉

*Medius inter antecedentem & sequentem magnitudine.*  
*Petioli latere non membranacei. Corollæ rubra. Legumina dorso canaliculata, at non marginibus acutis, uti antecedens & insequens. Legumen latum, ovali-oblongum.*

*sativus.*

5. **LATHYRUS** pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis.

*Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 363.

*Dalib. parif.* 216. *Sauv. meth.* 193. \*

*Lathyrus annuus*, flore cæruleo, ochri siliqua. *Herm. lugdb.* 357.

6. **Lathyrus sativus**, flore fructuque albo. *Baub. pin.* 343.

*Lathyrus* f. *Ciceroula.* *Dod. pempt.* 522.

*Habitat in Hispania, Gallia.* ☉

*inconspicuus*

6. **LATHYRUS** pedunculis unifloris calyce brevioribus, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis.

*Lathyrus orientalis*, flore vix conspicuo. *Boerb. lugdb.* 2. p. 42.

*Habitat in Oriente.* ☉

*Planta parva, spishaman* f. *pedalis.* Caules obsolete triangulares. Stipulæ subulato-lanceolatae: dente postico acuto. Petioli brevissimi, inferiores terminati seta subulata, brevissima, superiores in cirrhum filiformem elongati. Foliola bina, lanceolata, subtus striata, acuminata. Calyx minimus & stipulis brevior ex alis petiolorum, pedunculo vix manifesto insidens. Corolla tam parva et vix calyce longior, pallida. Legumen longitudine ferme foliorum, sed latius, glabrum, strictum.

7. **LA-**

7. **LATHYRUS** pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, *setifolius*.  
foliolis setaceo-linearibus.  
**Lathyrus** pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis: foliolis  
linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv.*  
*monsp.* 193.  
**Lathyrus** folio tenuiore, floribus rubris. *Baub. hist.* 2.  
p. 308.  
**Lathyrus** sylvestris major, angustissimo folio. *Baub.*  
*pin.* 344.  
**Lathyrus** angustissimo f. capillaceo folio. *Baub. prodr.*  
148.  
*Habitat* Monspelii.
8. **LATHYRUS** pedunculis unifloris cirrho terminatis, *angulatus*.  
cirrhis diphyllis: foliolis linearibus.  
**Lathyrus** pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis lineari-  
bus, seminibus angulatis.  
**Lathyrus** pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis  
capillaceis. *Sauv. monsp.* 193.  
**Lathyrus** angustissimo folio, semine anguloso. *Tournef.*  
*inst.* 395.  
**Lathyrus** folio tenuiore, floribus rubris. *Buxb. cent.* 3.  
p. 23. t. 42. f. 2.  
**Lathyrus** angustifolius leptolobus, semine hexaëdro, flo-  
re cæruleo. *Marif. blæs.* 279.  
*Habitat* in Gallia, Hispania, Oriente. ☉
9. **LATHYRUS** pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyll- *bithynicus*.  
lis, stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 363.  
**Lathyrus** pedunculis unifloris, petiolis tetraphyllis, sti-  
pulis setaceis, caule ancipiti. *Amen. acad.* 1. p. 166.  
**Chymenum** bithynicum, siliqua singulari, flore minore.  
*Boerb. lugdb.* 2. p. 43.  
*Habitat* in Italiæ, Bavariz arvis. 2  
Caules *angulati*. Cirrhi foliolis 2 parium, lato-lanceola-  
tis. Stipulæ valde dentatæ. Flores axillares, solitarii:  
calyce longitudine pedunculi, vexillo violaceo, alis at-  
bidis. Legumen erectum, compressum, ovato-oblongum  
villosum. Semina sena circiter. Media inter *Lathy-*  
*ros* & *vicias*.
10. **LATHYRUS** pedunculis subunifloris, cirrhis poly- *articulatus*.  
phyllis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. nps.*  
217. \* *Roy. lugdb.* 363.  
**Lathyrus**, angustissimo folio, americanus variegatus.  
*Baub. pin.* 344.

Cly-

*Clymenum hispanicum*, flore vario, filiqua articulata.  
*Tournes. inst.* 396.

β. *Lathyrus angustifolius humilior*. *Baub. pin.* 344.

*Habitat in Bætica.* ☉

*Folia sæpius tetraphylla; inferiores petioli lanceolati apophylli. Stipulae utrinque mucronatae.*

\* *Pedunculis bifloris.*

*obtusius.* 11. **LATHYRUS** pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 363.

*sculus.* α. *Lathyrus ticulus*. *Rupp. jen.* 210. *p. m.* 260.

*Lathyrus distroplatyphyllos hirsutus mollis, magno & peramæno flore, odore.* *Comm. hort.* 2. p. 219. t. 80.

*zeylanicus.* β. *Lathyrus zeylanicus*, odorato flore amæno ex albo & rubro vario. *Burm. zeyl.* 138.

*Habitat α in Sicilia, β in Zeylona.* ☉

*hirsutus.* 12. **LATHYRUS** pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lineari-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Roy. lugdb.* 363. *Dalib. paris.* 216. *Sauv. monsp.* 113.

*Lathyrus angustifolius, filiqua hirsuta.* *Baub. pin.* 344.

*Lathyrus filiqua hirsuta.* *Baub. hist.* 2. p. 305.

*Habitat inter Angliæ, Galliæ segetes.*

*tingitanus.* 13. **LATHYRUS** pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis alternis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 263.

*Lathyrus tingitanus, filiquis orobi, flore amplo ruberrimo.* *Morif. hist.* 2. p. 55.

*Habitat in Mauritania.* ☉

*clymenum.* 14. **LATHYRUS** pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. *Hort. cliff.* 368. *Hort. upf.* 217. *Roy. lugdb.* 364.

*Lathyrus vicioides, vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus cæruleis.* *Morif. hist.* 2. p. 56.

*Clymenum hispanicum, flore vario, filiqua plana.* *Tournes. inst.* 396.

*Habitat in Mauritania.* ☉

\* *Pedunculis multifloris.*

*inerosus.* 15. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Hort. cliff.* 367. *Hort. upf.* 216. *Roy. lugdb.* 364. *Dalib. paris.* 217. *Sauv. monsp.* 194. *Gort. gelr.* 421.

La-



*Lathyrus arvensis repens tuberosus. Bauh. pin. 344.*

*Apios. Fuchf. hist. 131.*

*Habitat inter Belgii, Genevæ, Tataria: segetes. 2*

16. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyll-*pratenfis*.  
lis: foliolis lanceolatis: cirrhis simplicissimis. *Hort.*  
*cliff. 367. Fl. succ. 599. Roy. lugdb. 364. Dalib. pa-*  
*ris. 217.*

*Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciæ. Bauh. pin. 344.*

*Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. Bauh. hist. 2.*

*p. 304. r. 304.*

*Lathyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso.*

*Hall. belv. 597.*

*Habitat in Europæ pratis. 2*

*Cirrhii quidem interdum trifidi sunt, at sæpius simpli-*  
*cissimi.*

17. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis di-*sylvestris*.  
phyllis: foliolis ensiformibus. *Hort. cliff. 367. Fl.*  
*succ. 598. Dalib. paris. 216.*

*Lathyrus sylvestris major. Bauh. pin. 433.*

*Lathyrus sylvestris. Clus. hist. 2. p. 129. Dod. pempt.*

*523.*

*Habitat in Europæ pratis montosis. 2*

18. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis di-*latifolius*.  
phyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis.  
*Hort. cliff. 367. Hort. nps. 217. Fl. succ. 1139. It.*  
*scan. 251. \**

*Lathyrus latifolius. Bauh. pin. 344. Garid. prov.*

*271. r. 271.*

*Lathyrus major latifolius, flore purpureo, speciosior.*

*Bauh. hist. 2. p. 303.*

*Habitat in Europæ sepibus. 2*

19. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyll-*heterophyll-*  
lis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis. *It. w-goth 75. lus.*  
*Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: folio-*  
*lis gramineis triuerviis, internodiis membranaceis.*  
*Sauv. monsp. 193.*

*Lathyrus major narbonensis angustifolius. Bauh. hist.*

*2. p. 304.*

*Habitat ad radices montium Europæ. 2*

20. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis poly-*palastris*.  
phyllis stipulis lanceolatis. *Hort. cliff. 368. Fl. succ. 600.*  
*Roy. lugdb. 364. Dalib. paris. 217.*

*La-*

*Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. Fl. lapp.*  
221.

*Lathyrus palustris, flore orobi nemorensis verni. Rupp.*  
*sem.* 210. *t.* 1. *p. m.* 260.

*Vicia lathyroides f. Lathyrus viciæformis. Pluk. alm.*  
387. *t.* 71. *f.* 2.

*Habitat in Europæ borealis pascuis paludosis. &*

*pissiformis.* 21. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis: basiacutis. *Hort. ups.* 217.

*Habitat in Sibiria. &*

*Planta ut Pisum crescens. Caules acute angulati. Petioli cirrhosi, sæpe hexaphylli: foliolis ovato-oblongis, acutis. Stipulæ foliis latiores, ovate, basi acuminata, vix angulata. Pedunculi longitudine foliorum, multiflori. Flores violacei.*

## **VICIA**

\* *Pedunculis elongatis.*

*pissiformis.* 1. **VICIA** pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovatis.

*Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis ovatis: infimis sessilibus. Hort. cliff.* 369.\*

*Roy. lugdb.* 365.

*Pisum sylvestre perenne. Bauh. pin.* 343.

*Pisum sylvestre. Clus. hist.* 2. *p.* 129.

*Habitat in Pannoniæ sylvis. &*

*dumetorum.* 2. **VICIA** pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis subdentatis.

*Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis: foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. Fl. suec.* 604. *Dalib. parif.* 219. *Sauv. monsp.* 234.

*Vicia maxima dumetorum. Bauh. pin.* 385.

*Vicia sylvatica maxima piso similis. Bauh. hist.* 2. *p.* 315.

*Vicia sylvatica. Riv. tetr.* 50.

*Habitat in Thuringia, Gallia. &*

*sylvatica.* 3 **VICIA** pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis.

*Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis. Fl. lapp.* 270. *Fl. suec.* 603. *Roy. lugdb.* 365. *Sauv. monsp.* 234.

*Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus*

bus albertibus: lineis caruleis notatis. *Pluk. alm.*

387. t. 71. f. 1.

*Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Galliæ sylvis. &*

4. VICIA pedunculis subsexfloris, foliolis denis ovatis *caffubica* acutis, stipulis integris.

*Vicia pedunculis multifloris, caule fruticoso. Hort. cliff.*

369. *Roy. lugdb.* 364.

*Vicia multiflora caffubica frutescens, filiqua lentis.*

*Pluk. alm.* 387. t. 72. f. 2.

*Habitat in Germania.*

5. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris.

*Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. Hort. cliff.* 368. *Fl. suec.* 605. *Roy. lugdb.*

364. *Dalib. paris.* 220. *Sauv. monsp.* 234.

*Vicia sylvestris spicata. Baub. pin.* 345.

*Vicia multiflora. Baub. pin.* 343.

*Cracca. Riv. tetr.* 49.

*Habitat in Europæ pratis, agris. &*

6. VICIA pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis inferne denticulatis.

*Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis linearibus. Sauv. monsp.* 235.

*Vicia onobrychidis flore. Baub. pin.* 345. *prodr.* 149.

*Habitat in Gallia. D. Sauvages.*

*Statura Viciæ Cracæ. Folia pinnata, cirrhosa: foliolis sæpius 14, linearibus, angustissimis: oppositionibus distantibus. Pedunculi axillares, foliis triplo longiores, striati. Floribus 10. f. 12, subsessilibus, remotissimis, Cracæ triplo majoribus, purpureis.*

7. VICIA pedunculis multifloris, foliolis oblongis, stipulis integris, leguminibus villosis ovato-oblongis.

*Vicia leguminibus sessilibus binis ternisve subovatis nutantibus, stipulis nullis. Roy. lugdb.* 14?

*Vicia orientalis, flore suave rubente, filiquis brevissimis.*

*Bærb. lugdb.* 2. p. 44?

*Habitat in Oriente.*

*Caulis sulcatus. Cirrhi foliolis 6 paribus, oblongis, vix reclusis, acumine terminatis, subvillosis. Stipulæ lanceolatae, angustissima. Pedunculi floribus 5. f. 6, minimis, atropurpureis. Legumina nutantia, compressa, ovato-oblonga, villosa, pentasperma.*

*biennis.*

8. VICIA pedunculis multifloris, petiolis fulcatis subde-  
decaphyllis: foliolis lanceolatis glabris.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis lanceolatis glabris. *Hort. upf.* 219. \*n. 6.

*Habitat in Sibiria.* ♂

*Benghalensis.*

9. VICIA pedunculis subquinquefloris, foliolis integerrimis, stipulis integris, leguminibus erectiusculis.

Vicia pedunculis subquinquefloris longitudine foliorum.

*Hort. cliff.* 368. *Hort. upf.* 219. *Roy. lugdb.* 365.

Vicia benghalensis hirsuta & inana, siliquis pili. *Herm. lugdb.* 623 t. 625.

*Habitat in Benghala.* ☉

\* *Fl. rubus axillariibus, subsessilibus.*

*fativa.*

10. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis.

Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis: foliolis acumine emarginatis, stipulis denticulatis. *Hort. cliff.*

368. *Hort. upf.* 218. *Fl. suec.* 601. *Roy. lugdb.* 365.

*Dalib. parif.* 218.

Vicia fativa vulgaris, semine nigro. *Bauh. pin.* 344.

Vicia fativa alba. *Bauh. pin.* 344.

*Habitat inter Europæ segetes hodie.* ☉

*Stipule subtus macula quasi innixa notatæ.*

*Lathyroides.*

11. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: interioribus obcordatis,

Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.* 242. t. 242.

Vicia montana minima, flosculo purpureo. *Amæn. acad.* 1. p. 167.

*Habitat in Scotia, Lusatia.* ☉

*lutea.**lutea.*

12. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris.

Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis apice emarginatis, leguminibus solitariis villosis. *Dalib. parif.* 219.

Vicia leguminibus solitariis deorsum flexis hirsutis. *Sanx. monsp.* 235.

Vicia sylvestris lutea, siliqua hirsuta. *Bauh. pin.* 345.

Vicia flore luteo pallido, siliquis hirsutis crassis brevibus propendentibus. *Moriz. hist.* 2. p. 62. f. 2. t. 21. f. 5.

*Habitat in Gallia.*

Variat foliis lanceolatis & retusis, Leguminibus hirsutis & subglabris. Stipulae alternatim integerrimæ & tridentatæ.

13. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis penta-hybrida.  
spermis, corollæ vexillis villosis.  
*Habitat* Montpelii, Massiliæ. ☉  
*Affinis* *V. lutea*. Foliola *obverse ovata, retusa, parva,*  
*pilis adspersa.* Stipulæ *non ad caulem fuscae, sed totæ*  
*virides.* Flores *flavi, supra subgrisei, pilosi.* *Cætera*  
*V. lutea.*
14. VICIA leguminibus subsessilibus pendulis glabris *te-peregrina*.  
traspermis, foliolis linearibus emarginatis.  
*Vicia peregrina* angustissimis foliis, siliqua lata glabra.  
*Pluk. alm.* 386. t. 233. f. 6.  
*Vicia angustifolia* purpureo-violacea, siliqua lata glabra.  
*Magn. monsp.* 276.  
*Habitat in* Gallia. D. *Sanvages.* ☉
15. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, sepium.  
foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescen-  
tibus.  
*Vicia leguminibus* adscendentibus, petiolis polyphyllis,  
foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 362.  
*Fl. succ.* 602. *Roy. Lugab.* 365. *Dalib. paris.* 219.  
*Sauv. monsp.* 234.  
*Vicia sepium*, folio rotundiore acuto. *Bauh. pin.* 345.  
*Vicia sepium.* *Riv. tetr.* 56.  
*Habitat in* Europæ *sepibus.* &
16. VICIA leguminibus subsessilibus solitariis erectis, fo-*narbonensis*.  
liolis senis subovatis, stipulis denticulatis. *Hort. upf.*  
218. *Sauv. monsp.* 234  
*Vicia* petiolis inferioribus tetraphyllis: superioribus po-  
lyphyllis, foliolis ovatis cirrhiferis. *Roy. Lugab.* 365.  
*Vicia* petiolis tetraphyllis cirrhosis. *Hort. cliff.* 360.  
*Vicia narbonensis.* *Riv. tetr.*  
*Faba sylvestris*, fructu rotundo atro. *Bauh. pin.* 338.  
*Bona sylvestris.* *Dod. pempt.* 516.  
*Habitat in* Gallia, Anglia. ☉
17. VICIA caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. Faba,*  
*cliff.* 369. *Hort. upf.* 218. *Mat. med.* 353. *Roy. Lugab.*  
366. *Dalib. paris.* 220.  
*Faba.* *Bauh. pin.* 338.  
*Bona* f. *Phaeolus.* *Dod. pempt.* 513.
18. *Faba minor* f. *equina.* *Bauh. pin.* 338.  
*Habitat in* - - - ☉

## CICER.

- aristinum.* 1. CICER foliolis ferratis. *Hort. cliff.* 370. *Hort. upf.* 224. *Mat. med.* 359.  
 Cicer sativum. *Bauh. pin.* 347.  
 Cicer arictinum. *Dod. pempt.* 525.  
*Habitat inter Hispaniæ, Italiæ segetes.* ☉

## ERVUM.

- Lens.* 1. ERVUM seminibus compressis convexis.  
 Cicer pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis indivisis. *Hort. cliff.* 124. *Mat. med.* 360. *Sauv. monsp.* 233.  
 Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. *Hort. cliff.* 370. *Dalib. paris.* 346.  
 Lens vulgaris. *Bauh. pin.* 346.  
 Lens. *Dod. pempt.* 526.  
*Habitat inter Galliæ segetes.* ☉
- tetraspermum.* 2. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Fl. suoc.* 606. *Dalib. paris.* 227.  
 Vicia segetum, singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin.* 345.  
*Habitat inter Europæ segetes.* ☉
- hirsutum.* 3. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis.  
 Cicer pedunculis multifloris, seminibus globosis. *Hort. cliff.* 370. *Fl. suoc.* 607. *Roy. lugdb.* 389. *Dalib. paris.* 228. *Sauv. monsp.* 233.  
 Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin.* 345.  
 Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.  
*Habitat in Europæ agris.* ☉
- monanthos.* 4. ERVUM pedunculis unifloris.  
 Vicia pedunculis unifloris, foliolis integerrimis, stipulis alternis dentatis. *Hort. upf.* 219. \*  
 Lens monanthos. *Herm. lugdb.* 360.  
*Habitat in Asia ruthenica.* ☉
- Ervilia.* 5. ERVUM germinibus undato-plicatis. *Hort. upf.* 224. *Mat. med.* 361. *Sauv. monsp.* 237.  
 Ervum leguminibus pendulis. *Hort. cliff.* 370.  
 Orobus siliquis articulatis, flore majore. *Bauh. pin.* 346.  
*Habitat in Gallia, Italia.* ☉ *semlæ*

GYTI

CYTISUS.

1. CYTISUS racemis simplicibus pendulis, foliolis *q. Laburnum*,  
vato-oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Hort. upf.* 210. *Roy.*  
*lugdb.* 369. *Hall. belv.* 591.  
Anagyris non foetida major alpina. *Bauh. pin.* 391.  
Anagyris non foetens minor. *Bauh. pin.* 391.  
Laburnum arbor trifolia anagyridi similis. *Bauh. hist.*  
*2. p.* 361.  
*Habitat in* Helvetia, Sabaudia. *h*
2. CYTISUS racemis simplicibus erectis, foliolis ova-*nigricans.*  
to-oblongis. *Hort. cliff.* 354. *Roy. lugdb.* 369. *Sauv.*  
*monsp.* 190.  
Cytisus glaber nigricans. *Bauh. pin.* 390.  
Cytisus IV. *Clas. hist.* 1. *p.* 95.  
*Habitat in* Austria, Pannonia, Bohemia, Italia. *h*
3. CYTISUS racemis erectis, calycibus bractea triplici *sessilifolius.*  
auctis, foliis floralibus sessilibus.  
Cytisus foliis saepius sessilibus, calycibus squamula tri-  
plici auctis. *Vir. cliff.* 71. *Hort. cliff.* 355. \* *Roy.*  
*lugdb.* 369. *Sauv. monsp.* 191.  
Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis.  
*Bauh. pin.* 390.  
Cytisus glaber, siliqua lata. *Bauh. hist.* 1. *p.* 373.  
*Habitat in* Italia, Galloprovincia. *h*
4. CYTISUS racemis axillaribus erectis, foliolis sub-*Cajen.*  
lanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato.  
*Fl. zeyl.* 379 \* *Hort. upf.* 211.  
Cytisus foliolis ovato-lanceolatis: intermedio petiolato,  
pedunculo ex alis multifloro. *Hort. cliff.* 354. *Roy.*  
*lugdb.* 369.  
Cytisus folio molli incano, siliquis orobi contortis &  
acutis. *Burm. zeyl.* 86. *t.* 37.  
Phaseolus erectus incanus, siliquis torosis. *Pluk. alm.*  
293. *t.* 213. *f.* 3. \*  
*Habitat in* India.
5. CYTISUS pedunculis simplicibus lateralibus, calyci-*hirsutus.*  
bus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. *Hort.*  
*upf.* 211. \*  
Cytisus calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis simpli-  
cibus brevissimis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 370.  
*Sauv. monsp.* 190.  
Cytisus incanus, siliqua longiore. *Bauh. pin.* 390.

*Cytisus. Clus. hist. 1. p. 94.*

*Habitat in Hispania, Sibiria, Austria, Italia. ♀*

*supinus.*

6. CYTISUS floribus capitatis, ramis decumbentibus.

*Roy. lugdb. 376. Hort. nps. 211.*

*Cytisus supinus, foliis infra & siliquis molli lanugine pubescentibus. Bauh. pin. 350.*

*Cytisus VII. species altera. Clus. hist. 1. p. 96.*

β. *Cytisus supinus, foliis incana lanugine inferne pubescentibus. Bauh. pin. 390.*

*Cytisus VII. species altera. Clus. hist. 1. p. 96.*

γ. *Cytisus incanus, folio oblongo, austriacus. Bauh. pin. 390.*

*Cytisus V. Clus. hist. 1. p. 195.*

*Habitat in Sibiria, Italia, Sicilia, Galloprovincia. ♀*

*Structura floris indicat summam cum C. hirsuto affinitatem.*

*æthiopicus.*

7. CYTISUS racemis lateralibus strictis, ramis angulatis, foliolis cuneiformibus.

*Cytisus æthiopicus, subrotundis incanis minoribus foliis, floribus parvis luteis. Pluk. alm. 128. t. 278. f. 3. ant*

*Habitat in Æthiopia. ♀*

*græcus.*

8. CYTISUS foliis simplicibus lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

*Barba jovis, linariæ folio, flore luteo parvo. Tournef. cor. 44?*

*Habitat in Archipelagi insulis. ♀*

*monspessulanus.*

9. CYTISUS floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. *Sauv. monsp. 191. †*

*Cytisus monspessulanus, medicæ folio, siliquis dense congestis & villosis. Tournef. inst. 648.*

*Habitat Monspeli.*

*Folia subsessilia. Foliola ovalia, tomentosa, incana. Legumina conferta, recta, villosa. Sauv.*

*argenteus.*

10. CYTISUS floribus subsessilibus, foliis tomentosis, caulibus herbaceis.

*Cytisus acaulis, floribus solitariis: foliolis sericeis lanceolatis. Sauv. monsp. 191.*

*Lotus fruticosus incanus siliquosus. Bauh. pin. 332.*

*Lotus asperior fruticosa narbonensis incana. Lob. sc. 2. p. 41.*

*Trifolium argenteum, floribus luteis. Bauh. hist. 2. p. 359.*

*Habitat in G. Narbonensi. ♀*

Rami



Rami *versus radicem fruticantes, superne herbacei. Flores subsessiles, solitarii, duo vel tres, ex alis & apicibus ramorum. Legumina hirsuta.*

11. CYTISUS foliis pinnatis. pinnatus.  
 Phaseolo affinis arbor indica Coral dicta polyphyllus non spinosa, foliis mollibus. *Pluk. phyt.* 104. f. 3.  
*Habitat in India.*  $\frac{1}{2}$   
 Folia *pinnata foliolis 5, ovatis, integerrimis, glabris.*  
*Racemus ad singulum dentem affigit flores 2. f. 3. pedicellatos.*

### ULEX.

1. ULEX foliis villosis acutis, spinis sparsis. europæus.  
 Ulex folio sub singulis spinis subulato plano acuto.  
*Hort. cliff.* 356. *Hort. upf.* 212. *Roy. lugdb.* 372.  
 Genista spinosa major, longioribus aculeis. *Bauh. pin.* 394.  
 Genista spinosa. *Dod. pempt.* 659.  
 2. Genista spinosa major, brevioribus aculeis. *Bauh. pin.* 394.  
*Habitat in Anglia, Gallia, Brabantia.*  $\frac{1}{2}$   
 2. ULEX foliis solitariis obtusis, spinis simplicibus tercapensis.  
 minalibus. *Roy. lugdb.* 372.  
 Genista spartium bacciferum, ericæ foliis, africanum.  
*Pluk. alm.* 166. t. 185. f. 6. *mal. Pet. gaz.* 9. t. 83. f. 9.  
*Habitat in Æthiopia.*  $\frac{1}{2}$

### ARACHIS.

1. ARACHIS. *Hort. cliff.* 353. *Hort. upf.* 228. *Roy. hypogæa. lugdb.* 390.  
 Arachidna quadrifolia villosa, flore luteo. *Plum. gen.* 49. *Ebret. pict.* t. 5. f. 3.  
 Senna terraphylla f. Absi congener hirsuta maderaspatensis, folliculos sub terra condens. *Pluk. alm.* 341. t. 60. f. 2.  
 2. Arachidnoides americana. *Niff. act.* 1723. p. 387. t. 19.  
*Habitat in Brasilia, Peru.* ☉

### GLYCYRRHIZA.

1. GLYCYRRHIZA leguminibus echinatis. *Roy. lugdb. echinata.* 386.

A a a 3

Gly-

*Glycyrrhiza capite echinato. Baub. pin. 352.*

*Dulcis radix. Cam. epit. 423.*

*Habitat in Gargano Apuliæ, in deserto Nagico Tataricæ. &*

*glabra.*

2. GLYCYRRHIZA leguminibus glabris. *Hort. cliff. 490. Mat. med. 362. Roy. lugdb. 386. Sauv. monsp. 232.*

*Glycyrrhiza siliquosa & germanica. Baub. pin. 352.*

*Glycyrrhiza vulgaris. Dod. pempt. 341.*

*Habitat in Franconia, Gallia, Hispania, Italia. &*

*hirsuta.*

3. GLYCYRRHIZA leguminibus hirsutis *Roy. lugdb. 386. Glycyrrhiza orientalis, siliquis hirsutissimis. Tournes. cor. 26.*

*Habitat in Oriente.*

## CORONILLA.

*Emerus.*

1. CORONILLA fruticosa, corollarum unguibus calyce duplo longioribus. *Roy. lugdb. 387. Hort. cliff. 363. Fl. succ. 590. It. goth. 229.*

*Colutea siliquosa f. scorpioides major. Baub. pin. 397.*

*Colutea scorpioides. Cam. epit. 541.*

- β. *Colutea siliquosa minor. Baub. pin. 397.*

*Habitat Geneva, Monspelii, Salerni, Viennæ. &*

*juncosa.*

2. CORONILLA fruticosa, foliolis quinis sublanco-latis, stipulis lanceolatis.

*Dorychnium luteum hispanicum carnosius. Barr. ic. 153.*

*Colutea caule genistæ fungoso. Baub. hist. 1. p. 383.*

*Polygala major massiliotica. Baub. pin. 349.*

*Habitat Massiliæ, Monspelii. &*

*valentina.*

3. CORONILLA fruticosa, stipulis subrotundis, Coronilla fruticosa, leguminibus teretibus, pedunculis multifloris, caule fruticoso. *Hort. upf. 234. Roy. lugdb. 386. Sauv. monsp. 235.*

*Coronilla leguminibus teretibus, unguibus corollæ brevibus, caule fruticoso. Hort. cliff. 363.*

*Coronilla leguminibus teretibus, unguibus corollæ brevibus, pinnis ad summum cuneaphyllis, foliolis ovatis. Guett. stamp. 1. p. 231.*

*Polygala aitera. Baub. pin. 349.*

*Polygala valentina. Clus. hist. 1. p. 98.*

*Habitat in Hispania, Italia. &*

4. CORONILLA fruticosa, foliolis undenis: extimo ma-  
jore. *argentea*.  
Colutea scorpioides odorata. *Alp. exot.* 17.  
*Habitat in Creta.* ☿
5. CORONILLA herbacea, leguminibus falcato-gladi-  
atis. *Securidaca*.  
*Hort. cliff.* 363. *Hort. upf.* 234. *Roy. lugdb.*  
386. *Sauv. monsp.* 235.  
*Securidaca lutea major.* *Bauh. pin.* 398.  
*Hedysarum primum.* *Dod. pempt.* 546.  
*Habitat inter Hispaniæ segetes.* ☉
6. CORONILLA herbacea, leguminibus erectis tereti-  
bus torosis numerosis, foliis glabris. *varia*.  
*Hort. cliff.* 363.  
*Hort. upf.* 235. *Roy. lugdb.* 386. *Dalib. parif.* 232.  
*Sauv. monsp.* 235.  
*Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis ar-*  
*ticulatis.* *Bauh. pin.* 349.  
*Securidaca 2. altera species.* *Clus. hist. 2. p.* 237.  
*Habitat in Lusatia, Bohemia, Dania, Gallia.* ☉
7. CORONILLA herbacea, leguminibus quinis erectis  
teretibus articulatis. *cretica*.  
*Roy. lugdb.* 387.  
*Coronilla cretica herbacea, flore parvo purpurascente.*  
*Tournef. cor.* 44.  
*Habitat in Creta.* ☉  
*Habet multa communia cum C. varia, at differt ab ea*  
*præcipue umbellis ex quinque floribus, raro pluribus,*  
*cum illa communiter viginti gerat.*
8. CORONILLA caule scandente flaccido. *scandens*.  
*Roy. lugdb.* 387.  
*Coronilla scandens pentaphylla.* *Plum. spec.* 19.  
*Habitat in America calidiore.*

## ORNITHOPUS.

1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus subar-  
cuatis. *perpusillum*.  
*Hort. upf.* 234. *Sauv. monsp.* 236.  
*Ornithopus foliis pinnatis, articulis leguminum subro-*  
*tundis lævibus.* *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383.  
*Dalib. parif.* 232. *Gort. gelr.* 438.  
*Ornithopodium minus.* *Bauh. pin.* 350.  
*Ornithopodium perpusillum.* *Dalech. hist.* 487.
- β. *Ornithopodium majus.* *Bauh. pin.* 350.
- γ. *Ornithopodium radice tuberculis nodosa.* *Bauh. pin.* 250.  
*Habitat in Angliæ, Belgii, Galliæ, Hispaniæ arenosis* ☉

- compressus.* 2. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis. *Hort. cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383. *Sauv. monsp.* 236.  
 Ornithopodio affinis hirsuta scorpioides, *Baub. pin.* 350.  
 Scorpioides leguminosa. *Dalech. hist.* 493.  
*Habitat in Italia, Sicilia.* ☉
- scorpioides.* 3. ORNITHOPUS foliis ternatis subsessilibus appendiculatis: impari maximo. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 234. *Roy. lugdb.* 383.  
 Scorpioides portulacæ folio. *Baub. pin.* 287.  
 Scorpioides matthioli. *Dod. pempt.* 71.  
*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia inter segetes.* ☉

## HIPPOCREPIS.

- unifiliquosa.* 1. HIPPOCREPIS leguminibus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 233. *Roy. lugdb.* 384. *Sauv. monsp.* 236.  
 Ferrum equinum siliqua singulari. *Baub. pin.* 349.  
 Ferrum equinum vulgare. *Col. ecphr.* 1. p. 302. t. 300.  
*Habitat in Italia.* ☉
- multifiliquosa.* 2. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis: margine altero lobatis. *Hort. cliff.* 364. *Hort. upf.* 233. *Roy. lugdb.* 384. *Sauv. monsp.* 236.  
 Ferrum equinum siliqua multiplici. *Baub. pin.* 346.  
 Ferrum equinum alterum polyceraton. *Col. ecphr.* 1. p. 300.  
*Habitat in Angliæ, G. Narbonensis, Hispania, Italia cretaseis.*
- comosa.* 3. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis: margine exteriori repandis. *Roy. lugdb.* 384. *Dalib. parif.* 232.  
 Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis: margine exteriori lobatis. *Hort. cliff.* 364.  
 Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate. *Baub. pin.* 346.  
 Ferrum equinum comosum, f. capitatum. *Col. ecphr.* 1. p. 302. t. 301.  
*Habitat in Germania, Italia, Gallia.*

## SCORPIURUS.

- vermiculata.* 1. SCORPIURUS pedunculis unifloris, leguminibus tectis undique squamis obtulis.

Scor-

Scorpioides filiqua crassa boelii. *Tournef. inst.* 402.

Scorpioides bupleuri folio, corniculis crassioribus & magis spongiosis instar litui contortis & in se convolutis. *Morif. hist.* 2. p. 127. f. 2. t. 11. f. III.

*Habitat in Europa australi.* ☉

2. SCORPIURUS pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum obtuse aculeatis.

Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis & rugosis f. rigidis, striatis f. sulcatis litui instar contortis & in se convolutis. *Morif. hist.* 2. p. 127. f. 2. t. 11. f. IV.

*Habitat in Europa australi.* ☉

3. SCORPIURUS pedunculis subtrifloris, leguminibus sulcata extrorsum spinis distinctis acutis.

Scorpiurus. *Hort. cliff.* 364. *Hort. ups.* 233. *Roy. lugdb.* 383.

Scorpioides bupleuri folio. *Bauh. pin.* 287.

Scorpioides prius. *Dod. pempt.* 71.

*Habitat in Europa australi.* ☉

4. SCORPIURUS pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis acutis.

Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis & convolutis. *Morif. hist.* 2. p. 127. f. 2. t. 11. f. II.

*Habitat in Europa australi.* ☉

Species hasce omnes olim ex una specie ortas esse dubium non est, nec sufficit locus harum generationi, quatum mutatus easdem redderet; quæ itaque mixtura harum produxerit constantes plantas? Qui has omnes aut conjungat aut distingvat videtur argumentis inniti.

## HEDYSARUM.

\* *Foliis simplicibus.*

1. HEDYSARUM foliis simplicibus lanceolatis obtusis, caule fruticoso spinoso. *Albagi.*

Genista-spartium spinosum, foliis polygoni. *Bauh. pin.* 394.

Genista-spinosa, flore rubro. *Wheel. itin.*

*Agul. Rauv. itin.* 74. t. 74.

*Habitat in Tataria, Persia, Syria, Mesopotamia.* ☉

2. HEDYSARUM foliis simplicibus linearibus acutis, caule bupleuriformi. *Or-*

le incrim.

A a a 5

Or-  
linum.

*Ornithopodium maderaspatanum*, bupleuri foliis. *Pet. gaz.* 18. t. 11. f. 12.

*Scorpioides maderaspatensis*, graminis leucanthemi folii, filiquis nodosis. *Pluk. amaltb.* 189. t. 443. f. 4.

*Habitat in India.*

*nummulari-folium.* 3. *HEDYSARUM* foliis simplicibus cuneiformibus. *Fl. zeyl.* 288. \*

*Onobrychis maderaspatensis*, nummulariæ folio, ornithopodii filiquis. *Pet. gaz.* 41. t. 26. f. 4.

*Habitat in India.*

*maculatum.* 4. *HEDYSARUM* foliis simplicibus ovatis obtusis. *Hort. cliff.* 449. *Hort. ups.* 233. *Fl. zeyl.* 290. *Roy. lugdb.* 385.

*Hedysarum humile*, capparidis folio maculato. *Dill. elth.* 170. t. 141. f. 161.

*Habitat in India.*

*gangeticum.* 5. *HEDYSARUM* foliis simplicibus ovatis acutis.

*Hedysarum monophyllum latifolium*, filiculis plurimis spica longa digestis. *Burm. zeyl.* 113. t. 49. f. 2.

*Onobrychis gangetica* monophyllos, filiculis singularibus lævibus: foliatim per internodia discriminatis. *Pluk. alm.* 270. t. 50. f. 3.

*Onobrychis zeylanica*, folio singulari oblongo rotundo. *Raj. suppl.* 453.

*Habitat in India.*

*vaginale.* 6. *HEDYSARUM* foliis simplicibus cordato-oblongis, petiolis simplicibus, stipulis vaginalibus. *Fl. zeyl.* 287. \*

*Genista articulata* repens, foliis crassiusculis planis acutis. *Burm. zeyl.* 104. t. 49. f. 1.

*Habitat in India.* ☉

*triquetrum.* 7. *HEDYSARUM* foliis simplicibus cordato-oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris. *Fl. zeyl.* 286. \*

*Onobrychis zeylanica* monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. *Burm. zeyl.* 176. t. 81.

*Onobrychis zeylanica*, aurantii folio. *Pet. ficc.* 247. *Raj. suppl.* 247.

*Habitat in India.*

*strobiliferum.* 8. *HEDYSARUM* foliis simplicibus, bracteis strobilorum cordatis obtusis. *Fl. zeyl.* 287. t. 3. \*

*Onobrychis indiae orientalis*, fagi foliis alternis, filiculis spica longa dispositis. *Raj. suppl.* 234.

*Habitat in India.*

\* F2-

\* *Foliis conjugatis.*

9. HEDYSARUM foliis binatis petiolatis: floralibus *diphyllum*, sessilibus. *Fl. zeyl.* 291. \*  
Hedysarum minus *diphyllum*. *Sloan. jam.* 73. *hist.* 1. p. 185. *Raj. suppl.* 450.  
Onobrychis maderaspatana *diphyllus*, filiculis elypeatis hirsutis, minor. *Pluk. alm.* 270. t. 246. f. 2.  
Nelsm-mari. *Rheed. mal.* 9. p. 161. t. 82. *Raj. suppl.* 404.  
β. Hedysarum bifolium: foliolis ovatis, filiculis asperis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. t. 50. f. 1.  
*Habitat in Indiis.* ☉

\* *foliis ternatis.*

10. HEDYSARUM foliis ternatis: bracteis strobilorum *pulchellum*, orbiculatis conjugatis *Fl. zeyl.* 292. \*  
Hedysarum trifoliatum frutescens, flore & fructu inter duo foliola absconditis. *Burm. zeyl.* 116. f. 52.  
Onobrychis maderasp. triphylla, filiculis eleganter foliaceis. *Raj. suppl.* 234.  
Onobrychis indica triphyllus, foliis amplis mucronatis, filiquis parvis in spicam longam ex alis inter binafolia circinnata arcte conniventia reconditis. *Pluk. amaltb.* 161. t. 433. f. 7.  
*Habitat in India.* ♀
11. HEDYSARUM foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, caule fruticoso. *Fl. zeyl.* 293. \*  
Hedysarum trifoliatum arborefcens, floribus ex alis foliorum, filiquis copiosis glabris. *Burm. zeyl.* 115. t. 51.  
*Habitat in India.* ♀
12. HEDYSARUM foliis ternatis, caule suffruticoso, leguminibus biarticulatis. *Fl. zeyl.* 296. \*  
Hedysarum triphyllum, filiculis glabris peltatis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. t. 50. f. 2.  
Onobrychis zeylanica trifolia minor perennis. *Raj. suppl.* 457.  
*Habitat in India.* ♀
13. HEDYSARUM foliis ternatis, floribus spicatis, leguminibus articulatis: infimo monospermo, stipulis setaceis. *Fl. zeyl.* 294. \*  
Hedysarum trifoliatum, filiculis inferioribus solitariis: superioribus articulatis. *Burm. zeyl.* 117. t. 53. f. 1.  
*Habitat in India.*

14. HEDYSARUM foliis ternatis, leguminibus mem-  
*viscidum.*  
0227

branaceis lævibus integris, caule ramisque hispidis. *Fl. zeyl.* 295.

*Habitat in India.* 5

*Legumina neutra sutura sinuata, sed omnino integerrima.*

*canadense.*

15. HEDYSARUM foliis simplicibus ternatisque, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 232. *upl.* 222.

Hedysarum foliis radicalibus simplicibus, caulinis ternatis, floribus laxè spicatis, leguminibus undulatis. *Hort. cliff.* 365. *Roy. lugdb.* 385.

Hedysarum triphyllum canadense. *Corn. canad.* 44. t. 45.

Onobrychis major perennis canadensis triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus. *Morif. hist.* 2. p. 130. f. 2. t. 11. f. 9.

*Habitat in Virginia, Canada.* 2

*canescens.*

16. HEDYSARUM foliis ternatis subtus scabris, caule hispido, floribus racemosis conjugatis. *Hort. upl.* 232.

Hedysarum foliis ternis solitariisque, caule hispido fruticoso. *Hort. cliff.* 365. *Gron. virg.* 87. *Roy. lugdb.* 385.

Hedysarum triphyllum fruticosum (supinum), flore purpureo. *Sloan. jam.* 73. *hist.* 1. p. 185. t. 118. f. 2. *Raj. suppl.* 458.

Onobrychis americana, floribus spicatis, foliis ternis canescentibus, filiculis asperis. *Pluk. alm.* 270. t. 308. f. 7.

*Habitat in Virginia, Jamaica.* 2

*marilandicum.*

17. HEDYSARUM foliis ternatis: foliolis subrotundis, caule frutescente ramosissimo, leguminibus articulatis lævibus. *Gron. virg.* 174.

Hedysarum, trifoliatum, siliqua breviorè. *Dill. elth.* 174. t. 144. f. 171.

Hedysarum triphyllum marilandicum minus, siliquis compressis articulatis asperis brevioribus. *Raj. suppl.* 455.

*Habitat in Carolina, Virginia.*

*frutescens.*

18. HEDYSARUM foliis ternatis subovatis, caule frutescente. *Gron. virg.* 174.

*Habitat in Virginia.* 5

*viridiflorum.*

19. HEDYSARUM foliis ternatis acutiusculis, caule erecto, racemis longissimis erectis. *Gron. virg.* 87.

*Habitat in Virginia.*

*hirtum.*

20. HEDYSARUM foliis ternatis ovalibus, caule fruticoso,



cofo, racemis ovatis, calycibus fructibusque hirsutis monospermis.

Trifolium fruticosum hirsutum, spicis oblongis pedunculatis. *Gron. virg.* 173. \*

*Habitat in Virginia.* b

21. HEDYSARUM foliis ternatis ovatis, floribus gemi-<sup>violaceis</sup> natis, leguminibus nudis venosis monospermis.

Hedysarum foliis ternatis lanceolatis, leguminibus monospermis. *Gron. virg.* 87.

*Habitat in Virginia.*

Flores violacei, gemini, propriis pedicellis plerumque annexi; in aliis glomerati ex foliorum alis, in aliis vero filiformibus pedunculis hinc inde affixi. Legumina calyce triplo longiora, ovata, compressa, acuta, glabra, reticulata, monosperma.

22. HEDYSARUM foliis ternatis lineari-lanceolatis, <sup>paniculatum</sup> floribus paniculatis.

Hedysarum panicula ramosa, foliolis lineari-lanceolatis. *Gron. virg.* 86.

Onobrychis mariana triphylla, passifloræ pentaphyllæ angustiori folio & facie, siliquis dentatis asperis. *Pluk. mant.* 140. t. 432. f. 6.

*Habitat in Virginia.*

23. HEDYSARUM foliis ternatis, scapo florifero nu-<sup>nudiflorum</sup> do, caule folioso angulato.

Hedysarum caule nudo longissimo foliofero, florifero angulato. *Gron. virg.* 86.

*Habitat in Virginia.*

24. HEDYSARUM foliis ternatis obcordatis, caulibus <sup>repens</sup> procumbentibus, racemis lateralibus.

Hedysarum caulibus procumbentibus, racemis lateralibus solitariis, petiolis pedunculo longioribus. *Gron. virg.* 86.

*Habitat in Virginia.*

25. HEDYSARUM foliis ternatis obcordatis, caulibus <sup>triflorum</sup> procumbentibus, pedunculis unifloris ternis. *Fl. zeyl.* 297. \*

Hedysarum trifoliatum repens, acetosellæ folio glabro, caule hirsuto. *Burm. zeyl.* 119. t. 54. f. 2.

- β. Hedysarum trifoliatum repens, folio ovali glabro, caule hirsuto, siliqua plana articulata. *Burm. zeyl.* 118. t. 54. f. 1.

γ. He-

- γ. HEDYSARUM procumbens, trifolii fragiferi folio. *Dill. elth.*  
172. t. 142. f. 169.  
*Habitat in India.* ☉

- volubile. 26. HEDYSARUM foliis ternatis ovato-oblongis, caule  
volubili. *Hort. cliff.* 499. *Roy. lugdb.* 385.  
Hedysarum trifolium scandens, folio longiore splendente. *Dill. elth.* 173. t. 143. f. 170.  
*Habitat in America septentrionali.*

\* *Foliis pinnatis.*

- alpinum. 27. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto. *Hort. upf.* 232.  
Hedysarum saxatile, siliqua lævi, floribus purpureis, inodorum. *Amm. ruth.* 116. n. 152. 153.  
β. Onobrychis semine clypeato lævi. *Bauh. pin.* 350. *prodr.* 149.  
*Habitat α. in Sibiria, β. in Helvetia.* 2  
Planta β differt caule humiliore, floribus majoribus paucioribus, calyce pubescente, at attributa specifica tot communia, ut vix sufficienter distinguatur.

- coronarium. 28. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso. *Hort. cliff.* 365. *Hort. upf.* 231. *Roy. lugdb.* 385.  
Onobrychis, semine clypeato aspero, major. *Bauh. pin.* 350.  
Onobrychis altera. *Dod. pempt.* 549.  
*Habitat in Italiæ pratis.* 2

- spinosissimum 29. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis tomentosis, caule diffuso. *Hort. upf.* 231. \*  
Hedysarum clypeatum asperum, siliqua spinosissima, flore purpureo. *Boerb. lugdb.* 2. p. 51.  
*Habitat in Hispania.* ☉

- flexuosum. 30. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis flexuosis, caule diffuso. \*  
Onobrychis major annua, siliculis articulatis asperis clypeatis undulatis junctis, flore purpureo-rubente. *Morif. hist.* 2. p. 130. *Raj. hist.* 929.  
*Habitat in Asia.* ☉

- virginicum. 31. HEDYSARUM foliis pinnatis, caule fruticoso, leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis. *Gron. virg.* 174.  
*Habitat in Virginia.*

22. HE-

32. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus mono- *Onobrychis*.  
 spermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus.  
 Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus subrotundis aculeatis. *Hort. cliff.* 365. *Hort. nps.* 271. *Roy. lugdb.* 385. *Sauv. monsp.* 233.  
*Onobrychis* folio viciæ, fructu echinato, major. *Bauh. pin.* 350.  
 Caput gallinaceum belgarum. *Lob. ic.* 2. p. 81.  
 3. *Onobrychis* incana, foliis longioribus. *Bauh. pin.* 350.  
*prod.* 149. n. *Burser.* XIX. 138.  
*Habitat in* Sibiria, Gallia, Angliæ, Bohemiæ apricis, cretaceis. &  
 33. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus mono- *Caput galli*  
 spermis aculeatis, petalis æqualibus.  
*Onobrychis*, fructu echinato, minor. *Bauh. pin.* 350.  
*prodr.* 149. *Burs.* XIX: 135.  
*Onobrychis* f. Caput Galli minus, fructu maximo insigniter echinato. *Triumf. obs.* 65.  
*Habitat in* Galloprovinciæ littoribus maris. ☉  
*Corollæ petala* longitudine æqualia, calyce vix longiora.  
 34. v. *asp.* 1198. **INDIGOFERA.**

1. INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis, race- *tinctoria*.  
 mis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. *Amæn. acad.* 1. p. 408. *Hort. nps.* 208. *Mat. med.* 348.  
*Indigofera* foliis nudis. *Hort. cliff.* 487.  
*Anil* f. Nil indorum color. *Bauh. hist.* 2. p. 945.  
*Ameri. Rheed. mal.* 1. p. 101. t. 54.  
*Habitat in* India. 5  
 2. INDIGOFERA leguminibus pendulis lanatis tetrago- *hirsuta*.  
 nis. *Fl. zeyl.* 272. \* *Amæn. acad.* 1. p. 408.  
*Astragalus* spicatus, siliquis pendulis hirsutis, foliis sericeis. *Burm. zeyl.* 37. t. 14.  
*Kattu-tagera. Rheed. mal.* 1. p. 55. t. 30.  
*Habitat in* India:  
 3. INDIGOFERA leguminibus horizontalibus teretibus, *glabra*.  
 foliis pinnatis ternatisque. *Fl. zeyl.* 274. *Amæn. acad.* 1. p. 408.  
*Colutea* siliquosa glabra, ternis quinisve foliis, maderaspata, semine rubello. *Pluk. alm.* 113. t. 166. f. 1.  
*Nir-pulli. Rheed. mal.* 9. t. 67. *Raj. suppl.* 470.  
*Habitat in* India. ☉

CRAC-

## CRACCA.

- virginiana.* 1. CRACCA leguminibus retrofalcatis compressis villosis spicatis, calycibus lanatis, foliolis ovali-oblongis acuminatis. *Gen. nov.* 1090.  
 Clitoria foliis pinnatis, caule decumbente. *Hort. cliff.* 498. \* *Gron. virg.* 83.  
 Elymus *Micb. gen.* 210.  
 Orobus virginianus, foliis fulva lanugine incanis, foliorum nervo in spinam abeunte. *Pluk. mant.* 142.  
 Cicer atragaloides virginianus hirsutis pubescens, floribus amplis subrubentibus. *Pluk. alm.* 103. t. 23. f. 2.  
*Habitat in Virginia, Canada.*  
*Caulis in loco natali erectus est.*
- villosa.* 2. CRACCA leguminibus retrofalcatis villosis pendulis racemosis lateralibus, foliis glabris lanceolatis. *Fl. zeyl.* 299. \* *Gen. nov.* 1090.  
 Securidaca maderaspatensis, siliquis falcatis fulvis & villosis plurimis circum ramulos stellatim positis. *Pluk. alm.* 399. t. 59. f. 6.  
 β. Coronilla zeylanica, siliquis fuscis hirsutis pilosis, flore albo. *Burm. zeyl.* 78. t. 33.  
*Habitat in India.*
- maxima.* 3. CRACCA leguminibus strictis adscendentibus glabris, stipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris striatis. *Fl. zeyl.* 300. \* *Gen. nov.* 1090.  
*Habitat in Zeylona.*
- purpurea.* 4. CRACCA leguminibus strictis adscendentibus glabris racemosis terminalibus, stipulis subulatis, foliis oblongis glabris. *Fl. zeyl.* 301. \* *Gen. nov.* 1090.  
 Coronilla zeylanica herbacea, flore purpurascente. *Burm. zeyl.* 77. t. 32.  
*Habitat in Zeylona.*
- tinctoria.* 5. CRACCA spicis lateralibus pedunculatis, leguminibus strictis pendulis, foliolis emarginatis subtus villosis. *Fl. zeyl.* 302. \* *Gen. nov.* 1090.  
*Habitat in Zeylona.*
- spenticosa.* 6. CRACCA leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis subtus sericeis, caule fruticoso. *Fl. zeyl.* 303. *Gen. nov.* 1090.  
*Habitat in Zeylona.* β

CLITORIA.

1. CLITORIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 360. *Hort. Ternatea.* nps. 214. *Fl. zeyl.* 283. \*. *Roy. lugdb.* 369.  
Flos clitoridis ternatentium. *Breyn. cent.* 76. t. 31.  
Phaseolus indicus, glycyrrhizæ foliis, flore amplo cæruleo. *Comm. hort.* 1. p. 47. t. 24.  
Schonga Cuspi. *Rheed. mal.* 8. p. 69. t. 38.  
*Habitat in India.*
2. CLITORIA foliis ternatis, calycibus campanulatis *brasiliæna*, solitariis. *Hort. nps.* 215.  
Clitoria foliis ternatis. *Hort. cliff.* 361. *Roy. lugdb.* 369.  
Pianta leguminosa brasiliæna, phaseoli flore, flore purpureo maximo. *Breyn. cent.* 78. t. 32.  
*Habitat in Brasilia.*
3. CLITORIA foliis ternatis, calycibus campanulatis *virginiana*, geminis. *Gron. virg.* 83.  
Clitorius trifolius, flore minore cæruleo. *Dill. elth.* 90. t. 76. f. 87.  
*Habitat in Virginia.*
4. CLITORIA foliis ternatis, calycibus cylindricis. *mariana*.  
Clitorius marianus trifolius subtus glaucus. *Pet. fice.* 243.  
*Habitat in America septentrionali.*

GLYCINE.

1. GLYCINE foliis pinnatis ovato-lanceolatis. *Hort. nps.* Apios. 227.  
Glycine radice tuberosa. *Hort. cliff.* 361. *Roy. lugdb.* 391. *Gron. virg.* 85.  
Apios americana. *Corn. canad.* 200. t. 201. *Stiff. bot.* 29. t. 29.  
Astragalus perennis spicatus americanus, scandens caulis, radice tuberosa. *Morif. hist.* 2. p. 102. f. 2. t. 9. f. 1.  
*Habitat in Virginia.* &
2. GLYCINE foliis pinnatis, caule perenni. *Hort. cliff. frutescent.* 361. *Roy. lugdb.* 391.  
Phaseoloides frutescens caroliniana, foliis pinnatis, floribus cæruleis conglomeratis. *Hort. angl.* 55. t. 15.  
*Habitat in Carolina.*
3. GLYCINE foliis pinnatis conjugatis: pinnis ovatis *Abrus*. oblongis obtusis. *Fl. zeyl.* 284. \* *Hort. nps.* 228.  
Phaseolus arborescens alatus & volubilis major orientalis,  
B b b lis,

lis, fructu coccineo: hilo nigro notato. *Pluk. alm.* 294. t. 214. f. 5.

*Pisum Indicum minus coccineum. Bank. pin.* 213.

*Abrus. Vest. aegypt.* 25. *Hort. cliff.* 488.

*Konni. Rheed. mal.* 8. p. 71. t. 39.

*Habitat in Indiis, Ægypto.* 2, b.

*congesta.* 4. GLYCINE foliis ternatis tomentosis, racemis axillaribus brevissimis, leguminibus dispermis.

*Ononis caule volubili. Gron. virg.* 81.

*Anonis phaseoloides scandens, floribus flavis sessilibus.*

*Dill. elth.* 30. t. 26. f. 29.

*Habitat in Virginia.* 2

*comosa.* 5. GLYCINE foliis ternatis hirsutis, racemis lateralibus. *Glycine foliis ternatis. Gron. virg.* 85.

*Phaseolus marianus scandens, floribus comosis. Pet. mus.* 453.

*Habitat in Virginia madidis umbrosis.*

*juvencica.* 6. GLYCINE foliis ternatis, caule villoso, petiolis hirsutis, bracteis lanceolatis minimis.

*Habitat in India.*

*Caulis volubilis, magnitudine Phaseoli vulgaris, adpersus pilis flavis retrorsum spectantibus. Folia magnitudine & figura Phaseoli, at pedicelli flavi pilis densis. Stipulae ad exortum petiolorum ovali-oblongae; at vero ad exortum petiolorum subulatae. Pedunculi foliariis, longitudine foliorum, terminati Spica orato-oblonga, densa, ex floribus nutantibus, violaceis, interstinctis Bracteis minutissimis.*

*bracteata.* 7. GLYCINE foliis ternatis nudiusculis, caule piloso, racemis pendulis, bracteis ovatis.

*Glycine foliis ternatis, pedicellis bracteatis. Gron. virg.* 173.

*Habitat in Virginia madidis, umbrosis.*

*Racemi nutantes. Stipulae ovatae, erectae. Caulis retrorsum griseo-pilosus. Flores Viciae Craccae dictae; Ale & Carina albæ, Vexillo pallide violaceo. Legumina compressa, semiorbiculata, Pedunculis elongatis dependentia.*

*bituminosa.* 8. GLYCINE foliis ternatis, floribus racemosis, leguminibus tumidis villosis.

*Phaseolus africanus hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo. Herm. lugdb.* 492. t. 493.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

PHA-

PHACA.

1. PHACA caulescens erecta pilosa, leguminibus tereti-  
cymbiformibus. *batica.*

Phaca leguminibus rectis. *Roy. lugdb.* 390.

Astragalus bæticus lanuginosus, radice amplissima.

*Bauh. pin.* 351.

Astragalus bæticus. *Clus. hist.* 2. p. 234.

*Habitat in Hispania, Lusitania.*

2. PHACA caulescens erecta glabra, leguminibus semi-  
ovatis. *alpina.*

*lll. 228.*

Astragaloides elatior erecta, vicæ foliis, floribus luteis,  
siliquis pendulis. *Amm. ruth.* 148.

*Habitat in Lapponia, Sibiria.*

3. PHACA acaulis, foliis pinnatis: pinnis digitatis. *Sibirica.*

Astragaloides incana non ramosa, floribus carneis.

*Amm. ruth.* 150. t. 19. f. 2.

Astragaloides hirsuta minor, non ramosa, floribus pur-  
pureiscentibus. *Amm. ruth.* 249. t. 19. f. 1.

*Habitat in Alpibus Sibiricis.*

ASTRAGALUS.

\* *Caulibus foliosis erectis, nec prostratis.*

1. ASTRAGALUS caulescens, spicis cylindricis sub-  
sessilibus, calycibus leguminibusque lanatis. *alopecuroides*

Astragalus capitulis oblongis sessilibus, calycibus & le-  
guminibus lanatis. *Hort. cliff.* 361. \* *Amæn. acad.*

2. p. 359. \* *Roy. lugdb.* 391.

Astragalus alpinus procerior alopecuroides. *Tournef.*  
*inst.* 416.

*Habitat in Sibiria, Hispania.*

2. ASTRAGALUS caulescens erectus, floribus glo-  
meratis subsessilibus ex omnibus axillis foliaceis. *christianæ.*

Astragalus orientalis maximus incanus erectus, caule ab  
imo ad summum florido. *Tournef. cor.* 29. *itin.* 2.  
p. 254. t. 254.

Astragalus dioec. vulgo Christiana radix. *Dalech. app.*  
26.

*Habitat in Oriente.*

Flores fere totum caulem cooperiunt.

3. ASTRAGALUS caulescens, capitulis globosis: pe-  
dunculis longissimis, foliolis emarginatis. *capitatus.*

360. *Roy. lugdb.* 391.

B b b 2

Astra-

*Astragalus orientalis villosissimus*, capitulis rotundioribus, floribus purpureis. *Tournef. cor.* 29?

*Habitat in Oriente.*

*pilosus.*

4. **ASTRAGALUS** caulescens erectus pilosus, floribus spicatis, leguminibus subulatis pilosis.

*Astragalus caulescens erectus*, leguminibus erectiusculis pilosis subulatis: acumine erecto. *Hort. nps.* 226. n. 4.

*Astragalus villosus erectus spicatus*, floribus flavescentibus. *Amm. ruth.* 166.

*Cicer montanum lanuginosum erectum.* *Banh. pin.* 347. *prodr.* 148.

*Habitat in Sibiria, Thuringia, Valesia.*

*Hedysaroides*

5. **ASTRAGALUS** caulescens erectus, stipulis vaginalibus.

*Astragalus caule erecto ramoso, spica purpurea nitente terminato.* *Hall. helv.* 567. t. 14. n. 6.

*Habitat in Sibiria, Helvetia.* 2

*Facies distincta ab Astragalis.* Flores *Hedysari*. Racemus ex singulis alis latus. Stipulae vaginae instar caulem involvunt supra folium. Fructum neque ego vidi.

*sulcatus.*

6. **ASTRAGALUS** caulescens erectus, caule glabro sulcato.

*Habitat in Sibiria.* 2

*Planta alta, stricta, glaberrima, Caule sulcato. Folia ex oppositionibus 8. s. 9. cum impari pinnata: foliolis glabris, angusto-lanceolatis. Pedunculi erecti, stricti, foliis triplo longiores. Flores in spicam laxam sparsi, violacei, parvi, calyce brevissimo. Legumina oblonga, erecta.*

*galegiformis.*

7. **ASTRAGALUS** caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris utrinque mucronatis.

*Astragalus caule erecto paniculato, pedunculis folio longioribus, floribus sparsis.* *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugab.* 391.

*Astragalus sylvaticus montanus procerior, albo flore, siliqua brevi glabra, semine luteo.* *Amm. ruth.* 162.

*Habitat in Sibiria.*

*Caulis bipedalis, strictissimus, glaber. Folia pinnata ex 25 ad 31 foliolis: petiolo basi tumido. Flores racemosi, penduli, flavo-albicantes. Legumina glabra, breviter, triquetra, acuta, intra calycem pedicellata. Semina utrinque 2.*

8. A-



8. **ASTRAGALUS** caulescens erectiusculus, floribus *uliginosus*.  
 spicatis, leguminibus erectiusculis nudis tumidis tere-  
 ti-depressis: mucrone reflexo. *Hort. upf.* 226. \* n. 3.  
*Habitat in Sibiria pratis subhumidis. D. Gmelin.* &  
*Carinae floris apex violaceus.*
9. **ASTRAGALUS** caulescens erectus laevis, peduncu- *carolinianus*.  
 lis spicatis, leguminibus ovato-cylindricis stylo acu-  
 minatis.  
*Astragalus floribus racemosis, pedunculis longitudine fo-  
 liorum, caule erecto, calycibus glabris. Roy. lugdb.*  
 391.  
*Astragalus procerior non repens, flore viridi-flavescenti-  
 te. Dill. elth.* 45. t. 39. f. 45.  
*Habitat in Carolina.* &  
 \* *Caulibus foliosis, diffusis.*
10. **ASTRAGALUS** caulescens diffusus, leguminibus *canadensis*.  
 subcylindricis mucronatis, foliolis subtus subvillosis.  
*Astragalus canadensis, flore viridi flavescente. Tournef.*  
*inst.* 416. *conf. Dill. elth.* 46.  
*Habitat in Virginia, Canada.* &  
*Foliola subtus tenuissime tomentosa sunt.*
11. **ASTRAGALUS** caulescens prostratus, leguminibus *Cicer*.  
 subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Hort. upf.* 226. n. 2.  
*Astragalus leguminibus subglobosis, floribus spicatis, cau-  
 le erecto. Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.  
*Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis, majus. Bauh.*  
*pin.* 347.  
*Cicer sylvestre. Cam. epit.* 205.  
*Habitat in Austria, Helvetia, Italia.* &  
*Foliola oblonga, sublanceolata sunt.*
12. **ASTRAGALUS** caulescens erecto-patulus: folio- *microphyllus*  
 lis ovalibus, calycibus tumidiusculis, leguminibus sub-  
 rotundis.  
*Habitat in Sibiria.*  
*Habitus A. Ciceris dicti, at quadruplo minor. Caulis*  
*erectus, flexuosus, pedalis, non glaber. Rami paten-*  
*tes, breviores. Folia pinnata: foliolis 13 f. 15, ovali-*  
*bus, obtusis, interdum emarginatis. Stipulae subulatae,*  
*minimae. Pedunculi solitarii, foliis longiores, superne*  
*floribus horizontalibus instructi. Calyces glabri, sub-*  
*rotundi, parum ventricosi, pilis raris vix conspicuis*  
*adspersi. Corollae flavae, calyce duplo longiores. Legu-*  
*mina subrotunda, inflata, villosa.*

- glycophyllos.* 13. **ASTRAGALUS** caulescens prostratus, leguminibus  
 subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo lon-  
 gioribus.  
*Astragalus* leguminibus lunatis biventricosis, caulibus  
 procumbentibus. *Hort. cliff.* 362. *Fl. suec.* 591. *Roy.*  
*lugdb.* 392.  
*Astragalus* luteus perennis procumbens vulgaris. *Morif.*  
*bist.* 2. p. 107.  
*Glycyrrhiza* sylvestris, floribus luteo-pallescentibus.  
*Bauh. pin.* 352.  
*Habitat in Europæ nemoribus.* 2
- harmefus.* 14. **ASTRAGALUS** caulescens procumbens, legumi-  
 nibus subulatis recurvatis glabris. *Hort. ups.* 226.  
*Sauv. mousp.* 237. *n. 5.*  
*Astragalus* leguminibus pendulis recurvis falcatis, *Hort.*  
*cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.  
*Astragalus* monspelianus. *Clus. bist.* 2. p. 234.  
*Securidaca* lutea minor, corniculis recurvis. *Bauh. pin.*  
 349.  
*Habitat Messanæ, Monspelli.* ☉
- contortuplicatus.* 15. **ASTRAGALUS** caulescens procumbens, legumi-  
 nibus contortuplicatis canaliculatis villotis.  
*Astragalus* acaulis, scapo foliis brevior, leguminibus  
 subulatis canaliculatis retortis hirsutis. *Hort. ups.* 227.  
*Astragalus* repens, siliquis undulatis. *Buxb. cent.* 3. p.  
 22. t. 39.  
*Astragalus* hirsutus procumbens, vicæ foliis cordatis,  
 siliquis incurvis. *Amm. ruth.* 164.  
*Habitat in Sibiria.* ☉  
*Mire variat ex solo quoad magnitudinem & staturam.*
- legitimus.* 16. **ASTRAGALUS** caulescens procumbens, spicis pe-  
 duncularis, leguminibus prismaticis rectis triquetris a-  
 pice uncinatis. *Hort. ups.* 225. *n. 1.*  
*Astragalus* caule erecto, floribus spicatis, leguminibus  
 oblongis acinaciformibus: apice recurvo. *Roy. lugdb.*  
 391.  
*Astragalus* annuus, foliis & siliquis longioribus glabris  
 ad foliorum ortum communi pediculo innixis. *Pluk.*  
*alm.* 60.  
*Astragalus* luteus annuus bæticus maritimus rectus al-  
 ter. *Morif. bist.* 2. p. 108. f. 2. t. 9. f. 11.  
*Securidaca* sicula, siliquis foliaceis. *Bocc. sic.* . . .  
*Raj. bist.* 935.  
*Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania.* ☉

17. ASTRAGALUS caulescens diffusus, capitulis subsessilibus lateralibus, leguminibus erectis subulatis acuminis reflexis. *Hort. cliff.* 361.

*Astragalus annuus*, foliis & siliquis hirsutis: plurimis in foliorum alis sessilibus. *Pluk. alm.* 60. t. 79. f. 3.

*Ornithopodio affinis hirsuta fructu stellato.* *Baub. pin.* 350.

*Vicia sesamea apula.* *Col. ecphr.* 1 p. 303. t. 301.

*Habitat in G. Narbonensi, Italia.* ☉

18. ASTRAGALUS caulescens procumbens, leguminibus capitatis cordatis acutis reflexis complicatis.

*Astragalus siliquis cordatis acutis pendulis: lateribus coniventibus.* *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.

*Astragalus hispanicus*, siliqua epiglottidi similis, flore purpureo, major, *Herm. lugdb.* 74. t. 75.

*Astragaloides incana*, flore purpureo lentis siliqua. *Barr. ic.* 537. f. 1.

*Habitat in Hispania.* ☉

19. ASTRAGALUS caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomentosis.

*Astragalus syriacus hirsutus.* *Baub. pin.* 351?

*Astragalus syriacus.* *Lob. ic.* 79?

*Astragalus syriacus hirsutus*, magno flore. *Morif. hist.* 2. p. 96. t. 8. f. 3?

*Habitat in Sibiria.* ☿

*Planta refert figuram anthorum, sed altior est; facie proprie accedit ad A. arenarium, a quo differt Planta triplo majore, minus incana; Floribus numerosis capitato-spicatis, nec racemosis; Floribus triplo majoribus magis reflexis. Sunt etiam Folia lineari-lanceolata. Legumina oblonga, pilosa, erecta.*

20. ASTRAGALUS subcaulescens procumbens, floribus subracemosis erectis, foliis tomentosis.

*Astragalus pedunculis folia villosa æquantibus, floribus erectis, caulibus procumbentibus.* *It. scan.* 108. \*

*Astragalus incanus parvus nostras.* *Pluk. alm.* 59. *Raj. angl.* 3. p. 326. t. 12. f. 3. mala.

*Glaux montana purpurea nostras.* *Raj. hist.* 939.

*Habitat in Angliæ, Scaniæ arena mobili.* ☿

21. ASTRAGALUS caulescens diffusus, capitulis pedunculatis imbricatis ovatis, floribus erectis.

*Ciceri sylvestri minori affinis.* *Baub. pin.* 347.

B b b 4

Glaux

*Glaux diofcoridis*, *Clus. hift. 2. p. 240. t. 241.*

*Habitat in Hispania.*

*Radix lignofa.* Caules *spithamei*, plurimi, *superne magis subvillofi*. Folia *pinnata*: foliolis 21. f. 23, minimis, ovali-oblongis, *subtus pilis albis adfperfis*. Pedunculi *ex fummis foliorum alis*, foliis *fapius breviores*, pilofi. Capitulum *Trifolii facie*, ovatum, calycibus ante & post *florefcentiam apicibus nigris*. Corollæ *erectæ*, *acuminatæ*, *vexilla fere duplo longiores*.

*Onobrychis.* 22. ASTRAGALUS caulefcens diffufus, pedunculis *fpicatis*, *vexillis flore duplo longioribus*.

*Onobrychis fpicata*, flore *purpureo*. *Bauh. pin. 350.*

*Onobrychis 1.* *Clus. hift. 2. p. 238.*

*Habitat in Austria.* 2

*alpinus.*

23. ASTRAGALUS subcaulefcens procumbens, floribus *pendulis racemofis*, leguminibus utrinque *acutis pilofis*.

*Astragalus pedunculis folio longioribus*, floribus *laxe fpicatis pendulis*, *Hort. cliff. 362. Fl. fucc. 592. Roy. lugdb. 392.*

*Astragalus alpinus minimus.* *Fl. lapp. 267. t. 9. f. 1.*

*Astragalus alpinus*, folio *viciæ*. *Scheuch. alp. 509. f. 7.*

*Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis.* 2

\* *Scapo nudo, absque caule foliofo.*

*montanus.*

24. ASTRAGALUS subacaulos, scapis folio longioribus, floribus *laxe fpicatis erectis*. *Roy lugdb. 392.*

*Astragalus quidam montanus vel Onobrychis aliis.* *Bauh. hift. 2. p. 240*

*Onobrychis floribus viciæ majoribus cæruleo-purpureifcentibus* f. foliis *tragacanthæ*. *Bauh. pin. 351.*

*Onobrychis IV.* *Clus. hift. 2. p. 240.*

*Habitat in Helvetia, Vallefia.* 2

*Differt ab A. alpino, quod caulis vix ac ne vix bafis ramofus: quodque flores rubicundi, erecti; nec penduli.*

*vesicarius.*

25. ASTRAGALUS acaulos, scapis folio longioribus *laxe fpicatis*, calycibus leguminibusque *inflatis hirsutis*.

*Astragalus alpinus*, *tragacanthæ folio*, *vesicarius.* *Tournef. infl. 417. Magn. hort. 27. t. 27. Raj. hift. 454.*

*Habitat in Delphinatu.* 2

*physades.*

26. ASTRAGALUS acaulos, scapis folia æquantibus, leguminibus *inflatis subglobosis nudis*.

Astra-

*Astragalus acaulos*, leguminibus inflatis subglobosis.

*Amœn. acad.* 2. p. 359. \*

*Habitat in* Sibiria.

*Bractææ villosæ*; *Fructus Coluteæ*, sed magis globosus.

27. *ASTRAGALUS acaulos*, scapo erecto foliis longioribus, leguminibus subulatis inflatis villosis erectis. *Hort. ups.* 226. \* *uralensis.*

*Astragalus non ramosus villosus & inœanus spicatus*, floribus purpuro-violaceis. *Amm. ruth.* 167.

*Habitat in* Sibiria. 2

28. *ASTRAGALUS acaulis*, scapis declinatis longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. *Hort. ups.* 227. *Sauv. monsp.* 238. *monspessulans.*

*Astragalus monspessulanus.* *Baub. hist.* 2. p. 338.

*Astragalus purpureus perennis monspeliensis.* *Morif. hist.* 2. p. 106.

*Habitat* Monspelii. 2

29. *ASTRAGALUS acaulos hirsutus*, scapis erectis spicatis, foliolis ovatis obtusis. *grandiflorus.*

*Astragalus, tragacanthæ folio*, non ramosus, floribus luteis. *Amm. ruth.* 168?

*Habitat in* Sibiria *D. Gmelin.* 2

*Folia spithamea: foliolis 17, ovalibus, obtusis, hirsutis præsertim subtus. Scapi crassi, pilosi, terminati Spica crassiuscula. Calyces hirsuti. Corollæ magna, flavæ.*

30. *ASTRAGALUS acaulos*, calycibus leguminibusque villosis, foliolis acutis. *It. æl.* 50. *Fl. succ.* 593. \* *campestris.*

*Astragalus acaulos*, foliis peracutis, calyce & fructu villosi. *Hall. helv.* 567. t. 13.

*Astragalus perennis supinus*, foliis & siliquis hispidis, flore luteo. *Buxb. Hall.* 32.

*Habitat in* Oelandia, Germania, Helvetia. 2

31. *ASTRAGALUS subacaulos*, scapis subbifloris, leguminibus hamatis subulatis bicarinatis. *trimestris.*

*Phaca leguminibus arcuatis.* *Roy. lugdb.* 390.

*Habitat in* Ægypto. ☉

*Planta tenera. Caules vix ulli aut breves. Scapi e radice s. pedunculi e caule, pauciflori subbiflori. Flores flavi. Legumen subulatum, in hamum flexum, compressum, externæ duobus angulis compressis carinatum.*

\* *Caule lignoso.**Tragacanthoides.*

32. ASTRAGALUS subacaulos, floribus radicalibus numerosis subsessilibus.

Astragalus acaulos, flore luteo. *Tournef. cor.* 28. *Buxb. cent.* 3. p. 21. t. 38. f. 2Astragalus repens, barbæ jovis foliis, acaulos ferme polyanthos. *Amm. ruth.* 170.*Habitat in* Sibiria, Armenia, &

Caulis aut Scapus nullus, sed radicis ramis supra terram diffusi, &amp; depressi, vestiti foliis pinnatis, parvis, villosis. Flores aggregati ad radicem, sessiles. Calyces hirsuti dentibus nigricantibus. Corollæ flavæ. Legumina subrotunda, levia.

*Tragacantha*

33. ASTRAGALUS caudice arborecente; petiolis spinulentis.

Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. *Pluk. alm.* 60.Tragacantha. *Bauh. pin.* 388. *Cam. epit.* 446. *Hort. cliff.* 361. *Mat. med.* 348.

- c. Tragacanthæ affinis lanuginosa, f. Poterium.
- Bauh. pin.*
- 388.

Tragacantha altera, Poterium forte, *Clus. hist.* 108.*Habitat in* littore Massiliensi, Æthna, Olympo. b

## BISERRULA.

*Polecinus.*

1. BISERRULA.
- Hort. cliff.*
- 361.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, siliquis utrinque serræ similibus. *Morif. hist.* 2. p. 107. f. 2. t. 9. f. 6.Securidaca siliquis planis utrinque dentatis. *Bauh. pin.* 349.Securidaca peregrina. *Clus. hist.* 2. p. 238.*Habitat in* Sicilia, Hispania, Galloprovincia. ☉

## PSORALEA.

*pinnatis.*

1. PSORALEA foliis pinnatis, floribus axillaribus.
- Hort. ups.*
225. \*

Psoralea foliis pinnatis: foliolis linearibus acuminatis. *Roy. lugdb.* 373.Dorycnium caule fruticoso, foliis pinnatis: foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 370.Spartium africanum. *Riv. tetr.* 5.Genitæ affinis arbor africana monospermos, flore cæruleo, foliis pinnatis. *Herm. lugdb.* 272. t. 273.

Ha-

*Habitat in Æthiopia. 5*

*Pedunculi axillares, solitarii, eglumes, bisfuri.*

2. PSORALEA foliis ternatis, foliolis cuneiformibus re-  
curvo-mucronatis.

*Psoralea foliis ternis: foliolis cuneiformibus triquetris aculeatis. Roy. lugd. 373.*

*Genista Spartium africanum trifolium, floribus cæruleis, foliis minimis in spinulam desinentibus. Raj. dendr. 104.*

*Habitat in Æthiopia. 5*

*Pedunculi axillares, plures, glumosi.*

3. PSORALEA foliis inferioribus ternatis; superioribus tenuifolia  
simplicibus lanceolato-subulatis.

*Habitat in Æthiopia. 5*

*Pedunculi axillares, solitarii, glumosi.*

4. PSORALEA foliis omnibus ternatis: pedunculis spi-  
bituminosa  
catis folio longioribus. *Hort. ups. 225.*

*Psoralea trifolia. B. Juss. act. 1744. p. 381.*

*Trifolium capitulis subrotundis, calycibus ventricosiss, caule arborecente. Hort. cliff. 373.*

*Trifolium bitumen redolens. Bauh. pin. 327.*

*Trifolium bituminosum. Dod. pempt. 566.*

5. *Trifolium bitumen redolens angustifolium. Boerb. lugd. 2. p. 32.*

*Trifolium bitaminosum inodorum. Best. syst. est. t. 11, f. 2.*

*Habitat in Siciliæ, Italiæ, Narbonæ collibus maritimis. 5*

*Varietas 3. differt Foliis radicalibus numerosis; Radice bienni; Caule minore, angustiore, magis herbaceo.*

5. PSORALEA foliis ternatis: foliolis subrotundis an-  
mericana  
gulatis, spicis axillaribus pedunculatis.

*Trifolium americanum. Lob. ic. 2. p. 31. Dod. pempt. 567. Bauh. pin. 327.*

*Habitat in America?*

*Caules diffusi, herbacei, punctis glandulosis adpersi.*

*Folia ternata: intermedio majore, petiolato, subrotunda, obtusissima, obsolete dentata aut angulata, adpersa punctis glandulosis, ut in congeneribus. Spicæ axillares, oblongæ, pedunculis longitudine foliorum. Lob. & Dod. figura bonæ sunt. Hoc ævo mihi non visq in Hortis Europæis.*

- Corylifolia.* 6. PSORALEA foliis simplicibus ovatis. *Hort. ups.* 225.  
 Psoralea folio integro subrotundo. *Juss. act.* 1744. p. 382.  
 Dorycnium foliis simplicibus ovatis. *Roy. lugdb.* 389.  
 Loto affinis coryli folio. *Dodart. act.* 4. p. 289. t. 289.  
*Pluk. alm.* 227. t. 96. f. 5.  
*Habitat in India.* ☉
- pentaphylla.* 7. PSORALEA foliis digitato-quinatis: foliolis inæqualibus. *Hort. ups.* 225.  
 Psoralea pentaphylla, radice crassa. *B. Juss. act.* 1744. p. 381. t. 17.  
*Habitat in Mexico vel Malabar.* 2
- Dalea.* 8. PSORALEA foliis pinnatis, spicis terminalibus.  
 Dalea. *Hort. cliff.* 363. t. 22. \*  
*Habitat in America.* ☉  
 Foliola subtus punctis glandulosis adspersa. Spica densa ut in *Plantagine*, alba aut cærulea.

## EBENUS.

- cretica.* 1. EBENUS.  
 Ebenus cretica. *Alp. exot.* 279. t. 278. *Pon. ital.* 128.  
 Trifolium spicis ovatis villosis, caule fruticoso. *Roy. lugdb.* 380.  
 Anthyllis fruticosa, foliolis ternatis ac quinatis lanceolatis tomentosis. *Sauv. meth.* 237.  
 Cytisus incanus creticus. *Baub. pin.* 390.  
 Barba jovis cytisi folio, flore rubello. *Barr. rar.* 1389. t. 377. f. 913.  
 Loto affinis alata, folio & facie pentaphylloides fruticosi, floribus in spicam longiorem positis. *Pluk. alm.* 227. t. 67. f. 5.  
*Habitat in Creta.*  
 Bractææ inter flores in spica distinguunt genus abunde a Trifoliis.

## TRIFOLIUM.

- \* Meliloti leguminibus nudis polyspermis.
- M. cærulea.* 1. TRIFOLIUM spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 381. *luy.* 223.  
 Lotus hortensis odorata. *Baub. pin.* 330.  
 Lotus sylvestris. *Cam. epit.* 724.  
*Habitat in Bohemia, Lybia.*

2. TRI-



2. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis mono- *M. indica.*  
spermis, caule erecto. *Hort. xps.* 223.

Trifolium erectum, caule teretiusculo, pedunculis compresso-angulatis, pericarpis racemosis rotundis rugosis nudiusculis monospermis. *Fl. zeyl.* 552. \*

Melilotus lutea indiae orientalis erecta, folliculis rotundis parvis *Pluk. alm.* 246 t. 45. f. 4.

- β. Melilotus humilis erecta, floribus exiguis odoratis albis. *Pluk. alm.* 247. t. 45. f. 5.

*Habitat in India, Africa.* ☉

3. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- *M. polonica*  
mis lanceolatis, caule erecto.

*Habitat in Polonia.* ☉

*Differt a T. Meliloti officinali* Caule omnino tereti; Foliiis minoribus, acuminatis, superne acute serratis.

Racemo floribus rarissimis longiusque pedicellatis. Pedunculis teretibus nec sulcatis. Florum vexillis replicatis, nec alis extrorsum marginibus longitudinaliter conniventibus. Leguminibus dispermis, parum rugosis, lanceolato-acuminatis, longioribus. Statura & odor conveniunt.

4. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- *M. officinalis*  
mis, caule erecto. *Hort. cliff.* 376. *Hort. xps.* 223.

*Fl. succ.* 619. *Mat. med.* 355. *Roy. lugab.* 223.

*Dalib. parif.* 225.

Trifolium odoratum s. Melilotus. *Dod. pempt.* 567.

Melilotus officinarum germaniae. *Bauh. pin.* 331.

- γ. Melilotus officinarum germaniae, flore albo. *Tournef. inst.* 407.

Lotus sylvestris, flore albo. *Tabern. hist.* 893.

*Habitat in Europæ campestribus.* ☉. ♂

5. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- *M. italica.*  
mis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris.

Melilotus italica, folliculis rotundis. *Bauh. pin.* 331.

Melilotus italica. *Cam. hort.* 99. t. 29.

*Habitat in Italia.* ☉

6. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis disper- *M. cretica.*  
mis membranaceis, caule erectiusculo.

Trifolium peltatum creticum. *Bauh. pin.* 352. *prodr.*

142. t. 142.

*Habitat in Creta.* ☉

*Habitus Meliloti italicae, foliis crassis, vix serratis carnosiss, inodoris, obtusis.*

7. TRI-

*M. corniculata.*

7. **TRIFOLIUM** floribus spicatis, leguminibus nudis mucronatis falcatis declinatis. *Hort. cliff.* 376. \* *Roy. lugdb.* 381. *Gort. gelr.* 435.

Melilotus, corniculis reflexis, major. *Bauh. pin.* 331.

Melilotus lutea major, corniculis reflexis ex eodem centro ortis. *Morif. hist.* 2. p. 162. f. 2. t. 16. f. 11.

Trifolium corniculatum 2. *Dod. pempt.* 573.

*Habitat in* Gargano, Apuliæ.

*St. ornithopodioides.*

8. **TRIFOLIUM** leguminibus nudis octospermis subternis calyce duplo longioribus, caulibus declinatis.

Medicago leguminibus ternatis erectis recurvis descendentibus, pedunculo communi. *Hort. cliff.* 376.

Trifolium filiquosum, loto affine, filiquis ornithopodii. *Pluk. alm.* 375. t. 68. f. 1.

Fœnu græcum humile repens, ornithopodii filiquis brevibus erectis. *Raj. angl.* 3. p. 331. t. 14. f. 1.

*Habitat in* Anglia, Gallia. ☉

\* Lotoidea leguminibus testis polyspermis.

*Lupinaster.*

9. **TRIFOLIUM** capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis. *Hort. ups.* 223.

Lupinaster. *Buxb. act.* 2. p. 345. t. 20.

Lupinaster floribus purpureis & albis, filiquis minoribus.

*Amm. rub.* 143. 144.

*Habitat in* Sibiria. ♀

*reflexum.*

10. **TRIFOLIUM** capitulis fructiferis reflexis, leguminibus trispermis.

Trifolium leguminibus polyspermis, foliolis obverse ovatis denticulatis, floribus tetrapetalis, capitulis fructiferis reflexis. *Gron. virg.* 84.

Trifolium montano simile virginianum, floribus amœne purpureis amplioribus & magis patulis summo caule glomeratis per maturitatem reflexis. *Pluk. mant.* 285.

*Habitat in* Virginia.

*hybridum.*

11. **TRIFOLIUM** capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente.

Trifolium pratense corymbiferum. *Mich. gen.* 28. t. 25. f. 2. 6.

- β. Trifolium caule fistuloso erecto, capitulis subglobosis, foliolis obverse ovatis ferratis. *Dalib. parif.* 226.

Trifolium orientale altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Vaill. parif.* 195. t. 22. f. 5.

Tri

Trifolium flore albo. *Riv. tetr.*

*Habitat in Europæ Cultis.*

12. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus *repens*, tetraspermis, caule repente.

Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 375. *Fl. succ.* 612. *Mat. med.* 354. *Roy. lugdb.* 378. *Gron. virg.* 85. *Dalib. paris.* 224.

Trifolium pratense album. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium repens. *Riv. tetr.* 17. *Fl. lapp.* 274.

*Habitat in Europæ pascuis.* 2

13. TRIFOLIUM capitulis umbellato-globosis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, leguminibus tetraspermis. *Roy. lugdb.* 379.

Lagopus americanus, floribus majoribus comosis. *Pet. mss.* 214.

*Habitat in America.*

14. TRIFOLIUM scapo nudo, leguminibus dispermis *alpinum* pendulis, foliis lineari-lanceolatis.

Trifolium scapo nudo simplicissimo, foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 499. *Sauv. monsp.* 185.

Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci. *Bauh. pin.* 328. *prodr.* 143.

Trifolium angustifolium alpinum. *Pon. bald.* 340. s. 340.

Anonis acaulis, floribus longissimis, foliis non serratis. *Hall. belv.* 588.

*Habitat in Alpibus* Italicis, Helveticis, Pyrenæis, Baldo. 2

\* *Lagopoda calycibus villosis.*

15. TRIFOLIUM capitulis villosis quinquefloris, involucri centrali reflexo rigido fructum involvente. *subterraneum*

*Hort. cliff.* 374. \* *Hort. ups.* 222. *Roy. lugdb.* 379. *Dalib. paris.* 224.

Trifolium blesense. *Dodart. mem.* 4. p. 313.

Trifolium album tricoccum subterraneum gastonium reticulatum. *Morif. hist.* 2. p. 132. f. 2. t. 14. f. 5.

Trifolium pratense supinum cathobleps. *Barr. ic.* 881.

*Habitat in Gallia, Italia.* ©

16. TRIFOLIUM capitulis villosis globosis, calycibus *globosum* superioribus flosculo destitutis. *Hort. cliff.* 374. \* *Roy. lugdb.* 379.

Tri-

*Trifolium globosum repens. Baub. pin. 329. prodr. 143.*

*Trifolium glomerulis personatæ cherleri. Baub. hist. 2. p. 377.*

*Lagopus minor supinus, molli & compresso capite. Barr. ic. 859.*

β. *Trifolium capitulis villosis globosis, calycibus omnibus fertilibus tomento connexis. Roy. lugdb. 379.*

*Habitat* Monspelii.

*rubens.*

17. **TRIFOLIUM** spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis serrulatis. *Hort. cliff. 375. Roy. lugdb. 380. Sauv. monsp. 184.*

*Trifolium montanum, spica longissima rubente. Baub. pin. 328.*

*Lagopus major alter. Dod. pempt. 578.*

*Habitat in Italia, G. Narbonensi, Helvetia. ☉*

*pratense.*

18. **TRIFOLIUM** spicis subvillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis.

*Trifolium spicis villosis, caule distuto, foliolis integerrimis. Hort. cliff. 375. Fl. succ. 612. Roy. lugdb. 580. Dalib. parif. 222.*

*Trifolium pratense, flore monopetalo. T. Fl. lapp. 273.*

*Trifolium pratense purpureum. Baub. pin. 327.*

*Trifolium pratense. Cam. epit. 582.*

*Habitat in Europæ graminosis. &*

*Spica sessilis inter Folia duo, opposita, sessilia, quorum Stipulæ membranaceæ, dilatata, calycem quasi communem constituunt.*

*squarrosum.* 19. **TRIFOLIUM** spicis subpilosis, calycum infimo dente longissimo reflexo, caule herbaceo.

*Trifolium purpureum lagopoides hirsutum annuum rotundifolium, spica dilute rubente. Morif. hist. 2. p. 140. f. 2. t. 13. f. 1.*

*Trifolium angustifolium hispanicum, spica dilute rubente. Baub. pin. 329.*

*Habitat in Hispania. ☉*

*Habitus Trifolii pratensis. Folia subpilosa, lanceolata aut ovalia, emarginata. Spicæ terminales, ovatae; calyces parum villosi, 5-dentati: dentibus nudis, setaceis: 4 erectis; 5:0 seu infimo reliquis triplo majore, reflexo, unde Spica squarrosa & uncinata valde existit.*

*lappaceum.* 20. **TRIFOLIUM** spicis globosis, calycibus setis rigidis obvallatis, caule erecto.

Tri-

Trifolium globosum f. capitulo lagopi rotundiore. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143.

Trifolium capitulo glomerato. rigido. *Bauh. hist.* 2. p. 378.

*Habitat* Monspelii.

21. TRIFOLIUM spicis villosis oblongis obtusis aphyllis, foliolis subrotundis. *Roy. lngdb.* 380. *Hort. nps.* 222. *Dalib. paris.* 225.

Trifolium spica rotunda rubra. *Bauh. pin.* 328. *subrod.*

Trifolium album incarnatum spicatum f. Lagopus maximus. *Bauh. hist.* 2. p. 376.

Lagopus maximum, folio & facie trifolii pratensis. *Lob. ic.* 39.

Trifolium alopecurum latifolium, spica longa. *Barr. ic.* 697.

*Habitat* in Italia. ☉

22. TRIFOLIUM spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 375. *Hort. nps.* 222. *Roy. lngdb.* 379.

Trifolium montanum angustissimum spicatum. *Bauh. pin.* 328.

Trifolium alopecurum angustifolium elatius. *Barr. ic.* 698.

*Habitat* in G. Narbonensi, Italia. ☉

23. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus. *Hort. cliff.* 375. *Fl. succ.* 616. *Roy. lngdb.* 379. *Dalib. paris.* 225.

Trifolium arvense humile spicatum f. Lagopus. *Bauh. pin.* 328.

Lagopus. *Fuchs. hist.* 494. *Cam. epit.* 724.

*Habitat* in Europa, America septentrionali. ☉

24. TRIFOLIUM spicis pilosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis cuneiformibus. *stellatum.*

Trifolium spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis lanceolatis patulis. *Hort. cliff.* 375. \* *Roy. lngdb.* 738. *Sauv. monsp.* 184.

Trifolium stellatum. *Bauh. pin.* 329. *prodr.* 143.

Lagopus minor erectus, capite globoso stellato. *Barr. ic.* 860. & 755.

*Habitat* in Sicilia, Italia, G. Narbonensi. ☉

25. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus patulis: *la-clypeatum.*  
G c c cincia

cinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *Hort. cliff.* 373. \* *Roy. lugdb.* 377. *up.* 722

*Trifolium clypeatum argenteum. Alp. exot.* 307. t. 306.  
*Habitat in Oriente.* ☉

*scabrum.* 26. **TRIFOLIUM** capitulis sessilibus ovatis, calycibus villosis inæqualibus.

\* *Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis scabris. Hort. cliff.* 373. \* *Roy. lugdb.* 377. *Hall. helv.* 583. *Dalib. parif.* 225. *Sauv. monsp.* 183.

*Trifolium capitulo oblongo aspero. Bauh. pin.* 329. *prodr.* 140.

*Trifolium* cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *Bauh. hist.* 2. p. 378.

\* *Trifolium flosculis albis in glomerulis asperis cauliculis adnatis. Vaill. parif.* 196. t. 33. f. 1.

*Habitat in Anglia, Gallia, Italia.* ☉

*glomeratum.* 27. **TRIFOLIUM** capitulis sessilibus globosis, calycibus striatis patulis æqualibus.

*Trifolium capitulis sessilibus lateralibus subglobosis. Hort. cliff.* 373. \* *Roy. lugdb.* 377. *Sauv. meth.* 183.

*Trifolium cum glomerulis, ad caulium nodos rotundis. Raj. angl.* 3. p. 329.

*Trifolium arvense supinum verticillatum. Barr. ic.* 882.  
*Habitat in Anglia.*

*striatum.* 28. **TRIFOLIUM** capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundatis.

*Trifolium capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calycibus subrotundis villosis striatis. Fl. succ.* 614. *Dalib. parif.* 225.

*Trifolium parvum hirsutum, flore parvo dilute purpureo in glomerulis mollioribus oblongis, semine magno. Vaill. parif.* 196. t. 33. f. 2.

*Habitat in Germania, Gallia, Hispania.*

*montanum.* 29. **TRIFOLIUM** capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis serratis. *Fl. succ.* 611. *Dalib. parif.* 223.

*Trifolium montanum album. Bauh. pin.* 328

*Trifolium pratense album. Fuchf. hist.* 818.

*Habitat in pratis siccis Europæ septentrionalis.* 2

*fruticans.* 30. **TRIFOLIUM** spicis subvillosis: lacinia calycut infima maxima, caule fruticoso, foliis subsessilibus.  
*Trifolium spicis subrotundis: lacinia calycum infima*

- maxima, foliis fere sessilibus. *Hort. cliff.* 373. \* *Roy. lugdb.* 378.
- Trifolium africanum fruticans, flore purpurascens.  
*Comm. hort.* 2. p. 211. t. 106.  
*Habitat in Æthiopia.* b
31. TRIFOLIUM acaule, pedunculis unifloris, floribus *uniflorum*,  
foliisque commixtis.  
Spica trifolia. *Alp. exot.* 169. t. 168.  
Melilotus cretica humillima humitusa; flore albo ma-  
gno. *Tournef. cor.* 28.  
*Habitat in Creta.*
- \* *Vesicaria calycibus inflatis ventricosus.*
32. TRIFOLIUM spicis ovatis, calycibus inflatis gla-*spumsum*,  
bris quinquedentatis, involucris universalibus penta-  
phyllis. *Hort cliff.* 373. \* *Roy. lugdb.* 378.  
Trifolium capitulo spumoso lævi. *Baub. pin.* 329. *prodr.*  
140.  
Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. *Baub. hist.*  
2. p. 379.  
*Habitat in Gallia, Italia, Apulia.*
33. TRIFOLIUM spicis subovatis, calycibus inflatis *resupinatum*  
dorso gibbis, caulibus prostratis. *Hort. cliff.* 373. \*  
*Roy. lugdb.* 378. *Gort. gelr.* 429.  
Trifolium pratense folliculatum. *Baub. pin.* 329. 1  
Trifolium pratense folliculatum, flore invertio. *Barr.*  
*rar.* 824. t. 872.  
Trifolium folliculatum f. vesicarium minus purpureum.  
*Baub. hist.* 2. p. 379.  
*Habitat in Anglia, Belgio.*  
Corollæ *resupinatae in hoc sunt, ut vexillum respiciat*  
*peripheriam, carina centrum.*
34. TRIFOLIUM capitulis sessilibus globosis hirsutis, *tomentosum*,  
calycibus inflatis reflexis. *Sauv. monsp.* 175. \*  
Trifolium fragiferum tomentosum. *Magn. monsp.* 265.  
t. 264.  
Trifolium glomerale tomentosum per caulum longitudi-  
nem. *Baub. hist.* 2. p. 379.  
*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania, D. San-*  
*tae. Læsing.* 2  
Caulis *undique decumbens, non repens.* Folia *obovata*  
*denticulata, obtusa, glabra; stipulis acuminatis;* Pedun-  
culi *axillares, foliis non longiores.* Capitula *parva.* Caly-  
cis

cis dentes 3 superiores elongati, inferiores 2 parvi. Calyx crassissimo tomento involutus, ut vasa minime conspiciantur. Accedit propius T. folliculato, quam fragifero. Involucrum universale dodecaphyllum. Corollæ fere resupinata.

*fragiferum.* 35. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Hort. cliff.* 373. \* *Fl. suec.* 613. *Roy. lugdb.* 378. *Dalib. paris.* 224. *Gort. gelr.* 428.

Trifolium fragiferum friscum. *Bauh. pin.* 329. *Clas. cur. app.* 38. t. 39.

Trifolium fragiferum. *Vaill. paris.* 195. t. 22. f. 2.

Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. *Bauh. hist.* 2. p. 379. fig. majore.

Habitat in Suecia, Gallia, Anglia. &

Pedunculi in hoc foliis longiores, & Caules radices agunt. Calyces parum pubescentes.

\* Lupulina vexillis corollæ inflexis.

*agrarium.* 36. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Fl. suec.* 617. *Hort. cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 378. *Dalib. paris.* 226.

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli s. agrarium. *Bauh. pin.* 328. *Vaill. paris.* 196. t. 22. f. 3.

Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.

Habitat in Europæ pratis. ☉

Calyx ante florescentiam vix manifeste villosus s. uno alterove pilo ad apices instructus. Corollæ flavæ nec spadiceæ.

*l. montanum.* 37. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *spadiceum Syst.* Trifolium montanum lupulinum. *Bauh. pin.* 328. *prodr.* 140.

Trifolium pratense, flore rufescente. *Vaill. paris.* 196.

Lupulinum montanum, capitulis spadiceis. *Rupp. jen.* 207.

Lotus montanus aureus, amplo lupuli capitulo, annuus. *Barr. ic.* 1024.

Habitat in Europæ pratis siccis. ☉

Differt a præcedenti vexillis ferrugineis, calycibus præcipue ante florescentiam manifeste pilosissimis.

*procumbens.* 38. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus. *Fl. suec.* 618. *Is. gotl.* 257.

Tri-



*Trifolium pratense* luteo-croceum. *Vaill. parif.* 196.

*Trifolium lupulinum alterum minus. Raj. angl. 3. p.*

330. r. 14. f. 3.

Habitat in Europæ campestribus. 24

39. **TRIFOLIUM** spicis subimbricatis, vexillis deflexis *filiforme*.  
perfluitantibus, calycibus pedicellatis, caulibus procum-  
bentibus.

**Trifolium lupulinum** minimum. *Morif. hist.* 2. p. 142.

*Raj. angl.* 3. p. 331. t. 14. f. 4.

*Habitat in Anglia.* ☉

*Caules filiformes, procumbentes. Pedunculi filiformes, foliis longiores, sustinentes. Flores 3 ad 5, in satis saepe 12. ad 15, deflexos, Calycibus fructum ferentibus insidentibus manifestis & distinctis pedicellis.*

40. TRIFOLIUM spicis bifloris sessilibus, involucris hi- *biflorum*.  
spidis infundibuliformibus, foliis lanceolatis.

Trifolium caule piloso, foliolis subserratis, floribus lateralibus subsolitariis, leguminibus ovatis. *Gron. virg.* 84.

*Anonis mariana* lutea, foliis angustioribus. *Pet. succ.* 84.

*Habitat in Virginia, Canada.*

*Caulis erectiusculus. Folia ternata, lanceolata: Petioli breves: Stipulis vaginalibus, dentibus apicibus acuminatis longitudine vaginæ. Capitula axillaria, infundibuliformia, sessilia, foliolis pluribus obvoluta leviter trifidis: lacinia media longiore. Flores duo, alternatim prodeuntes.*

LOTUS.

- \* *Leguminibus rarioribus nec capitulum constituentibus.*

1. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulatis, bracteis lanceolatis. *It. et.* 143. \* *Fl. succ.* 610. *Sauv. monsp.* 188.

*Lotus tetragonolobus maritimus*, flore luteo. *Bart. act.*  
2. p. 346.

*Lotus filiquosa* lutea, siliquis pinnatis strictioribus & longioribus. *Raj. hist.* 967.

*Habitat in Europæ maritimis. 2*

2. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulatis, bracteis ovatis. Hort. rousf. 220. v. 1.

*Lotus leguminibus subfoliariis: angulis quatuor membranaceis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388.*

*Lotus ruber*, filiqua angulosa. *Bauh. pin.* 332.

*Lotus pulcherrima tetragonolobus. Cam. hort. 91. t. 26.*  
*Habitat in Siciliae collibus. ☉*

- conjugata.* 3. LOTUS leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis oblongo-ovatis.  
*Lotus luteus, filiqua angulosa. Boerb. lugdb. 2. p. 37.*  
*Habitat Monspelii. ☉*  
*Convenit cum 2 habitu, etate, foliis, hirsutiae, leguminibus; differt vero corollis duplo minoribus, leguminibus duobus, eorumque alis integris minus crispis, foliorum basi caulem non amplexante, sed ab opposito latere, debiscente.*
- creta.* 4. LOTUS leguminibus solitariis rectis teretibus terminalibus, caule erecto. *Sauv. monsp. 189. †*  
*Lotus pratensis filiquosa lutea. Bauh. pin. 332. minor*  
*& mollior. Tournes. inst. 403.*  
*Lotus trifolia pratensis filiquosa monospeliensium. Lob. ic. 2. p. 42.*  
*Habitat Monspelii,*
- edulis.* 5. LOTUS leguminibus subfoliariis gibbis incurvis. *Hort. cliff. 370. Roy. lugdb. 388.*  
*Lotus pentaphyllos, filiqua cornuta. Bauh. pin. 332.*  
*Lotus edulis cretica. Raj. hist. 967.*  
*Lotus oligoceros cretica lutea, filiquis binis curvis pro-*  
*pendentibus. Moris. hist. 2. p. 176. f. 2 t. 18 f. 5.*  
*Habitat in Italia, Sicilia, Creta.*
- peregrinus.* 6. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus. *Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. Sauv. monsp. 188.*  
*Lotus, filiquis geminis, peregrina. Boerb. lugdb. 2. p. 38.*  
*Habitat in Europa australi.*
- angustissima* 7. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis.  
*Lotus leguminibus saepius ternatis linearibus strictis erectis. Hort. cliff. 372. Roy. lugdb. 388. Sauv. monsp. 188.*  
*Lotus pentaphyllos minor hirsutus, filiqua angustissima. Bauh. pin. 332.*  
*Lotus corniculata, filiquis singularibus s. binis, tenuis. Bauh. hist. 2. p. 356.*  
*Habitat in G. Narbonensi.*

8. LOTUS leguminibus subquinatis arcuatis compressis, *ornithopodi-*  
caulibus diffusis. *Hort. cliff.* 372. *Hort. upf.* 220. *oides.*  
*Roy. lugdb.* 388. *Sauv. monsp.* 188.  
Lotus siliquis ornithopodii. *Baub. pin.* 332.  
Lotus peculiaris siliquosa. *Cam. hort.* 91. t. 25.  
*Habitat in Sicilia.* ☉

9. LOTUS leguminibus subternatis, caule herbaceo *ere-jacobae-*  
cto; foliolis linearibus. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* —  
388.  
Lotus angustifolia, flore luteo purpurascente, insula s.  
jacobae. *Comm. hort.* 2. p. 165. t. 83.  
*Habitat in Insula S. Jacobi.* ☉

\* *Pedunculis multifloris in capitulum.*

10. LOTUS capitulis dimidiatis, caule fruticoso, foliis *cretica-*  
nitidis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387.  
Lotus argentea cretica. *Pluk. alm.* 226. t. 43. f. 1.  
Lotus polyceratos fruticosa cretica argentea, siliquis lon-  
gissimis propendentibus rectis. *Morif. hist.* 2. p. 177.  
*Habitat in Syria, Creta.*

11. LOTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirsuto, legu-*hirsuta-*  
minibus ovatis. *Hort. upf.* 220. *Sauv. monsp.* 188.  
Lotus caule fruticoso, florum capitulis depressis, caly-  
cibus lanigeris. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387.  
Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. *Baub. pin.* 372.  
Lotus polyceratos frutescens incana alba, siliquis erectis  
crassioribus & brevioribus rectis. *Morif. hist.* 2. p.  
177. f. 2. t. 18. f. 14.  
*Habitat in G. Narbonensi, Italia.* 2

12. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto, legumi-*recta-*  
nibus rectis glabris. *Hort. upf.* 221.  
Lotus caule fruticoso, florum capitulis globosis. *Hort.*  
*cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 387. *Sauv. monsp.* 188.  
Lotus siliquosus glaber, flore rotundo. *Baub. pin.* 332.  
Lotus polyceratos frutescens hirsuta alba major lasio-  
lia, siliquis tenuibus curtis rectis. *Morif. hist.* 2. p.  
177. f. 2. t. 18. f. 13.  
*Habitat in G. Narbonensi, Sicilia, Calabria.* 2

13. LOTUS capitulis depressis, caulibus decumbentibus, *corniculata-*  
leguminibus cylindricis.

Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, legu-  
minibus decumbentibus teretibus. *Hort. cliff.* 372.  
*Fl. succ.* 609. *Roy. lugdb.* 388. *Dalib. parif.* 221.

C c c 4

Lotus

Lotus f. Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Bauh. pin.* 332.

Trifolium corniculatum. *Dod. pempt.* 573.

β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. *Bauh. pin.* 222.

tenuifolia. γ. Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis. *Bauh. pin.* 332.

Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis. *Bauh. prodr.* 144. *Burj. XVIII.* 73.

Habitat in Europa. 2

Hujus forte varietas etiam γ. est, cujus Caules duplo longiores & angustiores, Folia linearia, & Legumina angustiora. Videtur in umbra nata; *Burserus C. Bauhizo* hanc attulit.

cytisoides. 14. LOTUS capitulis dimidiatis, caule diffuso ramosissimo, foliis tomentosis. *Roy. lugdb.* 387.

Lotus siliquosa maritima lutea, cytisi facie. *Barr. rar.* 71. t. 1031.

Habitat in maritimis Europæ australis.

Dorycnium. 15. LOTUS capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis. *Dorycnium* foliis digitatis sessilibus. *Hort. cliff.* 371.\*

*Roy. lugdb.* 389. *Sauv. monsp.* 214.

*Dorycnium* monspeliensium. *Lob. ic.* 51.

Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis. *Bauh. pin.* 329.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Austria. 2

## TRIGONELLA.

authenica. 1. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis pendulis linearibus rectis, foliolis sublanccolatis.

Trigonella leguminibus pedunculatis. *Vir. cliff.* 76. *Hort. cliff.* 378. \* *Roy. lugdb.* 382.

Melilotus supina angustifolia, medicæ facie, siliqua compressa. *Amm. ruth.* 159.

Lotus montana humilior trifolia ad caulem alata lutea, siliqua modo recta, modo medicaginis instar falcata nigra. *Amm. ruth.* 119.

Habitat in Sibiria.

Foliola lanceolata, obtusissima, superne acute serrata, dentata. Stipulæ integerrimæ. Legumina linearia.

platycarpæ. 2. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis pendulis ovalibus compressis, caule diffuso, foliolis subrotundis. *Hort. lug.* 229.

Meli-

Melilotus supina latifolia, siliqua lata membranacea compressa. *Amm. ruth.* 158. *Act. goett.* 1. p. 213. t.

13.

Melilotus siliqua membranacea compressa. *Act. petrop.* 8. p. 209. t. 12.

*Habitat in* Sibiria. ♂

Foliola subovata, longitudinaliter acute serrata. Stipulæ sæpius dentatæ. Legumina ovalia.

3. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis *polyceratis*. erectis rectis parallelis linearibus.

Medicago leguminibus confertis sessilibus erectis. *Roy. lugdb.* 382. *Sauv. monsp.* 187.

Medicago leguminibus confertis longis rectis parallelis, pedunculo communi. *Hort. cliff.* 376. \*

Fœnum græcum sylvestre alterum polyceration. *Baub. pin.* 348.

Fœnum græcum sylvestre alterum. *Dod. pempt.* 547. *Habitat in* Hispania.

4. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis *spinosa*. stis declinatis subfalcatis compressis, pedunculo communi spinoso foliis longiore.

Medicago leguminibus sæpius ternatis sessilibus arcuatis declinatis, spina ex alis. *Hort. cliff.* 377.

Fœnum græcum sylvestre polyceration creticum majus. *Breyn. cent.* 79. t. 33. f. 1.

*Habitat in* Creta. ☉

Stipulæ dentatæ; Pedunculus fit spina rigida ad cujus basin sæpe Legumina 5, venosa, glabra.

5. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis *monspeliaca*. declinatis subfalcatis, pedunculo communi inermi foliis longiore.

Medicago leguminibus confertis sessilibus arcuatis inclinat. *Hort. cliff.* 377. *Roy. lugdb.* 382. *Dalib. parif.* 231. *Sauv. monsp.* 187.

Fœnum græcum sylvestre polyceratum minus monspeliacum. *Breyn. cent.* 80. t. 33. f. 2.

*Habitat* Monspeli. ☉

Stipulæ simplices. Pedunculus apice desinit in acumen molle, sub quo Legumina 10 ad 12.

6. TRIGONELLA leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis. *Hort. ups.* 229. *Mat. con. med.* 356.

C c c 5

Tri-

*Trigonella* leguminibus sessilibus. *Vir. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 383. *Dalib. paris.* 228. *Sauv. monsp.* 187.

*Medicago* leguminibus subsolitariis sessilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. *Hort. cliff.* 376.

*Fœnum græcum sativum.* *Bauh. pin.* 348.

*Fœnum græcum.* *Fuchf. hist.* 798. *Cam. epit.* 199.

β. *Fœnum græcum sylvestre.* *Bauh. pin.* 348.

*Habitat* Montpelii. ☉

*indica.*

7. *TRIGONELLA* leguminibus sessilibus subsolitariis subsalcatis, foliis integerrimis, caule diffuso. *Fl. zeyl.* 285. \*

*Lotus maderaspatanus villosus, ornithopodii filiqua singulari.* *Pluk. alm.* 226. t. 200. f. 7.

*Habitat in* India.

### MEDICAGO.

*arbores.*

1. *MEDICAGO* leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 376. *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 382.

*Cytisus incanus, filiquis falcatis.* *Bauh. pin.* 389.

*Cytisus amarantæ.* *Lob. ic.* 2. p. 46.

*Habitat in* Rhodo, Neapoli. ☿

*virginica.*

2. *MEDICAGO* caule erecto ramosissimo, floribus fasciculatis terminalibus. *Gron. virg.* 86.

*Loto affinis trifoliata frutescens glabra.* *Pluk. mant.* 120.

*Habitat in* Virginia.

*radiata.*

3. *MEDICAGO* leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 377. \* *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 381. *Berg. viadr.* 95.

*Medicago annua, filiqua falcata striata.* *Morif. hist.* 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 3.

*Trifolium filiqua falcata.* *Bauh. pin.* 330.

*Lunaria radiata italorum.* *Lob. ic.* 2. p. 38.

*Habitat in* Italia. ☉

*circinnata.*

4. *MEDICAGO* leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 377. \*. *Hort. upf.* 230. *Roy. lugdb.* 382.

*Loto affinis filiquis hirsutis circinnatis.* *Bauh. pin.* 333.

*Habitat in* Hispania, Italia. ☉

*sativa.*

5. *MEDICAGO* pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Hort. cliff.* 377. *Roy. lugdb.* 281.

*Medica legitima.* *Clus. hist.* 2. p. 242. *Upf.* 229.

*Medica sativa* *Morif. hist.* 2. p. 150. f. 2. t. 16. f. 2. *Fœ-*

- Fœnum burgundicum.* *Lob. ic. 2. p. 36.*  
*Habitat in Hispaniæ, Galliæ apricis. 2.*
6. **MEDICAGO** pedunculis racemosis, leguminibus lufalcata, natis, caule prostrato. *Fl. succ. 620. Dalib. parif. 229.*  
*Trifolium sylvestre luteum, filiqua cornuta. Baub. pin. 330.*  
*Medica flavo flore. Clus. hist. 2. p. 243.*  
*Habitat in Europæ pratis apricis, siccis. 4.*
7. **MEDICAGO** spicis ovalibus, leguminibus reniformi lupulina, bus monospermis, caule procumbente. *Fl. succ. 621. Dalib. parif. 281.*  
*Trifolium leguminibus spicatis reniformibus nudis monospermis, caule procumbente. Hort. cliff. 375. Roy. lugdb. 380.*  
*Trifolium pratense luteum, capitulo brevior. Baub. pin. 328.*  
*Trifolium pratense luteum. Fuchf. hist. 819.*  
*Habitat in Europæ pratis. 3.*
8. **MEDICAGO** pedunculis racemosis, leguminibus marina, cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Hort. cliff. 378. \* Roy. lugdb. 381. Sauv. monsp. 186.*  
*Trifolium cochleatum maritimum tomentosum. Baub. pin. 329.*  
*Medica marina. Clus. hist. 2. p. 243.*  
*Habitat in maris Mediterranei littoribus.*
9. **MEDICAGO** leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffusis. *Hort. cliff. 378. Hort. ups. 230. Roy. lugdb. 381. Dalib. parif. 230.* *polymorpha.*  
*Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido. Baub. pin. 329.*
- a. **Medicago** leguminibus solitariis cochleatis compressis orbicularis. planis, stipulis ciliatis, caule diffusis. *Sauv. monsp. 186.*  
*Medica major dicarpos capsula compressa orbiculata nigra plana oris crispis. Moris. hist. 2. p. 152. f. 2. t. 15. f. 1.*  
*Medica orbiculata. Baub. hist. 2. p. 384.*  
*Trifolium cochleatum f. scutellatum, folio latiore, fructu minuto obusis. Baub. pin. 329. prodr. 140.*
- β. **Medica** cochleata major dicarpos, capsula rotunda scutellata. globos-

- globosa scutellata. *Morif. hist. 2. p. 152. f. 2. 7. 15. f. 4.*
- Medica scutellata. *Baub. hist. 2. p. 384.*
- Trifolium cochleatum, fructu latiore. *Baub. pin. 329.*
- tornata. 7. Medica tornata major & minor lenis. *Park. theat. 1116.*
- turbinata. 8. Medicago fructu turbinato. *Sauv. monsp. 187.*
- Medica dicarpos, fructus capsula turbinata rugosa. *Morif. hist. 2. p. 153.*
- Medica magna turbinata. *Baub. hist. 2. p. 385.*
- Trifolium cochleatum turbinatum, fructu compresso oblongo. *Baub. pin. 329.*
- intertexta. 2. Medica cochleata spinosa major dicarpos, capsula f. spinis longioribus sursum & deorsum tendentibus. *Morif. hist. 1. p. 153. f. 2. t. 15. f. 8. 9. 7.*
- arabica. 6. Medica cochleata minor polycarpos annua, capsula majore alba, folio cordato macula fusca. *Morif. hist. 2. p. 144. f. 2. t. 15. f. 17.*
- Medica arabica. *Cam. hort. 97. t. 27.*
- Trifolium cochleatum, folio maculato cordato. *Baub. pin. 329.*
- coronata. 7. Medicago fructu minimo, coronulam utrinque dentatam referente. *Sauv. monsp. 187.*
- Medicago cochleata polycarpos annua, capsula minima coronata. *Morif. hist. 2. p. 155. f. 25. t. 15. f. 21.*
- Medica coronata cherleri parva. *Baub. hist. 2. p. 386.*
- Trifolium folio obtuso, folliculis coronatis. *Baub. pin. 329. prodr. 141. n. 13.*
- ciliaris. 9. Medicago leguminibus congestis globosis hispidis, stipulis ciliatis. *Sauv. monsp. 186.*
- Medica annua, fructu ciliari. *Tournef. inst. 410.*
- Trifolium fructu cochleato ciliari. *Magn. monsp. 269.*
- hirsuta. 1. Medicago leguminibus solitariis globosis brevissime echinatis, stipulis serratis. *Sauv. monsp. 186.*
- Medica echinata hirsuta. *Baub. hist. 2. p. 386.*
- Trifolium echinatum arvense. *Baub. pin. 329.*
- rigidula. x. Medicago triphylla, leguminibus cochleatis spinosis, foliolis inferioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis. *Dalib. parif. 231.*
- Medica hirsuta, echinatis rigidioribus. *Baub. hist. 2. p. 385.*
- Trifolium fructu compresso spinis horrido. *Baub. pin. 329.*
- minima. 2. Medicago leguminibus cochleatis aculeis uncinatis alternis externe donatis, stipulis integris. *Gnett. stamp. 249. Dalib. parif. 230.*
- Medi-



*Medica echinata minima. Baub. hist. 2. p. 386.*

*Trifolium echinatum, fructu minore. Baub. pin. 330.*

μ. *Medica cochleata dicarpos, capsula spinosa rotunda muricata, nore. Moris. hist. 2. p. 153. f. 2. t. 15. f. 11.*

1. *Medicago fructu echinato, foliis linearibus dentatis, laciniata. Sauv. monsp. 187.*

*Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis.*

*Magn. monsp. 271. t. 270.*

*Trifolium cochleatum spinosum syriacum, foliis laciniatis. Breyn. cent. 81. t. 34.*

*in Eur. australi.*

## POLYADELPHIA.

## PENTANDRIA.

## THEOBROMA.

Cacao.

1. THEOBROMA foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 397. *Mat. med.* 364.  
*Cacao. Clus. exot.* 55. *Sloan. jam.* 134. *hist.* 2. p. 15. t. 160. *Mer. surin.* 26. t. 26. *Geoffr. mat.* 409.  
*Catesb. car.* 3. p. 6. t. 6.  
 Arbor cacavifera americana. *Pluk. alm.* 40. t. 268. f. 3.  
 Amygdalis similis guatimalensis. *Bauh. pin.* 442.  
*Habitat in America meridionali, Antillis. b*

Гуазаума.

2. THEOBROMA foliis serratis. *Hort. cliff.* 379. *Roy. lugdb.* 47.  
 Guazuma arbor ulmifolia, fructu ex purpura nigro. *Plum. gen.* 36.  
 Cenchramidea jamaicensis ulmifolia, fructu ovali integro verrucoso. *Pluk. alm.* 92. t. 77. f. 2.  
 Alni fructu morifolia arbor, flore pentapetalo flavo. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 18. *Raj. acndr.* 11.  
*Habitat in Jamaica campestribus. b*

## ICOSANDRIA.

## CITRUS.

Medica.

1. CITRUS petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *Hort. nps.* 236. *Mat. med.* 366. *Roy. lugdb.* 266.  
 Malus Medica. *Bauh. pin.* 435.

Limon.

2. Limon vulgaris. *Ferr. hesp.* 193  
 Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.  
*Habitat in Asia: Media, Assyria, Persia. b*  
*Varietates hujus hodie numerosissime una cum sequenti mixtae, de quibus Hesperides consulenda.*

Аурантиум.

2. CITRUS petiolis alatis. *Hort. cliff.* 379. *Hort. nps.* 236. *H. zeyl.* 304. *Mat. med.* 367. *Roy. lugdb.* 266.  
 Malus Aurantia major. *Bauh. pin.* 340.  
 Aurantia mala. *Cam. epit.* 150.

p. Ma-

- β. *Malus Aurantia*, corticē eduli. *Baub. pin.* 346. *sinensis.*  
 γ. *Malus aurantia* fructu rotundo maximo pallecente ca-  
 put humanum excedente. *Sloan. jam.* 212. *hist.* 1.  
*p.* 41. *t.* 12. *f.* 2. 3.  
*Pumpelmus.* *Meist. itin.* 84.  
*Habitat in India.* β

## POLYANDRIA.

### HYPERICUM.

\* *Pentagyna.*

1. **HYPERICUM** floribus pentagynis, caule fruticoso, *balearicum.*  
 foliis ramisque cicutatis.  
*Hypericum* floribus pentagynis, folio & ramis verruco-  
 sis. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 473.  
*Hypericum* f. *Ascyrum* frutescens, magno flore. *Magn.*  
*char.* 260.  
*Myrto-Cistus pennæi.* *Clus. hist.* 1. *p.* 68.  
*Habitat in Majorca.* β
2. **HYPERICUM** floribus pentagynis, caule fruticoso; *kalmianum.*  
 foliis lineari-lanceolatis.  
*Habitat in Virginia.* *Kalm.* β  
*Frutex.* Rami tetragoni. Folia *Rosmarini* aut *Lavē-*  
*dulæ*, glabra. Flores in *Corymbo* dichotomo, termina-  
 li, ex tribus aut septem floribus. Capsula ovata, lon-  
 gitudine calycis. Calyx lanceolatus, obtusiusculus. Sty-  
 li 5, tenuissimi.
3. **HYPERICUM** floribus pentagynis, foliis lanceolatis *Lasiacanthus.*  
 ferratis. *Hort. cliff.* 380.  
*Alcea* floridata quinquecapsularis, laurinis foliis leviter  
 crenatis, seminibus coniferarum instar alatis. *Pluk.*  
*amaltb.* 7. *t.* 352. *f.* 3. *Catech. cap.* 1. *p.* 44. *t.* 44.  
*Amm. alt.* 7. *t.* 352. *f.* 3.  
*Habitat in Carolina, Surinamo.* *J. Barfch.*
4. **HYPERICUM** floribus pentagynis, caule tetragono *Ascyron.*  
 herbaceo simplici, foliis lævibus integerrimis. *Hort.*  
*aps.* 236.  
*Hypericum* floribus pentagynis, foliis ovato-oblongis  
 glabris integerrimis. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 473.  
*Androsæmum* flore & theca quinquecapsulari omnium  
 maximis. *Morij. hist.* 2. *p.* 472.

Andro-

*Androsæmum constantinopolitanum*, flore maximo.

*Wheel. itin.* 172. *Raj. hist.* 1017.

*Habitat in Oriente, Sibiria, Canada.* 2

\* *Trigyna*

- Androsæmum.* 5. *HYPERICUM* floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti. *Hort. upf.* 237.  
*Hypericum* floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 374. *Dalib. parif.* 235.  
*Androsæmum* maximum frutescens. *Bauh. pin.* 280.  
*Androsæmum.* *Dod. pempt.* 78.  
*Habitat in Angliæ, Ilvæ sepibus.* 5
- Olympicum.* 6. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus acutis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 374.  
*Hypericum* montis olympi. *Wheel. itin.* 222. *Dill. elth.* 182. *t.* 151. *f.* 183.  
*Ascyrum* magno flore. *Bauh. pin.* 280. *prodr.* 130. *Burf. XVI.* 25.  
*Habitat in Pyrenæis, Olympo.* 5
- canariense.* 7. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus obtusis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 381. *Roy. lugdb.* 374.  
*Hypericum* frutescens canariense multiflorum. *Comm. hort.* 2. *p.* 135. *t.* 68.  
*Hypericum* f. *Androsæmum* magnum canariense ramosum, copiosis floribus, fruticosum. *Pluk. alm.* 189. *t.* 305. *f.* 1.  
*Habitat in Canariis.* 5
- bioginum.* 8. *HYPERICUM* floribus trigynis, staminibus corolla longioribus caule fruticoso ancipiti. *Hort. cliff.* 331. *Hort. upf.* 237. *Roy. lugdb.* 374.  
*Hypericum* foetidum frutescens minus. *Dill. elth.* 182.  
*Androsæmum* foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis. *Bauh. pin.* 280.  
*Tragium.* *Clus. hist.* 2. *p.* 205.  
*Habitat in Sicilia, Calabria, Creta.* 5
- egypticum.* 9. *HYPERICUM* floribus trigynis, nectariis petalorum lauceolatis, caulibus suffruticosis compressis.  
*Habitat in Ægypto.* *D. B. Jussæus.* 5  
*Frutex spinosus, ramosissimus, brachiatus: ramulis compressis. Folia (Polygoni) ovata, minima, acuminata, avenia,*

*avenia, sessilia, articulis ramorum longiora. Flores sapius bini in ramulis. Squamula nectarifera oblonga, intra ungues cujusvis petali. Facies planta Arenarie.*

10. *HYPERICUM* floribus trigynis, stipulis reflexis *o-orientale*.  
vatis crenatis.

*Hypericum orientale, ptarmicæ foliis. Tournef. cor. 18.*  
*itin. 2. p. 220. t. 220.*

*Habitat in Oriente.*

11. *HYPERICUM* floribus trigynis, foliis linearibus im *ericoides*.  
bricatis.

*Hypericum ericoides minimum, foliis cinereis. Pluk.*  
*alm. 189. t. 93. f. 5.*

*Hypericum tomentosum lusitanicum minimum. Tournef.*  
*inst. 256.*

*Habitat in Lusitania, Hispania.*

12. *HYPERICUM* floribus trigynis, foliis lineari-lan- *canadense*.  
ceolatis, caule quadrangulo, pericarpis coloratis.

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Caules herbacei, teretes, ramosi, glabri. Folia linearia*  
*f. sub lanceolata, integerrima, glabra. Panicula di-*  
*chotoma, Floribus pedicellatis. Flores parvi admodum,*  
*magnitudine Spergule. Pericarpium calyce duplo lon-*  
*gius, conicum, rubrum.*

13. *HYPERICUM* floribus trigynis, caule quadrato *quadrangu-*  
herbaceo. *Hort. cliff. 380. Fl. succ. 624. Roy. lugdb. lan.*  
*473. Dalib. paris. 234.*

*Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. Bauh.*  
*hist. 3. p. 382.*

*Ascyron. Dod. pempt. 78.*

*Habitat in Europæ pratis. 2*

14. *HYPERICUM* floribus trigynis, caule ancipiti, fo- *perforatum*.  
liis obtusis pellucido-punctatis. *Hort. cliff. 380. Fl.*  
*succ. 625. Mat. med. 368. Roy. lugdb. 474. Hall.*  
*belv. 630. Dalib. paris. 233.*

*Hypericum vulgare. Bauh. pin. 279.*

*Hypericon. Dod. pempt. 76.*

*Habitat in Europæ pratis. 2*

15. *HYPERICUM* floribus trigynis, caulibus ancipiti- *canisusum*.  
bus prostratis. †

*Hypericum foliis ovatis, caulibus supinis. Guss. stamp.*  
*2. p. 174. Dalib. paris. 234.*

D d d

Hype-

*Hypericum humilifolium* foliis perforatis punctis in margine nigris. *Hall. belv.* 360.

*Hypericum minus supinum* f. *supinum glabrum*. *Bauh. pin.* 279.

*Hypericum supinum* III. *minimum*. *Clus. hist.* 2. p. 181.

*Habitat in Europa australiore.* 2

*Affinis nimium antecedentis.*

*hypericum.* 16. *HYPERICUM* floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, caule erecto, foliis ovatis.

*Hypericum* foliis lanceolatis, calycinis laciniis linearibus. *Guett. stamp.* 176.

*Hypericum* floribus trigynis, calycum serraturis capitatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 380. *Fl. succ.* 626. *Roy. lugdb.* 474. *Dalib. parisi.* 234.

*Ascyrum* f. *Hypericum bifolium glabrum* non perforatum. *Bauh. pin.* 280.

*Androsæmum campoclarense*. *Col. ecphr.* 1. p. 73. t. 74. *It. vgoth.* 213.

β. *Hypericum* foliis ovato-oblongis brevipediculo donatis, calycinis laciniis oblongo-acutis. *Guett. stamp.* 178.

*Androsæmum Ascyron* dictum, caule rotundo hirsuto. *Morif. hist.* 2. p. 271. f. 5. t. 6. f. 11.

*Androsæmum hirsutum*. *Bauh. pin.* 280. *caute.*

*Habitat in Europæ collibus & montibus.* 2

*tomentosum.* 17. *HYPERICUM* floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis subovatis hirsutis.

*Hypericum supinum tomentosum minus & monspeliacum*. *Bauh. pin.* 279. *Sauv. monsp.* 149.

*Hypericum supinum tomentosum alterum*. *Clus. hist.* 2. p. 181.

β. *Hypericum supinum tomentosum majus & hispanicum*. *Bauh. pin.* 279.

*Hypericum supinum tomentosum hispanicum*. *Clus. hist.* 2. p. 181.

*Habitat in G. Narbonensi, Hispania.* 2

*pulchrum.* 18. *HYPERICUM* floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis cordatis glabris. †

*Hypericum* foliorum basi latissima, foliis calycis brevioribus obtusis. *Hall. belv.* 361

*Hypericum* foliis cordatis connatis, laciniis calycinis ovatis obtusis. *Guett. stamp.* 2. p. 175.

*Hypericum minus erectum*. *Bauh. pin.* 279.

*Hype*

*Hypericum minus glabrum erectum pulchrum. Moris. hist. 2. p. 470.*

*Hypericum pulchrum tragi. Bauh. hist. 3. p. 383.*

*Habitat in Europa australiori. &*

19. **HYPERICUM** floribus trigynis: calycibus serrato-*nummulari-*  
glandulosis, foliis cordato-orbiculatis glabris. *rius.*

*Hypericum nummulariae folio. Bauh. pin. 279. prodr. 130.*

*Hypericum fere orbiculato folio, floribus amplis pallide luteis, petalis in ambitu crenatis. Pluk. alm. 188. t. 93. f. 4.*

*Androsæum supinum saxatile, nummulariae folio aver- sa parte rubente. Bocc. mus. 2. p. 134. t. 91.*

*Habitat in Pyrenæis. &*

20. **HYPERICUM** floribus trigynis: calycibus serrato-*Coris.*  
glandulosis, foliis subverticillatis.

*Hypericum f. Coris legitima ericæ similis: Moris. hist. 2. p. 468. f. 5. t. 6. f. 4.*

*Hypericoides Coris quorundam. Bauh. hist. 3. p. 384.*

*Coris lutea. Bauh. pin. 280.*

*Habitat in Europa australi.*

*Stipulae utrinque solitariae f. ad singulum folium duæ, magnitudine & figura foliorum, hinc, quum folia sint opposita, quasi sena articulos cingunt, quorum quatuor sunt stipulae.*

\* *Digyna.*

21. **HYPERICUM** floribus digynis, foliis ovatis sessili-*multum.*  
bus. *Gron. virg. 88.*

*Habitat in Virginia, Canada.*

22. **HYPERICUM** floribus digynis, foliis linearibus. *setosum.*  
*Gron. virg. 88.*

*Hypericum virginianum parvum fruticosum, ramulis e- quiseti. Pluk. alm. 189.*

*Habitat in Virginia.*

**ASCYRUM.**

1. **ASCYRUM** foliis ovatis, caule tereti, panicula dicto-*Crua andree*  
toma.

*Hypericoides ex terra mariana, floribus exiguis luteis.*

*Pluk. mant. 104. Raj. suppl. 496.*

*Habitat in Virginia.*

- Hypericoides* 2. ASCYRUM foliis ovatis, caule compresso.  
 Ascyrum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 494. *Gron. virg.* 88.  
*Hypericoides frutescens erecta, flore luteo. Plum. gen.*  
 51.  
*Hypericum pumilum sempervirens, caule compresso*  
*ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo.*  
*Pluk. mant.* 104. *Raj. suppl.* 495.  
*Habitat in Virginia.*
- villosum.* 3. ASCYRUM foliis hirsutis, caule stricto.  
*Hypericum virginianum frutescens pilosissimum. Pluk.*  
*alm.* 189. t. 245. f. 6.  
*Habitat in Virginia. †*



## Classis XIX.

## SYNGENESIA.

## POLYGAMIA ÆQUALIS.

## TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris striatis. *pratense*.  
 Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.*  
 382. *Fl. suec.* 648. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.* 119.  
*Dalib. paris.* 242.  
 Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.  
 Tragopogon. *Fuchs hist.* 827.  
*Habitat in Europæ pratis apricis. ♂*
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *orientale*.  
*Hort. upf.* 243.  
 Tragopogon orientale angustifolium, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.  
 Barba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura*.  
*Habitat in Oriente. ♂*
3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radiis longioribus, foliis integris striatis, pedunculis superne incrassatis. *porrifolium*.  
*Hort. upf.* 243.  
 Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod *Arctifolium* vulgo. *Bauh. pin.* 274. *Morif. hist.* 3. p. 8. f. 1. 9. f. 5.  
 Tragopogon alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist.* 1079.  
*Habitat - - - ♂*
4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, seminibus levibus: disci plumosis; radii setaceis. *hybridum*.  
*Hort. upf.* 243. \*  
 Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Bauh. pin.* 275.  
 Tragopogon alterum, gramineo folio, flore suave rubente. *Col. ecphr.* 1. p. 232. t. 231.  
*Habitat in Italia. ☉*
5. TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis. *virginicum*.  
 Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexicaulis dentatis, caule ramoso. *Gron. virg.* 91?  

D d d 3

*Habitat*

*Habitat in Virginia, Canada. Kalm.*

*Folia radicalia plurima, lyrata: lobis rotundatis, glabris. Caules subnudi, erecti, stricti. Folio uno alterove lanceolato, integra amplexicauli, Ramis paucis. Rami terminantur Pedunculis tribus, ad quorum exortum folia 2, lanceolata, opposita: altero minore. Calyx in 12 folia ad basin divisis, æqualia, corolla breviora. Flores saturate lutei. Habitus Arnica gerberiæ. Pappus plumosus non est, nec stipitatus, sed simplex. Statura Hyoseridis; Calyx Tragopogonis. Semina Hieracii.*

- dulechampi.* 6. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus inermibus, foliis lyrato-sinuatis. *Hort. ups.* 244. *Hort. cliff.* 382. \* *Sauv. monsp.* 295.

*Chondrilla foliis cichorei tomentosis. Baub. pin.* 130.

*Chondrilla prior. Clus. hist.* 2. p. 143.

*Habitat in Hispania. &*

- microides.* 7. TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus aculeatis, foliis pinnato-hastatis. *Hort. cliff.* 382.

*Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inermibus hastato-sinuatis. Hort. ups.* 241. *Sauv. monsp.* 295.

*Sonchus asper laciniatus creticus. Baub. pin.* 124. *prodr.* 60.

*Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo. Baub. pin.* 127.

*Chondrilla creticæ nomine missa, semine crispo. Baub. hist.* 2. p. 1022.

*Habitat in Creta, Monspelii. ☉*

- asperum.* 8. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris: caulinis oblongis. *Sauv. monsp.* 82.

*Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. Baub. pin.* 124. *prodr.* 60.

*Habitat Monspelii.*

## SCORZONERA.

- humilis.* 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis nervosis planis. *Hort. cliff.* 382. *Fl. succ.* 647. *Mat. med.* 371.

*Scorzonera humilis latifolia nervosa. Baub. pin.* 275.

*Scorzonera humilis latifolia pannonica. Clus. hist.* 2. p. 138.

*Habitat in Europæ septentrionalioris pratis apricis. &*  
2. SCOR-

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 791

2. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicaulj-*hispanica*,  
bus integris ferrulatis. *Hort. cliff.* 383. *Hort. upf.*  
242. *Gmel. fib.* 2. p. 6.  
*Scorzonera latifolia sinuata. Baub. pin.* 275.  
*Scorzonera major hispanica. 1. Clus. hist.* 2. p. 137.  
*Habitat in Hispania, Sibiria. 2*
3. SCORZONERA foliis lineari-cusiformibus integris *graminisfolia*  
carinatis.  
*Scorzonera lusitanica, gramineo folio, flore pallide-lu-*  
*teo. T. Buxb. cent.* 2. p. 26. t. 21.  
*Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus acuminatis*  
*carinatis, calycibus acutis. Gmel. fibir.* 2. p. 4.  
*Habitat in Lusitania, Sibiria.*
4. SCORZONERA foliis lineari-subulatis integris pla-*purpurea*.  
nis, pedunculis cylindricis.  
*Scorzonera caule ramoso tereti, foliis linearibus acumi-*  
*natis, calycibus obtusiusculis. Gmel. fib.* 2. p. 7. t. 2.  
*Scorzonera angustifolia subcaerulea. Baub. pin.* 275.  
*Scorzonera sylvestris, foliis angustis, flore caeruleo.*  
*Mentz. pug. t.* 1. f. 1.  
*Habitat in Marchia Brandeburgica, Sibiria.*  
*Folia alterna, plana, remota. Pedunculi filiformes.*
5. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo *angustifolia*.  
incrassato, caule basi villosa.  
*Scorzonera angustifolia prima. Baub. pin.* 275.  
*Scorzonera humilis angustifolia pannonica III. Clus.*  
*hist.* 2. p. 137. t. 138.  
*Tragopogon pinifolium hispanicum. Barr. ic.* 496.  
*Habitat in Hispania. Læsting.*  
*Caulis vix spithameus, basi ramosus, villosus. Folia con-*  
*ferta, linearia, subulata, longitudine fere caulis. Pe-*  
*dunculi terminales, versus florem crassiores ipso caule.*  
*Flos magnus. Corolla lutea, subtus purpurascens.*
6. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Roy. Ingdb. laciniata.*  
120. *Hort. upf.* 242. *Dalio. parif.* 242.  
*Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. inst.* 477. *Sauv.*  
*monsp.* 692.  
*Tragopogon laciniatum luteum. Baub. pin.* 274. *Raj.*  
*hist.* 251.  
*Habitat in Germania, Gallia. 3*
7. SCORZONERA foliis omnibus antrorsum dentato-*tingitana*.  
sinuatis amplexicaulibus.

D d d 4

Scorzo-

*Scorzonera* foliis omnibus extrorsum dentatis amplexicaulibus, squamis calycinis margine membrenaceis.  
*Hort. upf.* 242.

*Sonchus* floribus solitariis, foliorum laciniis extrorsum flexis. *Hort. cliff.* 385.

*Sonchus tingitana* papaveris folio. *T. Raj. suppl.* 137.

*Chondrilla* tingitana, floribus luteis papaveris hortensis folio. *Herm. lugdb.* 657. t. 659.

*Habitat in* Tingide. ☉

*Picroides.* 8. *SCORZONERA* foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus lyratis.

*Crepis* foliis radicalibus ovato-oblongis denticulatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris squamosis. *Roy. lugdb.* 127.

*Sonchus* laevis angustifolius. *Baub. pin.* 124?

*Crepis* dalechampii. *Daleb. hist.* 562. \*

*Habitat* - - - ☉

Semina incurva & crenulata sunt.

9. v. app. 1198. *PICRIS.*

*Echioides.* 1. *PICRIS* perianthiis involucro maximo cinctis. *Hort. upf.* 241.

*Picris* calycibus simplicibus perianthio maximo obvallatis. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128. *Dalb. paris.* 240.

*Hieracium* echioides, capitulis cardui benedicti. *Baub. pin.* 128.

*Buglossum* echioides luteum hieracio cognatum. *Lob. ic.* 577.

β. *Hieracium* capitulis cardui benedicti. *Herm. par.* 185. t. 185.

*Habitat in* Angliæ, Galliæ sylvis caduis, aggeribus. ☉

*Hieracioides* 2. *PICRIS* perianthiis imbricatis. *Hort. cliff.* 387 *Fl. suec.* 641. *Roy. lugdb.* 128. *Dalb. paris.* 240. *Gmel. sibir.* 2. p. 39.

*Cichorium* pratense luteum hirsutiae asperum. *Baub. pin.* 126.

*Hieracium* asperum, majore flore, in agrorum limitibus. *Baub. hist.* 2. p. 1029.

*Habitat in* Germaniæ, Angliæ, Belgii, Galliæ versuris agrorum. &

*pyrenaica.* 3. *PICRIS* perianthiis laxis, caule piloso, foliis dentato-sinuatis.

Hic-

*Hieracium pyrenaicum*, blattariæ folio, minus pilosum.

*Herm. parad.* 184. t. 184.

*Habitat in Pyrenæis.* 2

4. *PICRIS* foliis pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. † *asplenoides*.

*Helminthotheca hispidota asplenoides*, succo sulphureo *Vaill. act.* 1721. p. 206.

*Habitat in Ægypto.*

## SONCHUS.

1. *SONCHUS* pedunculis hispidis, floribus racemosis, *canadensis*, foliis lyrato-hastatis.

*Chondrilla* foliis pinnato hastatis denticulatis. *Gron.*

*virg.* 89.?

*Habitat in Canada.* *Kalm.*

Folia *S. floridani*, *dentata*, *subtus glauca*. Pedunculi *longi, terminales, adspersi pilis glutiniferis*. Racemi *breves*. Flores *magnitudinis sequentis, caerulei*.

2. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis subum-  
bellatis, foliis basi sagittatis.

*Sonchus* pedunculis calycibusque hispidis, floribus distanticorymbosis. *Hort. ups.* 244.

*Sonchus* caule erecto, foliis pinnato-hastatis apiceque hastatis, floribus congestis villotis. *Hort. cliff.* 385.

*Roy. lugab.* 129. *Dalib. paris.* 244.

*Sonchus asper* arborefcens. *Baub. pin.* 124.

*Sonchus laevior austriacus* 5. *altissimus*. *Clus. hist.* 2. p. 147.

*Habitat in Belgii, Angliæ, Galliæ, Hungariæ pratis paludosis.* 2

*Facies a S. arvensi diversissima; Structura tamen ita eadem, ac si S. palustris ex S. arvensi olim ortus fuisset.*

3. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis subum-  
bellatis, foliis basi cordatis.

*Sonchus* pedunculis calycibusque hispidis, floribus congestis. *Fl. suec.* 642. *Dalib. paris.* 243.

*Sonchus* foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. *Hort. cliff.* 384.

*Hieracium majus*, folio sonchi, f. *Hieracium sonchites*. *Baub. pin.* 126.

*Hieracium majus*. *Fuchs. hist.* 319.

*Habitat in Europæ agris argillosis.* 2

*oleraceus.*

4. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus glabris.  
*Fl. succ.* 643. *Dalib. parif.* 243.

*Sonchus annuus ramosus diffusius, foliis laciniatis. Fl. lapp.* 289. *Hort. cliff.* 354.

*Sonchus caule ramolissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculi æqualibus. Roy. lugdb.* 129.

*lævis*

- a. *Sonchus lævis laciniatus latifolius. Bauh pin.* 124.

*Sonchus lævis. Cam. epit.* 279.

- β. *Sonchus lævis minor, paucioribus laciniis, Bauh. pin.* 124.

*Sonchus lævis latifolius. Tabern. ic.* 190.

*asper.*

- γ. *Sonchus asper laciniatus & non laciniatus. Bauh. pin.* 124.

*Sonchus asper laciniatus latifolius & angustifolius. Loef. pruss.* 257. t. 77. 75.

- δ. *Sonchus asper non laciniatus. Tournef. infl.* 474.

*Sonchus aspera. Fuchf. hist.* 674.

*Habitat in Europæ cultis. ☉*

*tenuissimus.*

5. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus pilosis.  
*Sonchus lævis in plurimas & tenuissimas lacinias divisus. Bauh. pin.* 124. *prodr.* 61.

*Chondrilla lutea. Bauh. hist.* 2. p. 120.

*Habitat Montpelii, Florentiæ. ☉*

*Caulis ramosissimus: pilis sparsis, glutiniferis. Pedicelli albo tomento vestiti. Calyces cylindrici: pilis patentibus adspersi. Folia glabra, tenera, pinnatifida, inermia.*

*alpinus.*

6. *SONCHUS* pedunculis squamosis, floribus racemosis.  
*Fl. succ.* 644.

*Sonchus caule erecto, foliis pinnato-hastatis: apice cordato-triangulis, floribus racemosis. Hort. cliff.* 385. \*

*Sonchus lapponum altissimus, floribus cæruleis. Fl. lapp.* 290.

*Sonchus lævis laciniatus cæruleus f. Sonchus alpinus cæruleus. Bauh. pin.* 124.

*Sonchus cæruleus. Cam. epit.* 284.

*Habitat ad latera Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Austriæ. ☉*

*serotinus.*

7. *SONCHUS* pedunculis subsquamosis, foliis lyrato-hastatis.

*Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentatis: radicalibus*

# SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 795

bus latissimis obtusis, floribus racemosis. *Roy. lugdb.* 129.

*Sonchus annuus canadensis altissimus laciniatus, flore cæruleo.* *Vail. act.* 1721. p. 198.

*Lactuca altissima, folio sonchi laciniato, flore parvo cæruleo.* *Boerb. lugdb.* 1. p. 81.

*Habitat in Virginia, Canada.*

8. *SONCHUS* pedunculis squamatis, foliis lanceolatis *sibiricus*, indivisis sessilibus. *Hort. upf.* 244.

*Sonchus foliis lanceolatis sessilibus plerumque denticulatis, floribus corymbosis, caulibus glabris* *Gmel. sibir.* 2. p. 11. t. 3.

*Lactuca salicis folio, flore cæruleo.* *Amm. ruth.* 211. 212.

*Habitat in Sibiria, Suecia septentrionali, Finlandia.* 2

## LACTUCA.

1. *LACTUCA* foliis pinnato-linuatis denticulatis acutis: *quercina*, subtus lævibus, caule glabro. *It. gotl.* 289. \* *Fl. succ.* 646. \*

*Lactuca foliis quernis.* *Raj. hist.* 221.

*Habitat in Insula Carolina Balthici.* 2

2. *LACTUCA* foliis rotundatis, caule corymbosa. *fativa.*  
*Lactuca fativa.* *Bauh. pin.* 122. *Hort. cliff.* 384. *Hort. upf.* 242. *Mat. med.* 370.

3. *Lactuca capitata.* *Bauh. pin.* 123. *Morif. hist.* 3. p. 57. *capitata*, f. 7. t. 2. f. 2.

γ. *Lactuca crispa.* *Bauh. pin.* 123. *Dod. pempt.* 644. *crispa*,  
*Habitat* - - - - - ⊙

*Cultura mangorico forte producta ex proximis.*

3. *LACTUCA* foliis carina aculeatis dentatis. *virosa* :

*Lactuca caule foliisque aculeatis.* *Hort. cliff.* 384. \* *Roy. lugdb.* 121. *Dalib. paris.* 236. *Sauv. monsp.* 295.

*Lactuca sylvestris, odore viroso.* *Bauh. pin.* 123. *Morif. hist.* 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 16.

β. *Lactuca sylvestris annua, costa spinosa, folio integro, colore cæcio.* *Morif. hist.* 3. p. 58.

γ. *Lactuca sylvestris italica, costa spinosa, sanguineis maculis adpersa.* *Herv. parad.* 191. t. 194.

δ. *Lactuca sylvestris, costa spinosa:* *Bauh. pin.* 123.

*Lactuca sylvestris laciniata.* *Morif. hist.* 3. p. 58. f. 7. t. 2. f. 17.

*Habitat in Europæ australioris aggeribus, sepibus.*

Folia

796 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Folia prima f. radicalia in α. integra, in β. sinuata.*  
*Raj. angl. 3. p. 161.*

*canadensis.* 4. **LACTUCA** foliis lanceolato-ensiformibus dentatis inermibus.

*Lactuca canadensis altissima angustifolia, flore pallide luteo. Tournesf. inst. 474.*

*Sonchus sylvestris, folio laciniato glauco; costa non spinosa. Raj. suppl. 137.*

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Differt a sativa caule altiore; Foliis quadruplo longioribus, angustioribusque; Racemo terminali longo, composito, nec corymboso.*

*saligna.* 5. **LACTUCA** foliis hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis. *Aman. acad. 1. p. 150.*

*Lactuca foliis linearibus hastatis: inferioribus dentatis. Roy. lugd. 121.*

*Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis, dorso serratis. Sauv. monsp. 692.*

*Lactuca foliis radicalibus linearibus dentato pinnatis: laciniis sursum dentatis: caulinis alato-lanceolatis, floralibus linearibus sessilibus. Guett. stamp. 374. Dalib. paris. 236.*

*Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis, superioribus acuminatis integris. Raj. suppl. 135.*

*Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio: costa albicante. Rupp. jen. 167. Hall. jen. 207. t. 4. optim.*

*Lactuca sylvestris, angusto-laciniato folio. Magn. monsp. 298. \**

*Endivia minor lactucina spinosa. Barr. ic. 136.*

*Habitat in Gallia, Lipsiæ.*

*perennis.* 6. **LACTUCA** foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis sursum dentatis. *Hort. cliff. 384. Roy. lugdb. 121. Dalib. paris. 236.*

*Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. Banb. pin. 130.*

*Chondrilla. Dod. pempt. 637.*

*Apate. Dalech. hist. 561.*

*Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. 2*

## CHONDRILLA.

*imica.* 1. **CHONDRILLA.** † *Hort. cliff. 383. Roy. lugdb. 120. Hall. belv. 755. Gmel. sibir. 2. p. 8.*

Chon-



Chondrilla foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolato-linearibus. *Wach. ult.* 223. *Bœhm. lips.* 89.

Chondrilla juncea viscosa arvensis. *Bauh. pin.* 30.

Chondrilla juncea. *Tabern. hist.* 487.

Chondrilla viminea. *Bauh. hist.* 2. p. 1021. \*

*Habitat in* Germania, Helvetia, Gallia *ad agrorum margines.*

## PRENANTHES.

1. PRENANTHES foliis linearibus integerrimis. *tenuifolia.*

*Prenanthes angustifolius*, flore purpureo. *Vaill. act.*

1721. p. 193.

Chondrilla angustissimo, longissimo integroque folio.

*Juss. act.* 1709.

*Habitat in* Alpibus Europæ australis.

2. PRENANTHES foliorum ramentis cauli adnatis. *viminea.*

*Prenanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis*, ramentis foliaceis cauli ramisque adnatis. *Vir. cliff.* 78. *Roy.*

*lugdb.* 120 *Sauv. monsp.* 692.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *Bauh. pin.* 130.

*Habitat in* Gallia, Lusitania.

3. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lanceolatis *purpureo.*  
denticulatis. *Hort. cliff.* 383.

*Lactuca montana* purpureo-cærulea minor. *Bauh. pin.*

123.

*Sonchus lævior* pannonicus 4, purpureo flore. *Clus. hist.*

2. p. 147.

- β. *Lactuca montana*, purpureo-cærulea, major. *Bauh. pin.*

123.

*Sonchus montanus*, purpureus tetrapetalos. *Col. ecphr.*

1. p. 245.

*Habitat in* Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ *nemoribus montanis.*

4. PRENANTHES flosculis quinis, foliis lyrato-hasta-*muralis.*  
tis. *Hort. cliff.* 383. *Fl. succ.* 645. *Roy. lugdb.* 120.

*Hall. belv.* 755. *Dalib. parif.* 235.

*Sonchus lævis* laciniatus muralis, parvis floribus. *Bauh.*

*pin.* 124.

*Sonchus lævis* vulgator 2. *Clus. hist.* 2. p. 136.

*Habitat in* Europæ *nemoribus umbratis.*

5. PRENANTHES erecta; flosculis quinis, foliis trilobis: *altissima.*

*Prenanthes canadensis* altissima, foliis variis, flore luteo.

*Vaill. act.* 1721. p. 194.

Son-

798 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Sonchus elatus* f. *dendroides virginianus*, ari in modum  
ariculatis foliis, ramosissimus, floribus luteis parvis pen-  
tapetalis. *Pluk. alm.* 355. n. 317. f. 2.  
*Habitat in Virginia, Canada.*

*alba.*

6. *PRENANTHES* flosculis plurimis; floribus nutanti-  
bus subumbellatis, foliis hastato-angulatis. *Hort. cliff.*  
383. *Gron. virg.* 89.

*Prenanthes* nov' *anglicanus*, chenopodii foliis, radice  
bulbosa, sanguineo caule, floribus racemosis candidis-  
simis. *Pluk. amalb.* 195.

- β. *Prenanthes autumnalis*, flore dilate purpureo deorsum  
nutante, spicatum ad caulem disposito, foliis scabris  
incilis, caule singulari. *Gron. virg.* 89.

*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.*

*altissima.*  
*repens.*

7. *PRENANTHES repens*, foliis trilobis. *Amæn. acad.*  
2. p. 360. f. 23. \*

*Habitat in Sibiria.*

LEONTODON.

- Taraxacum.* 1. *LEONTODON* calyce inferne reflexo. *Fl. lapp.* 280.  
*Fl. succ.* 627. *Mat. med.* 368. *Hort. cliff.* 386. *Gron.*  
*virg.* 176. *Roy. lugdb.* 122. *Dalib. parif.* 240. *Gmel.*  
*fibir.* 2. p. 14.

Dens leonis, latiore folio. *Bauh. pin.* 126.

Hedypnois. *Fuchf. hist.* 680.

- β. Dens leonis angustiore folio. *Bauh. pin.* 126.

*Habitat in Europæ pascuis. &*

*bulbosum.*

2. *LEONTODON* foliis oblongo-ovatis subdentatis gla-  
bris, calycibus lævibus, pedunculis hirtis.

*Taraxacum* calyce toto erecto subhirtuto, radice bulbo-  
sa. *Sauv. monsp.* 297.

*Chondrilla* bulbosa. *Bauh. pin.* 130.

*Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa.* *Lob. ic.* 230.

*Habitat Montpelii, inque Italia.*

*Dandelion.*

3. *LEONTODON* foliis ensiformibus integris, calyce  
erecto simplici. *Gron. virg.* 90. \*

*Habitat in Virginia.*

Pedunculi versus flores hispidi, & glutinosi et adunt.

Folia radicalia ensiformia, longa, glabra, integerrima.

*autumnale.*

4. *LEONTODON* calycibus erectis, pedunculis squa-  
mosis, foliis glabris dentatis integerrimis. *Fl. succ.* 629.  
*Crepis* foliis longis dentatis linearibus, caule declinato  
nudo. *Hort. cliff.* 386. *Hiera-*

Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice succisa, majus & minus. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium minus. *Fuchf. hist.* 320.

*Habitat in Europæ pratis, pascuis, autumno. 2*

5. LEONTODON foliis dentatis hirsutis, calyce erecto *tuberosum*, acuto.

Taraxaconoides chondrillæ folio hirsuto, asphodeli radice. *Vaill. act.* 1721. p. 170.

Dens Leonis asphodeli bulbulis. *Bauh. pin.* 126.

Chondrilla altera diofcoridis monipelientium. *Lob. ic.* 232.

*Habitat in Hetruriæ, Galloprovinciæ, Narbonæ pratis. 2*

6. LEONTODON calyce toto erecto hispido, foliis *hispidum*, hispidis dentatis integerrimis. *Hort. cliff.* 386. *Fl. suec.* 628. *Roy. lugdb.* 122. *Dalib. parif.* 241.

Pieris calyce erecto, foliis hispidis dentatis: dentibus integerrimis. *Sæuv. monsp.* 388.

Hieracium asperum, folio magno dentis leonis. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium, caule aphylo, hirsutum. *Bauh. hist.* 2. p. 1037.

7. Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum minus laciniatum. *Bauh. pin.* 127. *prodr.* 63.

8. Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum magis laciniatum. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium parvum hirtum, caule aphylo, crispum ubi siccatum. *Bauh. hist.* 1038.

*Habitat in Europæ pratis.*

*Varietates, quàmvis habitu diversus ejusdem esse speciei ex pilis apice stellatis judicavi.*

## HIERACIUM.

\* *Scapo nudo, unifloro.*

1. HIERACIUM foliis integris subdenticulatis lanceo-*incanum*, latis scabris, scapo unifloro.

Hieracium montanum angustifolium nonnihil *incanum*. *Bauh. pin.* 129.

Hieracium VI montanum. *Clus. hist.* 2. p. 141. *Bauh. hist.* 3. p. 1038.

*Habitat in Alpibus Danubio imminentibus; Helvetiæ, Tauro.*

Stolones nulli. Folia vix manifeste denticulata.

2. HIE-

*Hedypnoides* 2. **HIERACIUM** foliis dentatis viscidis hirsutis subspiculis, scapo nudo unifloro, calyce hirsuto. *Sauv. monsp.* 298. †

*Hieracium montanum*, dentis leonis folio, f. laciniatum, lanuginoso folio. *Bauh. pin.* 468.

*Hieracium folio Hedypnoidis.* *Clus. hist.* 2. p. 142.

*Habitat in* Lotharingia, Montspeli.

*alpinum.* 3. **HIERACIUM** foliis oblongis integris dentatis, caule subnudo unifloro, calyce piloso.

*Hieracium caule unifloro, calyce villosa.* *Fl. lapp.* 283. *Fl. suec.* 632.

*Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso.* *Bauh. pin.* 129.

*Hieracium villosum alpinum, flore magno singulari.* *Raj. angl.* 3. p. 169. t. 6. f. 2. \*

*Pilosella monoclonos non repens alpina minor lanuginosa, amplo flore.* *Morif. hist.* 3. p. 78. f. 7. t. 7. f. 5.

*Habitat in* Alpibus Laponicis, Britannicis.

*venosum.* 4. **HIERACIUM** foliis cuneiformibus hirtis, scapo nudo crassissimo erecto. *Gron. virg.* 89.

*Hieracium species 2.* *Cold. noveb.* 175.

*Hieracium marianum perelegans, lapathi venis sanguineis inscriptis foliis, flore parvo flavescente.* *Pluk. mant.* 102.

*Hieracium fruticosum latifolium, foliis punctis & venis sanguineis notatis.* *Banist. virg.*

*Habitat in* Virginia.

*Pilosella.* 5. **HIERACIUM** foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. *Hort. cliff.* 358. *Fl. suec.* 633.

*Mat. med.* 369. *Roy. lagab.* 122. *Hall. belv.* 742.

*Dalib. parif.* 238.

*Pilosella major repens hirsuta.* *Bauh. pin.* 262.

*Pilosella major.* *Cam. epit.* 709. *Fuchf. hist.* 605.

*Habitat in* Europæ pascuis aridis. 2

\* *Scapo nudo multifloro.*

*rubrum.* 6. **HIERACIUM** foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Fl. suec.* 634. *Dalib. parif.* 237. *Sauv. monsp.* 14.

*Pilosella major repens minus hirsuta.* *Bauh. pin.* 262.

*Habitat in* Suecia. 2

*Auricula.* 7. **HIERACIUM** foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro. *Fl. lapp.* 282. *Fl. suec.* 635. \*

*Hiera-*

*Hieracium* foliis integerrimis, caule repente, scapo nudo multifloro. *Hort. cliff.* 388. \*

*Pilosella* major erecta altera. *Bauh. pin.* 262.

*Pilosella* repens minor, caule pedali, polyanthos, foliis angustis oblongis. *Raj. suppl.* 147.

*Habitat in* Europæ pratis aridis, juxta agros. 2

8. *HIERACIUM* foliis ovatis subdentatis, scapo nudo <sup>præmorsum</sup> racemoso, floribus superioribus primoribus. *Fl. suec.* 636. \*

*Hieracium* foliis ovatis tomentosis, caule nudo floribus spicatis luteolis terminato. *Hall. helv.* 744. *Gmel. hb.* 2. p. 32. t. 13. f. 2.

*Hieracium* pratense latifolium non sinuatum majus. *Bauh. pin.* 129.

*Hieracium* latifolium, præmorsa radice, caule singulari, pilosellæ majoris affine. *Bauh. hist.* 2. p. 1033.

*Pilosella* major erecta. *Bauh. pin.* 262. *Raj. hist.* 241.

*Intybus* aphyllocaulis major. *Thal. barc.* 66.

*Habitat in* Helvetia, Hareynia, Uplandia. 2

9. *HIERACIUM* foliis integris, caule subnudo simpli-<sup>aurantiacum</sup> cissimo piloso corymbifero. *Hort. cliff.* 388. *Hort. upf.* 238.

*Hieracium* hortenſe, floribus atro-purpureſcentibus. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65.

*Hieracium* alpinum non laciniatum, flore fusco. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65.

*Hieracium* germanicum 1. *Col. ecphr.* 2. p. 28. t. 30.

*Pilosella* polyclonos repens major ſyriaca, flore amplo aurantiaco. *Morif. hist.* 3. p. 78. f. 7. t. 8. f. 7.

*Habitat in* Syria, Helvetia.

10. *HIERACIUM* foliis caulinis elongato-dentatis gla-<sup>chondrilloides.</sup> bris; radicalibus lanceolatis integris, caule ramoſo.

*Hieracium* alpinum pumilum, chondrillæ folio. *Bauh. pin.* 129. *prodr.* 65. *Barf. VI.* 87.

*Habitat in* Sneeborg Aultriæ inferioris.

*Caulis* spithameus, levis. *Folia* radicalia lanceolata, petiolata, integra, glabra. *Caulina* 5 ad 6, alterna, glabra, longa: dentibus longis, recurvatis, facie *Leontod. autumnalis*. *Pedunculi* ex alis superioribus foliorum, altitudine caulis, solitarii, nudi, uniflori: *Bractæa* una aut altera setacea, apice subvillosa. *Calyces* erecti, imbricati foliolis linearibus. *Corolla* pallide flava.

- Gronovii.** 11. **HIERACIUM** caule paniculato subnudo, foliis radicalibus obovatis integerrimis pilosis.  
*Hieracium* foliis radicalibus obverse ovatis pubescentibus: caulinis ovatis amplexicaulibus, floribus paniculatis, caule erecto. *Gron. virg.* 90.  
*Habitat in Virginia, Pennsylvania.* 2  
*Radix pramonfa. Folia radicata obovata, obtusa, integerrima, tenuitate membranacea, supra pilis raris adspersa, subtus subviolacea. Caulis pedalis, filiformis, uno alterove folio lanceolato, paniculatus, panicula inaequali.*
- Ervalini.** 12. **HIERACIUM** caule paniculato nudo, foliis radicalibus ovatis serratis glabris.  
*Hieracium* foliis ex sinuato-dentatis, caulibus supra ramosis subnudis, pedunculis hisutis unifloris. *Gmel. fib.* 2. p. 25. t. 8. f. 2.  
*Habitat in Sibiria.* 2  
*\* Caule folioso.*
- Canadensis.** 13. **HIERACIUM** caule erecto, foliis alternis lanceolatis nudis dentatis, panicula capillari.  
*Habitat in Canada. Kalin.*  
*Caulis pedalis, erectus, teres, inferne albo-lanatus, superne glaber. Folia lanceolata, latiuscula, basi attenuata, acuminata, remote dentata, tenera, glabra: inferiora subtus, praesertim ad carinam pilosa. Panicula terminalis varie ramosa: Pedunculis tenuissimis, fere capillaribus, divaricatis. Bractæ ad ramificationes brevissimæ, setaceæ. Flores parvi.*
- porrifolium.** 14. **HIERACIUM** caule composito ramosissimo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 125.\*  
*Hieracium phalangii foliis. Vaill. act.* 1721. p. 184  
*Hieracium montanum, asphodeli foliis acuminatis. Bocc. mus.* 147. t. 106. *Raj. suppl.* 142.  
*Habitat in Alpibus Austriae, Italiae.*  
*Folia radicalia subulata, fere Scitices. Caulis pedalis, Ramis longis, raris, parum subdivisis. Folia in caule minora & tantum ad exortum ramorum.*
- MINOTYNNI.** 15. **HIERACIUM** caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *Hort. cliff.* 388. *Fl. suec.* 637. *Roy. lugdb.* 123. *Dalib. parif.* 237. *Gmel. fibir.* 2. p. 25.  
*Hieracium caule ramoso, foliis ovatis dentatis. Fl. lapp.* 284.

Hiera-

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 803

- Hieracium murorum, folio pilosissimo. *Bauh. pin.* 129. pilosissimum.  
*Corchorus. Dalech. hist.* 565.
- β. Hieracium murorum laciniatum minus pilosum. *Bauh. sylvaticum*  
*pin.* 129. *It. wgoth.* 257.
- Pulmonaria gallica femina. *Tabern. hist.* 504.
- γ. Hieracium macrocaulon hirsutum, folio longiore. *Raj.*  
*angl.* 3. p. 169.  
*Habitat in Europæ apricis duris.*
16. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Fl. lapp.* 285. *paludosum.*  
*Fl. suec.* 638.
- Hieracium cichorei folio. *It. Wgoth.* 32.
- Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *Bauh. pin.* 129. *Morif. hist.* 3. p. 69. f. 7. t. 5. f. 47.
- Habitat in Europæ borealioris nemoribus paludosis.*  
*Calyces pilis nigris exstantibus hirtifunt. Varietas forte sola antecedentis, quamvis ex loco evasit facie diversissima.*
17. HIERACIUM caule multifloro, foliis lyratis glabris, calycibus pedunculisque hispidis. *lyratum.*  
 Hieracium caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus teneris oblongis plerumque petiolatis: petiolis inferiorum dentatis. *Gmel. sib.* 2. p. 24 t. 9.  
*Habitat in Sibiria D. Gmelin.*  
*Affinis maxime H. paludoso. Caulis laevis. Calyces pubescentes, & quod in precedenti non obtinet, Pedunculi etiam pubescentes. Folia magis lyrata, petiolata, angulis obtusioribus.*
18. HIERACIUM foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis semiamplexicaulibus. *cerinthoides.*  
*124. Hort. nps.* 238.  
 Hieracium pyrenaicum, foliis cerinthes, latifolium. *Tournef. inst.* 472.  
*Habitat in Pyrenæis. 2*
19. HIERACIUM foliis amplexicaulibus cordatis subdentatis, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramoso. *sub-amplexicaule.*  
*Hort. cliff.* 387. \* *Roy. lugdb.* 123.  
 Hieracium pyrenaicum longifolium amplexicaule. *Tournef. inst.* 472.
- β. Hieracium pyrenaicum rotundifolium amplexicaule. *Tournef. inst.* 472.  
*Habitat in Pyrenæis.*

- pyrenæicum*. 20. **HIERACIUM** foliis obovato-lanceolatis retrorsum dentatis, caule simplici, floribus terminalibus confertis. *Amæn. acad.* 1. p. 151. \*  
*Habitat in Pyrenæis. Barf. VI. 74.*
- Blatteroides* 21. **HIERACIUM** foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis, floribus solitariis, calycibus laxis. *Hort. cliff.* 387. \* *Roy. lugdb.* 123. *Amæn. acad.* 1. p. 151.  
*Hieracium pyrenæicum, blattariæ folio, minus hirsutum. Tournes. inst.* 472.  
*Habitat in Pyrenæis.*
- glutinofum*. 22. **HIERACIUM** foliis lanceolatis lyrato-dentatis scabriusculis, floribus umbellatis.  
*Hieracium dentis leonis folio, floribus parvis. Baub. pin.* 127. *prodr.* 63.  
*Habitat in G. Narbonensi. ☉*  
*Habitus Crepis tectorum. Folia summa lanceolata, integerrima. Caulis striatus. Folia mollia, glutinosa.*
- kalmii*. 23. **HIERACIUM** caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedunculis tomentosis.  
*Habitat in Pensylvania. Kalm.*  
*Caulis erectus, H. sabando angustior, levis. Folia lanceolata, alterna, subsessilia, acuminata, parva, nulla, argutius extrorsum dentata, quam ulla alia hujus generis. Pedunculi ad apicem caulis alterni, simpliciores & uniflori, tomentoso-albidi, Bracteis varioribus, linearibus. Flores parvi, terminales, erecti.*
- sprengerianum*. 24. **HIERACIUM** caule ramoso folioso, foliis semiamplexicaulibus oblongis repandis hispidis. *Roy. lugdb.* 123.  
*Hieracium pulchrum ramosum sprengerianum. Baub. hist.* 2. p. 1026. *Morif. hist.* 3. p. 65. f. 7. t. 5. f. 17.  
*Habitat in Lusitania.*
- sabaudum*. 25. **HIERACIUM** caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Roy. lugdb.* 124. *Hort. nps.* 238.  
*Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. Baub. pin.* 129.  
*Hieracii sabaudi varietas. 1. Baub. hist.* 2. p. 1030.  
*Habitat in Germania. 2*
- umbellatum*. 26. **HIERACIUM** foliis linearibus subdentatis spartis, floribus subumbellatis. *Fl. lapp.* 287. *Fl. succ.* 639. *Hort.*



*Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123. *Dalib. paris.* 237.  
*Gmel. sib.* 2. p. 25.

*Hieracium fruticosum angustifolium majus. Baub. pin.*  
 129.

*Hieracium sabaudum. Dalech. hist.* 570.

*Habitat in Europæ pascuis siccis. &*

### CREPIS.

1. CREPIS foliis ovatis integris villosis petiolatis, caule *Pygmaea* procumbente. †

*Hieracium alpinum incanum saxatile, brunellæ foliis integris. Bocc. mus.* 2. p. 33. t. 24. *Raj. suppl.* 142.

*Habitat in Alpibus Italiæ ad Nursiam prope lacum pilati.*

2. CREPIS foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis: *se-nudicaulis*.  
 tis subulatis, scapo unifloro.

*Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum magis & minus laciniatum. Baub. pin.* 127. *prodr.* 63. t. 633. n. 1.

*Habitat in G. Narbonensi, Hispania.*

3. CREPIS foliis pinnatifidis crenatis, scapo nudo *pau-bursifolia*.  
 cifloro.

*Hieracium ficulum, bursæ pastoris folio. Bocc. mus.* 2. p. 147. t. 106. & 112. *Raj. suppl.* 142.

*Hieracium minus panormitanum, cichorei folio. Cup. carb.* 95. *suppl.* 3.

*Habitat in Sicilia. &*

4. CREPIS involucris calyce longioribus: squamis *se-barbata*.  
 taceis sparsis. *Hort. ups.* 239.

*Hieracium calycibus setis longissimis distantibus patentibus obvallatis. Hort. cliff.* 387. *Sauv. monsp.* 83.

*Hieracium proliferum falcatum. Baub. pin.* 128.

*Hieracium calyce barbato. Col. ecphr.* 2. p. 28. t. 27. f. 1.

*Habitat in MonsPELLI, Vesuvii, Sicilia, Messanæ arenosis maritimis. ☉*

5. CREPIS involucris ovatis concavis obtulis *patenti-vesicaria*.  
 bus.

*Hieracium montanum rapifolium. Baub. pin.* 129. *prodr.* 749. *Raj. hist.* 237. *Morif. hist.* 3. p. 65. *secundum.*

*Burs. VI:* 70.

6. Cichorium pratense hirsutum vesicarium. *Baub. pin.* 126.

E e c 3

Cicho-

*Cichorium sylvestre vesicarium pratense. Col. ecphr. 1. p. 238. t. 237.*

*Habitat in Helvetia, & in Apulia.*

*Plantæ & Radix crassa. Folia lyrata, angulata, dentata, scabra. Caulis brevis. Rami longi, nudi, bifidi s. trifidi, uniflori, pedunculorum. Bractæ ovate, solitariae, concave, integrae, pallidae. Flores lutei. Calyces singuli cincti involucri longitudine calycis, ex foliolis 5. s. 6, patentibus. ovatis, obtusis, concavis, membranaceis, pallidis. Planta & foliis a priori manifeste differt, flores vero conjungunt utramque.*

*tubra.*

6. CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis; radicalibus sinuatis. *Vir. cliff. 79. Hort. ups. 239. Sauv. monsp. 295.*

*Hieracium foliis caulinis sinuatis, calycibus ante florescentiam nutantibus. Hort. cliff. 388.*

*Hieracium apulum, flore suaverubente. Col. ecphr. 1. p. 244.*

*Hieracium dentis leonis folio, flore suaverubente. Baub. pin. 127.*

*Chondrilla purpurascens foetida. Baub. pin. 130. prodr. 68. t. 68.*

*Habitat in Apulia. ☉*

*Pappus stipitatus ut in C. alpina.*

*alpina.*

7. CREPIS foliis amplexicaulibus oblongis acuminatis: inferioribus superne, summis inferne denticulatis. *Hort. ups. 238.*

*Hieracioides annua, endiviæ folio, capite magno. Vaill. act. 1721. p. 246.*

*Hieracium alpinum, scorzonerae folio. Tournes. inst. 472.*

*Leontodon calyce toto erecto: inferiore squamis fideis, foliis amplexicaulibus. Gmel. sibir. 2. p. 16. t. 5.*

*Habitat in Alpibus Italiae. ☉*

*pulchra.*

8. CREPIS foliis sagittatis dentatis, pedunculis superne turbinato-inflatis. *Gvett. stamp. 378. Dalib. parif. 238. n. 1.*

*Chondrilla, hieracii folio, annua Tournes. inst. 238.*

*Hieracium pulchrum. Baub. hist. 2. p. 1025.*

*Hieracium montanum hirsutum minus. C. B. Raj. hist. 234.*

*Hieracioides annua glutinosa, floribus parvis. Vall. act. 1721.*

*Habitat in Gallia. ☉*

9. CRE-

9. CREPIS foliis ovatis denticulatis, petiolis alatis am-<sup>sibirica.</sup>  
plexicalibus dentatis. *Hort. ups.* 239. \*
- Hieracium caule ramofo, foliis infirmis: infirmis petio-  
latis, reliquis ex ovato lanceolatis: omnibus sinuofis, pe-  
tiolorum infiar dentatis. *Gmel. fib.* 2. p. 26. t. 24.
- Habitat in Sibiria.* 2
- Pappus feffilis ut in *C. bienni* & *C. tectorum*.
10. CREPIS foliis lanceolatis fagittatis feffilibus lævibus: <sup>tectorum.</sup>  
inferioribus dentatis. *Fl. succ.* 640. *Dalib. parif.* 238.  
*Gmel. fib.* 2. p. 28.
- Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis, caulinis  
lanceolatis fubdenticulatis. *Fl. lapp* 286. *Hort. cliff.*  
387.
- Hieracium majus erectum anguftifolium, caule lævi.  
*Bauh. pin.* 127.
- Hieracium majus diofcoridis. *Tabern. ic.* 180.
- Habitat in Europæ aridis, tectis.* ☉
- Calyx calyculatus, fulcatus, adfperfus longitudinaliter  
pilis glutiniferis.
11. CREPIS foliis pinnato-haftatis fcabris: bafi fuperne <sup>biennis.</sup>  
dentatis, calycibus muricatis.
- Crepis scanentis, *It. scan.* 171: \*
- Hieracium, chondrillæ folio, glabrum. *Bauh. pin.* 127.
- Hieracium foliis & facie chondrillæ. *Lob. ic.* 239.
- Hieracium, chondrillæ folio, hirtutum. *Bauh. pin.* 127.
- Hieracium V. *Tabern. hift.* 492.
- Hieracioides foliis variis glabris, caule ramofiffimo. *Hall.*  
*helv.* 751.
- Cichorium pratense luteum lævius. *Bauh. pin.* 126.
- Habitat in Scanix & Europæ australioris apricis.* ☉
- Calyx calyculatus, fulcatus, muricatus longitudinaliter  
aculeis mollibus.
12. CREPIS foliis haftato-lyratis, caule pilofo, <sup>hirtum.</sup>  
Hieracioides foliis variis alperis, caule altiffimo foliofo  
unifloro. *Hall. helv.* 750.
- Hieracium, chondrillæ folio, hirtutum. *Bauh. pin.* 127.
- Hieracium crucifolium hirtutum. *Bauh. hift.* 2. p. 1025.
- Morif. hift.* 3. p. 65. f. 7. t. 5. f. 14.
- Habitat in Helvetia, Gallia.* ☉
13. CREPIS foliis pinnatis angularis, petiolis dentatis. <sup>fetida.</sup>  
*Roy. lugdb.* 126. *Dalib. parif.* 239.
- Hieracium luteum, cichorei fylveftris folio, amygdalas  
amaras olens. *Morif. hift.* 3. p. 63. f. 7. t. 4. f. 4.
- E e c 4 Sene-

Senecio hirsutus. *Baub. pin.* 131.  
 Erigeron tertium. *Dod. pempt.* 641.  
*Habitat in Gallia.*

## ANDRYALA.

- integrifolia.* 1. ANDRYALA foliis integris. *Guett. stamp.* 2. p. 384.  
*Hort. ups.* 240. *Sauv. monsp.* 83.  
 Sonchus villosus luteus major. *Baub. pin.* 124.  
 Sonchus lanatus. *Dalech. hist.* 1116.  
 Hieracium villosum. *Raj. hist.* 231.  
*Habitat in Gallia, Sicilia. ☉*

- sinuata.* 2. ANDRYALA foliis dentato-hastatis.  
 Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris.  
*Hort. cliff.* 357. *Sauv. monsp.* 692.  
 Eriophorus foliis inferioribus ad costam usque laciniatis.  
*Vaill. act.* 1721. p. 212.  
 Sonchus villosus luteus minor. *Baub. pin.* 124. *prodr.* 61.  
*Habitat Monspelii, inque Sicilia.*

## HYOSERIS.

\* *Caule nudo.*

- foetida.* 1. HYOSERIS scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis.  
 Taraxacnastrum, dentis leonis folio, radice foetida.  
*Vaill. act.* 1721. p. 180.  
 Leontodontoides alpinus glaber, crysimi folio, radice crassa foetida. *Mich. gen.* 31. t. 28.  
 Dens Leonis tenuissimo folio. *Baub. pin.* 126. *prodr.* 62.  
 Hieracium foetidum. 111. *Col. ecphr.* 2. p. 29. t. 31.  
*Habitat in Alpibus Italiæ, Austriæ superioris.*  
 Folia pinnatifida, glabra lobis latere postico subdentatis. Scapi simplices, nudi. Calyx simplex, basi audens.  
 Semina nuda.
- radiata.* 2. HYOSERIS scapis unifloris nudis, foliis glabris lyrate-hastatis angulatis.  
 Hyoseris foliis glabris hastato-pinnatis. *Roy. Lugdb.* 12.  
*Sauv. monsp.* 300.  
 Taraxacnastrum dentis leonis folio ad summitatem radiato. *Vaill. parif.* 121. p. 180.  
 Dens leonis minor, foliis radiatis. *Baub. pin.* 129. *Pl. alm.* 130. t. 37. f. 2.  
*Habitat in Hispania, G. Narbonensi. 2*

Pedunculus & rachis foliorum farinacea. Lobi foliorum imbricatim reflexi utrinque dentati, leves. Semina membranacea: Pappo simplici, sessili.

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis scabris, seminibus pappotis. *Hort. cliff.* 386 *Roy. lugdb.* 127.

*Taraxacnastrum*, erythri folio, flore minimo. *Vaih. act.* 1721. p. 235.

Deus leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis a flore delapso erectis & semina complexis. *Raj. suppl.* 147.

*Habitat in Sicilia.*

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyratis virginicæ glabris. *Gron. virg.* 60. \*  
*Habitat in Virginia.*

Folia radicalia prima ovata, tum lanceolata, demum lyrata, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex decem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Semina tetragona, coronata margine membranaceo integro & insuper setis 3. s. 4. longis.

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Fl. minima, succ.* 630. *Roy. lugdb.* 127. *Sauv. monsp.* 14.

*Hyoseris angustifolia. Tabern. ic.* 180.

*Hieracium minimum. Clus. hist.* 2. p. 142.

*Habitat in Europæ arvis apricis.*

\* *Caule folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ramo- *Hedypnois*,  
molo.

*Lapsana* fructibus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-pappotis. *Hort. ups.* 246. \* *Sauv. monsp.* 83.

*Lapsana* calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 131.

*Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. Vaill. act.* 1721. p. 202.

*Hedypnois annua. Tournef. inst.* 478.

*Habitat in Europa australi.* ☉

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloides*.  
*Lapsana* fructibus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-pappotis. *Hort. ups.* 246. \*

*Habitat in Europa australi.* ☉

E c c 5

8. HYO-

*cracca.*

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso.  
 Lappiana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calycu-  
 lato-pappotis. *Hort. ups.* 246. \*  
*Habitat in Creta.*

## HYPOCHÆRIS.

*arenis.*

1. HYPOCHÆRIS foliis dentatis, caule ramoso folio-  
 so, calycibus hispidis. †  
 Hypochæris hieracii carvati folio, calyce hispido. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 215.  
 Hieracium apinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-  
 scissis, capitulis pungenti lanugine oblitis *Cup. cath.*  
*95. Ray. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
 Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

*Achyrophor.*

2. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hispidis. *Hort.*  
*cliff.* 385. \* *Hort. ups.* 240. \*  
 Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque  
 folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.  
 Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde  
 hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus  
 inæqualibus incilis. *Ray. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* ♀

*pontana.*

3. HYPOCHÆRIS foliis lanceolatis dentatis, caule  
 simplici folioso unifloro.  
 Hypochæris non ramosa, endiviæ folio prælongo, mo-  
 nianthos. *Vaill. act.* 1721. p. 215.  
 Hieracium latifolium pontanum præaltum glabrum, en-  
 diviæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 148. t. 113. *Ray. suppl.*  
 142.  
*Habitat in Sabaudia montibus.*

*maculata.*

4. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario, fo-  
 liis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385.  
*Fl. succ.* 631. *Ray. lugab.* 125. *Dalib. parif.* 239.  
 Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 385. *Fl. lapp.* 288.  
 Hieracium alpinum latifolium hirsutæ incanum, flore  
 magno. *Bauh. pin.* 128  
 Hieracium latifolium 1. *Clus. hist.* 2. p. 139.  
 Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *Bauh.*  
*pin.* 128. *prodr.* 65. *Hall. helv.* 760. t. 24.  
*Habitat in Europæ frigidioris pratis asperis.* 4

5. HY-

# SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 811

5. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbricatis, caulo nudo, foliis dentato sinuatis. *Hort. cliff.* 386. n. 4. *Hort. upf.* 240. \* *Roy. lugdb.* 126. *Dalib. paris.* 239. *Sauv. monsp.* 300.  
Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. *Vaill. act.* 1721. p. 214.  
Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. *Bauh. pin.* 127.  
Hyoferis altera. *Tabern. hist.* 490.  
*Habitat in* Dania, Germania, Belgio. ☉
6. HYPOCHÆRIS foliis dentato-sinuatis scabris, caule *radicata*, ramoso nudo, pedunculis squamosis. *Hort. cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 125 *Dalib. paris.* 239. *It. scan.* 225. \* *Sauv. monsp.* 299.  
Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. *Bauh. pin.* 127. *Morif. hist.* 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27  
Hieracium longius radicum. *Lob. hist.* 120. *Raj. hist.* 230.  
Hieracium tertium. *Dod. pempt.* 639.  
*Habitat in* Europæ cultioris pascuis.

## LAPSANA.

1. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis *communis*, tenuibus ramulosis. *Hort. cliff.* 384. *Fl. succ.* 649. *Roy. lugdb.* 130. *Hort. upf.* 246. *Dalib. paris.* 244. *Gmel. sib.* 2. p. 40.  
Lapsana. *Dod. pempt.* 675.  
Soncho affinis Lapsana domestica. *Bauh. pin.* 124.  
*Habitat in* Europæ cultis.
2. LAPSANA calycibus fructus torulosis depressis obtusis sessilibus. *Zacintha*.  
Lapsana calycibus fructus subrotundis angulatis, pedunculis incrassatis, floribus erectis. *Roy. lugdb.* 131. *Hort cliff.* 390.  
Chondrilla verrucaria, foliis cichorei viridibus. *Bauh. pin.* 130.  
Cichorium verrucatum, zacintha. *Clus. hist.* 2. p. 144.  
*Habitat in* Italia. ☉  
Toruli calycis fructiferi octo, gibbi, profunde distincti nodis rufescentibus, exteriora vero calycis foliola tenera & mollia persistunt.
3. LAPSANA calycibus fructus nudique patentibus *stellata*, diis subulatis, foliis lanceolatis indivisis. *Hort. upf.* 245. \* *Sauv. monsp.* 82. *Hie-*

## 812 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

- Hieracium filiqua falcata. Bauh. pin. 128.*  
*Hieracium stellatum. Bauh. hist. 2. p. 1014.*  
*Habitat* Mouspelii, Bononiæ. ☉
- Rhagadiolus* 4. **LAPSANA** calycibus fructus undique patentibus: radiis subulatis, foliis lyratis. *Hort. upf. 245. \**  
*Hieracium falcatum alterum. Ray. hist. 256.*  
*Rhagadiolus lapsanæ foliis. Tournesf. cor. 36.*  
*Rhagadiolus edulis hieraciis affinis. Bauh. hist. 2. p. 1014.*  
*Habitat in Oriente. 5. fene.*
- Chondrilloides.* 5. **LAPSANA** calycibus pyramidatis, seminibus papposis, foliis oblongis subdentatis scabris. *Hort. upf. 245. \* Sauv. monsp. 83.*  
*Hieracium montanum alterum leptomacrocaulon. Col. ecphr. 1. p. 248. t. 249.*  
*Hieracium annuum montanum fruticosius, caule canaliculato. Moris. hist. 3. p. 68. f. 7. t. 5. f. 37.*  
*Habitat in Gallia, Italia. ☉*
- capillaris.* 6. **LAPSANA** seminibus papposis, foliis radicalibus lanceolatis obtusis subdentatis; caulinis hastatis, caule filiformi.  
*Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus. Bauh. pin. 127. prodr. 63.*  
*Habitat in Helvetiæ, Italiæ agris.*  
*Folia radicalia lanceolata, obtusa, glabra, subdentata; caulina lanceolata, hastata, subamplexicaulia, integerrima, acuta, parva. Caules erecti, filiformes, subdichotomi, spinulosi. Flores parvi, lutei. Calyces admodum parce imbricati.*

## CATANANCHE.

- cærulea.* 1. **CATANANCHE** squamis calycinis inferioribus ovatis. *Hort. cliff. 390. Roy. lugdb. 122. Sauv. monsp. 308.*  
*Catananche cærulea, semitofosculorum ordine simplici. Vaill. act. 1721. p. 215.*  
*Chondrilla cærulea, cyani capitulo. Bauh. pin. 130.*  
*Chondrilla species tertia. Dod. pempt. 638.*  
*Habitat in G. Narbonensi. ☉*
- lutea.* 2. **CATANANCHE** squamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Hort. cliff. 390. Hort. upf. 247. Roy. lugdb. 122. Sauv. monsp. 308.*  
*\* Catananche lutea, longo nervoso dentatoque folio. Vaill. act. 1721. p. 216.*  
*Chon-*



- Chondrilla cyanoides lutea*, coronopi folio non diviso.  
*Bocc. musf. 2. p. 21. t. 7. Barr. ic. 1135.*  
*Stoebe plantaginis folio. Alp. exot. 287. t. 286.*  
*Habitat in Creta. ☉*
3. CATANANCHE foliis incis. græca.  
*Catananche lutea*, foliis varie incis. *Vaill. act. 1721. p. 216.*  
*Scorzonera græca saxatilis & maritima*, foliis varie lacin-  
 niatis. *Tournef. cor. 36. itin. 1. p. 223. t. 223.*  
*Habitat in Græciæ maritimis*

## CICHORIUM.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Intybus.*  
*Fl. succ. 650. Dalib. parif. 244. Mat. med. 373.*  
*Cichorium caule simplici. Hort. cliff. 389.*  
*Cichorium sylvestre f. officinarum. Bauh. pin. 126.*  
*Intybus sylvestris. Cam. epit. 285. Fuchs. hist. 979.*  
*Habitat in Europa ad margines agrorum viarumque. ☉*
2. CICHORIUM caule simplici, foliis integris crenatis. *Endivia.*  
*Hort. cliff. 389. Hort. ups. 247. Mat. med. 374.*  
*Cichorium latifolium f. Endivia vulgaris. Bauh. pin. 125.*  
*Intybum sativum. Dod. pempt. 634.*
3. Endivia crispa. *Bauh. pin. 125.*  
*Habitat - - - ☉*
3. CICHORIUM caule dichotomo spinoso. *Hort. cliff. spinosum.*  
 388.  
*Cichorium spinosum. Bauh. pin. 126. prodr. 62. t. 62.*  
*Chondrillæ genus elegans, cæruleo flore. Clus. hist. 2. p. 145.*  
*Habitat in Cretæ, Siciliæ collibus arenosis maritimis. ☉*

## SCOLYMUS.

1. SCOLYMUS foliis margine attenuatis. maculatus.  
*Scolymus annuus. Hort. ups. 244.*  
*Scolymus. Hort. cliff. 388.*  
*Scolymus Chrysanthemus annuus. Dodart. mem. 4. p. 333.*  
*Scolymus theophrasti narbonensis. Clus. hist. 2. p. 153.*  
*Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☉*
2. SCOLYMUS foliis margine incrassatis. hispanicus  
*Scolymus vivax. Sauv. monsp. 294.*  
*Scolymus Chrysanthemos. Bauh. pin. 384.*

Scol-

## 814 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Scolymus theophrasti hispanicus.* *Clus. hist.* 2. p. 153.  
*Carduus Chrysanthemos.* *Dod. pempt.* 725.  
*Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonensi.* 2

### ELEPHANTOPUS.

- scaber.* 1. **ELEPHANTOPUS** foliis oblongis scabris. *Hort. cliff.* 390. *Hort. ups.* 247. *Gron. virg.* 176. *Roy. lugdb.* 131.  
*Elephantopus conyzæ folio.* *Dill. elib.* 126. t. 106. f. 126.  
*Bidens frutescens, foliis oblongis utrinque acuminatis venosis & lanuginosis.* *Brevn. ic.* 32. t. 32.  
*Echinophoræ indicæ affinis, semine & floribus in capitulis lævibus in caulium cymis.* *Pluk. alm.* 132. t. 388. f. 6.  
*Anaschovadi.* *Rheed. mal.* 10. p. 13. t. 7.  
*Habitat in Indiis.* 2
- tomentosus.* 2. **ELEPHANTOPUS** foliis ovatis tomentosis. *Gron. virg.* 90. \*  
*Habitat in Virginia.*  
*Affinis forte nimis præcedenti.*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

### GUNDELIA.

- Tournefortii* 1. **GUNDELIA.**  
*Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro.*  
*Tournef. cor.* 51. *Itin.*  
*Eryngium syriacum, foliis chamæleontis longis & spinosis.* *Morif. hist.* 3. p. 167.  
*Silybum diofcoridis f. Hacub atcardeg serapionis.* *Rauv. itin.* 74. t. 74.  
*Hacub f. Silybum quibusdam.* *Bauh. hist.* 3. p. 84.  
 β. *Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus intense purpureis, capite araneosa lanugine obsito.* *Tournef. cor.* 51.  
*Habitat in Armenia, Syria.* 2

### ECHINOPS.

- sphaerocephalus.* 1. **ECHINOPS** calyculis unifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis.  
*Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris.* *Hort. cliff.* 390. *Hort. ups.* 248. *Roy. lugdb.* 144. *Dalib. paris.* 245.

Echi-

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 815

*Echinopus major. Baub. hist. 3. p. 69.*

*Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris. Baub. pin. 381.*

*Chalcejos. Dalech. hist. 1480.*

*Habitat in Italia. 2*

2. ECHINOPS calyculis unifloris, caule unicapitato. *Ritro.*

*Echinops caule subunifloro. Hort. ups. 248. \**

*Echinops caule subunifloro, foliis duplicato-pinnatifidis foliolis latiusculis vicinis. Gmel. fib. 2. p. 100.*

*Carduus sphærocephalus cæruleus minor. Baub. pin. 381.*

*Ritro floribus cæruleis. Lob. ic. 2. p. 8.*

*Crocodylium montipellensium. Dalech. hist. 1476.*

β. *Echinops caule subunifloro, foliis duplicato-pinnatifidis foliolis linearibus remotis. Gmel. fib. 2. p. 102. t. 46.*

*Habitat in Gallia, Sibiria.*

3. ECHINOPS calycibus fasciculatis unifloris: lateralibus *strigosus.*

*sterilibus, foliis pinnatifidis supra strigosis.*

*Carduus tomentosus, capitulo majore. Baub. pin. 328.*

*Scabiosa cardifolia annua. Herm. parad. 224. t. 224.*

*Spina alba. Lob. ic. 2. p. 9.*

*Habitat in Hispania. Loxf. ☉*

*Folia pinnatifida: lanceola laciniis lanceolatis, spinamina terminatis, lateralibus inermibus, supra pilis rigidis strigosa, subtus tomentosa. Calyce non in capitulum globozum digesti, sed fasciculati, lateralibus. f. inferioribus minoribus sterilibus.*

4. ECHINOPS floribus fasciculatis, calycibus multiflo- *corymbosus.*

*ris. Hort. cliff. 591. Ray. lugdb. 144.*

*Carduus Chamæleon dictus, capitulis pluribus minoribus cæruleis corymbatim dispositis. Moris. hist. 3. p. 159. f. 7. t. 33. f. 17.*

*Chamæleon niger umbellatus, flore cæruleo hyacinthino. Baub. pin. 380.*

*Chamæleon niger. Dalech. hist. 1454. Dod. pempt. 727.*

*Habitat in Apulia, Hellesponto, Lemno, Tracia, in campis. 2*

5. ECHINOPS capitulis lateralibus sessilibus.

*fruticosus.*

*Echinops frutescens, ad nodos floridus, foliis oileis subtus argenteo Plum. spec. 10.*

*Habitat in America meridionali. 5*

ARCTI-

## ARCTIUM.

Lappa.

1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis.  
*Arctium. Hort. cliff. 391. Fl. suec. 651. Mus. med. 375.*  
*Roy. lugd. 144. Dalib. parif. 245.*  
*Lappa major f. Arctium diofcoridis. Baub. pin. 198.*  
*Bardana f. Lappa major. Dod. pempt. 58.*  
*Personata. Cam. epis. 887.*  
 β. *Lappa major montana, capitalis tomentosis. B. pin. 198.*  
*Habitat in Europæ cultis ruderalis. 8*

Personata.

2. ARCTIUM foliis decurrentibus ciliato-spinosis: radicalibus pinnatis: caulinis oblongo-ovatis.  
*Carduus mollis, foliis imis lacinatis, superioribus integris, squamis calycinis reflexis. Hall. helv. 678. t. 19.*  
*Carduus mollis latifolius, lappæ capitulis. Baub. pin. 377. prodr. 155. Burf. XXI. 13.*  
*Carduus capitulis in vertice congestis lanigeris: squamis reflexis. Gmel. fib. 2. p. 62. t. 24.*  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genève, Taurero Austriæ.*  
*Folia caulina ovato-oblonga, subtus tomentosa, serrata serraturis spinulosis, nec non spinulis minimis interjectis. Folia hec, basi quamvis attenuata, decurrunt per caulem tenuissimis marginibus spinosis. Pedunculi tomentosi & marginibus spinulosis armati.*  
*Habitus antecedentis elucet in textura foliorum, panicula, calycis figura, magnitudine.*

## SERRATULA.

tindoria.

1. SERRATULA foliis pinnatifidis: pinna terminali maxima. *Hort. cliff. 391. Hort. upf. 249. Fl. suec. 660. Roy. lugd. 143. Dalib. parif. 246.*  
*Serratula. Baub. pin. 235. Dod. pempt. 24.*

præalta.

- β. *Serratula præalta centauroides montana italica. Bocc. mus. 2. p. 45. t. 37.*  
*Carduus inermis, foliis glabris pinnatis: lacinia externa maxima, capitulis squaridis. Gmel. fib. 2. p. 49. t. 20.*  
*Habitat in Europæ borealis pratis β. in Italia, Sibiria. 2*  
*Planta β. quadruplo omnibus partibus major, at structura omnibus partibus cum communi eadem.*

alpina.

2. SERRATULA calycibus subhirsutis ovatis.  
*Serratula foliis petiolatis: radicalibus ovato-oblongis dentatis; caulinis integerrimis. Fl. suec. 661.*  
*Serratula foliis ovato-lanceolatis: radicalibus serratis caule thyrsofloro. Fl. lapp. 291. Hort. upf. 351.*

Circi

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 817

*Cirsium inerme*, foliis ex ovato-lanceolatis denticulatis infra lanugine candidis. *Gmel. fib. 2. p. 67 t. 26.*

*Carduo-Cirsium minus britannicum*, floribus congestis. *Pluk. alm. 83. t. 144. f. 3.*

β. *Cirsium humile montanum*, cynoglossi folio, polyanthemum. *Morif. hist. 3. p. 148. Dill. clib. 82. t. folia. 70. f. 81. vide. Gmel. fib. 2. p. 76. t. 32.*

γ. *Cirsium polyanthemum*, molli hastato folio. *Morif. hist. lapatifolia. 3. p. 148. f. 7. t. 29. f. 1. t. 22.*

*Cirsium* foliis triangularibus lunate dentatis. *Hall. belv. 683.*

*Carduus mollis*, lapathi foliis. *Bauh. pin. 377.*

*Carduus mollior* 2. *Clus. hist. 2. p. 151.*

δ. *Cirsium inerme*, foliis linearibus utrinque viridibus, calycibus hirsutis. *Gmel. fib. 2. p. 78. t. 33.*

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ, Arvonix, Sibirix. 2.*

*Planta floribus distinctissima, foliorum figura diversissima; sed quæ causâ produxerit has constantes varietates? certe locus non suffecerit.*

3. **SERRATULA** foliis lineari-lanceolatis alternis subsulcifolia. tus incanis sessilibus integerrimis.

*Cirsium inerme erectum*, foliis ex lineari-lanceolatis: infra candidis. *Gmel. fib. 2. p. 69. t. 27.*

*Habitat in Sibirix apricis, siccis.*

*Caulis angulatus, superne ramosus, ut in congeneribus.*

*Folia salicina, integerrima, subtus albida, basi vix ac ne vix decurrentia. Flores rubri; Calyces facie S. alpina, tres vel quatuor in singulo ramo.*

4. **SERRATULA** foliis lanceolatis subtus villosis sub-multiflora. decurrentibus integerrimis, caule corymbofo, calycibus cylindricis.

*Serratula elatior*, floribus umbellatis parvis. *Gerb. tan. 294.*

*Cirsium inerme*, caulibus adscendentibus, foliis linearibus infra cinereis. *Gmel. fib. 2. p. 71. t. 28? sed flores majores.*

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin.*

*Caulis angulatus, corymbosus, ramis itidem corymbosis, ut terminetur densissima sylva florum, fere infinitorum. Folia saligna, subtus albo villo vestita. Calyces cylindrici Squamis glabris, acutis, purpurascens; similis precedenti, sed folia basi parum decurrentia, subtus villosa, & Calyces copiosiores, argutiores, glabri magis & latius colorati.*

F f f

5. SER-

noveboracensis.

5. *SERRATULA* foliis lanceolato-oblongis serratis pendulis. *Hort. cliff.* 392. *Roy. lugdb.* 143.

- *Serratula noveboracensis* maxima, foliis longis serratis. *Dill. elt.* 255. t. 263. f. 342.

*Serratula noveboracensis* altissima, foliis doræ mollibus subincanis. *Morif. bist.* 3. p. 133. *Raj. suppl.* 208.

*Centaurium* medium noveboracense luteum, solidaginis folio integro tenuiter crenato. *Pluk. alm.* 93. t. 109. f. 3.

*Habitat in* Noveboraco, Virginia, Carolina, Canada, Kamtschatka. 2

præalta.

6. *SERRATULA* foliis lanceolato-oblongis serratis patentibus subtus hirsutis.

*Serratula virginiana*, perisæ folio subtus incano. *Dill. elth.* 356. t. 264. f. 343.

*Serratula præalta*, angusto plantaginis aut perisæ folio. *Bocc. mus.* 2. p. 45. t. 32.

*Eupatoria virginiana*, serratulae noveboracensis latioribus foliis. *Pluk. alm.* 141. t. 280. f. 6.

*Habitat in* Carolina, Virginia, Pennsylvania.

glauca.

7. *SERRATULA* foliis ovato-oblongis acuminatis serratis, floribus corymbosis, calycibus subrotundis.

*Gron. virg.* 92.

*Serratula marilandica*, foliis glaucis cirsiï instar denticulatis. *Dill. elth.* 354. t. 262. f. 341.

*Centaurium* medium marianum, folio integro cirsiï nostratis more spinulis fimbriato. *Pluk. mant.* 40.

*Habitat in* Marilandia, Virginia, Carolina. 2

squarrosa.

8. *SERRATULA* foliis linearibus, calycibus squarrosis sessilibus acuminatis. *Hort. cliff.* 392. \* *Gron. virg.* 92. *Roy. lugdb.* 143.

*Cirsium tuberosum*, capitulis squarrosis. *Dill. elth.* 83. t. 71. f. 82.

*Stœbe virginiana* tuberosa latifolia, capitulis sessilibus squamulis foliaceis acutis donatis. *Morif. bist.* 3. p. 137. f. 7. t. 27. f. 10. bona.

*Habitat in* Virginia. 2

scariosa.

9. *SERRATULA* foliis lanceolatis integerrimis, calycibus squarrosis pedunculatis obtusis lateralibus.

*Cirsium* non ramosum, foliis lateralibus, flores ferens pauciores majores. *Gron. virg.* 92.

*Jacea altera* non ramosa, tuberosa radice, foliis latioribus, flores ferens pauciores majores. *Banist. virg.* 1929. *Pluk. mant.* 105.

*Eupa-*

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 819

- Eupatorio affinis americana bulbosa, floribus scariosis, capitulis contextis. *Pluk. alm.* 142. t. 177. f. 4.  
*Habitat in Virginia.*  
*Diversissima a præcedente.* Calycibus squarrosis, obtusis. Pedunculis lateralibus, elongatis, unifloris, foliolis aliquot instructis. Foliis lato-lanceolatis, minime nervosis, sessilibus, nec decurrentibus.
10. SERRATULA foliis linearibus, floribus sessilibus spicata, lateralibus spicatis, caule simplici.  
*Serratula* foliis linearibus, floribus solitariis sessilibus.  
*Gren. virg.* 92.  
*Cirsium* tuberosum, lactucae capitulis spicatis. *Dill. elth.* 85. t. 72. f. 83.  
*Jacea* non ramosa, tuberosa radice, floribus plurimum rigidis perangustis. *Banist. virg.* 1927.  
*Jacea* angustifolia, tuberosa radice, virginiana. *Pluk. alm.* 190. t. 424. f. 6.  
*Stœbe* virginiana tuberosa angustifolia, capitulis sessilibus. *Morif. hist.* 3. p. 137. f. 7. t. 27. f. 10.  
*Habitat in America septentrionali.* 2
11. SERRATULA foliis linearibus sparsis revolutis, *ChamaePence.*  
 caule fruticoso.  
*Centaurea* calycibus inermibus: squamis lanceolatis, foliis linearibus confertis integerrimis. *Hort. cliff.* 421.  
*Roy. lugdb.* 138.  
*Jacea* fruticans, pini folio. *Bauh. pin.* 271. *Pluk. alm.* 190. t. 94. f. 3.  
*Chamaepeuce.* *Alp. exot.* 77. t. 76.  
*Stœbe* capitata, *chamaepinus* fruticosa cretica. *Pon. ital.* 75.  
*Stœbe* cretica fruticans, pineæ angustis foliis. *Morif. hist.* 3. p. 133. f. 7. t. 26. f. 8.  
*Habitat in Creta.* 5
12. SERRATULA foliis lanceolatis, squamis calycinis amara.  
 apice membranaceis obtusis patulis coloratis, floribus terminalibus.  
*Cirsium* inerme, foliis scabris: inferioribus ex sinuato dentatis, squamis calycum subrotundis membranaceis.  
*Gmel. sib.* 2. p. 72. t. 29.  
*Habitat in Sibiria.*  
*Habitus S. alpinæ.* Folia lanceolata, nonnihil decurrentia, superiora integerrima, margine præsertim scabra. Caules angulati. Rami erecti, singuli terminati pedunc-

*culis fibribusque saepius tribus. Flores magnitudine Cyani rubri, Pappus albus; Calyces squarrosi squamis membranaceis, mollibus ut Centauræ nonnulla, coloratis; pedunculi duo s. tres ramos terminant.*

*centauroides* 13. SERRATULA foliis pinnatifidis acutis glabris inermibus, squamis calycinis mucronatis: interioribus membranaceis.

Cirsium inerme, foliis scabris: inferioribus pinnatifidis. *Gmel. sib. 2. p. 80. t. 35.*

*Habitat in Sibiria. &*

Herba pedalis. Rami alterni (in culta), stricti, fere glabri, uniflori. Folia utrinque glabra, venosa, acuta, inermia, lanceolata: dentibus lanceolatis. Calyx ovato-oblongus, imbricatus squamis mucrone inermi, quarum flosculis propiores majores exaristæ. Corolla purpurea absque flosculis marginalibus. Habitus Centauræ moschatæ, sed caret flosculis neutris.

*arvensis.*

14. SERRATULA foliis dentatis spinosis. *Fl. suec. 662. Dalib. parif. 246.*

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis margine aculeatis. *Fl. lapp. 293. Roy. lugdb. 133.*

Carduus vinearum repens, fonchi folio. *Bauh. pin. 387. prodr. 156.*

Carduus in avena proveniens. *Bauh. pin. 377.*

Ceanothus theophrasti. *Col. ecphr. 1. p. 45. t. 45.*

*Habitat in Europæ cultis agris. &*

## CARDUUS.

\* *Foliis decurrentibus.*

*Acarna,*

1. CARDUUS foliis lanceolatis dentatis ciliatis decurrentibus: spinis marginalibus duplicibus.

Carduus caule alato spinoso, foliis spinosis: spinis duplicibus. *Roy. lugdb. 133.*

Acarna major, caule folioso. *Bauh. pin. 379.*

Chamaelon salmaticensis. *Clus. hist. 2. p. 155.*

β. Acarna humilis, caule folioso. *Bauh. pin. 379.*

Picnomon cretæ saloniensis. *Dalech. hist. 1456.*

*Habitat in Hispania.*

*leucographus.*

2. CARDUUS foliis dentatis spinosis decurrentibus, pedunculis nudis longissimis unifloris, calycibus spinosis inclinatis.

Carduus foliis sinuatis aculeatis, caule crispo, pedunculis unifloris. *Roy. lugdb. 134.*

Cirsium



SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 821

*Cirsium* maculis argenteis notatum. *Tournef. inst.* 448.  
*Carduus* leucographus f. *mariae* hirsutus, capitulo minore. *Morif. blef.* 244.  
*Habitat in Campania.*

3. **CARDUUS** foliis decurrentibus hastato-pinnatis spinosis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *lanceolatus.*

*Carduus* foliis lanceolatis decurrentibus: denticulis superficieque spinosis. *Hort. cliff.* 392. *Fl. suec.* 654.  
*Roy. lugdb.* 132. *Dalib. paris.* 247.

*Carduus lanceolatus latifolius. Baub. pin.* 385.

*Carduus lanceolatus f. sylvestris dodonæi. Baub. hist.* 3. p. 58.

*Habitat in Europæ cultis ruderalis.*

Calycis *intima squamæ inermes, setaceæ, exaridæ.*

4. **CARDUUS** foliis spinosis semidecurrentibus, floribus *nutans,* cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Fl. suec.* 655. *Gnett. stamp.* 2. p. 321. *Dalib. paris.* 248.  
*Gmel. sib.* 2. p. 42.

*Carduus* foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, floribus solitariis nutantibus. *Hort. cliff.* 393.

*Carduus nutans. Baub. hist.* 3. p. 56. *It. gotl.* 293. \*

*Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris. Baub. pin.* 385.

*Habitat in Europa ad pagos. ♂*

5. **CARDUUS** foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis: calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *acanthoides.*

*Carduus* foliis laciniatis: subtus tomentosis ex margine spinosis, capitulis sessilibus congestis aculeatis. *Hall. belv.* 677. *Dalib. paris.* 248.

*Carduus acanthoides. Baub. hist.* 3. p. 59. *It. scan.* 297. \*

*Carduus spinosissimus, capitulis minoribus. Raj. angl.* 3. p. 194.

*Carduus polyacanthos, capitulis longioribus & tenuioribus, foliis albicantibus. Morif. hist.* 3. p. 153.

*Habitat in Europæ ruderalis. ☉*

*Differt a Carduo nutante calycibus erectis, a C. crispo calycibus solitariis villosis.*

6. **CARDUUS** foliis sinuatis decurrentibus: margine spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis. *crispus.*  
*Hort. cliff.* 393. *Fl. suec.* 658. *Roy. lugdb.* 133. *Dalib. paris.* 248.

## 822 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. Loef. pruss.*

43. t. 5.

*Carduus caule crispo. Baub. hist. 3. p. 99.*

*Habitat in Europæ septentrionalioris agris, cultis. ☉*

*palustris.*

7. **CARDUUS** foliis dentatis decurrentibus: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus.

*Carduus foliis linearibus dentatis spinosissimis, caule crispo spinoso, floribus erectis. Roy. lugdb. 134. Fl. suec. 659. Dalib. parif. 249.*

*Carduus palustris. Baub. pin. 377. prodr. 156.*

*Carduus spinosissimus erectus angustifolius palustris.*

*Morif. hist. 3. p. 153. f. 7. t. 32. f. 13.*

*Carduus polycephalus angustifolius. Dalech. hist. 1743.*

*Habitat in Europæ pratis subpaludosis.*

*dissectus.*

8. **CARDUUS** foliis lanceolatis decurrentibus denticulis inermibus, calyce spinoso. *Hort. cliff. 392.\* Dalib. parif. 249.*

*Cirsium anglicum. Lob. ic. 583. Dalech. hist. 584. figura tenuis.*

*Cirsium majus, singulari capitulo magno, f. incanum varie dissectum. Baub. pin. 377.*

*Habitat in Anglia, Gallia. 2*

*cyanoideis.*

9. **CARDUUS** foliis pinnatifidis linearibus integerrimis inermibus petiolatis decurrentibus: subtus tomentosis.

*monoclonos.*

*Carduus caule simplici, foliis pinnatifidis rarius denticulatis: infra candidis, squamis calycum lanceolatis adscendentibus. Gmel. fib. 2. p. 42. t. 15.*

*polyclonos.*

β. *Carduus inermis, caule ramolissimo, foliis inferioribus pinnatis; superioribus linearibus integerrimis; infra candidis, squamis calycum lanceolatis adscendentibus. Gmel. fib. 2. p. 44. t. 16.*

*Habitat in Tataria.*

*Folia subtus albo tomento, absque serraturis aut setis, α sere Sorbi; β angustissima & linearia. Calycum squamæ lineares, acuminatæ, subvillosæ: in α magnitudine Scabiosæ, in β. Cyani. Habitus α. Jaceæ moschatæ J. B. 3. p. 34.*

*monspessulanus.*

10. **CARDUUS** foliis lanceolatis subrepandis glabris decurrentibus inæqualiter ciliatis, pedunculis alternis, calycibus inermibus.

*Carduus foliis lanceolatis glabris integris ciliatis decurrentibus, calycibus inermibus. Sauv. monsp. 79.*

*Car-*

*Carduus Cirsium monspelianum*, folio longo glabro.

*Bauh. hist. 3. p. 44.*

*Cirsium* foliis non hirsutis, floribus compactis. *Bauh. pin. 377.*

*Cirsion. Dod. pempt. 377.*

*Habitat* Montipellii.

*Habitus C. Serratuloides. Folia lanceolata, utrinque glabra, glauca, integra; radicalia vero repanda, margine spinis setaceis, inaequalibus ciliata. Capitata nonnulla in summitate caulis pedunculis brevibus.*

\* *Foliis amplexicaulibus.*

11. **CARDUUS** foliis lanceolatis sessilibus integerrimis: *casabonæ*. margine spinis ternatis. *Hort. cliff. 393.*

*Acarna major*, caule non folioso. *Bauh. pin. 379.*

*Acarna theophrasti angvillaræ. Lob. 486. f. 1. Dalech. bist. 1484.*

*Polyacanthus casabonæ, Acarnæ similis. Bauh. hist. 3. p. 92.*

*Habitat. - - -*

12. **CARDUUS** foliis integris subtus tomentosis, spinis *stellatus*. ramosis lateralibus. *Roy. lugdb. 133.*

*Carduus humilis aculeatus*, ptarmicæ austriacæ foliis.

*Trinmf. obs. 96. t. 96.*

*Carduus stellatus leucoji lutei foliis. Dödar. mem. 4. p. 261.*

*Habitat - - - - -* ☉

13. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis *marianus*, spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis.

*Carduus squamis calycinis margine apiceque spinosis.*

*Hort. cliff. 393. \* Hort. upf. 250. Roy. lugdb. 133.*

*Dalib. paris. 247. Mat. med. 316. Sauv. monsp. 291.*

*Carduus albis maculis notatus vulgaris. Bauh. pin. 281.*

*Carduus mariæ. Dalech. bist. 1475.*

*Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ aggeribus ruderatis.* ☉

14. **CARDUUS** foliis amplexicaulibus angulato-spinosis *syriacus*, floribus solitariis subsessilibus obvallatis foliolis subquinis. *Hort. cliff. 393. \* Hort. upf. 250. \**

*Carduus albis maculis notatus exoticus. Bauh. pin. 381.*

*Carduus luteus syriacus. Cam. hort. 35. t. 10. l. ladeus.*

*Habitat in Syria, Creta, Hispania.* ☉

15. **CARDUUS** foliis sessilibus bifariam pinnatifidis, *lanceolatis*, ciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Hort.*

*upf. 249. \* Sauv. monsp. 290. \**

F f i 4

Car-

- Carduus foliis sinuatis decurrentibus: denticulis superficique spinosis, calycibus lanigeris. Roy. lugdb. 133. Dalib. parif. 247.*  
*Carduus capite rotundo tomentoso. Bauh. pin. 382.*  
*Carduus tomentosus corona fratrum herbariorum. Lob. ic. 2. p. 9.*
- spurius.* β. *Carduus foliis semidecurrentibus duplicato pinnatifidis: laciniis alternis erectis, calycibus ovatis. Hort. ups. 249. not.*  
*Carduus tomentosus pyrenaicus, floribus purpureis glomeratis. Tournef. inst. 441?*  
*Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, Lusitania. ♂*
- altissimus.* 16. **CARDUUS** foliis pinnatifidis sinuatis serratis sessilibus inermibus, caule ramosissimo, calycibus villis subserratis.  
*Cirsium altissimum, laciniato folio subtus tomentoso. Dill. elth. 81. t. 69. f. 80.*  
*Habitat in Carolina. ♀*
- virginianus.* 17. **CARDUUS** caule folioso unifloro, foliis lanceolatis spinulosis: subtus tomentosus, caule inermi. *Gron. virg. 92.*  
*Cirsium minus virginianum, singulari capitulo, caule folioso. Morif. hist. 3. p. 150. Raj. suppl. 197.*  
*Habitat in Virginia.*
- tuberosus* 18. **CARDUUS** foliis pinnatifidis spinosis sessilibus, caule inermi, capitulis solitariis.  
*Carduus foliis semipinnatis: pinnis semibilobis, capitulis inermibus singularibus. Sauv. monsp. 292.*  
*Carduus pratensis, asphodeli radice, latifolius. Bauh. pin. 377. Morif. hist. 3. p. 7. t. 29. f. 27. 28.*  
*Carduus bulbosus monspeliensium. Lob. ic. 10.*  
 β. *Carduus pratensis, asphodeli radice, foliis tenuiter incis. Bauh. pin. 377.*  
*Jacea aculeata f. tuberosa. Tabern. ic. 154.*  
*Habitat Mospelii, Lipsiæ, inque Bohemia, Austria, Helvetia.*
- heterophyllus.* 19. **CARDUUS** caule subunifloro, calyce inermi acuto, foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque. *Hort. cliff. 392. \* Fl. succ. 657. \* Roy. lugdb. 134. Gmel. fib. 2. p. 51.*  
*Carduus calyce inermi, foliis lanceolatis margine ciliatis. Fl. lapp. 192.*

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 825

*Cirsium majus*, singulari capitulo magno, f. incanum varie dissectum. *Bauh. pin.* 377?

*Habitat in Europæ frigidioris pratis depressis.* &

Caulis sesquipedalis f. brevior. Foliis 5 ad 10, non dentatis, ciliatis. Radice repente.

20. **CARDUUS** foliis lanceolatis dentatis amplexicauli-*belenioides*.  
bus: spinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 392. *Hort. upf.* 250. \*

*Cirsium* foliis longe lanceolatis serratis: subtus tomentosis. *Hall. herb.* 683. t. 21.

*Cirsium* singulari capitulo squamato, vel incanum alterum: *Bauh. pin.* 377.

*Cirsium* anglicum, radice hellebori nigri modo fibrosa, folio longo. *Bauh. hist.* 3. p. 45?

*Habitat in Anglia, Sibiria.* &

Antecedenti *simillimus*, duplo f. homine altior, radice vix repente, foliis omnibus indivisis, subtus albis, at non ut illi niveis. Caule toto folioso; Foliis 40 a 50, semiamplexicaulibus (auriculis rotundis, reflexis, adnatis), dentatis, ciliatis spinis inermibus.

21. **CARDUUS** foliis lanceolatis integris subamplexicaulibus: serraturis spinoso-setaceis, pedunculis unifloris. *Hort. upf.* 248. (*sub Serratula*) \* *Sauv. monsp.* 79.

*Carduus* calycibus inermibus acutis, foliis utrinque viridibus firmis integerrimis inæqualiter ciliatis. *Gmel. fib.* 2. p. 52. t. 22. & 23. f. 1.

*Cirsium* singularibus capitulis parvis. *Bauh. pin.* 377?

*Cirsium* 3 montanum 1. *Clus. hist.* 2. p. 149.

*Habitat in Sibiria, Helvetia, Montpelii.* &

22. **CARDUUS** foliis lanceolatis amplexicaulibus, serraturis spinoso-setaceis, capitulis triphyllis.

*Habitat in Sibiria.* &

Habitus & altitudo *C. Serratuloides*, ut facile pro varietate sumeretur, a quo differt Foliis duplo latioribus, magis dentatis, vix ac ne vix subtus tomentosis; Capitulis foliolis 3, rarius duobus obvallatis, nec unico, ut ille. Foliis basi pungentibus. Floribus calyce cylindrico, nec globofo. Colore florum albo nec purpureo, at *Pappoplumoso* convenit.

23. **CARDUUS** foliis lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, capitulis aphyllis inermi spinosis.

F f f 5

*Habi-*

# 828 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Habitat in Hispania. Löfing.*

Caulis levis. Folia lanceolata, basi attenuata, argute dentata, inermia. Calyces cylindrico-ovati, terminati squamis aciformibus, mitibus, patulis. Corolla albo-flavescentes.

## 24. v. asp. 1199. CNICUS.

*benedictus.* 1. CNICUS caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Hort. cliff.* 395. *Hort. ups.* 250. *Mat. med.* 379.

Carduus sylvestris hirsutus f. Carduus benedictus. *Bauh. pin.* 378.

Carduus benedictus. *Cam. epit.* 562.

*Habitat in Chio, Lemno, Hispania ad versuras agrorum.* ☉

*oleraceus.* 2. CNICUS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis; superioribus integris concavis. *Hort. cliff.* 394. *Fl. suec.* 711.

Carduus pratensis latifolius. *Bauh. pin.* 376.

Carduus pratensis. *Lob. ic.* 2. p. 11.

*Habitat in Europæ septentrionalioris pratis subnemorosis.* 2

Calyces laterales sessiles, sæpius bini, intermedio subpedunculato.

*spinosissimus.* 3. CNICUS foliis amplexicaulibus sinuato-pinnatis spinosis, caule simplici, floribus sessilibus.

Carlina polycephalos alba. *Bauh. pin.* 380

Cirsium alpinum spinosissimum, floribus ochroleucis inter flavescentia folia congettis. *Hall. helv.* 679. t. 20.

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ.*

*Centauroides* 4. CNICUS foliis pinnatifidis, squamis calycinis membranaceis.

Carduus inermis, foliis pinnatifidis serratis inermibus, squamis calycinis membranaceis acuminato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 392.

Centaureum majus, foliis cinaræ cornuti. *Morif. hist.* 3. p. 131. f. 7. t. 25. f. 2.

*Habitat in Pyrenæis.* 2.

*cernuus.* 5. CNICUS foliis cordatis, petiolis crispis spinosis amplexicaulibus, floribus cernuis. *Hort. ups.* 251. \*

Carduus foliis ex cordato-lanceolatis margine serratis & spinosis, squamis calycum membranaceis laceris spinosis, capitulis nutantibus. *Gmel. fib.* 2. p. 47. t. 19.

*Habitat in Sibiria.* 2

ONO-

# SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 827

## ONOPORDUM.

1. ONOPORDUM calycibus squarrosis, foliis ovato-*acanthium.*  
oblongis sinuatis.  
Onopordum foliis decurrentibus margine spinosis. *Hort.*  
*cliff.* 393. *Fl. succ.* 653. *Roy. lugdb.* 134. *Dalib. pa-*  
*ris.* 246.  
Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. *Baub. pin.* 382.  
*Loef. pruss.* 261 t. 82.  
Acanthium. *Dod. pempt.* 721.  
*Habitat in Europæ ruderatis, cultis.* ♂
2. ONOPORDUM calycibus squarrosis, foliis lineari-*illyricum.*  
bus pinnatifidis.  
Onopordum foliis decurrentibus ligulatis pinnatifidis.  
*Sauv. monsp.* 290.  
Spina tomentosa altera spinosior. *Baub. pin.* 382.  
Carduus, quibusdam dictus Acanthium illyricum. *Baub.*  
*hist.* 3. p. 55.  
Acanthium illyricum. *Lob. ic.* 1.  
*Habitat in Europa australi.*  
Folia vix caule latiora, *Sauv.*
3. ONOPORDUM calycibus imbricatis. *Hort. upf.* 249. *arabicum.*  
Carduus tomentosus, acanthi folio, altissimus lusitanicus.  
*Tournef. inst.* 441.  
Carduus tomentosus, Acanthium dictus, arabicus. *Pluk.*  
*alm.* 85. t. 154. f. 5.  
Acanthium altissimum lusitanicum. *Morif. hist.* 3. p.  
153.  
*Habitat in Lusitania, G. Narbonensi.* ♂

## CYNARA.

1. CYNARA foliis subspinosis pinnatis indivisisque, ca-*Scolymus.*  
lycinis squamis ovatis.  
Cynara foliis pinnatis: laciniis serratis. *Hort. cliff.* 394.  
*Hort. upf.* 251. *Roy. lugdb.* 135.  
Cinara sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 384.  
β. Cinara hortenſis aculeata. *Baub. pin.* 383.  
*Scolymus dioscoridis.* *Clus. hist.* 2. p. 153.  
γ. Cynara hortenſis, foliis non aculeatis. *Baub. pin.* 383.  
*Habitat in G. Narbonensis, Italiæ, Siciliæ agris.* 2
2. CYNARA foliis spinosis: omnibus pinnatifidis, caly-*Cardunculus*  
cinis squamis ovatis.  
Cina-

## 828 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Cinara* foliis pinnatis: foliolis oblongis indivisis, caule spinoso. *Sauv. meth.* 239.

*Cinara* spinosa, cujus pediculi esistantur. *Bauh. pin.* 383.

*Scolymus aculeatus.* *Tabern. hist.* 1075.

*Habitat in Creta.* 2

Hybridam *f. natam ex præcedentis semine asseverat J. B.*

Flos saturate cæruleus corollis & pistillis, at stamina grisea.

*humilis.*

3. **CYNARA** foliis spinosis pinnatifidis subtus tomentosis, calycibus squamis subulatis.

*Cinara sylvestris bætica.* *Clus. cur.* 35.

*Carduus tingitanus*, flore magno cæruleo, folio atrætylidis, divisura subtus incano, spinis durioribus horrido. *Pluk. alm.* 85. t. 81. f. 2.

*Carduus humilis tingitanus* cæruleus magno strobilotenuius laciniatus. *Morif. hist.* 3. p. 158.

*Habitat in agro Tingitano in Bætica.* 2

Semina, in hac specie minore, reliquis longe majora & singularia.

## CARLINA.

*acaulis.*

1. **CARLINA** caule unifloro flore brevior. *Hort. cliff.* 395. *Hort. ups.* 252. *Mat. med.* 378. *Roy. lugdb.* 135. *Sauv. monsp.* 293.

*Carlina acaulos*, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.

*Chamæleon albus.* *Clus. hist.* 2. p. 155. *Cam. epit.* 428.

*Habitat in Italiæ, Germaniæ montibus.* 2

*lanata.*

2. **CARLINA** caule trifloro dichotomo: intermedio sessili. *Sauv. monsp.* 293. †

*Acarna* flore purpureo rubente patulo. *Bauh. pin.* 379.

*Acanthoides parva* apula. *Col. ecphr.* 1. p. 29. t. 27. f. 2.

*Habitat in Italia, G. Narbonensi.* ☉

*Calyx squamis lateribus inermibus constat.*

*vulgaris.*

3. **CARLINA** caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus. *Roy. lugdb.* 135.

*Acarna capitulis parvis luteis in umbella.* *Bauh. pin.* 379.

*Acarna apula umbellata.* *Colum. ecphr.* 27.

*Habitat in Italia.* ☉

*umbrosa.*

4. **CARLINA** caule multifloro corymbofo, floribus terminali-



minalibus. *Hort. cliff.* 395. *Fl. suec.* 652. *Roy. lugdb.* 135. *Gmel. fib.* 2. p. 82.

*Carlina sylvestris vulgaris. Clus. hist.* 2. p. 155.

*Cnicus sylvestris spinosior. Bauh. pin.* 378.

*Atractylis mitior. Fuchf. hist.* 121.

*Habitat in Europæ montosis, aridis, sabulosis.*

5. *CARLINA* floribus sessilibus lateralibus paucissimis. *racemosa.*

*Sauv. meth.* 293.

*Carlina sylvestris minor hispanica. Clus. hist.* 2. p. 157.

*Acarna flore lutco patulo. Bauh. pin.* 379.

*Habitat in Hispaniæ desertis. ☉*

6. *CARLINA* caule multifloro, foliis decurrentibus. *pyrenaica.*

*Carduus tomentosus pyrenaicus spinosissimus, flore albo.*

*Burf: XXI.* 43.

*Habitat in Pyrenæis versus Hispaniam copiose.*

*Habitus Onopordi, magnitudo antecedentis. Tota planta villis lanata. Folia pinnata, lobis rotundatis, spinisque validis armatis, decurrentia per caulem totaliter spinis aequè validis. Calyces copiosi in summo caule: squamis lanceolatis, longitudine floris, mucronatis: interioribus longioribus, membranaceis, lanceolatis, albis.*

## ATRACTYLIS.

1. *ATRACTYLIS* foliis oblongo-ovatis denticulatis *sp-fruticosa.*

*nos, calycibus patentibus, caule fruticoso. Hort. cliff.* 295. *Roy. lugdb.* 137.

*Carthamus africanus frutescens, folio ilicis, flore aureo.*

*B. Walt. hort.* 13. t. 7.

*Crocodiloides atractylidis folio, flore sulphureo coronato. Vaill. act.* 1718. p. 207.

*Habitat in Æthiopia. ♀*

2. *ATRACTYLIS* flore acaule.

*gummifera.*

*Cnicus, carlinæ folio, acaulos gummifer aculeatus.*

*Tournef. cor.* 33.

*Carlina acaulos gummifera. Bauh. pin.* 380.

*Carduus pinea theophrasti. Alp. exot.* 126. t. 124. 125.

*Chameleo albus dioscoridis. Colum. ecphr.* 1. p. 1. t. 12.

*Habitat in Creta, Italia.*

3. *ATRACTYLIS* foliis dentato-sinuatis, flore *radia-humilis.*

*to: obvallato involucreo patente, caule herbaceo.*

*Cnicus aculeatus purpureus humilior. Tournef. inst.* 451.

*Gro-*

## 830 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Crocodiloides atractylidis folio, flore purpureo coronato. *Vaill. ddt.* 1718. p. 172.

*Habitat* Madrilii in collibus. *Læff. VII:* 35.

Habitus *A. cancellatae*, sed folia *finuata*. Flos *radiatus*. Calycis *squamæ mucronatæ*. Involucrum *ex foliis veris patentibus*.

*cancellata.* 4. **ATRACTYLIS** involucris cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis.

*Atractylis* foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 157.

*Acarua* capitulis globosis. *Bauh. pin.* 379.

*Eryngium* parvum palmare, foliis serratis. *Morif. bist.* 3. p. 166. f. 7. t. 36. f. 16.

*Carduus* parvus. *Bauh. bist.* 3. p. 93. *Raj. bist.* 316.

*Carduus* minimus. *Alp. exot.* 254.

*Habitat* in Hispaniâ, Siciliâ, Cretæ agris. ☉

Receptaculum *tectum paleis coalitis*. Pappus *plumosus*, basi quasi *monophyllos sub florescentia*, corollulis longior. *Læffing.*

## CARTHAMUS.

*tinctoriis.* 1. **CARTHAMUS** foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *Hort. upf.* 251. *Mat. med.* 377. Cnicus sativus f. *Carthamus officinarum*, *Bauh. pin.* 378.

Cnicus vulgaris. *Clus. bist.* 2. p. 152.

*Habitat* in Ægypto. ☉

*lanatus.* 2. **CARTHAMUS** caule piloso: superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis. *Hort. upf.* 251. *Sauv. monsp.* 292.

*Carthamus* foliis amplexicaulibus acuminato-dentatis. *Hort. cliff.* 394. *Dalib. parif.* 250.

*Atractylis* lutea. *Bauh. pin.* 379.

*Atractylis* theophrasti & diolcoridis succo sanguineo.

*Col. cephr.* 1. p. 19. t. 23.

*Atractylis*. *Dod. pempt.* 736.

*Habitat* in Gallia, Italia. Creta. ☉

*cæruleus.* 3. **CARTHAMUS** foliis lanceolatis acuminato-serratis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 136.

Cnicus perennis cæruleus tingitanus. *Herm. lugdb.* 162. t. 163.

*Carduus* cæruleus erectus tingitanus, cnici facie, foliis magis integris. *Morif. bist.* 3. p. 159. f. Cni-

## SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 83r

- β. *Cnicus cæruleus asperior. Baub. pin. 378.*  
*Cnicus alter clusii, cæruleo flore. Clus. hist. 2. p. 152.*  
*Carduus cæruleus erectus, cnici foliis dissectioribus. Moris. hist. 3. p. 159. f. 7. t. 34. f. 19.*  
*Habitat in agro Tingitano & Hispalensi inter segetes. 2*
4. **CARTHAMUS** foliis inermibus: radicalibus dentatis, caulinis pinnatis. *Guett. stamp. 2. p. 330. Dalib. parisi. 250.*  
*Carthamoides cærulea humilis & mitior. Vaill. act. 1718.*  
*Carduncellus montis lupi minor species. Moris. hist. 3. p. 159.*  
*Habitat circa Parisios.*
5. **CARTHAMUS** foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine platæ. *Carduncellus.*  
*Carthamus foliis caule longioribus ligulatis pinnatifidis. Sauv. monsp. 292. \**  
*Carthamus foliis radicalibus superne serratis, inferne dentatis; caulinis dentato-pinnatis. Roy. lugdb. 136.*  
*Cnicus cæruleus humilis montis lupi. Herm. lugdb. 164.*  
*Carduncellus montis lupi. Lob. ic. 2. p. 20.*  
*Eryngium montanum minimum, capitulo magno. Baub. pin. 386.*  
*Habitat Monspelii.*
6. **CARTHAMUS** foliis ensiformibus sinuato-dentatis. *arborescens.*  
*Roy. lugdb. 136.*  
*Carthamoides lutea altissima & foetidissima. Vaill. act. 1718. p. 772.*  
*Cnicus hispanicus arborescens foetidissimus. Tournef. inst. 451.*  
*Habitat in Hispania. b*

## STOEBE.

- STOEBE. *Hort. cliff. 390. \**  
*Conyza africana frutescens, foliis ericæ hamatis & incanis. Tournef. inst. 455.*  
*Eupatorioides capeusis capitatus. Pet. gar. 13. t. 8. f. 1?*  
*Helichrysoides juniperi creberrimis aduncis foliis, floribus in ramulorum cymis. Vaill. act. 1719. p. 393.*  
*Habitat in Æthiopia. b*

## BIDENS.

- BIDENS** corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, se- tripartitis.  
 minibus erectis, foliis trifidis.

Bi-

# 832 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Bidens corona* seminum retrorsum aculeata, seminibus erectis. *Hort. cliff.* 399. *Fl. suec.* 663. *Roy. lugdb.* 157.

*Bidens* foliis tripartito-divitis. *Tournef. inst.* 462. *Fl. lapp.* 294.

*Cannabina aquatica*, folio tripartitim diviso. *Baub. pin.* 321.

*Hepatorium aquatile*. *Dod. pempt.* 595.

*Habitat in Europæ inundatis.* ☉

*cernua.*

2. *BIDENS* seminibus erectis: foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis. *Fl. suec.* 664.

*Cannabina aquatica*, folio non diviso. *Baub. pin.* 321.

*Eupatorium cannabinum chrysanthemum.* *Tabern. ic.* 117.

*Habitat in Europa ad fontes & fossas.* ☉

*Conferatur* *Coreopsis bidentis* ejusque affinitas.

*nodiflora.*

3. *BIDENS* foliis oblongis integerrimis, caule dichotomo, floribus solitariis sessilibus.

*Bidens nodiflora*, brunellæ folio. *Dill. elth.* 52. t. 44. f. 52.

*Habitat in Benghala.*

*frondosa.*

4. *BIDENS* foliis pinnatis ferratis, seminibus erecto-distantibus, calycibus frondosis, corollis radiatis.

*Bidens canadensis latifolia*, flore luteo. *Tournef. inst.* 362.

*Chrysanthemum cannabinum bidens virginianum*, caule erecto firmo subrubente. *Morif. hist.* 3. p. 17. f. 6. t. 5. f. 21.

*Habitat in America septentrionali.* ☉

Folia ternata aut ex 5 pinnata, supra glabra, striata, serrata. Calyces frondosi; radius in corolla brevissimus, saepe mutilatus.

*pilosa.*

5. *BIDENS* foliis pinnatis subpilosis, corollis flosculosis, calycibus simplicibus, seminibus divergentibus.

*Bidens corona* seminum retrorsum aculeata, seminibus undique patentibus. *Hort. cliff.* 399. \* *Hort. ups.* 255.

*Bidens latifolia* hirsutior, semine angustiore radiato. *Dill. elth.* 51. t. 43. f. 51.

*Habitat in America.* ☉

*bipinnata.*

6. *BIDENS* foliis bipinnatis incis, calyce involucrato, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus.

*Chrysanthemum aquaticum*, foliis multifidis cicutæ nonnihil similibus, virginianum. *Herm. lugdb.* 416.

*Chrysanthemum americanum*, coridis indi folio. *Herm. par.* 123. t. 123.

*Chry-*

*Chrysanthemum cannabinum bidens virginianum*, cicutaræ foliis, flosculis conniventibus. *Morif. hist.* 3. p. 17.

*Habitat in Virginia.* ☉

*Confer Chrysanthemum chinense*, foliis plurifariam divisib. halicacabi peregrini æmulis. *Pluk. phyt.* 22. f. 4.

*Chrysanthemum curassavicum*, foliis multifidis latioribus, seminibus longissimis. *Morif. hist.* 3. p. 17.

*Hybridæ esse aliquas inter Bidentes conicas, frondosas & bipinnatas, suadet habitus & semina divergentia. Flores interdum carent radio, interdum flosculo uno alterove radiante & sterili instructi sunt.*

7. *BIDENS* foliis simplicibus ferratis petiolatis, floribus <sup>niveo</sup> globosis, pedunculis elongatis, seminibus lævibus.

*Bidens* foliis cordatis ferratis petiolatis, floribus globosis, pedunculis filiformibus. *Roy. lugdb.* 158.

*Ceratocephalus* foliis cordatis s. triangularibus, flore albo. *Vaill. act.* 1720. p. 327. *vide. Dill. elth.* 1. 47. f. 55. n. 3.

β. *Bidens* scabra, flore niveo, folio trilobato. *Dill. elth.* 55. t. 47. f. 55.

γ. *Bidens* scabra, flore niveo, folio panduræformi. *Dill. elth.* 54. t. 46. f. 54.

*Habitat in Carolina.* 2

8. *BIDENS* foliis oblongis integris: inferne alternis, superne oppositis, floribus verticillatis. *Hort. cliff.* 399.\* <sup>verticillata.</sup>

*Bidens americana* procumbens, polygoni folio subtus incano. *Houst. mss.*

*Habitat in Vera Cruce.*

9. *BIDENS* foliis ovatis ferratis petiolatis, caule frutico- <sup>fruticosa,</sup> so. *Hort. cliff.* 399. \*

*Habitat in America.* 3

10. *BIDENS* foliis oppositis ovatis acuminatis integerri- <sup>scandens,</sup> mis, caule scandente fruticoso, floribus oppositis paniculatis. *Hort. cliff.* 399. \*

*Habitat in Vera Cruce.*

11. *BIDENS* foliis ovatis ferratis: inferioribus oppositis, <sup>bullata-</sup> superioribus ternatis: intermedio majore.

*Habitat in America.* ☉

*Caulis cræstut. Folia subovata, serrata, crassa, villosa, fere*  
 ♂ ♀

*fere bullata: inferiora simplicia, superiora ternata, subsessilia: foliolis lateralibus minimis. Flores axillares, solitarii, subsessiles, lutei; Calyces basi cincti foliolis ovato-oblongis.*

# CACALIA.

## \* Frutescentes.

- papillaris.* 1. CACALIA caule fruticoso, obvallato spinis petiolari-  
ribus truncatis.  
Kleinia caule carnosio, petiolis truncatis obvallato. *Hort. cliff.* 395.  
Cacalianthemum caudice papillari. *Dill. elth.* 63. t. 55. f. 63.  
*Habitat in Æthiopia. h*

- Anteuphorbium.* 2. CACALIA caule fruticoso, foliis ovato-oblongis, pe-  
tiolis basi linea triplici deductis.  
Kleinia foliis carnosis planis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 395.  
Anteuphorbium. *Bauh. pin.* 387. *Dod. pempt.* 378. *Morif. hist.* 3. p. 345. f. 7. t. 37. f. 10. *Dill. elth.* 63. t. 55. f. 2. 3  
*Habitat in Æthiopia. h*

- Kleinia.* 3. CACALIA caule fruticoso composito, foliis lanceo-  
latis planis, petiolorum cicatricibus obsolete.  
Kleinia foliis lanceolatis planis, caule lævi ventricoso.  
*Hort. cliff.* 395.  
Cacalianthemum folio nerii glauco. *Dill. elth.* 61. t. 54. f. 2.  
Frutex indiæ orientalis, lavendulæ folio. *Bauh. pin.* 401.  
Nec Cacalia, nec Cacaliastrum, an Tithymaloides frutescens nerii folio. *Klein. monogr.*  
*Habitat in Canariis, forte etjam in India. h*

- Ficoides.* 4. CACALIA caule fruticoso, foliis compressis carno-  
sis.  
Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, caule tereti. *Hort. cliff.* 395.  
Senecio africanus arborescens, ficoidis folio & facie.  
*Comm. rar.* 40. t. 40.  
*Habitat in Æthiopia. h*

## \* Herbaceæ.

- Pterophyllum* 5. CACALIA caule herbaceo indiviso, foliis ellipticis  
subcrenatis. Po

Porophyllum foliis ellipticis. *Hort. cliff.* 494. \*

Tagetes foliis integris perforatis. *Plum. spec.* 10.

Senecio indicus, atriplicis folio glabro. *Morif. hist.* 3. p. 106. f. 7. t. 17. f. 7.

Chrysanthemum americanum frutescens, balsaminæ foliis nigris maculis punctatis. *Pluk. alm.* 100. t. 161. f. 1.

*Habitat in America.* ☉

6. CACALIA caule herbaceo, foliis lyratis dentatis. *Sonchifolia.*

Kleinia caule herbaceo, foliis lyratis. *Fl. zeyl.* 305. \*

Chondrilla zeylanica minor marina, folio sinapios.

*Burm. zeyl.* 61.

Tagolina luzonum, flore purpureo. *Pet. gaz.* t. 80.

f. 13. *Camell. luz.* 3. n. 8.

*Habitat in Zeylona, China.* ☉.

7. CACALIA caule herbaceo, foliis trilobis acuminatis *hastata* ferratis.

Senecio foliis ex dentato-trilobis acuminatis ferratis.

*Gmel. fib.* 2. p. 136. t. 66.

*Habitat in Sibiria.* D. *Gmelin.*

Caulis erectus, altus, purpureus. Folia petiolata, triloba, lobis acuminatis: intermedio duplo majore, serrata inter lobos, basi rotundata, subtus parum villosa. Flores in panicula parva, pedunculus incanis subtomentosis, absque bracteis setaceis præterquam ad subdivisiones. Facies accedit ad suaveolentem.

8. CACALIA caule herbaceo, foliis hastato-sagittatis *suaveolens* denticulatis, petiolis superne dilatatis. *Hort. upf.* 254. \*

*Habitat in Virginia, Canada.* ☿

Planta humane altitudinis. Folia sagittato-triangulari f. deltato-hastata, margine serrata; pedunculi etiam supra ramificationes bracteis setaceis adspersi, glabri nec incani.

9. CACALIA caule herbaceo, foliis subcordatis dentato-sinuatis, calycibus quinquefloris.

Cacalia virginiana glabra, foliis deltoidibus sinuatis subtus glaucis. *Morif. hist.* 3. p. 94. f. 7. t. 15. f. 7.

Porophyllum foliis deltoidibus angulatis. *Gron. virg.* 94.

Nardus americana procerior, foliis cæsiis. *Pluk. alm.* 251. t. 101. f. 2

*Habitat in Virginia, Canada.* ☿

Magnitudo & statura antecedentis. Folia inferiora cordata, superiora latiora quam longa, sinuata, subtus glau-

G g 2

*glauca, laevia. Differt a precedente non modo figura foliorum & glauco colore, sed & floribus quintuplo minoribus, tantum ex quinqueflojculis compositis, cum antecedentes gaudeant pluribus.*

*alpina.*

10. CACALIA foliis reniformibus acutis denticulatis.

Cacalia. Hall. herb. 705.

Tussilago caule ramofo. Roy. lugdb. 159. Saww. monsp. 113.

- α. Cacalia foliis crassis hirsutis. Baub. pin. 197. Morif. hist. 3. p. 94. f. 7. t. 12. f. 1.

Cacalia incano folio. Clus. hist. 2. p. 115.

- β. Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris. Baub. pin. 198. Morif. hist. 3. p. 94. f. 7. t. 12. f. 6.

Cacalia glabro folio. Clus. hist. 2. p. 115.

Cacalia. Lob. ic. 592.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ. &

Hanc speciem genere cum antecedentibus convenire docuit autopsia, hinc genere conjungenda; Cacalia cum Kleiniis.

## EUPATORIUM.

\* *Calycibus quadrifloris.*

- hyssopifolia.* 1. EUPATORIUM foliis lanceolato-linearibus trinerviis integerrimis.

Eupatorium virginianum, folio angusto, floribus albis. Dill. elt. 141. t. 115. f. 140.

Eupatorium virginianum, flore albo, hyssopi foliorum æmulum. Morif. hist. 3. p. 98.

Eupatoria hirsuta, hyssopi foliorum æmula, virginiana. Pluk. alm. 141. t. 88. f. 2. Raj. suppl. 189.

Habitat in Virginia. &

- scandens.* 2. EUPATORIUM caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. Hort. cliff. 396. Hort. ups. 253. Roy. lugdb. 156. Gron. virg. 93. Cold. noveb. 182.

Clematitis novum genus, cucumeris folio, virginianum.

Pluk. alm. 109. t. 163. f. 3.

Habitat in aquis virginiae. &

*houstoniana.*

3. EUPATORIUM caule volubili, foliis ovatis integerrimis. Hort. cliff. 396. \*

Conyza americana scandens, foliis subrotundis mucronatis, floribus spicatis singulis quatuor flojculis constantibus. Amm. herb. 451.

Habitat in Vera Cruce.

\* *Caly-*



\* *Calyxibus quinquefloris.*

4. EUPATORIUM foliis ovato-hastatis petiolatis den- ~~zeylanicum.~~  
tatis. *Fl. zeyl.* 306. \*

Eupatorium zeylanicum, foliis dentatis ad pediculos bre-  
ves auriculatis. *Morif. hist.* 3. p. 99.

Cacalia foliis auriculatis ferratis supra nigricantibus, in-  
fra lanugine alba obductis. *Burm. zeyl.* 52. t. 21.

Jacoea, senecionis flore, zeylanica odorata. *Raj. suppl.*  
188.

*Habitat in Zeylona.*

5. EUPATORIUM foliis sessilibus amplexicaulibus dis- *sessilifolium*  
tinctis lanceolatis. *Hort. upf.* 254. \*

Eupatorium virginianum, flore albo, foliis menthæ an-  
gustioribus sessilibus minutim dentatis. *Morif. hist.* 3. p.  
98. *Raj. suppl.* 188.

*Habitat in Virginia.* 2.

6. EUPATORIUM foliis ovatis petiolatis ferratis. *chinense.*  
*Habitat in China.* *Osbeck.*

Caulis *teres, brachiatus, nudiusculus.* Folia *opposita,*  
*ovata, acuminata, grosse serrata, petiolata, glabra,*  
*subtus pallidiora.* Corymbi *terminales, flosculis quinis.*

7. EUPATORIUM foliis sessilibus distinctis subrotun- *rotundifo-*  
do-cordatis. *lium.*

Eupatoria valerianoides virginienensis, triflaginis folio abs-  
que pediculis. *Pluk. alm.* 141. t. 88. f. 4. *Raj. suppl.*  
189.

Cacalia foliis rotundioribus ad caulem sessilibus. *Morif.*  
*hist.* 3. p. 94.

*Habitat in Virginia, Canada.*

8. EUPATORIUM foliis lanceolatis nervosis: inferio- *atissimum.*  
ribus extimo subserratis, caule suffruticoso. *Hort. upf.*  
253.

Eupatorium virginianum, longissimis & angustissimis  
foliis. *Morif. hist.* 3. p. 97. *Raj. suppl.* 187.

*Habitat in Pennsylvania.* 2.

9. EUPATORIUM foliis ternis.

Eupatorium caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ferratis *trifoliatum,*  
petiolatis ternatis. *Gron. virg.* 178.

Eupatorium cannabinum, foliis in caule ad genicula ter-  
nis, marilandicum. *Raj. suppl.* 189.

*Habitat in Virginia.*

- cannabinum* 10. EUPATORIUM foliis digitatis. *Hort. cliff.* 396. *Fl. succ.* 665. *Mat. med.* 380. *Roy. lugdb.* 155.  
 Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320.  
 Eupatorium adulterinum. *Fuchs. hist.* 265.  
*Habitat in Europa ad aquas.*

\* *Calycibus octofloris.*

- purpureum*. 11. EUPATORIUM foliis subverticillatis lanceolato-ovatis serratis petiolatis rugosis.  
 Eupatorium foliis verticillatis. *Cold. noveb.* 180.  
 Eupatorium foliis ovato-lanceolatis obtuse serratis inpetiolo delincentibus. *Gron. virg.* 93.  
 Eupatorium enulæ folio. *Corn. canad.* 72. t. 72  
 Eupatorium canadense elatius, longioribus foliis rugosis integris & caulibus ferrugineis. *Morif. hist.* 3. p. 97. f. 7. t. 13. f. 4.  
 β. Eupatorium foliis lanceolato-ovatis serratis petiolatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 396. *Roy. lugdb.* 155.  
 Eupatorium novæ angliae, urticæ foliis, floribus purpurascens, caule maculato. *Herm. par.* 158. t. 158.  
*Morif. hist.* 3. p. 97. f. 7. t. 18. f. 3. *Raj. suppl.* 187.  
*Habitat in America septentrionali.* 2  
 Caulis teres, erectus, viridis, punctis linearibus longitudinalibus purpurascens. Folia terna, quaterna, f. sena, lato-lanceolata f. lanceolato-ovata, serrata, rugosa, scabriuscula, petiolata, utrinque viridia. Corymbus terminalis. Calyces florum incarnati. Flosculi octo, Corollis albidis, Antheris purpureis, stylis longissimis.

\* *Calycibus multifloris.*

- cælestinum*. 12. EUPATORIUM foliis cordato-ovatis obtuse serratis petiolatis, calycibus multifloris.  
 Eupatorium foliis cordatis serratis petiolatis. *Gron. virg.* 94.  
 Eupatorium scardoniae folio, flore caeruleo. *Dill. elib.* 140. t. 114. f. 139.  
 Eupatorium marianum, scrophulariae foliis, capitulis globosis colore cælestino. *Pluk. mant.* 71. t. 394. f. 4.  
*Habitat in Carolina, Virginia.*

\* *Calycibus quindecim flosculis.*

- perfoliatum*. 13. EUPATORIUM foliis connatis tomentosis. *Hort. cliff.* 396. *Hort. upf.* 253. *Roy. lugdb.* 156. *Gron. virg.* 177. *Cold. noveb.* 181.

Eupa-

# SYNGENESIA: POLY GAMIA ÆQUALIS: 839

*Eupatorium virginianum*, salviæ foliis longissimis acuminatis, perfoliatum. *Pluk. alm.* 140. t. 87. f. 6. *bon. Raj. suppl.* 189.

*Eupatorium virginianum*, mucronatis rugosis & longissimis foliis, perfoliatum. *Morif. bist.* 3. p. 97.

*Habitat in Virginiae aquosis.* 2

\* *Calycibus multifloris: viginti circiter flosculis.*

14. **EUPATORIUM** foliis ovatis obtuse ferratis petio-*aromaticum.* latis trinerviis, calycibus simplicibus.

*Eupatorium* caule erecto ramoso, foliis ovatis obtuse ferratis petiolatis. *Gron. virg.* 177.

*Eupatoria valerianoides*, flore niveo, tenerii foliis cum pediculis, virginiana. *Pluk. alm.* 141. t. 88. f. 3. *Morif. bist.* 3. p. 98.

*Habitat in Virginia.* 2

Caulis *terres, quadripedalis, strictus, ramis brachiatus, facie Scutellariæ.* Folia ovato-oblonga, obtuse serrata, trinervia, subrugosa, petiolata. Racemi terminales. Flores calyce duplo longiores, toti nivei flosculis 18 ad 28, stylis vix flosculo longioribus. Differt a reliquis imprimis calycibus non imbricatis sed ferme aequalibus & stylis non flore longioribus, uti *Ageratum*; sed huic pappus seminum verus.

## AGERATUM.

1. **AGERATUM** foliis ovatis, caule piloso.

*Conyzoides.*

*Ageratum. Hort. cliff.* 396. *Hort. ups.* 253.

*Eupatorium humile africanum*, senecionis facie, folio laurii. *Herm. par.* 161, t. 161.

*Habitat in America.* ☉

2. **AGERATUM** foliis ovatis crenatis obtusis, caule ciliare, glabro.

*Centaureum ciliare minus bisnagaricum*, origani foliis amplioribus, floribus in umbellis. *Pluk. alm.* 93. t. 81. f. 4.

*Habitat in Bisnagar.*

3. **AGERATUM** foliis ovato-cordatis rugosis, floralibus alternis, caule glabro.

*Eupatorium* foliis ovatis ferratis petiolatis, caule glabro. *Hort. ups.* 254.

*Eupatorium* caule erecto, foliis cordatis ferratis *Hort. cliff.* 396. *Gron. virg.* 93.

*Eupatorium scrophulariæ* foliis glabris, flore albo. *Morif. bist.* 3. p. 98. f. 7. t. 18. f. 11. Va-

*Valeriana urticæ folio, flore albo. Corn. canad. 20. t. 21.*  
*Habitat in* Canada, Virginia. 2

## STÆHELINA.

*gnaphaloides* 1. STÆHELINA foliis tomentosis, squamis calycinis lanceolatis.

*Gnaphalium foliis linearibus, floribus terminalibus, calycibus cylindraceis: squamis reflexis. Roy. lugdb. 151.*  
*Jacea æthiopica, stæchados citrinæ majoribus tomentosis foliis, capitulorum spinis & squamulis ex aureo colore nitentibus. Pluk. alm. 193. t. 302. f. 3.*

*Habitat in* Æthiopia.

*centauroides* 2. STÆHELINA foliis subtrigonis, squamis calycinis crenatis.

*Santolina foliis linearibus, flore solitario terminali, squamis calycinis crenatis. Hort. cliff. 398. \**

*Habitat in* Æthiopia.

*dubiâ.* 3. STÆHELINA foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis.

*Gnaphalium caule fruticoso, foliis linearibus denticulatis, capitulis oblongis. Roy. lugdb. 151.*

*Stæchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus. Bauh. hist. 3. p. 156.*

*Elichrysum sylvestre, flore oblongo. Bauh. pin. 265.*

*Jacea capitata, rosmarini folio. Tournesf. inst. 444.*

*Habitat in* Hispania, G. Narbonensi. 5

*Singularis planta quasi media inter Serratulas, Gnaphalia & Stæhelinas. Fructificatio in viva planta debet attente examinari & genus certius determinari.*

## CHRYSOCOMA.

\* *Frutescentes.*

*Coma aurea.* 1. CHRYSOCOMA fruticosa, foliis linearibus dorso decurrentibus. *Hort. cliff. 397. Hort. ups. 252. Roy. lugdb. 146.*

*Coma aurea africana fruticans, foliis linearibus angustis, major. Com. hort. 2. p. 89. t. 45.*

*Conyza æthiopica, flore bullato aureo, pinastri brevioribus foliis læte viridibus. Pluk. alm. 400. t. 327. f. 2.*

*Habitat in* Æthiopia. 5

*cetina.* 2. CHRYSOCOMA subfruticosa, foliis linearibus subtus pilosis, floribus ante florescentiam cernuis. *Hort. cliff. 397. \* Roy. lugdb. 146.*

*Coma*

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 841

*Coma aurea*, foliis linearibus angustioribus, minor. *Comm.*

*amst.* 2. p. 89. t. 45. f. 1.

*Habitat in Æthiopia.* 5

3. CHRYSOCOMA suffruticosa, foliis linearibus re-ciliata, curvis scabris ciliatis, floribus erectis.

*Conyza africana tenuifolia subfrutescens, flore aureo.*

*Dill. elsh.* 104. t. 88. f. 13.

*Habitat in Æthiopia.* 5

\* *Herbaceæ.*

4. CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus glabris, *Linosyris*, calycibus laxis.

*Chrysocoma calycibus laxis.* *Hort. cliff.* 396. *Ray. lugdb.* 145.

*Chrysocome dioscoridis & plinii.* *Col. ecphr.* 1. p. 81. t. 82.

*Linosyris nuperorum.* *Lob. hist.* 223.

*Osyris austriaca.* *Clus. hist.* 1. p. 325.

*Linaria, folioso capitulo luteo, major.* *Bauh. pin.* 213.

*Habitat in Europa temperatiore.* 2.

5. CHRYSOCOMA herbacea paniculata, foliis lanceo-bistorta, latis trinerviis punctatis nudis.

*After calycibus oblongis laxis, foliis ex lineari-lanceo-latis integerrimis trinerviis: infra scrobiculis excavatis.* *Gmel. fib.* 2. p. 189. t. 82. f. 1.

*Conyza lini foliis asperis rigidis & nervosis, floribus luteis umbellatis.* *Amm. ruth.* 192.

*Habitat in Sibiria.*

*Flos variat cum & sine radio.*

6. CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus lanceo-graminifolia latis glabris, floribus corymbosis.

*Habitat in Canada.* *Kalm.*

*Habitus Achilleæ Ptarmicæ dictæ. Caulis levis, erectus, herbaceus, parum angulatus. Folia alterna, remotà, lineari-lanceolata, acuminata, glabra, integerrima, margine scabro subcarinata, obsolete trinervia. Corymbus foliatus, ex floribus numerosissimis, sæpe 3 f. 4 simul in singulo pedicello, subsessilibus, magnitudine Achilleæ. Calyces semi-ovati, imbricati, glabri. Pappus simplex.*

7. CHRYSOCOMA herbacea, foliis lanceolatis villosis, calycibus arctis.

G g g s

After

*Aster incanus*, calycibus laxis oblongis, foliolis ex linearilanceolatis, floribus nudis umbellatis. *Gmel. fib.* 2. p. 192. t. 82. f. 2.

*Conyza tomentosa* & *incana*, floribus luteis umbellatis, echii scorpioidis folio. *Amm. rub.* 190.

*Habitat in* Sibiria, Tataria.

## TARCHONANTHUS.

*camphoratus* 1. TARCHONANTHUS. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 152.

*Elichryso* affinis arbor africana, flore purpuro-violaceo, folio *salviae*, odore *rosmarini*. *Herm. lugdb.* 228. t. 229.

*Pluk. alm.* 134. t. 174. f. 1. *Morif. hist.* 3. p. 90.

*Habitat in* Æthiopia. b

## SANTOLINA.

*ChamaeCyparissus*. 1. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *Hort. ups.* 252. *Mat. med.* 383. *Roy. lugdb.* 146.

*Abrotanum femina*, foliis teretibus. *Bauh. pin.* 136.

*Abrotanum femina* vulgare. *Clus. hist.* 1. p. 341.

*Habitat in* Europa australi. b

*rosmarinifolia*. 2. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 397. *Roy. lugdb.* 146.

*Abrotanum femina*, foliis *rosmarini*, majus. *Bauh. pin.* 137. *Morif. hist.* 3. p. 12. f. 6. t. 3. f. 22.

*Abrotanum femina* 4. *Clus. hist.* 1. p. 342.

β. *Abrotanum femina*, foliis *rosmarini*, minus. *Bauh. pin.* 137.

γ. *Abrotanum femina* viridis. *Bauh. pin.* 137.

δ. *Abrotanum femina*, flore majore. *Bauh. pin.* 137.

*Habitat in* Hispania.

*crenata*. 3. SANTOLINA flore solitario terminali, squamis calycinis crenatis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 398. \*

*Habitat in* Æthiopia.

*aristata*. 4. SANTOLINA corymbis simplicibus coarctatis, foliis pinnatifidis dentatis.

*Elichrysum inodorum* glabrum, coronopi folio, annuum magnoli. *Herm. lugdb.* 228. t. 227.

*Helichrysum inodorum* glabrum, coronopi folio, annuum. *Magn. monsp.* 307. \*

*Chrysanthæum corymbiferum*. *Triumph. obs.* 85. t. 86.

Bel-

# SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 843

Bellis polyclonos annua africana, coronopi folio, floribus nudis compactis. *Morif. hist.* 3. p. 30.

*Habitat in Africa.* ☉

5. SANTOLINA corymbis compositis fastigiatis, foliis *dentata*, inferioribus linearibus dentatis, superioribus ovatis serratis. *Hort. cliff.* 398. *Roj. lugdb.* 147.

Coma aurea africana frutescens, foliis inferioribus incis, superioribus dentatis. *Comm. rar.* 41. t. 41.

*Habitat in Æthiopia.*

6. SANTOLINA corymbis simplicibus fastigiatis, foliis *trifurcata*, is trilobis cuneiformibus.

Santolina corymbo simplici terminali, foliis trifidis.

*Hort. cliff.* 397. *Roy. lugdb.* 146.

Coma aurea africana fruticans, foliis glaucis & in extremitate trifidis. *Comm. hort.* 2. p. 97. t. 49.

*Habitat in Æthiopia.*

7. SANTOLINA corymbis simplicibus fastigiatis, foliis *crithmifolia*, semitridis linearibus.

Santolina corymbo simplici, foliis trifidis. *Hort. ups.*

252. *Cliff.* 397.

Coma aurea africana fruticans, foliis crithmi marini.

*Comm. hort.* 2. p. 99. t. 50.

Jacobaea æthiopica, foliis abrotani trifidis, summo caule capitulis parvis glomeratis. *Pluk. alm.* 194. t. 302. f. 7.

*Habitat in Æthiopia.*

*Præcedenti nimis affinis.*

## TANACETUM.

\* *Herbacea.*

1. TANACETUM foliis pinnatis: pinnis linearibus re- *crithmifolia* motis integerrimis. *um.*

Santolina corymbo composito terminali, foliis linearibus dentatis: dentibus longitudine folii. *Hort. cliff.*

397. *Roy. lugdb.* 146.

Elichrysum africanum frutescens, foliis crithmi marini.

*Comm. hort.* 2. p. 113. t. 57.

Ageratum capense, crithmi folio, capitulis parvis. *Pet. gaz.* t. 34. f. 1.

*Habitat in Æthiopia.*

2. TANACETUM foliis pinnato-multifidis: laciniis li- *suffrutico-* nearibus subdivisis acutis. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* *sum.* 155.

Abro-

Abrotanum africanum fruticans multiflorum, foliis tanacetii decuplo-minoribus. *Comm. hort.* 2. p. 199. t. 100.

*Habitat in Æthiopia.* 5

\* *Fruticosa.*

- frutescens.* 3. TANACETUM foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis obtusiusculis integerrimis.

Tanacetum foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 154.

Tanacetum africanum arboreseens, foliis lavendulæ multifido folio. *Comm. hort.* 2. p. 201. t. 101.

*Habitat in Æthiopia.* 5

- viridum.* 4. TANACETUM foliis pinnatis: laciniis linearifili-  
formibus, corymbis glabris, caule herbaceo.

Tanacetum foliis pinnatis multifidis: laciniis linearibus trifidis. *Gmel. fib.* 2. p. 134. t. 65. f. 2.

*Habitat in Sibiria.*

Folia linearia, pinnata: pinnis linearibus, filiformibus, sæpe bifidis trifidisve, integerrimis. Corymbus terminalis & axillares pauciflori floribus luteis.

- incanum.* 5. TANACETUM foliis bipinnatis tomentosis, corymbo ovato composito.

Artemisia caule simplici, corymbo composito ovato terminali. *Hort. cliff.* 404. \*

Abinthium orientale incanum tenuifolium, floribus luteis in capitulum congestis & sursum spectantibus.

*Tournef. cor.* 34.

*Habitat in Oriente.* 2

- annuum.* 6. TANACETUM foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentosis. *Roy. lugdb.* 155.

Tanacetum annuum villosum, ablinthii austriaci folio. *Vaill. act.* 1719. p. 281.

Abinthium corymbiferum annuum. *Tournef. inst.* 458.

Elichrysum foliis abrotani. *Bauh. pin.* 264.

Elichryson. *Clus. hist.* 1. p. 325. t. 326.

*Habitat in Hispania, Hetruria.* ☉

Rami longiores quam umbella primaria.

- vulgare.* 7. TANACETUM foliis bipinnatis incisissimis serratis. *Hort. cliff.* 398. *Fl. succ.* 666. *Mat. med.* 381. *Roy. lugdb.* 155. *Gmel. fib.* 2. p. 133. t. 65. f. 1.

Tanacetum foliis pinuatis planis: pinnis serratis. *Fl. lapp.* 295.



# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 845

- Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.  
 Athanasia f. Tanacetum. *Dalech. hist.* 955.  
 Artemisia monoclonos. *Fuchf. hist.* 46.  
 β. Tanacetum foliis crispis. *Bauh. pin.* 132. crispum.  
 Tanacetum crispum. *Dod. pempt.* 36.  
*Habitat in Europæ aggeribus. 2*
8. TANACETUM foliis ovatis integris serratis. *Hort. Balsamita.*  
*cliff.* 398. *Hort. upf.* 255. *Mat. med.* 382. *Roy.*  
*lugdb.* 154.  
 Mentha hortensis corymbifera. *Bauh. pin.* 226.  
 Costus hortensis. *Dalech. hist.* 678.  
*Habitat in Hetruria, Narbona. 2*

## POLYGAMIA SUPERFLUA.

### ARTEMISIA.

#### \* *Fruticosæ erectæ.*

1. ARTEMISIA foliis linearibus confertis minimis di-*athiopion.*  
 visis, caule fruticoso tomentoso.  
 Abrotanoides africanum, foliis cinereis muscosis, ca-  
 pitulis florum globosis magnis. *Raj. suppl.* 232.  
 Absinthium africanum arborescens, folio vermicula-  
 tæ incano. *Tournef. inst.* 358.  
*Habitat in Æthiopia. 5*  
 Caulis fruticosus, paniculatus, albus. Folia *Erica ma-*  
*gnitudine, minima, coacervata.* Flores in racemis  
*subrotundis, magnitudine A. Absinthii.*
2. ARTEMISIA foliis ramosissimis setaceis, caule ere-*Abrotanum.*  
 cto suffruticoso. *Hort. cliff.* 403. *Hort. upf.* 257.  
*Mat. med.* 385.  
 Abrotanum mas angustifolium majus. *Bauh. pin.* 136.  
 Abrotanum mas. *Dod. pempt.* 21.  
*Habitat in Syriæ, Galatiæ, Cappadociæ montibus a-*  
*pricis. 5*

#### \* *Procumbentes ante florescentiam.*

3. ARTEMISIA foliis caulinis linearibus pinnato-mul-*Santonicum.*  
 tistidis, ramis indivisis; spicis secundis reflexis.  
 Artemisia fruticosa incana ramosissima, corymbis sessi-  
 libus spicatis subrotundis, foliis superioribus lineari-  
 bus brevissimis obtusiusculis. *Gmel. fib.* 2. p. 115. 1.  
 51.  
 Semen sanctum. *Lob. ic.* 756.

*Habi-*

*Habitat in Tataria, Persia. &c.*

Habitus *A. campestris*, sed erectus. Caulis paniculatus, subincanus. Folia inferiora pinnato-multifida, linearia, canescentia. Rami virgati, Racemis s. Spicis alternis, secundis, recurvatis, Pedicellis adspersis foliis linearibus, obtusiusculis, recurvis. Flores solitarii, cylindrici; in Planta fructificante omnes Caules erecti; tum amittere incanum colorem. Folia in ramis minima, linearia, indivisa.

- campestris.* 4. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. suec.* 668. *Roy. lugdb.* 154. *Gmel. sib.* 2. p. 117.  
Abrotanum campestre. *Bauh. pin.* 136.  
Ambrosia altera. *Cam. epit.* 597.  
*Habitat in Europæ campis apricis, aridis. 2*

- palustris.* 5. ARTEMISIA foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis subsessilibus.  
Artemisia herbacea, foliis multifidis linearibus, corymbis in spica interrupta glomeratis sessilibus. *Gmel. sib.* 2. p. 119. t. 55.  
Ablinthium capillaceis foliis, flosculis aureis densissime congestis. *Amm. ruth.* 197.  
*Habitat in Sibiria.*  
Caulis procumbentes, adscendentes. Folia Coronopi, linearia, pinnatifida: segmentis 5. s. 7. Flores glomerati, subsessiles, flavi.

- crithmifolia.* 6. ARTEMISIA foliis compositis divaricatis linearibus carnosulis glabris, caule adscendente paniculato.  
Abrotanum hispanicum maritimum, folio crasso splendens & rigido. *Tournef. inst.* 459.  
Ablinthium inodorum, foliis crithmi lucidis obscure virentibus. *Morif. hist.* 3. p. 11. *Raj. suppl.* 232.  
*Habitat in Lusitanix littoribus arenosis. Læfing.*  
Habitus *A. campestris*, glaber. Caulis semipedales, s. pedales, adscendentes, Paniculae florum terminati. Folia pinnatifida trifidaque, linearia, glabra, carnosula. Flores *A. campestris*.

- maritima.* 7. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis.  
Artemisia foliis compositis multifidis tomentosis, ramis floriferis nutantibus. *It. æl.* 112. \* *Fl. suec.* 671.

Art

*Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simplicibus alternis, floribus erectis sessilibus. Roy lugdb. 113. Savv. monsp. 264.*

*Absinthium seriphium belgicum. Bauh. pin. 139. Bauh. hist. 3. p. 178.*

β. *Absinthium seriphium germanicum. Bauh. pin. 139. Habitat in Europæ septentrionalioris littoribus maris. 2*

8. ARTEMISIA foliis pinnatis, caulibus adscendentibus <sup>rupestris.</sup> hirsutis, floribus globosis cernuis: receptaculo papposo, *it. gotl. 285. t. 285. \* Fl. succ. 669. \**

*Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis adscendentibus, floribus oblongis suberectis. Gmel. fib. 2. p. 111. t. 49. f. 1.*

*Absinthium pumilum repens & supinum. C. B. Pluk. alm. 3. t. 37. f. 1.*

*Absinthium pumilum palmeum minus, argenteo sericeoque folio. Bocc. mus. 2. p. 81. t. 71.*

*Absinthium alpinum incanum. Bauh. pin. 139. prodr. 71?*

β. *Absinthium viride, foliis multifidis linearibus. Gmel. fib. 2. p. 131. t. 64. f. 2.*

*Habitat in Sibiria, Oelandiæ rupibus calcareis.*

*Differt C. B. (ex Bursero) planta ramis longioribus, aliisque forte ex loco notis; Sibirica magis fruticosa est. Planta in rupibus alba sericea. In horto major, atroviridis, nuda.*

\* *Erectæ herbacæ, foliis compositis.*

9. ARTEMISIA foliis multipartitis subtus tomentosis, <sup>ponticæ</sup> floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo.

*Hort. upf. 257. Hort. cliff. 404. Mat. med. 387.*

*Absinthium ponticum tenuifolium incanum. Bauh. pin. 138.*

*Absinthium tenuifolium. Dod. pempt. 24.*

*Habitat in Hungaria interiore, Pannonia, Thracia, Myfia. 2*

10. ARTEMISIA foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus: receptaculo glabro conico. *Hort. upf. 257.*

*Artemisia, radice annua, viridis, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis, calycibus subrotundis fere erectis ex alis copiosissimis. Gmel. fib. 2. p. 125.*

*Absinthium, tanacetifolio, odoratissimum. Amm. ruth. 142. t. 193. f. 23. imperfecte.*

β. Ab-

β. Absinthium, folio tenui multifido, camphoram spirans.  
*Boerb. lugdb. 1. p. 126.*  
*Habitat in Sibiria montosis. ☉*

*sanacetifolia* 11. ARTEMISIA foliis bipinnatis subtus tomentosis nitidis, pinnis transversis, racemis simplicibus.

Artemisia radice perenni, foliis pinnatis pinnatifidis incisis serratis, calycibus subrotundis viridibus nutantibus. *Gmel. sib. 2. p. 123. t. 58.*

*Habitat in Sibiria. 2*

*Absinthium.* 12. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villosa. *Hort. cliff. 404. Fl. succ. 670, Mat. med. 386. Roy. lugdb. 153.*

Absinthium incanum, foliis compositis latiuscule multifidis, floribus subglobosis pendulis. *Gmel. sib. 2. p. 129. t. 63.*

Absinthium ponticum f. romanum, officinarum f. dioscoridis. *Bauh. pin. 138.*

Absinthium. *Cam. epit. 452.*

*Habitat in Europæ ruderalis aridis. 2*

*vulgaris:* 13. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisis: subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis: radio quinquefloro.

Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Hort. cliff. 404. Fl. succ. 667. Mat. med. 384.*

*Roy. lugdb. 153. Gmel. sib. 2. p. 108.*

Artemisia vulgaris major. *Bauh. pin. 137. Fl. lapp. 379.*

Artemisia vulgaris. *Bauh. hist. 3. p. 184.*

*Habitat in Europæ cultis, ruderalis. 2*

\* *Foliis simplicibus.*

*integrifolia.* 14. ARTEMISIA foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque.

Artemisia foliis planis lanceolato-linearibus: inferioribus sæpe ex pinnato-dentatis. *Gmel. sib. 2. p. 109. t. 48. f. 1.*

*Habitat in Sibiria.*

Habitus absolute Artemisie vulgaris; at Folia lanceolata, rigidiuscula, glabra, subtus cævo tomentosa, margine integerrima, rarius uno alterove dente erecto notata. Racemi axillares, breves, terminales, glomerati. Flores rotundiusculi: flosculi feminei sæpius quinque.

*caerulea.* 15. ARTEMISIA foliis lanceolatis integris: lateralibus sæpe palmatis. *Hort. cliff. 403.*

Ab-

*Abinthium maritimum*, lavendulæ folio. *Bauh. pin.* 139.

*Morif. hist.* 3. p. 7. f. 6. t. 1. f. 5.

*Abinthium angustifolium*. *Dod. pempt.* 26.

8. *Abinthium maritimum*, foliis superioribus in aliquot laciniis divisis. *Bauh. pin.* 139.

*Abrotanum latifolium rarius*, artemisizæ folio. *Col. ecphr.*

2. p. 75. t. 76.

*Habitat in Europæ australis littoribus maris.*

Folia utrinque villosa. Flores cylindrici, nutantes.

16. ARTEMISIA foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Dracunculus*

*Hort. cliff.* 403. *Hort. ups.* 256. *Gmel. sib.* 2. p. 126.

t. 59. & 60. f. 1.

*Abrotanum lini* folio acriori & odorato. *Tournef. inst.*

459.

*Dracunculus hortensis*. *Bauh. pin.* 98.

*Draco herba*. *Dod. pempt.* 709.

*Habitat in Sibiria, Tataria.* 2

17. ARTEMISIA foliis simplicibus tomentosis obtusis chinensis, lanceolatis: inferioribus cuneiformibus trilobis.

*Artemisia* foliis radicalibus a caulinis diversis. *Gmel. sib.*

2. p. 61. f. 1. 2.

*Habitat in China, Lagerström. Sibiria.*

Folia tomentosa, pollicem transversum longa: inferiora cuneiformia, triloba; superiora lanceolata, obtusa. Flores in summitate conferti, in Racemum sæpius ovatum, simplicem, subrotundi, Calyce laxo, tomentoso.

18. ARTEMISIA foliis simplicibus lyrato-sinuatis, caulis procumbentibus; floribus pedunculatis solitariis globosis oppositifoliis. *maderaspatanana.*

*Abinthium maderaspatanum*. *Pluk. phyt.* 357. f. 3.

*Abinthium minus odoratum gangeticum*, floribus chamæmeli solitariis e foliorum alis. *Pluk. alm.* 2. t. 1. f. 2. mal.

*Habitat in India.* 2

Herba procumbens, terra adpressa, Ramis alternis, teretibus, flexuosis, striatis, pubescentibus. Folia pinnato f. dentato-sinuata, lyrata, exsertsum latiora, mollia. Pedunculi solitarii, folio oppositi, uniflori, nudi, striati, villosi. Flores subglobosi disco convexo, magni, lutei. Flosculi marginales feminei trifidi, stylo bifido tenuiore; discoidei hermaphroditi: stylo simplici.

19. ARTEMISIA foliis cuneiformibus repandis, caule minima, procumbente, floribus axillaribus sessilibus.

H h h

Habi-

*Habitat in China. Lagerström. ☉*

*Planta omnium minima. Folia glabra. Flores ex 6. f. 7. flosculis, minimi, sessiles, axillares, solitarii.*

# GNAPHALIUM.

\* *Argyrocomæ calycibus albis.*

*dioicum.* 1. GNAPHALIUM caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, sarmentis procumbentibus. *Hort. cliff.* 400. *Fl. succ.* 672. *Mat. med.* 388. *Roy. lugdb.* 147. *Gmel. fib.* 2. p. 105.

Gnaphalium caule simplicissimo, floribus coloratiterminato. *Fl. lapp.* 672.

*mas.* Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Baub. pin.* 263.

*Pilosella minor. Dod. pempt.* 68. f. exterior.

*femina.* 2. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore. *Baub. pin.* 263.

*Pilosella minor. Dod. pempt.* 68. f. interior.

*Habitat in Europæ apricis aridis. &*

*plantagini-folium.* 2. GNAPHALIUM caule simplicissimo, foliis radicalibus ovatis maximis, sarmentis procumbentibus.

Gnaphalium stolonibus reptatricibus longissimis, foliis ovatis, caule capitato. *Gron. virg.* 95.

Gnaphalium, plantaginis folio, virginianum. *Pluk. alm.* 171. t. 348. f. 9.

*Habitat in Virginia. &*

*Habitus omnino precedentis; sed Folia radicalia pollice majora, ovalia. Vidi solam feminam; an precedentis sola varietas?*

*latifolium.* 3. GNAPHALIUM foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. *Hort. cliff.* 401. *Hort. ups.* 255. *Gmel. fib.* 2. p. 107.

Gnaphalium latifolium americanum. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium americanum. *Clus. hist.* 1. p. 327.

*Habitat in America septentrionali, kamtschatca. &*

*grandiflorum.* 4. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus ovatis nervosis utrinque lanuginosis.

Gnaphalium tomentosum, foliis inferioribus subrotundis; superioribus acuminatis. *Burm. afr.* 213. t. 76. f. 1.

Elichrysum africanum lanuginosum latifolium, calyce floris argenteo & amplissimo. *Old. afr.* 27.

*Habitat in Æthiopia.*

5. GNA-

5. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus integerrimis *faridum*, acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Hort. cliff.* 402. *Hort. wps.* 256.  
 Gnaphalium africanum latifolium fœtidum, capitulo argenteo. *Comm. hort.* 2. p. 111. t. 56.  
 Conyza africana graveolens, capitulis argenteis. *Pluk. alm.* 117. t. 243. f. 1. *Morif. hist.* 3. p. 115 f. 7. t. 20. f. 32.  
*Habitat in Æthiopia.* ☉
6. GNAPHALIUM foliis amplexicaulibus lanceolatis, *heliantemifolium*, corymbis compositis, caule ramosissimo.  
 Gnaphalium africanum, floribus minimis albicantibus. *Volk. norib.* 194. t. 94.  
*Habitat Æthiopia,* 2.
7. GNAPHALIUM foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *Roy. lugdb.* 149.  
 Elichrysium sylvestre latifolium, capitulis conglobatis. *Baub. pin.* 264.  
 Gnaphalium majus, lato oblongo folio. *Baub. pin.* 263. *Pluk. alm.* 171. t. 31. f. 16.  
 Gnaphalium ad stœchadem citrinam accedens. *Baub. hist.* 3. p. 160.  
*Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Hispania, Lusitania.* ☉  
 Planta valde lanata. Calyces flavo-albicantes, molles, squamis ovato-lanceolatis.
8. GNAPHALIUM foliis lanceolatis, caule tomentoso ramoso, floribus terminalibus glomeratis confcis. *obtusifolium*.  
 Gnaphalium foliis lanceolatis, caule tomentoso, corymbis supradecompositis, floribus sessilibus confertis. *Gron. virg.* 95.  
 Elichrysium obtusifolium, capitulis argenteis conglobatis. *Dill. elt.* 130. t. 108. f. 131.  
 Helichrysium Chrysocoma Gnaphaloides virginiana annua, foliis obtusioribus, capitulis argenteis conglobatis. *Morif. hist.* 3. p. 88. f. 7. t. 10. f. 19.  
*Habitat in Virginia, Pennsylvania.* ☉  
 Caulis tomentosus, pilosus, ramosus, erectus. Folia lanceolata, recurvata, nudiuscula. Flores terminales, conglobati, inæquales, subsessiles. Calyces scinici, albi, acuti. Corollæ flavæ.

# 852 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

- undulatum.* 9. **GNAPHALIUM** foliis decurrentibus acutis undatis  
subtus tomentosis, caule ramoso. *Hort. cliff.* 402.  
*Elichrysum graveolens acutifolium, caule alato. Dill.*  
*eth.* 130. t. 108. f. 130.  
*Habitat in Africa.* ☉
- indicum.* 10. **GNAPHALIUM** foliis lanceolatis alternis, caule  
herbaceo ramosissimo diffuso, corymbis inæqualibus.  
*Fl. zeyl.* 307. \*  
*Gnaphalium, latiore folio, minus ramosum, capitulis pal-*  
*lescentibus. Pluk. alm.* 172. t. 187. f. 5.  
*Habitat in India.*
- incanum.* 11. **GNAPHALIUM** foliis filiformibus tomentosis sub-  
imbricatis, caule ramosissimo fruticoso.  
*Gnaphalium incanum, folio lineari, caule acumbente.*  
*Burm. afr.* 215. t. 77. f. 1.  
*Elichrysum æthiopicum, tenuissimis stœchadis citrinæ*  
*foliis confertis, ramosissimum, comis argenteis.*  
*Pluk. mant.* 67. *Raj. suppl.* 171.  
*Habitat in Æthiopia.*
- maricatum.* 12. **GNAPHALIUM** fruticosum, calycibus coronatis,  
foliis revolutis obliquis mucronatis.  
*Gnaphalium caule fruticoso, foliis lanceolatis contor-*  
*tis fasciculatis, calycibus cylindricis longis. Hort.*  
*cliff.* 403.  
*Gnaphalium fruticosum, foliis lanceolatis congestis, flo-*  
*rum calyce tubuloso. Burm. afr.* 221. t. 79. f. 1.  
*Argyrocome capitis b. spei, thymi foliis. Pet. gaz.* t. 7.  
f. 3.  
*Xeranthemum africanum frutescens, folio ericæ f. ju-*  
*niperi angustiore brevior acuto, floribus congloba-*  
*tis exiguis albis. Raj. suppl.* 182.  
*Xeranthemum stœchadis citrinæ foliis rigidis pungen-*  
*tibus, flore albo duriusculo. Pluk. mant.* 190.  
*Gnaphaloides æthiopicum frutescens, stœchadis citrinæ*  
*foliis spinosis. Pluk. alm.* 92. *Raj. suppl.* 193.  
*Eupatorioides capitis b. spei, saturejæ foliis rigidis.*  
*Pet. cent.* 208. *Raj. suppl.* 239.  
*Lychnis coronaria monomotapensis globulifera, foliis*  
*ex albidis genistæ aculeatæ. Pluk. amalth.* 134. t. 406  
f. 6.  
β. *Gnaphalium fruticosum, foliis rarioribus, capitatum*  
*Burm. afr.* 223. t. 79. f. 2.  
*Xeranthemum africanum, foliis brevioribus canescen-*  
ti



SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 853

- ribas, floribus minimis conglobatis albis. *Raj. suppl.* 182.  
 Eupatorioides capensis capitatus. *Pet. gaz. t. 8. f. 1. Raj. suppl.* 239.  
 Frutex æthiopicus cineraceus, foliis nepetæ aculeatis, floribus albis coronatus. *Pluk. phyt.* 410. f. 2.  
 7. Gnaphalium frutescens, foliolis lanceolatis æqualibus, umbellatum. *Burm. afr.* 223. t. 79. f. 3.  
 Elichrysum æthiopicum frutescens, coridis foliis incanis, capitulis parvis glomeratis. *Pluk. alm.* 72.  
*Habitat in Æthiopia. b*  
 \* *Chrysocomæ calycibus luteis.*  
 13. GNAPHALIUM foliis confertis angusto-lanceola *orientale.* tis, caule fruticoso; corymbo composito. *Hort. cliff.* 402. *Hort. upf.* 256.  
 Elichrysum orientale. *Bauh. pin.* 264. *prodr.* 123.  
 Elichrysum africanum frutescens, angustis & longioribus foliis incanis. *Comm. hort.* 2. p. 109. t. 55.  
 Helichrysum frutescens latifolium, flore corymbifero toto aureo. *Morif. hist.* 3. p. 86. f. 7. t. 10. f. ult.  
*Habitat in Africa. 2-b.*  
 14. GNAPHALIUM foliis linearibus, caule fruticoso *Stœchas,* ramoso, corymbo composito. *Hort. cliff.* 401. *Hort. upf.* 256  
 Elichrysum f. *Stœchas citrina angustifolia.* *Bauh. pin.* 264.  
 Helichrysum f. *Chrysocome angustifolia vulgaris.* *Morif. hist.* 3. p. 401. f. 7. t. 11. f. 7.  
 Chrysocome f. *Stœchas citrina minor.* *Barr. ic.* 410. 409. 278.  
*Stœchas citrina.* *Dod. pempt.* 268.  
*Habitat in Germania, Gallia, Hispania b*  
 15. GNAPHALIUM foliis linearibus alternis, caule frutescente, floribus paniculatis subternis terminalibus sessilibus. *Hort. cliff.* 401. \*  
 Elichrysum sylvestre angustifolium, capitulis conglobatis. *Bauh. pin.* 264.  
 Stœchadi citrinæ affinis, capitulis parvis raris. *Bauh. hist.* 3. p. 156. *Raj. hist.* 283.  
 Stœchas citrina spuria, longioribus foliis. *Barr. ic.* 368. 277.  
 Ageratum aliud quorundam. *Dalech. hist.* 778.  
*Habitat in G. Narbonensi. b*

H h h 3

16. GNA-

- cretifolium.* 16. GNAPHALIUM caule ramoso fruticoso, corymbis ramosis, foliis confertis teretiusculis. *Hort. cliff.* 401. \*
- Gnaphalium frutescens, foliis tenuissimis teretibus, ramis creberrimis. *Burm. afr.* 217. t. 77. f. 3.
- Millefolium æthiopicum, ericæ foliis, incanum, flore specioso. *Pluk. alm.* 251. t. 308. f. 2.
- Habitat in Æthiopia.* b
- petiolatum.* 17. GNAPHALIUM caule fruticoso, foliis ovatis integerrimis petiolatis, floribus confertis terminalibus. *Hort. cliff.* 402. \*
- Gnaphallum sericeum tomentosum, foliis orbiculatis subtus incanis. *Burm. afr.* 214. t. 76. f. 2.
- Habitat in Æthiopia.* b
- dentatum.* 18. GNAPHALIUM foliis cuneiformibus dentatis, caule fruticoso, corymbo simplici. *Roy. lugdb.* 151. \*
- Coma aurea incana, foliis obtusis tridentatis, capitulis oblongis. *Burm. afric.* 185. t. 68. f. 3.
- Habitat in Æthiopia.* b
- arenarium.* 19. GNAPHALIUM foliis lanceolatis inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo composito. *Fl. succ.* 674. *Mat. med.* 389. *Gmel. fib.* 2. p. 107.
- Elichrysum s. Stœchas citrina latifolia. *Hamb. pin.* 264. *It. æt.* 160.
- Stœchas citrina germanica, latiore folio. *Bauh. bist.* 3. p. 153. *Raj. bist.* 281.
- Habitat in Europæ campis arenosis.* ☉
- rutilans.* 20. GNAPHALIUM foliis linearilanceolatis, caule inferne ramoso, corymbo decomposito terminali. *Hort. cliff.* 401. \*
- Elichrysum africanum, folio oblongo angusto, flore rubello postea aureo. *B. Dill. elsb.* 127. t. 107. f. 127.
- Habitat in Africa.* z
- igneus.* 21. GNAPHALIUM foliis linearibus tomentosis integerrimis sessilibus, corymbis alternis conglobatis, floribus globosis. *Roy. lugdb.* 149.
- Elichrysum flore suaverubente. *Boerb. lugdb.* 1. p. 120.
- Habitat* - - -
- purpureum.* 22. GNAPHALIUM foliis lanceolatis nudis, caule erecto simplicissimo, floribus spicatis lateralibusque sessilibus. *Roy. lugdb.* 148. *Gron. ving.* 178.

Eli-

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 855

*Elichrysum spicatum obtusifolium*, basi angustiore. *Dill. elth. 131. t. 109. f. 132.*

*Gnaphalium spicatum majus non ramosum erectum virginianum*, foliis obtusioribus. *Monis. hist. 3. p. 92.*

*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.* ☉

23. **GNAPHALIUM** foliis lanceolatis semiamplexicaulis *cymosum*, libus, caule inferne ramoso terminali. *Hort. cliff. 401.\**

*Elichrysum africanum*, folio longo subtus cano supra viridi, flore luteo. *B. Dill. elth. 128. t. 107. f. 128.*

*Habitat in Africa.* 24

24. **GNAPHALIUM** foliis lanceolatis tomentosis, caule *imbricatum*, le ramoso, squamis calycinis reflexis.

*Gnaphalium incanum angustifolium*, calycis, squamis ferrugineis reflexis. *Burm. afr. 226. t. 80. f. 2.*

*Habitat in Aethiopia.*

25. **GNAPHALIUM** foliis oblongis tomentosis sessili-*scabrum*, bus, capitulis foliosis villosissimis. *Roy. lugdb. 150.*

*Gnaphalium*, latiore folio, aethiopicum, flore roseo, calyculis spinosis. *Pluk. alm. 171. t. 323. f. 1.*

*Habitat in Aethiopia.*

26. **GNAPHALIUM** foliis amplexicaulibus spatulatis, *patulum*, ramis patentibus, corymbis aggregatis. *Hort. cliff. 402. n. 15.\**

*Elichrysum africanum*, folio oblongo tomentoso caulem amplectente, flore luteo. *Boerb. lugdb. 1. p. 121.*

*Habitat in Aethiopia.*

27. **GNAPHALIUM** foliis decurrentibus obtusis mucronatis utrinque tomentosis planis. *olora:issimum,*

*Elichrysum latifolium villosum*, alato caule, odoratissimum. *Pluk. alm. 134. t. 173. f. 6.*

*Habitat* - - -

\* *Filagine calycibus cinereis.*

28. **GNAPHALIUM** caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato. *Leontopodium*

*Gnaphalium alpinum*, magno flore, folio oblongo. *Bauh. pin. 264.*

*Gnaphalium alpinum pulchrum.* *Bauh. hist. 3. p. 161.*

*Gnaphalium alpinum.* *Clus. hist. 1. p. 328.*

*Leontopodium.* *Dod. percept. 68.*

β. *Gnaphalium magno flore*, folio brevi. *Bauh. pin. 264.*

H h h 4

*Habi-*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valleſiæ, Corinthi, Aſtriæ, Sibiricæ. 2*

- alpinum.* 29. GNAPHALIUM caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali aphylo, floribus oblongis. *Fl. lapp.* 301. *Fl. ſucc.* 673.

Gnaphalium latiori folio, caule non ramoſo, ſpica nuda fulca terminato. *Hall. belv.* 701.

Gnaphalium alpinum minus. *Baub. pin.* 264.

Filago alpina minor erecta. *Scheuch. alp.* 133.

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. 2*

Caulis ſimpliciſſimus, digito brevior, foliis 3 ſ. 4 lanceolatis. Folia radicalia lanceolato-cuneiformia, ſupra viridia lævia, ſubtus tomento ſtriato albiſſa, ut margo etiam a latere ſuperiore albus conſpiciatur. Ad radicem ſarmenta ut *G. dioico*. Flores terminales, pauci, conferti, abſque foliis. Calyx cylindricus, baſi ventricofus, ſquamis apice membranaceis, lanceolatis, acutis, erectis. Floſculi ſeminei, in planta a me culta, abſque ſtaminibus. an *G. dioici* varietas obſexum, ſarmenta, caulem nudum.

- uliginofum.* 30. GNAPHALIUM caule ramoſo diſfuſo, floribus confertis terminalibus. *Fl. lapp.* 300. *Fl. ſucc.* 676.

*Hort. cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 142. *Gmel. ſib.* 2. p. 105.

Gnaphalium longifolium humile ramoſum, capitulis nigris. *Raj. hiſt.* 295. *angl.* 3. p. 18.

Gnaphalium annuum ſerotinum, capitulis nigricantibus, in humidis gaudens. *Moriſ. hiſt.* 3. p. 92.

*Habitat in Europæ paludibus, ubi aquæ ſtagnant. ☉*

- ſylvaticum.* 31. GNAPHALIUM caule ſimpliciſſimo, floribus ſparſis. *Fl. lapp.* 298. *Fl. ſucc.* 675. *Hort. cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 148. *Gmel. ſib.* 2. p. 106.

Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio, alterum. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium rectum. *Baub. hiſt.* 3. p. 160.

*Habitat in Europæ ſylvis arenofis. ♂*

- arvenſe.* 32. GNAPHALIUM paniculatum hirsutum. *Fl. ſucc.* 679.

Gnaphalium caule erecto ramoſiſſimo, glomerulis florum ad alas longe ſeſſilibus. *Hall. belv.* 702.

Filago incana tomentofa erecta. *Vaill. aſt.* 1719. p. 391.

*Habitat in Europæ campis aridis, arviſque ſabuloſis. ☉*

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 857

33. GNAPHALIUM caule erecto diviso, floribus pyramidalis lateralibus axillaribusque. *Fl. suec.* 678. *montanum.*

Gnaphalium minus repens. *Bauh. pin.* 262.

Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 482, *Bauh. hist.* 3. p. 159. *Raj. hist.* 296.

*Habitat in Europæ collibus sabulosis.* ☉

34. GNAPHALIUM caule erecto dichotomo, floribus pyramidalis axillaribus. *flori-gallicum.*

Gnaphalium vulgare medium. *Morif. hist.* 3. f. 7. t. 11. f. 14. *Pet. herb.* t. 18 f. 12.

Gnaphalium minimum alterum nostras, stœchadis citrinæ foliis tenuissimis. *Pluk. alm.* 172. t. 298 f. 2.

*Habitat in Anglia, Gallia.*

*Differt a G. germanico Floribus in capitulis paucis; a G. montano, foliis subtomentosis, tamen glabris nec hirsutis.*

35. GNAPHALIUM caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillaribus terminalibusque. *capitu-germanicum*

Gnaphalium caule erecto dichotomo, floribus in alis sessilibus. *Fl. lapp.* 299. *Fl. suec.* 677. *Roy. lugdb.* 148.

Gnaphalium vulgare majus. *Bauh. pin.* 262.

Gnaphalium decimum. *Pet. herb.* 18. f. 10.

*Habitat in Germania* ☉

36. GNAPHALIUM foliis alternis linearibus acutis saxatile, planis, pedunculis longissimis unifloris. *Hort. cliff.* 401.

Helichrysum capitulis singularibus brevibus. *Morif. hist.* 3. p. 87. f. 7. t. 10. f. 16.

Helichrysum saxatile, singulari capitulo amplo, angusto stœchadis folio. *Bocc. mus.* 142. t. 104.

Helichryso sylvestri, flore oblongo, similis. *Bauh. pin.* 265. *prodr.* 123. t. 123.

*Habitat in Italia. Sicilia.*

## XERANTHEMUM.

\* *Receptaculo paleaceo, semin. corona quinqueseta.*

1. XERANTHEMUM foliis lanceolatis patentibus. *7771100177.*

Xeranthemum receptaculis paleaceis, seminum pappo quinqueseto. *Hort. cliff.* 400.

Xeranthemum, oleæ folio, capitulis simplicibus incanis, non fœtens, flore majore violaceo. *Morif. hist.* 3. p. 43. f. 6. t. 2. f. 2.

Jacea oleæ folio, capitulis simplicibus. *Bauh. pin.* 272.

H h h 5

Ptar-

- Psarmica austriaca. Clus. hist. 2. p. 11.*  
*inapertum.*  $\beta$ . *Xeranthemum*, oleæ folio, capitulis simplicibus, incanum fœtens, flore purpureo minore. *Morif. hist. 3. p. 43. f. 6. t. 12. f. 1.*  
*Xeranthemum capitulis inapertis. Hall. belv. 709. t. 23.*  
*Jaceæ oleæ folio, minore flore. Baub. pin. 272.*  
*orientale.*  $\gamma$ . *Xeranthemum orientale*, fructu maximo, *Tournes. cor. 38.*  
*Jaceæ oleæ folio, capitulis compactis. Baub. pin. 272.*  
*Habitat  $\alpha$ . in Austria,  $\beta$ . in Italia, Helvetia G. Narbonensi. ☉*
- erucifolium.* 2. *XERANTHEMUM* foliis pinnatifidis. *Gmel. sib. 2. p. 108. t. 47. f. 1. †*  
*Habitat ad Tanaium prope oppidum Cavilkenfe.*  
*\* Receptaculo nudo, seminum corona pilosa.*
- vestitum.* 3. *XERANTHEMUM* fruticosum erectum, foliis lanceolato-linearibus, ramis unifloris foliosis.  
*Xeranthemum frutescens lanuginosum, foliis longis mollibus, flore argenteo amplissimo. Burm. afr. 177. t. 66. f. 1.*  
*Xeranthemum speciosum capense, flore albo maximo. Pet. gaz. 1. t. 1. f. 9.*  
*Chrysocome f. Argyrocome africana ericoides, flore albo. Seb. thes. 2. p. 45. t. 43. f. 5.*  
*Habitat in Æthiopia. b*
- speciosissimum.* 4. *XERANTHEMUM* fruticosum erectum, foliis lanceolatis, ramis unifloris subnudis.  
*Xeranthemum tomentosum latifolium, flore maximo. Burm. afr. 178. t. 66. f. 2.*  
*Elichrysum africanum arboreescens, foliis incanis latioribus. Baerb. lugdb. 1. p. 121.*  
*Elichrysum africanum lanuginosum latifolium, calyce floris argenteo & amplissimo. Breyer. ic. 27. t. 16. f. 1.*  
*Chrysocome f. Argyrocome gnaphaloides africana, amplissimis floribus. Seb. thes. 2. p. 45. t. 43. f. 6. 160*
- proliferrum.* 5. *XERANTHEMUM* caule prolifero, foliis subrotundis imbricatis obsoleteis.  
*Elichrysum abrotani feminæ foliis. Breyer. ic. 28. t. 17. f. 1.*  
*Habitat in Æthiopia.*  
*\* Receptaculo nudo, seminum coronis plumosis.*
- retortum.* 6. *XERANTHEMUM* caulibus frutescentibus provolutis, foliis tomentosis recurvatis. *Xe-*

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 859

*Xeranthemum* receptaculis nudis, seminum pappo plumoso. *Hort. cliff.* 400. \*

*Xeranthemoides* procumbens, polii folio. *Dill. clth.* 423. t. 322. f. 415.

*Habitat in Æthiopia.* b

7. *XERANTHEMUM* caulibus frutescentibus provocillatum. lulis, foliis ciliatis hirsutis.

*Aster africanus* frutescens, splendentibus parvis & reflexis foliis. *Comm. bert.* 2. p. 55. t. 28.

*Habitat in Æthiopia.* b

8. *XERANTHEMUM* squamis calycinis mucronato-spinosum. spinosis.

*Xeranthemum spinosum æthiopicum*, foliolis simplicibus, capite spinoso. *Burm. afr.* 182. t. 73. f. 3.

*Xeranthemum spinosum æthiopicum* capitulis compactis purpurascens. *Breyn. pradr.* 2. p. 105.

*Habitat in Æthiopia.*

9. *XERANTHEMUM* ramis unifloris imbricatis, foliis sesamoides. obsoletis.

*Xeranthemum ramosum*, foliis squamosis linearibus, floribus argenteis. *Burm. afr.* 181. t. 76. f. 2.

β. *Xeranthemum* sesamoides, flore albo, ericæ foliis caulium tomentoso adstrictis; ad radicem vero stœchadis citrinæ longioribus & solutis. *Pluk. amalib.* 213. t. 449. f. 5.

*Chrysocome* f. *Argyrocome* africana ericoides, capitulis b. spei. *Seb. tbes.* 2. t. 43. f. 5.

*Elichrysium africanum* lanuginosum, angustissimo folio, calyce floris argenteo & amplissimo. *Breyn. ic.* 27. t. 16. f. 2.

*Habitat in Æthiopia.*

10. *XERANTHEMUM* floribus paniculatis, foliis linearibus paniculatis. neari-lanceolatis.

*Xeranthemum incaum*, foliis oblongo-acutis, capitulis plurimis argenteis. *Burm. afr.* 180. t. 77. f. 1.

*Habitat in Æthiopia*

## CARPESIMUM.

1. *CARPESIMUM* floribus terminalibus.

*Carpesium.* *Ast. nps.* 1741. p. 81. *Hort. nps.* 257.

*Aster atticus*, foliis circa florem mollibus. *Bauh. pin.* 265.

*Cernuum.*

*Aster*

*Aster cernuus. Col. cephr. 1. p. 251. t. 252.*

*Chrysanthemum conyzoides cernuum, foliis circa florem mollibus. Moris. hist. 3. p. 18. f. 6. t. f. 27.*

*Habitat in Italia. &*

*abrotanoides* 2. **CARPESIMUM** floribus lateralibus.

*Habitat in China Obeck.*

*Caules ramosi, duriusculi. Folia alterna, lato-lanceolata, in petiolos attenuata, obsolete crenata, digitum longa. Flores sparsi, saepe solitarii ad axillas foliorum, longitudinaliter, secundum ramos, sessiles aut brevissimis pedunculis unifloris insidentes, magnitudine nucis coryli, nutantes. Calyces umbilicati, cincti foliolis parvis. Flosculi numerosi. Semina oblonga, nuda, glabra, balsamo quasi illita.*

### BACCHARIS.

*ivafolia.*

1. **BACCHARIS** foliis lanceolatis longitudinaliter dentato-serratis. *Hort. cliff. 404. Roy. lugdb. 152.*

*Conyza frutescens, foliis augustioribus nervosis. Few. peruv. 750. t. 37.*

*Eupatorium africanum, agerato affinis peruvianæ, floribus albis. Pluk. alm. 400. t. 328. f. 2.*

*Pseudo-Helichrysum frutescens peruvianum, foliis longis serratis. Moris. hist. 3. p. 90.*

*Habitat in Virginia, Peru. b*

*tenuifolia.*

2. **BACCHARIS** foliis ovato-lanceolatis serratis, caule suffruticoso. *Hort. cliff. 404. \**

*Conyza africana tenuifolia subfrutescens, flore aureo. B. Dill. elsb. 104. t. 88. f. 103.*

*Habitat in Africa. b*

*neriifolia.*

3. **BACCHARIS** foliis lanceolatis superne uno alterove denticulo serratis. *Hort. cliff. 404. \* Roy. lugdb. 152.*

*Arbuscula foliis nerii. Boerb. lugdb. 2. p. 263.*

*Habitat in Æthiopia. b*

*halimifolia.*

4. **BACCHARIS** foliis obovatis superne emarginato crenatis. *Hort. cliff. 405. Grøn. virg. 96. Roy. lugdb. 153.*

*Senecio virginianus arborescens, triplicis folio. Raj. hist. 1799. Herm. parad. 225.*

*Pseudo-Helichrysum virginianum frutescens, halimi latioris foliis glaucis. Moris. hist. 3. p. 90. f. 7. t. 10. f. 4.*

Eli-



# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 861

*Elichryso affinis virginiana frutescens, foliis chenopodii glaucis. Pluk. alm. 134. t. 27. f. 2.*

*Argyracome virginiana, atriplicis folio. Pet. gaz. t. 7. f. 4.*

*Habitat in Virginia. 5*

5. BACCHARIS foliis obovatis denticulatis.

*indica.*

*Habitat in India. Braad.*

*Rami striis elevatis. Folia obovata, glabra, medio subserrato-dentata, magnitudine extimi pollicis. Corymbus magnus, terminalis: pedunculis angulatis bracteis aliquot subulatis. Calyces cylindrici, laeves. Rami ex alis foliorum superiorum, corymbo longiores.*

6. BACCHARIS foliis lanceolatis serrato-dentatis, co-satida, rymbis foliosis. *Gron. virg. 96.*

*Conyza americana frutescens foetidissima. Dill. elth. 106. t. 89. f. 105.*

*Habitat in Virginia. 2*

## CONYZA.

1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymbo squarrosa, boso. *Hort. cliff. 405. Hort. ups. 257.\* Roy. lugd. 157.*

*Conyza major vulgaris. Baub. pin. 265.*

*Conyza. Cam. epit. 612.*

*Habitat in Germaniæ, Belgii, Angliæ, Galliæ siccis. 3*

2. CONYZA foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis.

*Aster americanus albus, mezerei arabum exasperatis foliis, florum petalis reflexis. Pluk. alm. 56. t. 79. f. 2.*

*Habitat in America septentrionali.*

3. CONYZA foliis lato-lanceolatis subserratis, corollis Asteroides radiatis.

*Aster marilandicus, pharmitæ capitulis, flore albo, baccharidis monspeliensium folio & effigie. Pluk. mant. 29.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

*Habitus Asteris; Corymbus subfastigiatus. Flores præcedentis radiati.*

4. CONYZA foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *bifrons. Hort. cliff. 405.*

4. Conyza pyrenaica, foliis primulæ veris. *Herm. parod. radiata. 127. t. 127.*

*β. Tu-*

- apiculata.* 3. *Eupatoria conyzoides maxima canadensis*, foliis can-  
lem amplexantibus. *Pluk. alm.* 141. t. 87. f. 4.  
*Habitat in Pyrenæis, Canada.*
- lobata.* 5. *CONYZA* foliis inferioribus trifidis, superioribus o-  
vato-lanceolatis obsolete serratis, floribus corymbo-  
sis. *Hort. cliff.* 405.  
*Conyza arborescens lutea*, folio trifido. *Plum. spec.* 9.  
*Habitat in Vera Crucè.* 5
- bifoliata.* 6. *CONYZA* foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyll-  
lis: bracteis oppositis.  
*Eupatoria conyzoides*, integro *Jacobææ* folio molli &  
incano. *Pluk. alm.* 140. t. 177. f. 1.  
*Habitat in India.*
- tortuosa.* 7. *CONYZA* caule tortuoso fruticoso, foliis ovato-ob-  
longis integerrimis, racemis reflexis. *Hort. cliff.*  
405. \*  
*Conyza madagascariensis fruticosa*, tortuoso caule, cor-  
ni folio. *Vaill. act.* 1719. p. 396.  
*Habitat in Madagascar, Vera Cruce.* 5
- candida.* 8. *CONYZA* foliis ovatis tomentosis, floribus confer-  
tis, pedunculis lateralibus terminalibusque. *Hort. cliff.*  
405. *Roy. lugdb.* 157.  
*Conyza cretica fruticosa*, folio molli candidissimo to-  
mentoso. *Tournef. cor.* 33.  
*Jacobæa cretica incana*, integro limonii folio. *Barr.*  
*rar. t.* 217.  
*Habitat in Creta.*
- ciperea.* 9. *CONYZA* foliis oblongis, floribus paniculatis.  
*Senecioides.* *Fl. zeyl.* 419.  
*Senecio indica*, foliis ternis crenatis. *Burm. zeyl.* 211.  
t. 96. f. 1.  
*Senecio indicus*, triplicis folio. *Morif. hist.* 3. p. 106.  
f. 7, t. 17. f. 7.  
*Eupatorium*, angustiore folio, bermudense, floribus fla-  
vescentibus. *Plum. alm.* 141. t. 243. f. 3.  
*Habitat in India.* ☉  
*Variant Folia figura lanceolata f. ovata, crenata f. ser-  
rata.*
- chinensis.* 10. *CONYZA* foliis lanceolato-ovatis serratis subtus to-  
mentosis, floribus terminalibus congestis.  
*Habitat in China.* *Toren.*  
*Raro plures quam tres flores simul congesti.*

11. CONYZA foliis ovalibus integerrimis scabris subtus *hirsuta*,  
hirsutis.

*Habitat in China.*

Caulis *subvillosus*. Folia *oblonga s. ovalia, integerrima, scabra, subtus valde hirsuta pallida*. Flores *in racemis conferti*. Calyces *Asteris*.

## ERIGERON.

1. ERIGERON pedunculis unifloris lateralibus, calyci-*viscosum*,  
bus squarrosis. *Hort. ups. 258. \**

Alter foliis ferratis, pedunculis simplicibus lateralibus  
unifloris longitudine folii, foliosis. *Hort. cliff. 409.*

Conyza mas theophrasti, major dioscoridis. *Bauh pin.*  
165.

Conyza major. *Dod. pempt. 51.*

*Habitat in Narbonensi, Hispania, Italia.*

Folia *adpersa pilis, interjectis glandulis viscidis.*

2. ERIGERON caule paniculato, floribus subsolitariis *carolinia*  
terminalibus, foliis linearibus integerrimis. *nam.*

Virga aurea carolinensis, linariae monspessulanæ foliis.

*Dill. elth. 412. t. 306. f. 393.*

*Habitat in Carolina.*

3. ERIGERON caule floribusque paniculatis. *Hort. cliff. canadensis.*  
407. *Hort. ups. 258. Gron. virg. 96. Gort. gelr. 475.*

Conyza annua acris alba elatior, linariae foliis. *Morif.*

*hist. 3. p. 115. f. 11. t. 20. f. 29. Bocc. sic. 85. t.*  
46.

*Habitat in Canada, Virginia, nunc in Europa australi. ☉*

4. ERIGERON foliis basi revolutis.

*bonariensis.*

Erigeron foliis inferioribus dentato-laciniatis: superiori-  
bus integris. *Hort. cliff. 407. Hort. ups. 258.*

Senecio bonariensis purpurascens, foliis imis coronop-  
i. *Dill. elth. 344. t. 257. f. 334.*

*Habitat in America australi. ☉*

5. ERIGERON caule multifloro, foliis lanceolatis sub-*philadelph-*  
ferratis; caulinis semiamplexicaulibus. *cum.*

*Habitat in Canada. Kalm. 2.*

Caulis *pedalis, parum ramosus*. Folia *lanceolata, sca-*  
*bra, una alterave acuta ferratūra*; Caulina *semiam-*  
*plexicaulia, breviora*. Flores *sæpe 7 & 8, radio albo*  
*aut purpurascente; pappo albo.*

6. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Hort. cliff. acre.*

407. *Fl. suec. 691. Roy. lugdb. 165.*

*Eri-*

*Erigeron vulgare*. *Fl. lapp.* 308.

*Conyza cærulea acris*. *Bauh. pin.* 265.

*Amellus montanus æquicolorum*. *Col. ecphr.* 2. p. 25. t. 26.

*Habitat in Europæ apricis, siccis, &*

*alpinum.*

7. *ERIGERON* caule subbifloro, calyce subhirsuto.

*Conyza cærulea alpina major*. *Bauh. pin.* 265. *prodr.* 124.

*Asteri montano purpureo similis f. globulariæ*. *Bauh. hist.* 2. p. 107.

*Habitat in Alpibus Helvetiæ. &*

*Pappus rufo-ferrugineus est.*

*uniflorum.*

8. *ERIGERON* caule unifloro, calyce piloso. *Hort. cliff.*

407. *Fl. succ.* 692.

*Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villosulo subrotundo*. *Fl. lapp.* 307. t. 9. f. 3.

*Aster caule unifloro, calyce tomentoso*. *Hall. bot.* 724.

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. &*

*gramineum.*

9. *ERIGERON* caule unifloro, foliis linearibus ciliatis scabris.

*Aster caule unifloro longitudine foliorum linearium.*

*Gmel. sib.* 2. p. 174. t. 76. f. 2.

*Aster acaulos albus, foliis gramineis*. *Amm. rus.* 215.

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin. &*

*Minima planta, obvallata foliis emarcidis, aridis.*

*ficulum.*

10. *ERIGERON* squamis calycinis inferioribus laxis forem superantibus. *Hort. cliff.* 407.

*Conyza ficula annua lutea, foliis atro-virentibus, caule rubente*. *Bocc. sic.* 62. t. 31. f. 4. *Morif. hist.* 3. p. 115. f. 7. t. 20. f. 28.

*Habitat in Siciliæ paludosis. ☉*

*camphoratum.*

11. *ERIGERON* foliis lanceolato-ovatis villosis: ferraturis apice cartilagineis. *Hort. upf.* 259

*Baccharis foliis ovato-lanceolatis serratis, caule herbaeco*. *Gron. virg.* 97.

*Habitat in Virginia. ☉*

*tuberosum.*

12. *ERIGERON* foliis lanceolatis, ramis unifloris, caule suffruticoso.

*Erigeron caule subunifloro, foliis lanceolato-linearibus rigidis, radice tuberosa*. *Sauv. monsp.* 55.

• *Chondrilla bulbosa syriaca, foliis angustioribus*. *Bauh. pin.* 130.

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 865

*Conyza marina. Moris. hist. 3. p. 114. f. 7. t. 19. f. 20. bona.*

β. *Chondrilla bulbosa syriaca, foliis latioribus. Bauh. pin. 130.*

*Conyza tuberosa lutea, foliis angustis & rigidis. Magn. monsp. 77. Moris. hist. 3. p. 114. f. 7. t. 20. f. 15.*

γ. *Alter conyzoides gesneri. Moris. hist. 3. p. 118. f. 7. t. 22. f. 7.*

*Habitat in Galloprovincia, G. Narbonensi, Syria.*

*Caulis brevis, lignosus; Rami simplices, uniflori. Folia sparsa, lanceolata, subpetiolata, integerrima. Flores lutei, Asteris facie, terminales, sessiles. Pappus griseus. Media inter Asteres & Erigera.*

## TUSSILAGO.

1. **TUSSILAGO** scapo unifloro, foliis lyrato-ovatis. *Anandria.*

*Tussilago scapo unifloro, calyce clauso. Hort. upf. 259.*

*t. 3. f. 1. \* Gmel. fib. 2. p. 141. t. 68. f. 1.*

*Anandria. Amoen. acad. 1. p. t. 11. \**

β. *Tussilago scapo unifloro, calyce subaperto. Gmel. fib.*

*t. p. 143. t. 67. f. 2.*

*Habitat in Sibiria. 2*

*Una eademque planta, quæ in solo libero calycem clausum flore occultato gerit, in olla loco calidiori florem præcociorem radiatum expandit, ut variis annis observavimus.*

2. **TUSSILAGO** scapo subnudo unifloro, foliis corda-*alpina.*

*to orbiculatis crenatis. Hort. cliff. 411. Roy. lugdb.*

*159.*

*Tussilago alpina rotundifolia glabra. Bauh. pin. 197.*

*Tussilago alpina 2. Clus. hist. 2. p. 113.*

β. *Tussilago alpina rotundifolia canescens. Bauh. pin.*

*197.*

*Tussilago alpina 1, flore evanido. Clus. hist. 2. p. 113.*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Bohemiæ. 2*

3. **TUSSILAGO** scapo imbricato unifloro, foliis subcor-*Forsara.*

*dati angulatis denticulatis. Hort. cliff. 411. Fl. suec.*

*680. Mat. med. 391. Roy. lugdb. 159. Dalib. paris.*

*256. Gmel. fib. 2. p. 140.*

*Tussilago vulgaris. Bauh. pin. 197.*

*Tussilago. Clus. hist. 140. Cam. epit. 590. 591.*

*Habitat in Europæ argillosis subtus humidis. 2*

4. **TUSSILAGO** thyrsis fastigiato, floribus radiatis. *Fl. frigida.*

*lapp. 303. Fl. suec. 682.*

Tussilago scapo imbricato, floribus spicatis radiatis, foliis infra incanis acutis. *Gmel. sib. 2. p. 150. t. 70.*

Petasites scapo paucifloro, foliis subtus tomentosis albissimis. *Hall. belv. 707.*

Cacalia tomentosa. *Bauh. pin. 198. pradr. 102. Scheuch. alp. 130. t. 18. f. 1.*

*Habitat in Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Sibiria con-wallibus. 2*

*alba.*

5. TUSSILAGO thyrsis fastigiato, flosculis femineis nudis paucis. *Hort. cliff. 411. Fl. suec. 681. Roy. lugdb. 159.*

Petasites minor. *Bauh. pin. 197.*

Petasites flore albo. *Cam. epit. 593.*

*Habitat in Europa. 2*

*hybrida.*

6. TUSSILAGO thyrsis oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Hort. cliff. 411. Roy. lugdb. 159. Gort. gelr. 478.*

Petasites major, floribus pedunculis longis insidentibus.

*Dill. elth. 309. t. 230. f. 297.*

Petasites in medio majoribus flosculis, reliquis minoribus. *Buxb. hal. 258.*

*Habitat in Germania, Hollandia. 2*

*Petasites.*

7. TUSSILAGO thyrsis ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff. 411. Fl. suec. 685. Mat. med. 390. Roy. lugdb. 159. Dalib. paris. 256.*

Tussilago major. *Cam. epit. 592.*

Petasites major & vulgaris. *Bauh. pin. 197.*

*Habitat in Europa temperiore. 2*

## SENECIO.

\* *Floribus flosculosis.*

- bivaccifolius* 1. SENECIO corollis nudis, foliis amplexicaulibus lacinis, caule herbaeco erecto. *Hort. ups. 261.*

Senecio foliis lanceolatis amplexicaulibus levibus acute sinuatis denticulatis, caule herbaceo. *Hort. cliff. 406.*

*Roy. lugdb. 163.*

Senecio americanus altissimus, blattariæ s. hieracii folio.

*Herm. par. 226. t. 226.*

*Habitat in America septentrionali. ☉*

- divaricatus* 2. SENECIO corollis nudis, foliis lanceolatis dentatis scabris ramulis floriferis divaricatis.

*Habitat in China. Osbeck.*

Cau-

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 867

Caulis erectus, angulatus, angustus, sesquipedem altus, Folia alterna, remota, lanceolata, petiolata, serrato-dentata, tomentoso-scabra. Ramorum tantum rudimenta ex alis foliorum. Ex supremis alis foliorum aliquot ramuli cum floribus, basi admodum divaricati. Flores terminales, aliquot, pedunculati, magnitudinis precedentis, Calycibus basi squamis aliquot laxis subulatis adpersis.

3. SENEIO corollis nudis, scapo subnudo longissimo. *Pseudo China* Roy. lugdb. 164.

Senecio maderaspatanus, rapi folio, floribus maximis, cujus radix a nonnullis China dicitur. *Dill. cit.* 345. t. 258. f. 335.

Habitat in India. 2

4. SENEIO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus spatis. *Roy. lugdb.* 165. *Hall. belv.* 733. *Fl. suec.* 690. *Dalib. paris.* 257.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis: laciniis æqualibus patentissimis: rachi lineari. *Hort. cliff.* 406.

Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131. *Fl. lapp.* 296.

Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.

Habitat in Europæ cultis, ruderatis, succulentis. ☉

\* Floribus radiatis: radio revoluto.

5. SENEIO corollis revolutis, foliis sessilibus sinuatis, trifloris, calycibus conicis: squamis minimis intactis. *Hort. nps.* 261.

Senecio foliis pinnatifidis: laciniis inæqualibus erectis. *Hort. cliff.* 406.

Senecio foliis sinuatis petiolatis, pedunculis folio longioribus, florum radiis disco brevibus. *Roy. lugdb.* 165.

Jacobæa ægyptica, senecionis folio, semistofculis vix conspicuis. *Vaill. act.* 1720. p. 293.

Habitat in Ægypto. ☉

6. SENEIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus sinuatis, squamis calycinis brevioribus integris spha-celatis. *Hort. nps.* 261. \*

Jacobæa ægyptica, senecionis folio, flore minore. *Vaill. act.* 1720. p. 298.

Habitat in Ægypto. ☉

7. SENEIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, squamis calycinis brevissimis intactis. *Hort. nps.* 261. \* n. 7.

Senecio foliis sinuatis: basi latioribus amplexicaulibus, floribus corymbosis, radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 165?

*Habitat in Hispania.* ☉

- trilobus.* 8. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, squamis calycinis sphacelatis laceris. *Hort. ups.* 261. \*  
*Habitat in Hispania.* ☉

- viscosus.* 9. SENECEO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii.  
Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 142. *it. Wgth.* 142. *Dalib. paris.* 258.  
Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elib.* 347. t. 258. f. 336.

Senecio incanus pingvis. *Bauh. pin.* 131.

*Habitat in Europæ pagis, urbibus.* ☉

- sylvaticus.* 10. SENECEO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis; caule corymboso erecto.  
Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *It. Wgth.* 326. *Fl. succ.* 689. *Dalib. paris.* 258.  
Senecio minor, latiore folio, s. montanus. *Bauh. pin.* 131. *Dill. elib.* 258. t. 258. f. 337.  
Jacobæa, senecionis folio incano, perennis. *Raj. hist.* 285. *Hall. jern.* 177. t. 2. 3.  
*Habitat in Europæ borealis sylvis ceduis.* ☉

- glauca.* 11. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, linearibus pinnato-dentatis: laciniis linearibus integris. *Roy. lugdb.* 164.  
Jacobæa ægyptia annua; coronopi folio glauco. *Vaill. act.* 1720. p. 297.  
Jacobæa ægyptia, folio glauco coronopi. *Boerb. lugdb.* 1. p. 99.  
*Habitat in Ægypto.* ☉

\* *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

- basistatus.* 12. SENECEO corollis radiantibus, petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pinnato-sinuatis. *Roy. lugdb.* 164.  
Jacobæa afra perennis viscosa lutea, asplenii foliis. *Vail. act.* 1720. p. 298.  
*Habitat in Africa.*



SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 869

13. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis pinnatifidis æ- *elegans.*  
qualibus patentissimis: rachi inferne angustata. *Hort.*  
*cliff.* 406. *Hort. ups.* 260. n. 2.  
*Jacobæa africana* frutescens, flore amplo purpureo ele-  
gantissimo, senecionis folio. *Volck. norib.* 225. f.  
225.  
*Aster africanus* frutescens, foliis senecionis crassioribus.  
*Comm. hort.* 2. p. 61. t. 31.  
*Habitat in Æthiopia.*
14. *SENECIO* corollis radiantibus planis calyce longio- *squalidus.*  
ribus integris, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus di-  
stantibus. *Hort. ups.* 260. n. 2.  
*Habitat in Europa Australi:* ☉
15. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis pinnatifidis den- *erucifolia.*  
tatis subhirtis, caule erecto.  
*Senecio scanorensis.* *it. scan.* 225.  
*Jacobea altissima*, foliis erucæ artemisiæve similibus &  
æmulis. *Rupp. jen.* 164. 176  
*Jacobæa incana repens.* *Barr. rar.* 1075. t. 153.  
*Habitat in aggeribus Europæ temperatæ.*
16. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis utrinque to- *incanus.*  
mentosis semipinnatis: laciniis subdentatis, corymbo  
subrotundo. *Hall. helv.* 731.  
*Chrysanthemum alpinum incanum*, foliis laciniatis.  
*Bauh. pin.* 133.  
*Chrysanthemum alpinum* I. *Clus. hist.* 1. p. 333.  
*Jacobæa alpina incana minor.* *Barr. ic.* 262.  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæo-*  
*rum.*
17. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis pinnato-multifi- *abrotanifoli-*  
dis linearibus. † *us.*  
*Senecio* foliis decompositis. *Guest. stamp.* 360.  
*Chrysanthemum alpinum*, foliis abrotani multifidis.  
*Bauh. pin.* 134.  
*Chrysanthemum alpinum* II. *Clus. hist.* 1. p. 333. t.  
334.  
*Habitat in Alpibus Stiriæ, Pyrenæicis.*
18. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis bipinnatis li- *canadensis.*  
nearibus.  
*Habitat in Canada.* *Kalm.*  
*Caulis erectus, levis. Folia bipinnata, linearia, glabra:*  
*summa simpliciter pinnata. Corymbus terminalis,*  
*com-*

*compositus, fastigiatus, flavus. Calyces rufescentes.*

- Jacobæa* 19. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 406. *Fl. suec.* 688. *Roy. lugdb.* 174. *Dalib. parif.* 257. *Jacobæa vulgaris lacinata. Baub. pin.* 131.

*Herba f. Jacobi. Fuchs. hist.* 742.

*Habitat in Europæ pascuis. &*

- arenis,* 20. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis crenatis: infimis cordatis petiolatis; superioribus pinnatifidis lyratis. *Gron. virg.* 98.

*Jacobæa virginiana, foliis imis alliaræ glabris; caulescentibus barbæræ. Moris. hist.* 3. p. 110. *Raj. suppl.* 180.

*Habitat in Virginia, Canada. &*

*Antecedenti nimis affinis.*

\* *Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.*

- paludosus,* 21. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute serratis subtus subvillosis; caule stricto.

*Senecio foliis integris serratis. Guett. stamp.* 2. p. 559.

*It. scan.* 396 \*

*Solidago caule simplici, corymbo terminali, foliis subtus tomentosis, flosculis femineis sedecim. Lech. scan.* 68. *Fl. suec.* 686.

*Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. Moris. hist.* 3. p. 110. *f. 7. t. 7. f. 22.*

*Conyza palustris serratifolia. Baub. pin.* 266.

- β. *Solidago palustris altissima incana & tomentosa, foliis longioribus serratis. Amm. ruth.* 220. *Gmel. fib.* 2. p. 162.

*Habitat in Europæ paludibus maritimis. &*

*Variat foliis utrinque tomentosis.*

- nemorensis.* 22. **SENECIO** corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis biserratis subtus villosis, caule ramoso.

*Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, floribus umbellatis. Hall. helv.* 734. *Itin.* 23. *Harveya*

*Jacobæa nemorensis, latiore rigidior & hirsuto folio. Rupp. jen.* 142. 177.

*Solidago foliis lanceolatis serratis, floralibus ad pedunculum minimis. Gmel. fib.* 2. p. 165.

*Habitat in Germaniæ, Sibiræ nemoribus. &*

23. **SENECIO** corollis radiantibus, floribus corymbosis, *sarracenicus*.  
 foliis lanceolatis serratis glabriusculis. *Hort. ups.* 266.  
*Senecio* foliis lanceolatis serratis, floralibus pedunculosis  
 æquantibus. *Vir. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 163. *Gort.*  
*gelr.* 481.  
*Solidago* caule simplici, corymbo terminali; pedunculis  
 partialibus alternis nudis longitudine folii. *Hort. cliff.*  
 410.  
*Solidago sarracenicæ*. *Fuchs. hist.* 728.  
*Virga aurea angustifolia serrata*. *Bauh. pin.* 268.  
*Habitat in Helvetiæ montanis, nemorosis.* 4.  
*Dignoscitur facie, latis foliis, magnitudine, radice ma-*  
*xime reptatrice.*
24. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis obovatis car-*balimifolius*.  
 nosis subdentatis, caule fruticoso.  
*Solidago* foliis obverse ovatis carnosissimis crenatis, caule  
 fruticoso, corymbo ramoso. *Hort. cliff.* 411.  
*Doria africana* arborescens, foliis crassis & succulen-  
 tis triplicem referentibus. *B. Dill. clth.* 124. t. 104.  
*f.* 124.  
*Habitat in Æthiopia.* 5
25. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis serrato-subspi-*byzantinus*.  
 nosis.  
*Senecio* foliis crenato-dentatis: inferioribus pinnato-ly-  
 ratis: superioribus pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 530.  
*Habitat Byzantii.* 8  
*Caulis quadripedalis, teres, striatus, viridis, adpersus*  
*pilis albis. Rami in inferiore parte caulis, patentissi-*  
*mi. Folia lanceolata, sessilia, amplexicaulia, revoluta,*  
*serrata dentibus acutis, sinibus obtusis, acuminibus*  
*spinoso-inermibus; supra viridia, nitida, scabrinscu-*  
*la; subtus venosa, villosa, viridia. Ramorum rudi-*  
*menta ex singulis alis foliorum. Scapi terminales, te-*  
*retes, caule longe angustiores, filiformes, longissimi,*  
*læviores, striati, inferne adpersi foliis linearibus, in-*  
*divisis, non dentatis, sed serrato-spinosis; subnudi.*  
*Corymbi terminales, alterni, subdivisi. Calyces api-*  
*cæ sphacelati. Corollæ luteæ: Radio octifloro, ovato,*  
*vix tridentato. Facies Serratulæ arvensis.*
26. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis sagittatis am-*ilicifolius*.  
 plexicaulibus dentatis, caule fruticoso. *Vir. cliff.* 84.  
*Hort. cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164.

## 872 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

*Jacobæa africana* frutescens, foliis incisfis & subtus cinereis. *Comm. rar.* 42. t. 42.

*Habitat in Æthiopia.* 5.

*rigidus.*

27 *SENECIO* corollis radiantibus, foliis cordato-oblongis amplexicaulibus scabris acuminatis serratis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164.

*Jacobæa africana* frutescens, foliis rigidis & hirsutis. *Comm. hort.* 2. p. 149. t. 75.

*Jacobæa africana* ramosissima, foliis senecionis pinguis rigidis & lucentibus subtus incanis. *Raj. supp.* 179.

*Habitat in Æthiopia.* 5

## ASTER

\* *Integrifolii, pedunculis nudis.*

*fruticosus.*

1. *ASTER* foliis linearibus fasciculatis punctatis, pedunculis unifloris nudis, caule fruticoso rugoso. *Hort. cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 168.

*Aster africanus* frutescens, foliis angustis & plerumque conjunctis. *Comm. hort.* 2. p. 53. t. 27

β. *Aster maritimus* fruticosus, hyslopi foliis confertis, flore albo. *Pluk. mant.* 29. t. 340. f.

*Habitat ad Cap. b. Spei in saxosis.* 5

*alpinus.*

2. *ASTER* foliis lanceolatis hirtis: radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro.

*Aster montanus* cæruleus, magno flore, foliis oblongis. *Bauh. pin.* 267?

*Aster VII austriacus* V. *Clus. hist.* 2. p. 15?

β. *Aster atticus alpinus* alter. *Bauh. pin.* 267.

*Aster atticus* cæruleus alpinus. *Bauh. pin.* 905.\*

γ. *Aster hirsutus austriacus* cæruleus, magno flore, foliis subrotundis. *Bauh. pin.* 267. *prodr.* 124.

*Habitat in Austria, Vallesia, Helvetia, Pyrenæis.* 2

*sibiricus.*

3. *ASTER* foliis lanceolatis venosis scabris extimoseratis, caulibus striatis, pedunculis tomentosis.

*Aster* foliis ovatis oblongis supra serratis, caulibus striatis, pedunculis unifloris umbellatis. *Gmel. sib.* 2. p. 186.

t. 80. f. 10.

*Habitat in Sibiria.*

*Tripolium.*

4. *ASTER* foliis lanceolatis integerrimis carnosiss glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Roy. lugdb.* 168.

*Fl. succ.* 697. *Gmel. sib.* 2. p. 187. t. 80. f. 2.

*Aster maritimus Tripolium* dictus. *Raj. hist.* 270. *Hort. cliff.* 408.

Tri-

*Tripolium majus cæruleum. Bauh. pin. 267.*

*Tripolium. Dod. pempt. 379.*

*Habitat in Europæ littoribus maritimis & ad Sibiricæ lacus salfos. 2*

5. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trinervis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtatis. *Amellus.*

*Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus subserratis, calycibus laxis: squamis lanceolatis. Hort. cliff. 407. Roy. lugdb. 168. Gmel. fib. 2. p. 185.*

*Aster atticus cæruleus vulgaris. Bauh. pin. 267.*

*Aster atticus. Dod. pempt. 266.*

*Aster VIII. italorum fuchsi. Clus. hist. 2. p. 16.*

*Habitat in Europæ australis asperis collibus. 2*

6. ASTER ramis divaricatis, foliis ovatis ferratis, floribus integerrimis. *divaricatus.*

*Aster caule infirmo, foliis ovatis acuminatis integerrimis, pedunculis unifloris nudis, calycibus simplicibus. Gron. virg. 99.*

*Aster americanus latifolius albus, caule ad summum brachiato. Pluk. alm. 56. t. 79. f. 1.*

*Habitat in Virginia. 2*

\* *Integrifolii, pedunculis squamosis.*

7. ASTER foliis linearibus integerrimis, caule paniculato. *paniculatus.*

*Hort. cliff. 408. Roy. lugdb. 167. Gron. virg. 99.*

*Aster novæ anglæ, linariæ foliis, chamæmeli floribus.*

*Herm. par. 95. t. 95.*

*Aster americanus multiflorus, flore albo bellidis: disco luteo. Pluk. alm. 56. t. 78. f. 6.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

*Caulis paniculato-ramosissimus, ramis filiformibus. Folia caulina angusto lanceolata. Ramorum linearia. Pedunculi filiformes, striati, uniflori, adpersi foliolis angustissimis. Flores parvi Calyce erecto, imbricato, laxo; Radius copiosus albus; Discus flavus, radio parrior.*

8. ASTER foliis sublinearibus integerrimis, pedunculis tenuifoliis.

*Aster americanus, belvedere foliis, floribus ex cæruleo albicantibus, spicis longis. Pluk. alm. 56. t. 78. f. 5.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

*Caules tenues, angulati, leves. Folia alterna, linearisub-*

*sublanceolata, integerrima, minus scabra. Caulis parum ramosus. Flores terminales, solitarii, Pedunculis foliolis subulatis, minimis adspersis.*

- linariifolius.* 9. ASTER foliis linearibus integerrimis mucronatis scabris carinatis, pedunculis foliolosis.

Aster americanus frutescens, saturejæ foliis scabris, floribus amplis saturate violaceis. *Pluk. alm. 56. t. 14. f. 7.*

Aster marilandicus, rosmarini foliis angustioribus, in caule crebris inordinatis, floribus in summitate paucis. *Raj. suppl. 175.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

Caulis purpurascens. Folia linearia, viridia, valde scabra, acuta, sparsa. Pedunculi alterni, foliolis minimis adspersi. Flores terminales, solitarii.

- linifolius.* 10. ASTER foliis linearibus acutis integerrimis, caule corymbofo ramosissimo. *Hort. cliff. 408. Gron. virg. 99. Roy. lugdb. 167.*

Aster tripolii flore, angustissimo & tenuissimo folio. *Morif. hist. 3. p. 121.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

- sedifolius.* 11. ASTER foliis lanceolato-linearibus subcarnosis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliolosis.

Aster caule erecto umbellifero, venis simplicibus, foliis ligulatis. *Sauv. monsp. 54.*

Aster tripolii flore. *Baub. pin. 167.*

Aster minor narbonensium, tripolii flore, linariæ folio. *Lob. ic 349. bene. Pluk. alm. 56. t. 271. f. 3?*

*Habitat in Hungaria interamni, Hispania, Monspeli.*

- concolor.* 12. ASTER caule simplicissimo, foliis ovatis sessilibus integerrimis, racemo terminali. *Gron. virg. 178. \**

Aster purpureus non ramosus, foliis parvis rigidis, floribus concoloribus seriatim ad caulem dispositis. *Clayt. ibid.*

*Habitat in Virginia. 2*

- agilis.* 13. ASTER floribus terminalibus solitariis, foliis linearibus alternis. *Gron. virg. 98.*

Aster foliis parvis rigidis crebris, caule non ramoso ligneo infirmo, flore unico specioso: barbulis purpureis longis, flosculis in disco ferrugineis, calyce squamoso tumido rotundo. *Clayt. ibid.*

*Habitat in Virginia. 2*

14. A-

14. ASTER foliis cordato-lanceolatis undulatis, flori-<sup>undulatis.</sup> bus racemosis adscendentibus. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 167.  
Aster novæ angliz purpureus, virgæ aureæ facie & foliis undulatis. *Herm. par.* 96. t. 96.  
Aster virginianus comosus, foliis latoribus & flosculis minimis cæruleis. *Morif. hist.* 3. p. 120.  
*Habitat in America septentrionali.* 2
15. ASTER foliis lanceolatis alternis integerrimis semi-<sup>nova anglia</sup> amplexicaulibus, floribus terminalibus. *Hort. cliff.* 408. *Gron. virg.* 100. *Roy. lugdb.* 166.  
Aster novæ angliz altissimus hirsutus, floribus amplis purpuro-violaceis. *Herm. par.* 98. t. 98.  
Aster novæ angliz altissimus hirsutus, floribus omnium maximis purpuro-violaceis. *Tournef. inst.* 482.  
*Habitat in Nova Anglia.* 2  
Caulis fuscus. Pedunculi imbricati foliolis. Corollæ radialis cæruleus.
16. ASTER caule paniculato, pedunculis racemosis: pe-<sup>ericoides.</sup> dicellis foliosis: foliolis linearibus integerrimis. *Gron. virg.* 100.  
Aster caule paniculato, floribus racemosis, calycibus patulis oblongis, foliis subulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 168.  
Aster ericoides dumosus. *Dill. elt.* 40. t. 36. f. 40.  
*Habitat in America septentrionali.* 2  
\* *Serratifolii, pedunculis lævibus.*
17. ASTER foliis cordatis ferratis petiolatis, caule pa-<sup>cordifolius.</sup> niculato. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 167.  
Aster latifolius glaber humilis ramosissimus, flore parvo cæruleo, foliis ad basin cordatis. *Morif. hist.* 3. p. 121. f. 7. t. 22. f. 34.  
Aster latifolius autumnalis. *Corn. canad.* 64. t. 65.  
*Habitat in America & Asia septentrionali.* 2
18. ASTER foliis semiamplexicaulibus lanceolatis ser-<sup>puniceus.</sup> ratis scabris, pedunculis alternis subunitioris, calycibus discum superantibus. *Hort. cliff.* 408. *Roy. lugdb.* 166.  
Aster americanus latifolius, puniceis caulibus. *Herm. lugdb.* 649. t. 651. *Morif. hist.* 3. p. 120.  
*Habitat in America septentrionali.* 2
19. ASTER foliis lanceolatis: lateribus inferiorum cre-<sup>antheris.</sup> natis, radice annua, caule corymbofo, pedunculis nudis.

- nudis. *Hort. cliff.* 409. *Hort. ups.* 262. \* *Roy. lugdb.* 169.  
 Aster annuus ramosus albus latifolius canadensis. *Morif. hist.* 3. p. 122.  
 Bellis ramosa umbellifera. *Corn. canad.* 193. t. 194.  
 — *Habitat in* Canada. ☉
- vernus.* 20. ASTER caule subnudo filiformi subramoso, pedunculis nudis, foliolis radicalibus lanceolatis integerrimis obtusis: *Gron. virg.* 99.  
 Aster palustris, foliis bellidis non ferratis, barbulis tenuibus albis, disco luteo, caule viridi hirsuto erecto. *Clayt. ibid.*  
*Habitat in* Virginia. 2
- \* *Serratifolii, pedunculis squamosis.*
- indicus.* 21. ASTER foliis ovato-oblongis ferratis: floralibus ovali-lanceolatis integerrimis, ramulis unifloris.  
 Aster conyzoides ind. orient. ramosior, caulibus sparsis. *Pluk. alm.* 57. t. 149. f. 4.  
*Habitat in* China.
- lævis.* 22. ASTER foliis lanceolatis sessilibus lævibus subserratis, pedunculis foliolosis subdivisis.  
*Habitat in* America septentrionali. *Kalm.* 2  
 Caulis erectus, lævis, angulatus, angustus. Folia alterna, remota, medio parum serrata, sessilia, lato-lanceolata, utrinque glaberrima. Panicula minus ramosa: Pedunculis foliolis subulatis, minimis adspersis. Radius corollarum cæruleus.
- mutabilis.* 23. ASTER foliis lanceolatis, calycibus imbricatis basi squarrolis.  
 Aster cæruleus americanus non fruticosus serotinus angustifolius humilis, flore amplo floribundus. *Pluk. alm.* 56. t. 326. f. 1.  
*Habitat in* America septentrionali. 2  
 Differt a *A. serotino* Calycibus magis arcte imbricatis & Corollæ radiis saturate purpureis; Discus florum primum luteus, dein purpureus.
- tradescenti.* 24. ASTER foliis lanceolato-linearibus medio serratis, pedunculis foliosis, caule racemoso, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 408. *Hort. ups.* 262. \* *Roy. lugdb.* 167.  
 Aster virginianus ramosissimus serotinus, parvis floribus albis tradescenti. *Morif. hist.* 3. p. 121.  
*Habitat in* Virginia. 2

25. A-



25. ASTER foliis lanceolatis subserratis sessilibus, cau- *novi belgii.*  
 le paniculato, ramulis unifloris solitariis, calycibus  
 squarrosis. *Hort. cliff.* 408. *Hort. ups.* 262. \*  
 Aster novæ belgiæ latifolius umbellatus, floribus dilute  
 violaceis. *Herm. lugdb.* 66. t. 67.  
*Habitat in Virginia, Pennsylvania. b*
26. ASTER caule corymbofo, foliis lanceolatis reflexis, *grandiflorus.*  
 floribus solitariis, calycibus patulis. *Roy. lugdb.* 168.  
 Aster foliis lanceolatis semiamplexicaulibus crenatis sca-  
 bris, ramis unifloris foliosis. *Gron. virg.* 99.  
 Aster grandiflorus asper: squamis reflexis. *Dill. elth.*  
 41. t. 36. f. 41.  
 Aster virginianus pyramidatus, triglossi foliis asperis, ca-  
 lycis squamulis foliaceis. *Mart. cent.* 19. t. 19.  
*Habitat in America septentrionali. 2*
27. ASTER floribus ovatis, disco radiis longiore. *miser.*  
 Aster ericoides, meliloti agricæ umbone. *Dill. elth.* 40.  
 t. 35. f. 39.  
*Habitat in America septentrionali. 2*  
*Habitus proximorum.* Caulis sesquipetalis, crassus,  
 viridis, minus paniculatus, quam in reliquis. Folia  
 caulis parum serrata, nutantia. Ramorum lanceolata,  
 integerrima. Calyces cum disco corollæ ovati, imbrici-  
 cati foliolis erectiusculis, longitudine radii. Radius  
 albus, brevissimus & miser. Discus parvus, valde  
 convexus, pallidus, stylis flavis.
28. ASTER caule fruticoso, ramis unifloris, foliis ovato-*reflexis.*  
 lanceolatis recurvis serrato-ciliatis.  
 Aster africanus frutescens, splendentibus parvis reflexis  
 foliis. *Comm. hort.* 2. p. 55. t. 28.  
*Habitat in Æthiopia. b*
29. ASTER foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, ca- *chinensis.*  
 lycibus terminalibus patentibus foliosis. *Hort. cliff.*  
 407. *Hort. ups.* 262 *Roy. lugdb.* 169.  
 Aster, chenopodii folio, annuus, flore ingenti specioso.  
*Dill. elth.* 38. t. 34. f. 38.  
*Habitat in China? ☉*
- \* *Pinnatifolii.*
30. ASTER foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 407. \* *aurantiis.*  
 Aster americanus, foliis pinnatis & serratis, floribus au-  
 rantiis. *Houft. mss. c. fig. Amm. herb.* 466.  
*Habitat in Vera Cruce.* SO-

## SOLIDAGO.

- sempervirens* 1. **SOLIDAGO** foliis lanceolatis subcarnosis glaberrimis margine scabriusculis, paniculacorymbosa.  
*Solidago panicula corymbosa*, racemis reflexis, floribus adscendentibus, foliis glaberrimis. *Gron. virg.* 97.  
*Solidago maxima*. *Corn. canad.* 168.  
*Virga aurea noveboracensis* glabra, caulibus rubentibus, foliis angustis glabris. *Herm. flor.* 26.  
*Virga aurea canadensis*, foliis carnosissimis non serratis: latioribus f. angustioribus. *Morif. hist.* 3. p. 124. f. 7. t. 23. f. 15.  
*Virga aurea* f. *Solidago procerior americana*, caule multiplici. *Pluk. alm.* 389. t. 235. f. 5.  
*Habitat in Noveboraco, Canada.* 2  
*Notabilis Caule rubro, homine altiore, Foliis glaberrimis, subcarnosis, margine parum scabris, tota hyeme persistentibus; tempore florendi nimis sero, ut apud nos hyems sapissime flores suffocet.*
- canadensis.* 2. **SOLIDAGO** paniculato-corymbosa, racemis recurvatis, floribus adscendentibus, foliis trinerviis subserratis scabris, *Hort. upf.* 259. *Hort. cliff.* 409. *Gron. virg.* 97. *Roy. lugdb.* 161.  
*Virga aurea angustifolia*, panicula speciosa canadensis. *Pluk. alm.* 389. t. 236. f. 1. *Morif. hist.* 3. p. 125.  
*Virga aurea americana*, foliis serratis angustis subtus nervosis. *Morif. blaf.* 322.  
*Habitat in Virginia, Canada.* 2
- altissima.* 3. **SOLIDAGO** paniculato-corymbosa, racemis recurvis, floribus adscendentibus, foliis enerviis subintegerrimis. *Hort. upf.* 259.  
*Virga aurea altissima serotina*, panicula speciosa patula. *Mart. cent.* 14. t. 14.  
*Habitat in America septentrionali.* 2  
*Habitus precedenti simillimus, diversus magnitudine, tempore florendi, serraturis nervisque foliorum; ceterum eadem commiscet plantas vix genuinas, forte hybridas, ut vix limites reperias. Itaque conferantur.*  
*Virga aurea novæ anglie altissima*, paniculis nonnunquam reflexis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 97.  
*Virga aurea americana hirsuta*, radice odorata. *Dill. elth.* 410. t. 304. f. 391.  
*Virga aurea novæ anglie*, rugosis foliis crenatis. *Dill. elth.* 406. t. 308. f. 396. Vir-

Virga aurea americana aspera, foliis brevioribus serratis. *Dill. elth.* 411: t. 305. f. 392.

Virga aurea marilandica, spicis florum racemosis, toliis integris scabris: *Mart. cent.* 13. t. 13.

4. SOLIDAGO panicula corymbosa: racemis recurvis *laterisflora* ascendentibus, caule inferne ramoso floriferoque.

*Habitat in America septentrionali. Kalm.*

Planta *S. canadensis* dimidio minor. Folia non serrata, molliora, sed uno alterove dente interdum notata. Flores & omnia ut in præcedentibus, at caulis infra medium Ramos emittit simplices, caule paulo breviores, apice corymbosos; nullos vero ramos inter corymbum terminalem caulis & medium seu ramos, quod in hac singulare.

5. SOLIDAGO panicula corymbosa, racemis supra cæsia. densioribus, caule glabro lævi.

Virga aurea marilandica cæsia glabra. *Dill. elth.* 414. t. 307. f. 395.

Virga aurea marilandica, foliis longis angustis acutis, ramis f. virgulis floriferis e foliorum alis exeuntibus longa serie. *Raj. supp.* 168.

*Habitat in America septentrionali. &*

6. SOLIDAGO caule obliquo, pedunculis erectis foliolatis ramosis, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 161.

Virga aurea mexicana. *Bauh. pin.* 517.

Virga aurea, limonii folio, panicula uno versu disposita. *Tournef. inst.* 404.

*Habitat in Mexico? &*

7. SOLIDAGO caule flexuoso, foliis ovatis acuminatis serratis, racemis lateralibus simplicibus. *Roy. lugdb.* 161.

Virga aurea montana, serophulariæ folio. *Pluk. alm.* 390. t. 235. f. 3.

Virga aurea canadensis, asteris folio. *Herm. par.* 244. t. 244.

*Habitat in Canada.*

8. SOLIDAGO caule erecto, foliis ovatis acuminatis serratis, racemis lateralibus simplicibus.

Virga aurea, latissimo folio, canadensis glabra. *Pluk. alm.* 389. t. 235. f. 4.

*Habitat in Canada. &*

Ni-

*Nimis affinis S. flexicauli. Caulis rectus, acute angulatus. Folia ovata, utrinque mucronata, serrata, supra laevia, subtus scabra. Racemi ex alis, foliopleurumque breviores.*

*Virganea.* 9. **SOLIDAGO** caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis.

*Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. Hort. cliff. 409. Fl. jucc. 685. Mat. med. 393. Roy. lugdb. 161. Hall. belv. 729. Dalib. parif. 256. Gmel. fib. 2. p. 154.*

*Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis. Fl. lapp, 306.*

*Virga aurea vulgaris latifolia. Bauh. hist. 2. p. 162.*

*Virga aurea latifolia serrata. Bauh. pin. 268.*

*Habitat in Europæ pascuis siccis. 2*

*virgida.* 10. **SOLIDAGO** foliis caulinis ovatis scabris, ramis alternis fastigiatis, corymbis terminalibus. *Hort. cliff. 410. Roy. lugdb. 162.*

*Virga aurea novæ anglîæ, lato rigidoque folio. Herm. par. 243. t. 243.*

*Habitat in Pennsylvania. 2*

*novaeboracensis.* 11. **SOLIDAGO** foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caule nudiusculo ramoso fastigiato.

*Habitat in America septentrionali. 2*

*Folia radicalia S. virgaureæ, maxime scabra. Caulis pedalis, tribus quatuorve foliis minoribus, superne ramosus, fastigiatus. Flores solitarii ramos terminant, magni, lutei.*

*alpina.* 12. **SOLIDAGO** foliis cordatis petiolatis dentatis. *Roy. lugdb. 162.*

*Jacobæa alpina, foliis subrotundis serratis. Bauh. pin. 131. prodr. 70. t. 71.*

*Jacobæa alpina laciniata, flore buphthalmi. Bauh. pin. 131.*

*Jacobæa 3 latifolia 1. Clus. hist. 2. p. 23.*

*Senecio foliis petiolatis cordatis serratis subtus incanis, floribus luteis ex summo caule racemosis. Hall. belv. 730. n. 1*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Tyrol. 2*

*Doronicum.* 13. **SOLIDAGO** foliis lanceolatis subdentatis: caulinis amplexicaulibus, caule subunifloro.

*Doronicum foliis lanceolatis alternis dentatis: caulinis am.*

# SYNGENEſIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 881

- amplexicaulibus, caule ramoso. *Roy. lugdb.* 160. *Sauv. monsp.* 84.  
*Doronium longifolium hirsutie asperum.* *Bauh. pin.* 185.  
*Doronicum* II, *Austriacum* I. *Clus. hist.* 2. p. 17.  
 ̢. *Tussilago alpina*, folio oblongo. *Bauh. pin.* 197. *prodr.* 101.  
 7. *Virga aurea montana ferrata*, magno flore. *Bauh. pin.* 268.  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Italiæ, Monspe-  
 lii.*  
 14. *SOLIDAGO* foliis linearibus integerrimis, corym-  
 bo simplici. *Hort. cliff.* 410.  
*Linariæ aureæ affinis.* *Bauh. pin.* 213. *prodr.* 107.  
*Jacobæa*, lini folio, hispanica & Italica. *Bocc. mus.* 2.  
 p. 60. t. 49. *Barr. rar.* 97. t. 802.  
*Habitat in Hispania, Italia.*  
 15. *SOLIDAGO* foliis lanceolatis ferratis decurrentibus, *montana*  
 caule angulato. *Le Monier. Sauv. monsp.* 84.  
*Conyza montana*, foliis longioribus ferratis, flore sul-  
 phureo albicante. *Vaill. parif.* 1725.  
*Habitat Monspelii.*

## INULA.

1. *INULA* foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, ca-  
 lycum squamis ovatis. *Amæn. acad.* 1. p. 410. *Mat.  
 med.* 392.  
*Aster* foliis ovatis rugosis amplexicaulibus: subtus to-  
 mentosis, calycum squamis ovatis patulis. *Hort. cliff.*  
 407. *Fl. suec.* 695. *Roy. lugdb.* 166. *Dalib. parif.*  
 260. *Gmel. fib.* 2. p. 175.  
*Helenium vulgare.* *Bauh. pin.* 266.  
*Heienium.* *Cam. epit.* 35. *Fuchj. hist.* 242.  
*Habitat in Anglia, Belgio. 2*  
 2. *INULA* foliis dentatis hirsutis: radicalibus ovatis, cau-  
 linis lanceolatis amplexicaulibus, caule paucifloro.  
*Aster luteus*, radice odora. *Bauh. pin.* 266.  
*Asteris altera species apula.* *Col. escphr.* 1. p. 251. t.  
 253.  
*Conyza altera apula.* *Morif. hist.* 3. p. 113. f. 7. t. 21.  
 f. 6.  
*Habitat in Italia, Galloprovincia, Narbona. 2*  
 3. *INULA* foliis oblongis integris hirsutis, caule piloso  
 corymboso, floribus confertis. *Oculus Chris-  
 sti.*  
 K k k Aster

882 SYNGENESIA: POLYGAM, SUPERFLUA.

Aster caule superne ramoso ampliato, foliis lanceolatis amplexicaulibus integris, calycibus laxis terminalibus.  
*Hort. cliff.* 407.

*Conyza pannonica lanuginosa. Baub. pin.* 265. *Morif. hist.* 3. p. 113. f. 7. t. 19. f. 1.

*Conyza 3 austriaca. Clus. hist.* 2. p. 20.

*Habitat in austria. 2*

*Britannica.* 4. *INULA* foliis lanceolatis ferratis subamplexicaulibus: subtus villosis, caule ramoso erecto.

*α. Conyzis affinis. Baub. pin.* 265.

*Conyza palustris repens britannica dicta. Morif. hist.* 3. p. 113. f. 7. t. 19. f. 8.

*β. Conyza aquatica, asteris flore aureo. Baub. pin.* 266. *prodr.* 124. *Burf. XV.* 41.

*Habitat in Lusatia, Bavaria, Scania.*

*Habitus 7. dysenterica, sed Caulis altior, erectior. Folia angustiora, argutius serrata. β. differt Foliis angustioribus & subtus magis villosis; ceterum radii petala angustissima & subsiliformia.*

*dysenterica.* 5. *INULA* foliis oblongis, caule hirsuto paniculato, squamis calycinis setaceis. *Amæn. acad.* 1. p. 410. *Sauv. monsp.* 85.

Aster foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule paniculato hirsuto, floribus latis, squamis calycinis setaceis. *Fl. succ.* 694. *Gvett. stamp.* 2. p. 355. *Dalib. parif.* 260. *Gmel. sib.* 2. p. 180.

Aster pratensis autumnalis, conyzæ folio. *it. gotl.* 273. *Conyza media, asteris flore luteo, f. tertia dioscoridis.*

*Baub. pin.* 265.

*Conyza 1. Tabern. hist.* 1243.

*Calaminthæ tertium genus. Fuchf. hist.* 436.

*Habitat in Europæ fossis subhumidis. 2*

*Pulicaria.* 6. *INULA* foliis undulatis amplexicaulibus, caule prostrato.

*Erigeron foliis undulatis amplexicaulibus. Fl. succ.* 693.

*Conyza ramis secundum flores gradatim enascentibus, foliis lanceolatis obtusis. Hort. cliff.* 405,

*Conyza minor, flore globoso. Baub. pin.* 266.

*Conyza minima. Dod. pempt.* 52.

*Habitat ad vias & plateas Europæ temperatæ. ☉*

*salicina.*

7. *INULA* foliis lanceolatis recurvis ferrato-ciliatis, floribus solitariis, ramis angulatis. *Amæn. acad.* 1. p. 410. *Sauv. monsp.* 86. After

Aster foliis lanceolatis amplexicaulibus serrato-ciliatis glabris acuminatis recurvis, floribus solitariis, caule striato. *Fl. succ.* 696. *Dalib. paris.* 259 *Gmel. fib.* 2. p. 177. t. 67.

Aster montanus luteus, salicis glabro folio. *Bauh. pin.* 266.

Bubonium luteum 1. *Tabern. hist.* 716.

*Habitat in Europæ borealis pratis uliginosis, asperis. 2*  
*Differt ab Inulæ hirta, Caule glabro superne sulcato s. angulato; Foliis glabris, margine tantum scabris.*

8. INULA foliis lanceolatis semiamplexicaulibus hispi-hirta, dis, caulibus subunifloris teretibus.

Aster foliis lanceolatis sessilibus integerrimis, caulibus simplicibus unifloris, squamis calycinis subulatis. *Dalib. paris.* 259.

Aster luteus, hirsuto salicis folio. *Bauh. pin.* 266.

Aster tertius pannonicus clusii luteus, folio hirsuto salicis. *Bauh. hist.* 2. p. 1047.

*Habitat in Bavaria, Gallia, Geneva. 2*

*Habitus Inulæ salicinæ, sed Folia latiora, obtusiora, vix manifesto serrata, venosa, scabra præsertim margine & carina: Caule foliisque pilis rigidiusculis adpersis, ubique teretibus, nec sulcato-angulatis.*

9. INULA foliis lanceolatis recurvis subdentatis scabris, germanica, floribus subscaiculatis.

Aster foliis lanceolatis amplexicaulibus oris reflexis, ramis multifloris, calycibus oblongis laxis. *Gmel. fib.* 2. p. 181. t. 78. f. 1

*Conyzæ affinis germanica. Bauh. pin.* 266. *Morif. hist.* 3. f. 7. t. 19. f. 26.

Aster thuringiacus altissimus latifolius montanus, flore luteo parvo. *Halt. jen.* 181.

*Habitat in Misnia, Pannonia, Sibiria. 2*

*Habitus J. Salicinæ. Folia eadem; at Flores cylindrici, conferti ad apicem caulis in corymbum.*

10. INULA foliis linearibus acuminatis nervosis glabris ensifolia, sparsis, caule subunifloro.

Aster luteus, linariæ rigido glabro folio. *Bauh. pin.* 267.

*Habitat in Austria inferiore. 2*

11. INULA foliis linearibus carnosissimis tricuspidatis. *crithmoides.*

Aster flore terminali, foliis linearibus tricuspidatis. *Hort.*

*cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 168. *Guet. stamp.* 2. p. 464.

*Crithmum maritimum, colore alteris atij. Bauh.*

*pin.* 288.

K k k 2

Crith-

*Crithmum chrysanthemum. Dod. pempt. 706.*

*Habitat in Angliæ, Galliæ, Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis. 2*

*provincialis.* 12. *INULA* foliis subserratis subtus tomentosis: radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro.

*Jacobæa rotundifolia incana. Bauh. pin. 131. prodr. 66. Burf. VI: 127.*

*Habitat in Collendaneis Galloprovinciæ. 2*

*Radix fibris validis, Caulis pedalis, simplicissimus, erectus, villosus. Folia Radicalia ovata, petiolata, obtuse serrata, subtus villosa, obtusiuscula; Caulina parva, lanceolata, sessilia, minus serrata, subtus villosa, summa linearia. Flos sat magnus, flavus.*

*montana.* 13. *INULA* foliis lanceolatis pubescentibus integerrimis: caule unifloro.

*Aster foliis lanceolatis sessilibus villosis, caule subunifloro simplicissimo. Roy. lugdb. 168.*

*Aster montanus, luteo magno flore. Bauh. pin. 267.*

*Morif. hist. 3. p. 119. f. 7. t. 21. f. 12.*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valesiæ. 2*

### ARNICA.

*montana;* 1. *ARNICA* foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis.

*Doronicum foliis caulinis oppositis. Fl. succ. 684. Mart. med. 395. Gmel. sib. 2. p. 153.*

*Doronicum foliis oblongo-ovalibus Fl. lapp. 304. Roy. lugdb. 160.*

*Doronicum, plantaginis folio, alterum. Bauh. pin. 185.*

*Alisma. Marsh. diosc. 934.*

*Diuretica. Renealm. spec. 118.*

*alpina:* β. *Doronicum* foliis lanceolatis. *Fl. lapp. 305. Roy. lugdb. 160.*

*Caltha alpina. Tabern. ic. 336.*

*Habitat in Alpibus & pratis Europæ frigidioris. 2*

*scorpioides.* 2. *ARNICA* foliis alternis serratis. *Hall. belv. 737. †*

*Doronicum radice scorpii brachiata. Bauh. pin. 184.*

*Doronicum brachiata radice. Dalech. hist. 1203. Lob. ic. 649.*

β. *Doronicum* radice dulci. *Bauh. pin. 184.*

*Habitat in Helvetia. 2*

*maritima.* 3. *ARNICA* foliis lanceolatis: inferioribus serratis, caulifolioso multifloro. †

Ath



# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 885

*Aster* f. *potius Helenium maritimum fruticosum*, caule crasso, foliis fere *helenii officinalis*. *Gmel. sib.* 2.

p. 175.

*Habitat in Kamtschatka & America septentrionali.*

## 4. ARNICA foliis ovatis denticulatis.

crocea.

*Gerbera foliis planis dentatis, flore purpureo. Burm.*

*afr.* 157. t. 56. f. 2.

*Dens leonis, caulæ folio. Pet. mus.* 393. *Raj. suppl.* 238.

*Doronici forte species pumila, auriculæ urfi folio glabro, flore saturate croceo. Pluk. mant.* 65.

*Habitat in Æthiopia. 2*

## 5. ARNICA foliis pinnatifidis: lobis rotundatis.

*Gerbera.*

*Gerbera foliis ex radice oblongis excavatis sinuosis subtus lanugine ruffa villosis. Burm. afr.* 155. t. 56. f. 1.

*Aster africanus monanthos, scolopendriæ folio, flore luteo. Raj. suppl.* 161.

*Doronicum africanum, folio asplenii. Buxb. cent.* 5. t. 12. f. 24.

*Scolopendriæ f. Asplenii facie planta æthiopica, summis pinnis acuminatis sericea lanugine ex ruffo candicante villosa. Pluk. alm.* 336. t. 313. f. 5.

*Habitat in Æthiopia.*

## 6. ARNICA foliis pinnatis: laciniis linearibus.

coracopis  
lin.

*Habitat in Æthiopia.*

*Præcedenti minis affinis.*

## DORONICUM.

### 1. DORONICUM foliis cordatis obtusis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus.

*pardalianches.*

*Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramofo.*

*Hort. cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 159.

*Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus.*

*Bauh. pin.* 184.

*Doronicum VII, austriacum 3. Clus. hist.* 2. p. 19.

### β. Doronicum radice scorpii.

*Bauh. pin.* 184.

*Doronicum latifolium. Clus. hist.* 2. p. 16.

*Aconitum Pardalianches. Dod. purg.* 305.

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Pannoniæ, Valleisæ. 2*

### 2. DORONICUM foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis.

*plantagineum.*

*Hort. cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 160. *Dalib. parif.* 256.

K k k 3

Do-

*Doronicum plantaginis folio. Bauh. pin. 184.*

*Doronicum minus officinarum. Dalech. hist. 1202.*

β. *Doronicum, plantaginis folio, lusitanicum. Tournef. inst. 488.*

*Habitat in Lusitania, Hispania, Gallia. 2*

*incanum.*

3. *DORONICUM* foliis lanceolatis denticulatis subtus tomentosis, caule unifloro. *Roy. lugdb. 160. Sauv. meth. 84. †*

*Doronicum helveticum incanum. Bauh. pin. 185. prodr. 97. Schenck. alp. 33. & 333.*

*Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis. 2*

*An etjam semina radii in hoc & sequente papposa?*

*Bellidiastrum.*

4. *DORONICUM* caule nudo simplicissimo unifloro. *Hort. cliff. 500. Roy. lugdb. 160. †*

*Bellidiastrum alpinum, foliis brevioribus hirsutis, caule palmari, flore albo. Mich. gen. 32. t. 29.*

*Bellis sylvestris media, caule carens. Bauh. pin. 261.*

β. *Bellis caule pedali f. bipedali nudo, foliis magnis latis, floribus rubris & albis. Menz. pug. t. 8.*

*Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis, Tyrolensibus. 2*

## HELENIUM.

*autumnale.* 1. *HELENIUM.*

*Helenium foliis decurrentibus. Hort. cliff. 418. Hort. ups. 266. Gron. virg. 101. Roy. lugdb. 180.*

*Chrysanthemum americanum perenne, caule alato, folio angustato glabro. Moris. hist. 3. p. 24. f. 6. t. 6. f. 74.*

*Aster floridanus aureus, caule alato. Pluk. amaltb. 43. t. 372. f. 4.*

*Aster luteus alatus, Corn. canad. 52. t. 63.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

## BELLIS.

*perennis.*

1. *BELLIS* scapo nudo.

*Bellis scapo nudo unifloro. Hort. cliff. 418. Hort. ups. 265. Fl. suec. 707. Mat. med. 405. Roy. lugdb. 177. Dalib. parif. 264.*

*Bellis sylvestris minor. Bauh. pin. 267.*

*Bellis sylvestris. Dod. pempt. 265.*

*hortensis.*

β. *Bellis hortensis, flore pleno. Bauh. pin. 261.*

γ. *Bellis hortensis, flore albo bullato. Tournef. inst. 491.*

δ. *Bellis hortensis rubra, flore multiplici filuloso. Tournef. inst. 491.*

1. *Bel-*

## SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 887

1. *Bellis hortensis prolifera.*

*Habitat in Europæ apricis pascuis. 2*

2. *BELLIS* caule subfolioso.

*Bellis minima pratensis, caule folioso. Bott. mus. 2. p. 96. t. 35.*

*Bellis minima annua. Triumf. obs. 80. t. 80.*

*Bellis minima, caule folioso pubescens. Cup. cath.*

*Bellis-Leucanthemum annuum italicum. Mich.gen. 34.*

*Habitat in Sicilia, Hispania, Montpelii. ☉*

### TAGETES.

1. *TAGETES* caule subdiviso diffuso. *Hort. cliff. 418. patula.*

*Hort. upf. 267. Roy. lugdb. 180.*

*Tanacetum africanum f. Flos africanus minor. Bauh. pin. 132.*

*Flos africanus. Dod. pempt. 255.*

2. *Tagetes indicus minor, multiplicato flore. Tournef. inst. 488.*

*Tagetes minor, flore fulvo maculato. Dill. elth. 273. t. 279. f. 361.*

*Habitat in Mexico. ☉*

3. *TAGETES* caule simplici erecto, pedunculis nudis u-<sup>erecta,</sup> nifloris. *Hort. cliff. 418. Hort. upf. 267. Roy. lugdb. 180.*

*Tanacetum africanum majus, simplici flore. Bauh. pin. 133.*

*Cariophyllus indicus. Cam. epit. 406.*

4. *Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato. Bauh. hist. 3. p. 100.*

5. *Tagetes mexicanus, flore fistuloso, simplex. Col. ecphr. 2. p. 47. t. 46. f. 1.*

6. *Tagetes mexicanus alter polyanthos, fistuloso flore. Col. ecphr. 2. p. 48. t. 46.*

*Habitat in Mexico. ☉*

7. *TAGETES* caule simplici recto, pedunculis squamo-<sup>†</sup>minuta<sup>†</sup>sis multifloris. *Hort. cliff. 419.*

*Tagetes multiflora, minuto flore albicante. Dill. elth. 374. t. 280. f. 362.*

*Habitat in Chili. ☉*

### CHRYSANTHEMUM.

\* *Leucanthema.*

1. *CHRYSANTHEMUM* fruticosum, foliis linearibus frutescens. dentato-trifidis. *Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 174.*

K k k 4

Leu

*Leucanthemum canariense*, sapore pyrethri. *Walsh. hort.*

31. t. 24.

*Chamæmelum canariense* ceratophyllum fruticosius.

*Morif. hist.* 3. p. 35.

*Bellis canariensis* frutescens, foliis crassis pyrethri sapore. *Raj. suppl.* 221.

*Buphthalmum canariense* leucanthemum, cotulæ foetidæ crassioribus foliis. *Pluk. alm.* 73. t. 272. f. 6.

*Habitat in Canariis insulis.* b

*serotinum.* 2. **CHRYSANTHEMUM** foliis lanceolatis superne ferratis utrinque acuminatis. *Hort. cliff.* 416. *Roy. lugdb.* 174. it. *scav. append.*

*After*, foliis profunde dentatis & quasi laciniatis, ramosus. *Raj. suppl.* 162.

*Bellis major*, radice repente, foliis latioribus ferratis. *Morif. hist.* 3. p. 29. f. 6. t. 9. f. 11. *bles.* 239. *Raj. hist.* 351.

*Bellis americana* frutescens ramosa. *Raj. hist.* 1865.

*Bellis americana* procerior serotina ramosa, flore amplissimo. *Pluk. alm.* 65. t. 17. f. 2.

*Habitat forte in America septentrionali? cum sero flore- at.* 2

*Leucanthemum.* 3. **CHRYSANTHEMUM** foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis, inferne dentatis. *Hort. cliff.* 416. *Fl. suec.* 700. *Mat. med.* 404. *Roy. lugdb.* 174. *Dalib. parif.* 261.

*Chrysanthemum* foliis oblongis ferratis. *Fl. lapp.* 310.

*Bellis sylvestris*, caule folioso, major. *Baub. pin.* 261.

*Bellis major.* *Fuchf. hist.* 148. *Cam. epit.* 635.

*Habitat in pratis Europæ.* 2

*montanum.* 4. **CHRYSANTHEMUM** foliis imis spathulato-lanceolatis ferratis, summis linearibus. *Sauv. monsp.* 87. †

*Leucanthemum montanum* minus. *Tournef. inst.* 492.

*Bellis montana* minor. *Baub. hist.* 3. p. 115. *Magn. monsp.* 36.

*Habitat Monspeli.*

*gramineifolium.* 5. **CHRYSANTHEMUM** foliis linearibus subintegerimis. *Sauv. monsp.* 87.

*Leucanthemum gramineo folio.* *Tournef. inst.* 493.

*Bellis montana*, gramineis foliis. *Magn. monsp.* 291. \*

*Hort.* 31. t. 31.

*Habitat Monspeli.* 2

6. CHRYSANTHEMUM foliis imis palmatis: fo- *monspeliense*  
liolis linearibus pinnatifidis. *Sauv. monsp.* 304.  
Bellis montana major, foliis chrysanthemi cretici angu-  
stioribus. *Magn. monsp.* 306. \*  
Leucanthemum montanum, foliis chrysanthemi. *Tour-  
nesf. inst.* 492.  
*Habitat* Monspelii. 2
7. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatifidis: laciniis *alpinum*.  
parallelis integris, caulibus unifloris.  
Chrysanthemum foliis linearibus pinnatifidis, *Sauv.*  
*monsp.* 304?  
Chamæmelum alpinum. *Baub. pin.* 136.  
Leucanthemum alpinum, foliis coronopi. *Tournesf. inst.*  
493?  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ ad Thermas Piperinas.*  
\* *Chrysanthema.*
8. CHRYSANTHEMUM foliis simplicibus ovatis si- *indicum*.  
nuatis angulatis serratis acutis.  
Matricaria sinensis, minore flore, petalis & umbone o-  
chroleucis. *Pluk. alm.* 142. t. 43a. f. 2.  
β. Chrysanthemum maderaspatanum, oxyacanthæ foliis  
cæsiis ad marginem spinosis, calyce argenteo. *Pluk.*  
*alm.* 101. t. 160. f. 6.  
Matricaria indica, latiore folio, flore pleno. *Morif. hist.*  
3. p. 33.  
Matricaria sinensis, flore monstroso. *Vailh. act.* 1720.  
p. 368. *Fl. zeyl.* 421. \*  
Matricaria zeylanica hortensis, flore pleno. *Raj. suppl.*  
224.  
*Habitat in India.*
9. CHRYSANTHEMUM foliis simplicibus cuneiformi- *arcticum*.  
bus subpalmatis multifidis obtusis.  
Pyrethrum foliis longe petiolatis palmatis supra dilata-  
tis: ultimis laciniis trilobis. *Gmel. sib.* 2. p. 203. t. 84.  
*Habitat in Kamtschatka, America septentrionali.*  
Caulēs debiles, diffusi, herbacei, inferne ramosi. Folia  
petiolis longis, subcarnosa, lævia, cuneiformia, triloba-  
ta, sinuato-angulata, obtusa. Flores terminales, soli-  
tarii, magnitudine C. coronarii, Pedunculo subvillo-  
so.
10. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: su- *segetum*.  
perne laciniatis; inferne dentato-serratis. *Hort. cliff.*  
416. *Fl. suec.* 699. *Roy. lugdh.* 174. *Dalib. paris.* 261.  
K k k 5 Chry.

- Chrysanthemum fegetum. Clus. hist. 1. p. 334.*  
*Chrysanthemum fegetum vulgare glaucum. Moris. hist. 3. p. 15. f. 6. t. 4. f. 1.*  
*Bellis lutea, foliis profunde incisfis, major. Bauh. pin. 262.*  
*Habitat in Scaniae, Germaniae, Belgii, Angliae, Galliae agris. ☉*
- coronatum.* 11. **CHRYSANTHEMUM** foliis pinnatifidis incisfis extorsum latioribus. *Hort. cliff. 416. Hort. upf. 263. Roy. lugdb. 174.*  
*Chrysanthemum foliis matricariae. Bauh. pin. 134.*  
*Chrysanthemum creticum. Clus. hist. 1. p. 334. Moris. hist. 3. p. 16. f. 6. t. 4. f. 2. 3.*  
*Habitat in Creta, Sicilia. ☉*
- corymbosum.* 12. **CHRYSANTHEMUM** foliis pinnatis inciso-ferratis, caule multifloro. *Roy. lugdb. 174. Sauv. monsp. 267.*  
*Tanacetum montanum inodorum, minore flore. Bauh. pin. 132.*  
*Tanacetum leucanthemum. Tabern. hist. 379.*  
 β. *Tanacetum inodorum, flore majore. Bauh. pin. 132.*  
*Habitat in Thuringia, Bohemia, Helvetia, Sibiria. ☿*
- bipinnatum.* 13. **CHRYSANTHEMUM** foliis bipinnatis ferratis villosis.  
*Pyrethrum foliis duplicato-pinnatis: pinnulis incisfis, pedunculis unifloris. Gmel. sib. 2. p. 205. t. 85. f. 1.*  
*Habitat in Sibiria. ☿*  
*Habitus Anthenudis apricae. Folia bipinnata, pinnulis sublanceolatis, hirsutis, fere Tanaceti. Pedunculli axillares, nudi, uniflori, pubescentes, longitudine foliorum. Flores lutei: radio disco longe brevior.*
- flosculosum.* 14. **CHRYSANTHEMUM** flosculis omnibus uniformibus hermaphroditis. *Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 174.*  
*Bellis major spinosa, petalis carens s. nuda. Moris. hist. 3. p. 29. f. 6. t. 9. f. 16.*  
*Bellis spinosa, foliis agerati. Bauh. pin. 262.*  
*Bellis spinosa. Alp. exot. 327. t. 326.*  
*Habitat in Africa.*

## MATRICARIA.

- Portulacum.* I. **MATRICARIA** foliis compositis planis: foliolis ovatis incisfis, pedunculis ramosis. *Hort. cliff. 416. Hort. upf. 263. Mat. med. 400. Roy. lugdb. 173.*  
 Matri-

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 891

- Matricaria vulgaris* f. *fativa*. *Bauh. pin.* 133.  
*Matricaria*. *Dod. pempt.* 35.  
*Habitat in Europæ cultis, ruderatis.* 2. 8.
2. **MATRICARIA** receptaculis hemisphæricis, foliis bi-<sup>maritima,</sup> pinnatis subcarinosis: supra convexis, subtus carinatis.  
*Chamæmelum maritimum* perenne humilius, foliis brevioribus crassius obscure virentibus. *Raj. angl.* 3. p. 186.  
*t. 7. f. 1. It. wgoth.* 148. \*  
*Habitat in Europæ septentrionalis littoribus maris.*
3. **MATRICARIA** receptaculis hemisphæricis, radiis *Chamomilla,* patentibus, seminibus coronato marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Fl. succ.* 702. *Mat. med.* 402. *Dalib. parif.* 262. *Gmel. fib.* 2. p. 200.  
*Matricaria* foliis supradecompositis setaceis, pedunculis solitariis. *Hort. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 173.  
*Chamæmelum vulgare* f. *Leucanthemum*, *dioscoridis.*  
*Bauh. pin.* 135.  
*Anthemis vulgaris.* *Lob. ic.* 770. *Fl. lapp.* 309.  
*Habitat in Europæ agris, cultis.* ☉
4. **MATRICARIA** foliis bipinnatis, pedunculis solitariis. *argentea,*  
*Hort. cliff.* 415. \* *Roy. lugdb.* 173.  
*Matricaria monoleucanthemos*, foliis argenteis plerumque conjugatis. *Vaill. act* 1720. p. 369.  
*Chamæmelum orientale incanum*, millefolii folio. *Tournef. cor.* 37.  
*Habitat in Oriente.*
5. **MATRICARIA** receptaculis conicis, radiis deflexis, *recutita,*  
 seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. succ.* 701. (non synonyma) *Gmel. fib.* 2. p. 200.  
*Matricaria leucanthemos* annua suaveolens, chamæmeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. parif.* 1720.  
*Chamæmelum tenue incisum*, foliis floris deorsum pro-  
 tentis: umbone extuberante, suavius olens. *Cup. cathol. suppl.* 17.  
*Habitat in Europa.* ☉

## COTULA.

1. **COTULA** foliis pinnato-multifidis, corollis radio *anthemoides,*  
 destitutis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 173.  
*Ananthocyclus chamæmeli* folio V. *Dill. elth.* 26. t. 23. f. 25

Chry-

## 892 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

*Chrysanthemum exoticum perpussillum nudum, foliis coronopi. Pluk. alm. 101. t. 274. f. ult.*

*Habitat in Insula Helenæ, Hispania.*

*Conf. Chamæmelum luteum, capite aphylo. Baub. pin. 135. Annon huic propius, quam Anthemidi nobili?*

*coronopifolia* 2. *COTULA* foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus pinnatifidis. *Hort. cliff. 417. Hort. upf. 266. Roy. lugdb. 173. Moehr. E. N. C. 1742. vol. 6. p. 298.*

*Ananthocyclus coronopi folio V. Dill. elth. 27. t. 23. f. 26.*

*Chrysanthemum exoticum minus, capite aphylo, chamæmeli nudi facie. Breyn. cent. 156. t. 76.*

*Bellis annua, capite aphylo luteo, coronopi folio, caulibus procumbentibus. Herm. lugdb. 86. Moris. hist. 3. p. 30. f. 6. t. 6. f. ult.*

*Habitat in Æthiopia, nunc in Frisiæ inundatis prope Emdon. Mæhringio teste. ☉*

*viscosa.* 3. *COTULA* foliis lyrato-pinnatis, corollis radiatis. *Hort. cliff. 417. ♥*

*Jacobæa americana odorata viscosa, florum radiis brevissimis albis. Homst. nass.*

*Habitat in Vera Cruse.*

*turbinata.* 4. *COTULA* receptaculis subtus inflatis turbinatis. *Hort. cliff. 417. Hort. upf. 266. Roy. lugdb. 173.*

*Chamæmelum æthiopicum lanuginosum. Breyn. cent. 148. t. 73. Moris. hist. 3. p. 36. f. 6. t. 12. f. 14.*

*Habitat in Æthiopia. ☉*

## ANACYCLUS.

*creticus.* 1. *ANACYCLUS* foliis decompositis linearibus: laciniis divisis planis. *Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 171.*

*Cotula cretica minima, chamæmeli folio, capite inflexo. Tournef. cor. 37.*

*Habitat in Creta.*

*orientalis.* 2. *ANACYCLUS* foliis compositis setaceis acutis rectis. *Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 171.*

*Chamæmelum orientale, foliis pinnatis. Tournef. cor. 37. Boerb. lugdb. 1. p. 110. t. 110.*

*Habitat in Oriente. ♀*

*valentinus.* 3. *ANACYCLUS* foliis decompositis linearibus: laciniis divisis teretiusculis acutis, floribus flosculosis. *Hort. cliff. 417. Roy. lugdb. 171.*

*Chrysanthemum valentinum. Clus. hist. 1. p. 332.*

*Buph-*



*Bupthalamo tenuifolio simile. Baub. hist. 3. p. 125.*  
*Habitat ad Reg. Valentini agros & vias.*  
*Confer Anthemidem valentinam.*

# ANTHEMIS.

\* *Radio dicolori f. albo.*

1. ANTHEMIS florum paleis rigidis pungentibus. *Roy. Cosa, lugdb. 172.*

*Anthemis italica arvensis annua major vulgatissima, flore maximo disco pungente. Mich. gen. 32.*

*Chamæmelum annuum ramosum, cotulæ foetidæ floribus amplioribus, capitulis spinosis. Moris. hist. 3. p. 36. f. 6. t. 8. f. 11. pro. 12.*

*Habitat in Italiæ arvis.*

2. ANTHEMIS erecta, foliorum apicibus subspinosis. *altissima.*

*Anthemis foliorum serraturis setaceis, radiis florum albis. Sauv. monsp. 265.*

*Chamæmelo affine Bupthalamum italicum segetum altissimum. Baub. hist. 3. p. 120.*

*Chamæmelum Leucanthemum hispanicum, magno flore. Baub. pin. 135. prodr. 70.*

*Habitat in Italiæ, Hispaniæ, G. Narbonensis agris. D. Sauvages. ☉*

*Caulis multiflorus, segete fere altior, striatus, erectus.*

*Pedunculi superne parum incrassati. Calyces glabri.*

*Paleæ latæ, subtruncatæ, terminatæ seta radiuscula longitudine calycis. Folia multifido-composita dentibus acuminatis: acuminibus pallidis, quasi spinosis.*

3. ANTHEMIS foliis pinnatis denticulatis carnosis, caule ramoso. *maritima.*

*Anthemis maritima perennis, foliis crassis & punctatis.*

*Mich. gen. 33.*

*Matricaria maritima. Baub. pin. 134.*

*Chamæmelum maritimum. Baub. hist. 3. p. 122.*

*Habitat Monspelii, inque Italia.*

4. ANTHEMIS foliis pinnatifidis obtusis planis, pedunculis hirsutis foliosis, calycibus tomentosis. *her. cliff. 415. \* Roy. lugdb. 172.*

*Chamæmelum, coronopi folio, tomentosum. Vaill. act. 1720. p. 412.*

*Chamæmelum maritimum incanum, folio absinthii crasso. Boerb. lugdb. 1. p. 110.*

*Habitat in Græciæ maritimis.*

5. AN.

*mixta.*

5. *ANTHEMIS* foliis simplicibus dentato-laciniatis.  
*Anthemis* foliis singularibus pinnato-dentatis. *Gnest. stamp.* 346.  
*Anthemis* maritima lanuginosa annua, foliis crassis pyrethri sapore, semisflosculis albis juxta discum luteis. *Mich. gen.* 32. t. 30. f. 1.  
*Chemæmelum* annuum ramosum, coronopi folio, flore mixto. *Morif. hist.* 3. p. 36. f. 6. t. 18. f. 15.  
*Chemæmelum* lusitanicum latifolium, f. coronopi folio. *Breyn. cent.* 149. t. 74.  
*Habitat in Italia, Gallia.* ☉  
*Folia non composita, sed laciniata, Radius florum albus, basi luteus.*

*chia.*

6. *ANTHEMIS* foliis pinnatifidis laciniatis, pedunculis nudis subvillosis. *Hort. cliff.* 415. \* *Roy. lugdb.* 172.  
*Habitat in Chio.*

*nobilis.*

7. *ANTHEMIS* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis.  
*Anthemis* foliis pinnato-decompositis: laciniis setaceis. *Hort. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 172.  
*Matricaria* receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. suec.* 701. *Mat. med.* 401. *Dalib. parif.* 262.  
*Chemæmelum* nobile f. *Leucanthemum* odoratus. *Bauh. pin.* 135.  
*Chemæmelum* odoratum. *Dod. pempt.* 270.  
 β. *Chemæmelum* nobile, flore multiplici. *Bauh. pin.* 135.  
*Chemæmelum* romanum, flore multiplici. *Cam. epit.* 646.  
*Chemæmelum* chium vernum, folio crassiflore, flore magno. *Tournef. cor.* 37. *Roy. lugdb.* 172.  
*Habitat in Europæ pascuis apricis.* 2

*arvensis.*

8. *ANTHEMIS* receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Fl. suec.* 704. \* *Dalib. parif.* 263.  
*Anthemis* arvensis. *It. scan.* 177.  
*Chemæmelum* inodorum. *Bauh. pin.* 186? *Raj. angl.* 3. p. 185? *Rupp. jen.* 173.  
*Habitat in Europæ, præsertim Sueciæ agris.* 3  
*Planta canescens. Caulis diffusus. Paleæ lanceolatæ.*

*Ostula.*

9. *ANTHEMIS* receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus nudis. *Fl. suec.* 703. *Mat. med.* 403. *Dalib. parif.* 263.  
*Anthemis* foliis pinnato-decompositis: laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua. *Roy. lugdb.* 172.

Cha-

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 895

*Chamæmelum foetidum. Baub. pin. 135.*

*Chamæmelum foetidum f. Cotula foetida. Baub. hist. 3.*

*p. 36.*

*Habitat in Europæ ruderatis, præcipue in Ucraina. ☉*

*Paleæ in hac minutissima sunt.*

10. *ANTHEMIS* foliis pinnato-multifidis planis: laci- *cretica;*  
niis linearibus acutis trifidis, pedunculis longissimis.

*Hort. cliff. 415. \* Roy. lugdb. 172.*

*Chamæmelum orientale, foliis absinthii. Tournef. cor. 37.*

*Habitat in Creta?*

11. *ANTHEMIS* foliis simplicibus ovato-lanceolatis re- *repanda.*  
pando-crenatis.

*Chrysanthemum lusitanicum, agerati folio. Tournef.*  
*inst. 492.*

*Habitat in Hispania.*

*Caules simpliciusculi, erecti. Folia ovato-oblonga, repan-*  
*do-crenata, petiolata, alterna, obtusa; vix villosa.*

*Flores terminales, subsolitarii, globosi; Calyx minus*  
*imbricatus. Radius angustus; discus convexus flavus.*

*Semina tetragona, coronata squamis quatuor, quarum*  
*duæ in setas desinunt.*

12. *ANTHEMIS* caulibus simplicibus unifloris decum- *Pyrethrum.*  
bentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff. 414.*

*Hort. ups. 263. Mat. med 396. Roy. lugdb. 170.*

*Sauv. monsp. 265.*

*Bupthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo & al-*  
*bo. Breyn. cent. 150. t. 75.*

*Chamæmelum specioso flore, radice longa fervida.*  
*Schaw. afr. 138.*

*Pyrethrum flore bellidis. Baub. pin. 148.*

*Habitat in Arabia, Syria, Creta, Apulia, Thuringia. &*

*\* Radio concolore f. luteo.*

13. *Anthemis* caule ramoso, foliis pinnato-multifidis seta- *valentina.*  
ceis, calycibus villosis pedunculatis. *Hort. cliff. 414.*

*Bupthalmum cotulæ folio. Baub. pin. 134.*

*Bupthalmum tenuifolium, folio fere millefolii. Baub.*  
*hist. 3. p. 124.*

*Bupthalmum alterum penæ. Dalech. hist. 863.*

*Habitat in G. Narbonenti.*

*Affinis admodum Anacyclo valentino.*

14. *ANTHEMIS* foliis triternatis, pedunculis terminali- *americana.*  
bus ramo longioribus. *Hort. cliff. 414.*

*Chry-*

# 896 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

*Chrysanthemum palustre* minimum repens, apii folio.  
*Sloan. jam.* 126. *hist.* 1. p. 263. t. 155. f. 3. *Raj.*  
*suppl.* 215.

*Chrysanthemum humile*, ranunculi folio. *Plum. spec.* 10.  
*Habitat in Jamaica, Caribæarum pratis humidiusculis.* ☉

*Millefolia.* 15. *ANTHEMIS* foliis bipinnatis: laciniis linearibus integris, pedunculis nudis longissimis. *Roy. lugdb.* 171.  
*Chamæmelum montanum*, absinthii folio, parthenii odore. *Vaill. act.* 1720. p. 319.

*Leucanthemum*, folio absinthii, alpinum ciansi. *Boerb. lugdb.* 1. p. 107.

*Pyrethrum* foliis duplicato-pinnatis: pinnulis incis, pedunculis unifloris, caule procumbente. *Gmel. fib.* 2. p. 207. t. 86. f. 1. 2.

*Habitat in Sibiria.*

*Habitus Millefolii.* Folia *Millefolii*, sed paulo majora. Pedunculi in summis ramis, alterni, longissimi. Flores *Anthemidis apricæ*, sed parvi lutei.

*cinctoria.* 16. *ANTHEMIS* foliis bipinnatis ferratis subtus tomentosis, caule corymboso.

*Bupthalmum* caule ramoso, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus dentatis ferratis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 414. *Fl. suec.* 698. *Roy. lugdb.* 171.

*Bupthalmum tanacetii* minoris foliis. *Baub. pin.* 134.

*Chrysanthemum* foliis tanacetii. *Loef. pruss.* 47. t. 9.

*triumfetti.* β. *Bupthalmum alpinum*, flore candido. *Triamf. obs.* 79. t. 80.

*Habitat in Sueciæ, Germaniæ apricis pratis siccis.* &

Planta β. differt radio perfecte explicato albo, basi tamen luteo; reliqua conveniunt ut vix species diversa ernatur. Calycis squamæ interiores utrinque apice ciliatæ.

*arabica.* 17. *ANTHEMIS* caule decomposito, calycibus ramiferis. *Hort. cliff.* 413. t. 24. \* *Hort. ups.* 264. *Roy. lugdb.* 170.

*Asteriscus annuus trianthophorus* Craffas arabibus dictus. *Shav. afr.* 58. t. 36. f. 58.

*Habitat in Arabia.* ☉

## ACHILLEA.

\* *Corollis flavis.*

*santolina.* 1. *ACHILLEA* foliis setaceis dentatis: denticulis subintegris subulatis reflexis. *Hort. cliff.* 412.

Achil-

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 897

*Achillea lutea tomentosa*, fantolinæ folio. *Vaill. act.* 1720. p. 417.

*Ptarinica orientalis*, fantolinæ folio, flore majore. *Tournef. cor.* 37.

*Habitat in Oriente.* 2

2. *ACHILLEA* foliis lanceolatis obtusis acute serratis. *Ageratum.* *Hort. cliff.* 413. *Hort. upf.* 265. *Mat. med.* 399.

*Roy. lugdb.* 176. *Sauv. monsp.* 88.

*Ageratum* foliis serratis. *Bauh. pin.* 221.

*Balsamita minor.* *Dod. pent.* 295. *Morif. hist.* 3. p. 38. f. 6. t. 1. f. 2.

*Habitat in G. Narbonensi, Hetruria.* 2

3. *ACHILLEA* foliis linearibus dentatis obtusis *plafalcatis*,  
nis: denticulis crenatis. *Hort. cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 176.

*Achillea incana*, fantolinæ foliis plerumque falcatis a-  
speris, flore sulphureo. *Vaill. act.* 1720. p. 417.

*Habitat in Oriente.* 2

4. *ACHILLEA* foliis pinnatis hirsutis: pinnis linearibus *tomentosa*.  
dentatis.

*Achillea* foliis linearibus pinnatifidis pubescentibus,  
foliolis tripartitis transversalibus: media productiore.  
*Hort. cliff.* 413. *Hort. upf.* 265. *Roy. lugdb.* 175.

*Millefolium tomentosum luteum.* *Bauh. pin.* 140.

*Stratiotes millefolia*, flavo flore. *Clus. hist.* 1. p. 330.

*Habitat in G. Narbonensi, Valesia, Tataria.* 2

5. *ACHILLEA* foliis pinnatis: foliolis lanceolatis incis *pubescens*.  
serratis subtus lanigeris. *Hort. cliff.* 413. *Roy. lugdb.* 175.

*Millefolium orientale*, foliis tanaceti incanis, radiis palli-  
de luteis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 112.

*Ptarinica orientalis*, foliis tanaceti incanis, semifloscu-  
lis florum pallide luteis. *Tournef. cor.* 37.

*Matricaria tomentosa* & *incana*, achilleæ folio, flore  
aureo. *Vaill. act.* 1722. p. 286.

*Habitat in Oriente.* 2

6. *ACHILLEA* foliis pinnatis supradecompositis: laciniis *abrotanifolia*  
linearibus distantibus. *Roy. lugdb.* 175.

*Millefolium orientale altissimum* luteum, abrotani fo-  
lio. *Tournef. cor.* 37.

*Habitat in Oriente.*

\* *Corollis radio albis.**macrophylla.* 7. *ACHILLEA* foliis pinnatis planis inciso-ferratis: extremis majoribus.*Achillea* foliis bipinnatis: pinnulis linearibus indivisis. *Sauv. meth.* 267.*Achillea* foliis pinnatis, pinnis ferratis maximis: extremis confluentibus. *Hall. belv.* 713.*Dracunculus* alpinus, foliis scabiofæ. *Baub. pin.* 98. *prodr.* 39.*Ptarmica* alpina, matricariæ foliis. *Triumf. obs.* 83. *t.* 23. *Bocc. mus.* 2. p. 150. *t.* 110. *Barr. rar.* 1119. *t.* 991.*Corymbifera* millefolii umbella, folio alato & laciniato. *Raj. hist.* 345.*Habitat in Alpibus* Helvetiæ, Italiæ.*Folia magnitudine Tanacetii.**impatiens.* 8. *ACHILLEA* foliis pinnatis: pinnis distantibus linearilanceolatis: basi sursum acutis. *Roy. lugdb.* 176.*Achillea* foliis pinnatis, pinnis longis acutis: inferioribus sursum dente acutis glaberrimis. *Gmel. sib.* 2. p. 197. *t.* 83. f. 1.*Habitat in* Sibiria.*Planta albis gaudet floribus.* Foliorum pinnae remotæ et admodum distantes, distinguunt plantam a reliquis.*Claveana.* 9. *ACHILLEA* foliis pinnatifidis planis obtusis tomentosis.*Achillea* foliis sinuato-laciniatis planis villosis nitidis obtusis. *Hort. cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 176.*Abinthium* alpinum umbelliferum latifolium. *Baub. pin.* 139.*Abinthium* alpinum umbelliferum. *Clus. hist.* 1. p. 340.*Dracunculus* argenteus, *Morif. hist.* 3. p. 40. f. 6. t. 10. f. 5.*Habitat in Alpibus* Austriæ, Pannoniæ, Corinthiæ. &*Ptarmica.* 10. *ACHILLEA* foliis lanceolatis acuminatis argute serratis.*Achillea* foliis integris minutissime serratis. *V. Hort. cliff.* 412. *Hort. ups.* 265. *Fl. suec.* 706. *Mat. med.* 398. *Roy. lugdb.* 176. *Hall. belv.* 713. *Dalib. parisi.* 264. *Gmel. sib.* 2. p. 196.*Dracunculus* pratensis, serrato folio. *Baub. pin.* 98.*Ptarmica* vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 12.β. *Ptarmica* vulgaris, flore pleno. *Clus. hist.* 2. p. 12.*Habitat in Europa temperata.* &

11. A.

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 899

11. ACHILLEA foliis lanceolatis dentato-ferratis: denti-*alpina*.  
culis tenuissime ferratis. *Hort. cliff.* 413 *Roy. lugdb.* 176.  
Ptarmica alpina, foliis profunde incis. *Tournef. inst.* 497.  
Ptarmica alpina, incanis ferratis foliis. *Herm. lugdb.* 694.  
*Habitat in Alpibus Sibiriae.* 2  
*an locus potuerat ex precedenti formasse hanc?*
12. ACHILLEA foliis pinnulis pectinatis integriusculis, *atrata*.  
pedunculis villosis.  
Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis subhirsutis  
raro dentatis. *Hall. helv.* 714.  
Matricaria alpina, chamæmeli foliis. *Bauh. pin.* 134.  
Parthenium alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 336.  
*Habitat in Alpibus Helvetiae, Valleisae, Austriae.* 2  
*Margines calycis atræ & sphacelatae sunt.*
13. ACHILLEA foliis pinnatis dentatis hirsutis, floribus *nana*,  
glomeratis.  
Achillea foliis pinnatis lanugine obductis, floribus albis  
umbellatis. *Hall. helv.* 713.  
Millefolium alpinum incanum, flore specioso. *Bauh.*  
*hist.* 3. p. 138. *Morif. hist.* 3. p. 39. *f.* 6. *t.* 11. *f.*  
11. *Raj. hist.* 347.  
Millefolium alpinum tomentosum odoratum nanum.  
*Bocc. mus.* 2. p. 166. *t.* 120.  
*Habitat in Alpibus Helvetiae, Valleisae.*  
*Planta parva. Calyces spadicei.*
14. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus *Millefolium*.  
dentatis. *Hort. cliff.* 413. *Fl. succ.* 705. *Mat. med.*  
397. *Roy. lugdb.* 175. *Gron. virg.* 101. *Dalib. paris.* 263.  
Achillea foliis pinnato-pinnatis. *Fl. lapp.* 311.  
Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140.  
β. Millefolium purpureum. *Tabern. hist.* 130. 2774  
*Habitat in Europae pascuis pratisque.* 2
15. ACHILLEA foliis bipinnatis: pinnis distantibus u-*nobilis*.  
trinque subseptenis obtusiusculis.  
Millefolium nobile. *Trag. hist.* 476.  
Tanacetum minus album, odore camphoræ. *Bauh. pin.*  
132.  
*Habitat in Helvetia, Misnia, Bohemia, G. Narbo-*  
*nenfi, Tataria.* 2  
*Folia ferme Anthemidis tinctoria.*
16. ACHILLEA foliis linearibus: pinnis subrotundis re-*retro-*  
trorsum imbricatis, caule tomentoso.

*Millefolium incanum creticum. Bauh. pin. 140. prodr. 72.*

*Millefolium creticum. Bauh. hist. 3. p. 139.*

*Habitat in Creta. 2.*

*Habitus A. Millefolii. Caulis tomentosus. Folia linearia, subtomentosa, retrorsum imbricata: pinnis reniformibus, supra quadrifariam imbricatis. Flores albi.*

\* \*

- egyptiac.* 17. *ACHILLEA* foliis pinnatis: foliolis obtuse lanceolatis ferrato-dentatis. *Hort. cliff. 413. Roy. lugdb. 175.*  
*Ptarinica incana, pinnulis cristatis. Tournef. cor. 37. itin. 1. p. 228. t. 87.*

*Ablinthium fantonicum ægyptiacum. Bauh. pin. 139.*

*Ablinthium ægyptiacum. Dod. pempt. 25.*

*Habitat in Ægypto & Oriente.*

- bipinnata.* 18. *ACHILLEA* foliis bipinnatis tomentosis: foliolis ovatis integris. *Hort. cliff. 413. \* Roy. lugdb. 176.*  
*Ptarinica orientalis, santolinæ folio, flore minore. Tournef. cor. 37?*

*Habitat in Oriente. 2.*

- inodora.* 19. *ACHILLEA* foliis dentato-laciniatis integerrimis: apice trifidis. *Roy. lugdb. 176.*  
*Ageratum, laciniatis foliis, inodorum africanum. Herm. flor. 55. Boerb. lugdb. 1. p. 125.*  
*Habitat in Africa.*

## TRIDAX.

- procumbens.* 1. *TRIDAX. Hort. cliff. 418. \**  
*Aster americanus procumbens, foliis laciniatis & hirsutis. Houst. mss.*  
*Habitat in Vera Cruce.*

## SIGESBECKIA.

- orientalis.* 1. *SIGESBECKIA* petiolis sessilibus, calycibus involu-  
 cratis.  
*Sigesbeckia. Hort. cliff. 412. t. 23. \* Hort. ups. 267. \**  
*Bidenti similis foliis latissimis ferratis. Buxb. cent. 3. p. 29. t. 52.*  
*Cichorio affinis Lapsana sinica, menthastri foliis, calyce fimbriato hispido. Pluk. amaltb. 58. t. 380. f. 2.*  
*Habitat in China, Media ad pagos. ☉*
- occidentalis.* 2. *SIGESBECKIA* petiolis decurrentibus, calycibus nudis.

Ver-



Verbesina foliis ovatis petiolatis decurrentibus oppositis,  
flosculis radiorum solitariis. *Gron. virg.* 179. \*  
*Habitat in Virginia.*

## VERBESINA.

1. VERBESINA foliis alternis decurrentibus undulatis *alata*,  
obtusis. *Hort. cliff.* 411. *Hort. upf.* 262.  
Cannabina indica, foliis integris, alato caule. *Magn.*  
*hort.* 40. t. 40.  
Chrysanthemum curassavicum, alato caule, floribus au-  
rantiis. *Herm. par.* 125. t. 125.  
Chrysanthemum americanum, caule alato, flore aphyll-  
lo globofo aurantio, foliis baccharidis. *Comm. hort.*  
1. p. 5. t. 13.  
Chrysanthemum americanum bidens alatum, flore par-  
vo aurantiaco. *Pluk. alm.* 100. t. 84. f. 3.  
Chrysanthemum conyzoides curassavicum, abrotani fœ-  
minæ flore aurantio. *Volk. norib.* 106. t. 106.  
*Habitat in Curassao, Surinamo. &c.*  
*A reliquis maxime differt habitu & structura.*
2. VERBESINA foliis alternis petiolatis ovato-lanceola-  
tis serratis. *chinensis.*  
*Habitat in China. Osbeck.*  
Caulis simplex, teres, subtomentosus. Rami simplices,  
ex alis superioribus foliorum. Folia ovato-lanceolata,  
subtomentosa, obtusiuscula, petiolata, serrato dentata,  
alterna. Flores terminales, solitarii, pedunculati. Ca-  
lyx hemisphæricus, imbricatus, tomentosus. Corolla  
lutea. Flosculi Radii lanceolati, integri, multi; Disci  
vero copiosi, paleis interstincti. Semina coronata mar-  
gine & setis 2 levibus.
3. VERBESINA floribus corymbosis, foliis lanceolatis *virginica*,  
petiolatis. *Gron. virg.* 102. \*  
*Habitat in Virginia.*
4. VERBESINA foliis oppositis lanceolatis subserratis, *Pencil-As-*  
pedunculis flore longioribus. *Fl. zeyl.* 308. \* *mella.*  
Bidens zeylanica, flore luteo, melissæ folio, Acimella di-  
cta. *Seb. thes.* 1. p. 19. t. 10. 11.  
Chrysanthemum maderaspatanum latifolium, scabiosæ  
capitulis parvis. *Pluk. alm.* 99. t. 154. f. 4.  
*Habitat in Zeylona.*
5. VERBESINA foliis oppositis lanceolato-ovatis petio- *Acimella.*  
latis

latis serratis, pedunculis unifloris dichotomiæ caulis.  
*Fl. zeyl.* 309. \* *Mat. med.* 406.

*Chrysanthemum bidens* f. *Bidens zeylanica*, flore luteo,  
 lamii folio, *Acmella* dicta. *Raj. suppl.* 228. *Breyn.*  
*alm.* 48. t. 48. \*

*Senecio ind. orient. ocymi majoris* folio profunde cre-  
 nato. *Pluk. alm.* 343. t. 315. f. 2.

*Habitat in Zeylona.*

*Lavenia.* 6. VERBESINA foliis oppositis ovatis trinerviis glabris  
 petiolatis, seminibus tricornibus. *Fl. zeyl.* 310. \*

*Eupatorio-phalacron scrophulariæ aquaticæ* foliis oppo-  
 sitis. *Burm. zeyl.* 94. t. 42.

*Chrysanthemum aquaticum, scrophulariæ folio*, *Lavenia*  
 dictum. *Raj. suppl.* 217.

*Habitat in Zeylona.*

*alba.* 7. VERBESINA foliis oppositis lanceolatis serratis. *Hort.*  
*cliff.* 500. *Gran. virg.* 103.

*Eupatorio-phalacron balsaminæ feminæ* folio, flore al-  
 bo discoide V. *Dill. elth.* 138. t. 113. f. 137.

*Scabiosa conyzoides americana* latifolia, capitulis & flo-  
 ribus albis parvis. *Pluk. alm.* 335. t. 109. f. 1. *Morif.*  
*bist.* 3. p. 47. f. 6. t. 13. f. 16.

*Habitat in Virginia, Surinamo.* ♂

*prostrata.* 8. VERBESINA foliis oppositis lanceolatis serratis, flo-  
 ribus alternis geminis subsessilibus.

*Eupatorio-phalacron menthæ arvensis* folio. V. *Dill.*  
*elth.* 139. t. 113. f. 138.

*Chrysanthemum maderaspatanum, menthæ arvensis* folio  
 & facie, floribus bigemellis ad alas, pediculis curtis.  
*Pluk. alm.* 100. t. 118. f. 5.

*Habitat in India.*

*calendulacea* 9. VERBESINA foliis oppositis lanceolatis obtusiusculis,  
 pedunculis longis unifloris. *Fl. zeyl.* 311. \*

*Caltha* flore solitario ex alis foliorum longissimo pedun-  
 culo prodeunte. *Burm. zeyl.* 52. t. 22. f. 1.

*Habitat in Zeylona.*

*asteroides.* 10. VERBESINA foliis oppositis lineari-lanceolatis ob-  
 tusis integerrimis tomentosis, pedunculo unifloro.

*Buphtalmum* foliis oppositis lanceolato-linearibus obtu-  
 sis integerrimis, calycibus subrotundis. *Hort. cliff.*  
 415. \*

*Habitat* - - - *ad C. bonæ Spej.*

*amellus.* Ed. nov.

Flos

# SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 903

Flos *Asteris facie, luteus: radio violaceo, corona seminum ex 5 dentibus hispidis-fetaceis. Folia lychnidis.*

## TETRAGONOTHECA.

### 1. TETRAGONOTHECA

*Tetragonotheca doronici maximi folio. Dill. elzb. 378.*

*Helianthoides.*

*t. 283. f. 365. Gron. virg. 103.*

*Habitat in Virginia.*

## BUPHTHALMUM.

*\* Asterisci T.*

### 1. BUPHTHALMUM foliis oppositis lanceolatis, petiolatis bidentatis. *frutescens.*

*Hort. cliff. 415. Gron. virg. 101.*

*Roy. lugdb. 170.*

*Asteriscus frutescens, leucodii foliis sericeis & incanis.*

*Dill. elzb. 44. t. 38. f. 44.*

*Chrysanthemum fruticosum maritimum, foliis glaucis*

*oblongis, flore luteo. Sloan. jam. 125. hist. 1. p. 260.*

*Catesb. car. 1. p. 93. t. 93.*

*Habitat in Jamaica, Virginia. &*

### 2. BUPHTHALMUM calycibus acute foliosis, ramis *spinosis.*

*alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. Hort. cliff. 414. Roy. lugdb. 170. Sauv. monsp.*

*87.*

*Aster luteus, foliis ad florem rigidis. Bauh. pin. 266.*

*Aster legitimus clusii alter f. spinosus luteus. Barr. ic.*

*551.*

*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia, ad margines agrorum. ☉*

### 3. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliosis sessili- *aquaticum.*

*bus axillaribus, foliis oblongis obtusis. Hort. cliff.*

*414. Hort. ups. 464. Roy. lugdb. 170. Sauv. monsp. 87.*

*Asteriscus annuus lusitanicus odoratus. B. Seb. thes. 1.*

*p. 47. t. 29. f. 7.*

*Chrysanthemum conyzoides lusitanicum. Breyn. cent.*

*157. t. 77.*

*Habitat in Creta, Lusitania, Massiliæ. ☉*

### 4. BUPHTHALMUM calycibus obtuse foliosis pedun- *maritimum.*

*culatis, ramis alternis, foliis cuneiformibus. Hort.*

*cliff. 414. Hort. ups. 264. Roy. lugdb. 170.*

*Aster supinus lignosus ticular, conyzæ odore. Bocc. mus.*

*2. p. 161. t. 129.*

*Aster supinus luteus massilioticus. Barr. ic. 1151.*

*Aster 2. supinus. Clus. hist. 2. p. 13.*

*Aster luteus supinus. Baub. pin. 267.*

*Habitat Massiliæ, & in Sicilia ad littora maris. 2. ☉*

\* *Asteroidea T.*

*salicifolium. 5. BUPHTHALMUM* foliis lanceolatis subserratis villosis, calycibus nudis. *Hort. cliff. 414. Roy. lugdb. 170. Hall. belv. 711. Sauv. monsp. 87.*

*Aster luteus major, foliis succilæ. Baub. pin. 266.*

*Aster 3, austriacus 1. Clus. hist. 2. p. 13.*

*Habitat ad radices Alpium Austriæ, Stiria, Lusatia, Monspeli. 2*

*grandiflo- 6. BUPHTHALMUM* foliis lanceolatis subdenticulatis  
*rum.* glabris, calycibus nudis. *Hort. cliff. 415. \* Hort. upf. 264. Roy. lugdb. 170.*

*Aster luteus angustifolius. Baub. pin. 266.*

*Chrysanthemum perenne minus, foliis glabro folio, ramosum. Moris. hist. 3. p. 21. f. 6. t. 7. f. 52.*

*Habitat in Alpibus Austriæ, Italiæ, Monspeli. 2*

*Helianthoides. 7. BUPHTHALMUM* calycibus foliosis, foliis cordatis serratis trinerviis basi hinc brevioribus. *Hort. upf. 264.*

*Helianthus foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis longissimis. Gron. virg. 179.*

*Corona Solis caroliniana, parvis floribus, folio trinervi amplo aspero, pediculo alato. Mart. cent. 20. t. 20.*

*Chrysanthemum, scrophulariæ folio, americanum. Pluk. alm. 99. t. 22. f. 1.*

*Chrysanthemum virginianum, foliis glabris scrophulariæ vulgaris æmulis. Moris. hist. 3. p. 24. f. 6. t. 3. f. 69. Raj. suapl. 211.*

*Habitat in America septentrionali. 2*

*Folia summa altero latere baseos longe breviora sunt. Radius pistillis instructus & calycis folia obtusiora reddunt plantam distinctam ab Helianthemis, quibus simillima.*

## POLYGAMIA FRUSTRANEA.

### HELIANTHUS.

*antherus.*

1. *HELIANTHUS* foliis omnibus cordatis; nervis po-  
ne basin unitis: extrorsum denudatis.

*Heli*

*Helianthus radice annua. Vir. cliff. 88. Hort. cliff. 419.  
Hort. upf. 268. Roy. lugdb. 180.*

*Helenium indicum maximum. Baub. pin. 276.*

*Herba maxima. Dod. pempt. 264.*

*Chrylis. Reneal. spec. 84. t. 83.*

*Habitat in Peru, Mexico. ☉*

2. **HELIANTHUS** foliis inferioribus cordatis: nervis *multiflorus*.  
pone basin unitis denudatis: superioribus ovatis.

*Helianthus radice tereti inflexa perenni. Hort. cliff. 419.*

*Hort. upf. 268. Roy. lugdb. 180.*

*Helenium indicum ramosum. Baub. pin. 277.*

*Corona Solis minor femina. Tabern. ic. 764. 1147*

*Habitat in Virginia. ☿*

*Calyx constat squamis 40 a 50.*

3. **HELIANTHUS** foliis, ovato cordatis: nervis *intuberosus*,  
tra folium unitis.

*Helianthus radice tuberosa. Hort. cliff. 419. Hort. upf.  
268. Roy. lugdb. 180.*

*Helenium indicum tuberosum. Baub. pin. 277.*

*Chrysanthemum latifolium brasiliense. Baub. prodr. 70.*

*Flos Solis farnesianus. Col. cephr. 2. p. 11. t. 13.*

*Habitat in Brasilia. ☿*

4. **HELIANTHUS** caule inferne lævi, foliis lanceola-*decapetalus*.  
to-cordatis, radiis decapetalis.

*Habitat in Canada ex semine. D. Kalm.*

*Simillima H. multifloro, sed differt quod caulis, vix hu-  
mane altitudinis, inferne glaber. Folia magis lan-  
ceolato-ovata (nec cordata) nervis longius intra basin  
coeuntibus. Corolla radiis non pluribus quam decem.  
Calyx squamis viginti constat. Habitus distinctus.*

5. **HELIANTHUS** radice fusiformi. *Hort. cliff. 420. strumosus*,  
*Roy. lugdb. 181.*

*Chrysanthemum canadense latifolium altissimum. Mo-  
ris. bles. 250. hist. 3. p. 23.*

*Chrysanthemum canadense latifolium elatius. Bocc. sic.  
52. t. 27. f. 4.*

*Chrysanthemum canadense strumosum vulgo. Herm.  
lugdb. 143. \**

*Habitat in Canada.*

6. **HELIANTHUS** foliis lanceolatis scabris, caule stri-*giganteus*.  
cto: inferne glabro.

*Helianthus foliis lanceolatis sessilibus. Gran. virg. 104.*

L 115

Chry-

*Chrysanthemum virginianum* altissimum angustifolium,  
puniceis caulibus *Morif. hist.* 3. p. 24 f. 6. t. 7. f. 67.

*Chrysanthemum virginianum* elatius angustifolium,  
caule hirsuto viridi. *Pluk. alm.* 99. t. 159. f. 5.

*Habitat in Virginia, Canada.* &

Radius flosculis 16. f. 18, apice bifidis, sterilibus. Caulis  
decem pedum.

*lævis.* 7. *HELIANTHUS* foliis lanceolatis serratis lævibus.

*Gron. virg.* 104.

*Habitat in Virginia.*

*angustifolius* 8. *HELIANTHUS* foliis linearibus. *Gron. virg.* 103.

Flos Solis marianus, foliis alternis angustissimis scabris.

*Pet. mus.* 103.

*Habitat in Virginia.*

*divaricatus.* 9. *HELIANTHUS* foliis oppositis sessilibus ovato-ob-  
longis trinerviis, panicula dichotoma.

*Chrysanthemum virginianum* repens, foliis asperis bina-  
tim sessilibus acuminatis. *Morif. hist.* 3. p. 22. f. 6.  
t. 7. f. 66 mala.

*Habitat in America septentrionali.* &

Caulis vix humane altitudinis, superne levissimus pi-  
lis sparsis asperis, purpureus rore glauco. Flores in  
panicula ramis trichotomis, flavi, parvi, peduncula-  
ti: intermedio pedunculo simplici.

*atrorubens.* 10. *HELIANTHUS* foliis ovatis crenatis trinerviis sca-  
bris, squamis calycinis erectis longitudine disci. *Gron.*  
*virg.* 103.

Corona Solis minor, disco atrorubeunte. *Dill. elth.* 111.  
t. 94. f. 110.

*Habitat in Virginia.* &

## RUDBECKIA.

*laciniata.* 1. *RUDBECKIA* foliis compositis laciniatis. *Vir. cliff.*  
88. *Hort. cliff.* 420. *Hort. ups.* 269. *Roy. lugab.*  
181. *Gron. virg.* 180.

*Chrysanthemum americanum* perenne, foliis divisis di-  
latius virentibus, majus. *Morif. hist.* 3. p. 22. f. 6. t.  
6. f. 53. & 54.

*Doronicum americanum*, laciniato folio. *Banh. pin.*  
516.

*Aconitum helianthemum canadense.* *Corn. canad.* 173.  
t. 179.

*Habitat in Virginia, Canada.* &

2. *RUD-*

2. **RUDBECKIA** foliis inferioribus trilobis, superioribus *trilobis* indivisis. *Hort. ups.* 269.  
*Rudbeckia* foliis trilobis. *Gron. virg.* 180  
*Chrysanthemum cannabinum virginianum hirsutum*, disco magno, petalis aureis radiato. *Pluk. alm.* 100. t. 22. f. 2.  
*Chrysanthemum annuum majus virginianum*, foliis laciniatis & hirsutis, umbone nigricante. *Morif. bist.* 3. p. 19. n. 37.  
*Habitat in Virginia.* ♂
3. **RUDBECKIA** foliis indivisis spatulato-ovatis, radii *hirta*, petalis emarginatis.  
*Rudbeckia*, ramis indivisis unifloris, foliis ovato-lanceolatis, hirta. *Bätn. canon.* 227. \*  
*Rudbeckia* foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, petalis radii integris. *Gron. virg.* 181.  
*Obeliscotheca integrifolia*, radio aureo, umbone atro-rubente. *Dill. elth.* 295. t. 218. f. 285.  
*Chrysanthemum helenii folio*, umbone floris graduscullo prominente. *Pluk. alm.* 99. t. 242. f. 2. *Morif. bist.* 3. p. 23. *Raj. suppl.* 210.  
*Habitat in Virginia, Canada.* ♂. ♀
4. **RUDBECKIA** foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, petalis radii bifidis. *Gron. virg.* 104. 181. \*  
*Chrysanthemum americanum*, doronici folio, flore persici coloris: umbone magno prominente ex atro purpureo viridi & aureo fulgente. *Pluk. alm.* 99. t. 21. f. 1. *Catesb. car.* 2. p. 59. t. 59.  
*Dracunculus virginianus latifolius*, petalis florum longissimis purpurascens. *Morif. bist.* 3. p. 42. f. 6. t. 9. f. 1. *Raj. suppl.* 218.  
*Bobartia.* *Pet. mus.* *Amm. herb.* 473.  
*Habitat in Virginia, Carolina.*
5. **RUDBECKIA** foliis oppositis lanceolato-ovatis *ser-oppositifolia*, ratis, petalis radii bifidis. *Gron. virg.* 180.  
*Habitat in Virginia.*  
*Calyx brevissimus foliolis ovatis. Radius flavus, longissimus. Discus convexus, flavus.*

## COREOPSIS.

1. **COREOPSIS** foliis decomposito-pinnatis linearibus. *verticillata*.  
*Coreopsis* foliis verticillatis linearibus multifidis. *Gron. virg.* 105.

Cera-

908 SYNGENESIA: POLYGAM. FRUSTRAN.

*Ceratocephalus delphinii* foliis. *Vaill. act.* 1720.

*Chrysanthemum marianum*, scabiosæ tenuissime divisis foliis, ad intervalla confertis. *Pluk. mant.* 48. t. 344. f. 4.

*Habitat in Virginia.* ♂

*tripteris.*

2. COREOPSIS foliis subternatis integerrimis. *Hort. upf.* 269. \*

*Rudbeckia* foliis compositis integris. *Roy. lugdb.* 181.

*Chrysanthemum virginianum*, folio acutiore lævi tritoliato f. anagyridis folio. *Morif. hist.* 3. p. 21. f. 6. t. 3. f. 44. *Raj. suppl.* 215.

*Habitat in Virginia.* 2

Folia pleraque ternata, sæpe etiam in caule ferme pinata.

*alba.*

3. COREOPSIS foliis subternatis cuneatis ferratis.

*Chrysanthemum americanum*, ciceris folio glabro, bellidis majoris flore. *Herm. par.* 124. t. 124. flore albo. *Pluk. alm.* 101. t. 160. f. 3.

*Habitat in Insula St. crucis.* 2

*auriculata.*

4. COREOPSIS foliis ovatis: inferioribus ternatis. *Gron. virg.* 105.

*Chrysanthemum hirsutum virginianum*, auriculato dulcamaræ folio, octopetalon. *Pluk. alm.* 101. t. 83. f. 5. & t. 242. f. 4. *Raj. suppl.* 212.

*Chrysanthemum virginianum tritoliatum humilius*, obtusioribus foliis hirsutis. *Morif. hist.* 3. p. 20. f. 6. t. 3. f. 45.

*Habitat in Virginia.*

*lanceolata.*

5. COREOPSIS foliis lanceolatis integerrimis.

*Coreopsis* foliis integerrimis. *Roy. lugdb.* 181.

*Coreopsis.* *Hort. cliff.* 420.

*Bidens succisæ* folio, radio amplo laciniato. *Dill. elth.* 55. t. 48. f. 56.

*Bidens caroliniana*, florum radiis latissimis insigniter dentatis, semine alato per maturitatem convoluto. *Mart. cent.* 26. t. 26.

*Habitat in Carolina.*

*angustifolia.*

6. COREOPSIS foliis linearibus integerrimis. *Gron. virg.* 181.

*Habitat in Virginia.*

*Bidens.*

7. COREOPSIS foliis lanceolatis ferratis oppositis amplexicaulibus.

*Corea*



*Coreopsis bidentis. It. wgoth. 272. \**

*Hepatorium aquatile, folio non diviso, flore aureis petalis undique radiato. Triumf. obs. 65.*

*Chrysanthemum aquaticum bidens, folio non diviso, flore aureis petalis undique radiato. Moris. hist. 3. p. 17. f. 6. t. 5. f. 25.*

*Eupatorium cannabinum chrysanthemum. Barr. ic. 1209.*

*Habitat ad fossas Europæ. ☉*

*Si observationibus evincatur hanc BIDENTIS cernuæ solam esse varietatem, ad Bidentes reducat, sin constans sit, permaneat.*

8. COREOPSIS foliis lanceolatis serratis alternis petiolo-<sup>alternifolia?</sup> alternis decurrentibus. *Hort. upf. 270.*

*Coreopsis foliis serratis. Roy. lugdb. 181.*

*Chrysanthemum canadense bidens, alato caule. Moris. bles. 253. Raj. hist. 337.*

*Chrysanthemum virginianum, alato caule, bidens altissimum, folio aspero, flore minore ferotino. Moris. hist. 3. p. 25. f. 6. t. 7. f. 75. & 76.*

*Chrysanthemum virginianum, caule alato, ramosius, flore minore. Pluk: alm. 100. t. 159. f. 3.*

*Habitat in Virginia, Canada. 2*

## CENTAUREA.

\* *Jaceæ calycibus lævibus inermibus.*

1. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis lineari-<sup>Crapina.</sup> subulatis, foliis pinnatis serratis. *Hort. cliff. 420. Hort. upf. 271. Roy. lugdb. 137. Sauv. monsp. 264.*

*Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpureo flore. Baub. pin. 130.*

*Senecio-Carduus apulus. Col. ecphr. 1. p. 32. t. 34.*

*Habitat in Hetruria, G. Narbonensi. ☉*

2. CENTAUREA calycibus inermibus subrotundis gla-<sup>mosibata.</sup> bris: squamis ovatis, foliis sinuatis. *Hort. cliff. 421. Hort. upf. 271. Roy. lugdb. 138.*

*Cyanus orientalis major moschatus, flore purpureo & albo. Moris. hist. 3. p. 135. f. 7. t. 25. f. 5.*

3. *Cyanus orientalis major, foliis magis dissectis, flore lu- Amberboi.*

*reo. Moris. hist. 3. p. 135. f. 7. t. 25. f. 9.*

*Habitat in Tataria. ☉*

3. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis lanceo-<sup>crucifolia,</sup> latis, foliis lanceolatis subdentatis. *Hort. cliff. 421. Roy. lugdb. 138.*

Ja-

*Jacea* foliis crucæ lanuginosis. *Tournef. inst.* 444.

Amberboi, crucæ folio, majus. *Vaill. act.* 1718. p. 181.

Stœbe major foliis crucæ mollibus lanuginosis. *Bauh. pin.* 273.

*Habitat* - - - 2

*Lippii.*

4. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis mucronatis, foliis pinnatifidis obtusis decurrentibus.

Amberboi, crucæ folio, minus. *Isn. act.* 1719. p. 169. t. 10.

*Habitat in Ægypto inter Alexandriam & Rosette.* ①

*alpina.*

5. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis ovatis obtusis, foliis pinnatis glabris integerrimis: impari serrato. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 138.

*Centaureum alpinum luteum.* *Bauh. pin.* 117. *prodr.* 56.

*Morif. hist.* 3. p. 132. f. 7. t. 25. f. 5.

*Centaureum majus luteum.* *Corn. canad.* 69. t. 70.

*Habitat in Baldo.*

*Centaureum.*

6. CENTAUREA calycibus inermibus: squamis ovatis, foliis pinnatis: foliolis serratis decurrentibus.

*Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 137.

*Centaureum majus*, folio in laciniis plures diviso. *Bauh. pin.* 117.

*Centaureum majus* i vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 10.

*Habitat in Alpibus* Gargano, Baldo, Tataria. 2

\* *Cyani calycinis squamis serrato-ciliatis.*

*phrygia.*

7. CENTAUREA calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis.

*Centaurea calycibus ciliatis: ciliis setaceis recurvatis.*

*Hort. cliff.* 422. *Hort. ups.* 270. *Roy. lugdb.* 139.

*Dalib. paris.* 266.

*Jacea latifolia & angustifolia*, capite hirsuto. *Bauh. pin.* 271.

*Jacea 4 austriaca*, capite villoso. *Clus. hist.* 2. p. 7.

- β. *Jacea alba*, hirsuto capite. *Bauh. pin.* 271.

*Habitat in Helvetia, Austria, Finlandia.* 2

*capillata.*

8. CENTAUREA calycibus seta recurvato-plumosis, foliis imis pinnatis dentatis; summis lanceolatis.

*Centaurea calycibus ciliatis oblongis, foliis scabris, caulium pinnatis: ramorum simplicissimis linearibus.*

*Gmel. sib.* 2. p. 98. t. 43.

*Cyanus foliis calycinis plumosis reflexis, foliolis pinnatis.*

*Act. goett.* 1. p. 202. t. 6.

*Habitat in Sibiria.* *Gmelinus.*

9. CEN-

9. **CENTAUREA** calycibus pinnatis: squamula ovata: *nigra*.  
 ciliis capillaribus erectis.  
 Cyanus foliis imis ad basin pinnatis: superioribus integris  
 ovato-lanceolatis. *Hall. herb. 691. t. 23. f. 1.*  
*Jacea nigra laciniata. Bauh. pin. 271.*  
*Jacea austriaca VI. Clus. hist. 2. p. 7.*  
*Habitat in Anglia, Helvetia, Austria.*  
*Differt a C. phrygia, quod squamula ciliaris sit ovata e-*  
*recto patens, nec recurva & subulata.*
10. **CENTAUREA** calycibus ciliatis verticillato-folio-*pullata*,  
 fis, foliis lyrato dentatis, caule foliis brevior.  
 Centaurea inermis, calycum ciliis pinnatis, foliis oblon-  
 gis villosis humifatis, floralibus verticillatis ligulatis.  
*Sauv. monsp. 288.*  
*Jacea humilis alba, hieracii folio. Bauh. pin. 271. Mo-*  
*rif. hist. 3. p. 140 f. 6. t. 28. f. 18.*  
*Jacea monspessulana, cui in squamis fibræ nigræ, inter-*  
*dum acaulis. Bauh. hist. 3. p. 29.*  
*Jacea pumila serpens acaulis ferme, flore albo. Lob. ic.*  
*542.*  
*Habitat in G. Narbonensi, Hispania. ☉*  
*Calyx foliis cingitur sessilibus, intra hæc folia Squamæ*  
*calycine lineari-lanceolatæ margine atro, apice setis*  
*pallidis ciliatæ. Folia in caule sæpe lyrata sunt.*
11. **CENTAUREA** calycibus ferratis, foliis lanceolatis *montana*,  
 decurrentibus, caule simplicissimo. *Hort. cliff. 422.*  
*Hort. upf. 270. Roy. lugdb. 138.*  
 Cyanus montanus latifolius f. *Verbasculum cyanoides.*  
*Bauh. pin. 273.*  
 Cyanus montanus, caule folioso, capitulo oblongo.  
*Bocc. musf. 2. p. 20. i. 2.*  
 Cyanus major. *Lob. ic. 548.*
- β. **Jacea** integrifolia humilis. *Bauh. pin. 271. prodr. 127.*  
*Burf. XV. 29.*  
*Habitat in Alpibus Helveticis. 2*  
 Planta β. foliis minoribus, parum basi decurrentibus, nec  
 ad proximum folium, a vulgari differt.
12. **CENTAUREA** calycibus ferratis: foliis linearibus *Cyanus*,  
 integerrimis: infimis dentatis. *Hort. cliff. 422. Fl.*  
*suec. 710. Mat. med. 408. Roy. lugdb. 130. Dalib.*  
*parif. 265.*  
 Cyanus segetum. *Bauh. pin. 273.*  
 Cyanus vulgaris. *Lob. ic. 546.*  
*Habitat inter Europæ segetes biennes. ☉*

- paniculata.* 13. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis linearibus, caule paniculato.  
*Centaurea* calycibus ciliatis, foliis filiformibus bipinnatis, caule folioso ramoso. *San. monsp.* 264.  
*Jacea* non spinosa, foliis magis divitis, elatior, capitulis minoribus non splendentibus. *Morif. hist.* 3. p. 140. f. 7. t. 28. f. 15.  
*Stœbe* major, capliculis non splendentibus. *Bauh. pin.* 273.  
*Centaurei* majoris species tenuifolia. *Bauh. hist.* 3. p. 31.  
*Habitat in* G. Narbonensi, Austria, Hispania, Verona, Sibiria. ☉
- sessiliflora.* 14. *CENTAUREA* calycibus ferratis ciliatisque, foliis lanceolatis dentatis, floribus sessilibus. *Hort. cliff.* 422.\*  
*Roy. lugdb.* 139.  
*Habitat in* G. Narbonensi.
- spinosa.* 15. *CENTAUREA* calyce subciliato, ramis spinosis.  
*Hort. cliff.* 422. \*  
*Jacea* cretica aculeata incana. *Tournef. inst.* 445.  
*Stœbe* spinosa cretica. *Morif. hist.* 3. p. 136.  
*Cyanus* spinosus. *Alp. exot.* 163. t. 162.  
*Habitat in* Creta.
- ragusina.* 16. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis tomentosis pinnatifidis, foliolis obtusis ovatis integerrimis: exterioribus majoribus. *Hort. cliff.* 422. *Roy. lugdb.* 139.  
*Jacea* cretica lutea, foliis cinaræ. *Morif. hist.* 3. p. 141. f. 6. t. 27. f. 22.  
*Jacea* arborea argentea *ragusina*. *Zan. hist.* 107. t. 43.  
*Stœbe* montana nivea, capite cardui, subrotundis foliorum lobis. *Barr. ic.* 309.  
*Habitat in* Creta, Epidauro. 2
- Cineraria.* 17. *CENTAUREA* calycibus ciliatis terminali sessilibus, foliis tomentosis bipinnatifidis: lacinulis linearibus.  
*Hort. cliff.* 422. *Roy. lugdb.* 139.  
*Jacea* montana candidissima, stœbes foliis. *Bauh. pin.* 272. *prodr.* 126. *Morif. hist.* 3. p. 141. f. 7. t. 26. f. 20.  
*Jacea* cineraria laciniata, flore purpureo. *Triumph. obs.* 72. *Morif. hist.* 3. p. 141. *Barr. ic.* 348. 347.  
*Habitat in* Italia. 2
- argentea.* 18. *CENTAUREA* calycibus ciliatis villosis, foliis cuneiformibus superne ferratis inferne dentatis. *Hort. cliff.* 422. Ja-

*Jacea cretica* laciniata argentea, flore parvo flavescente. *Tournef. cor.* 32. *Barr. ic.* 218.

*Habitat in Creta.*

19. **CENTAUREA** calycibus ciliatis, foliis tomentosis *sibirica.*  
indivisis pinnatifidisque integerrimis, caule declinato.

*Centaurea* calycibus ciliatis subrotundis, foliis pinnatis & integris: foliolis simplicissimis: extremo maximo.

*Gmel. fib.* 2. p. 96. t. 42. f. 2.

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin.* 2

Folia tomentosa, lanceolata: radicalia pleraque pinnatifida: Lobis sursum versis, lanceolatis, integerrimis, decurrentibus, extimo majore. Folia caulina sepius 6 s. 7, superioribus indivisis. Caulis simplicissimus, raro unico ramulo, pubescens, subsulcatus. Flos sepius unicus. Calyce ventricoso: foliolis auctis Squamula ovata, magnitudine folioli calycini, argute ciliatis, pallidis. Corolla purpurea; radio sterili magno.

20. **CENTAUREA** calycibus ciliatis, foliis lanceolatis: *sempervirens.*  
superne ferratis. *Hort. cliff.* 422. \* *Roy. lugdb.* 139.

*Jacea lusitanica* sempervirens. *Morif. hist.* 3. p. 139. f. 7. t. 28. f. 9.

*Habitat in Lusitania.* 2

21. **CENTAUREA** calycibus margine ciliatis, foliis pin- *Scabiosa.*  
natifidis: pinnis lanceolatis. *Hort. cliff.* 422. *Fl.*

*succ.* 708. *Roy. lugdb.* 139. *Dalib. parif.* 266. *Gmel. fib.* 2. p. 93.

*Scabiosa* major, squamatis capitalis. *Bauh. pin.* 269.

*Scabiosa* major. *Dalech. hist.* 1066.

*Habitat in Europæ septentrionalis pratis.*

22. **CENTAUREA** calycibus squama ciliatis, foliis pin- *orientalis.*  
natifidis: pinnis lanceolatis.

*Centaurea* calycibus ciliatis, foliis pinnatis glabris: foliolis lanceolatis integerrimis. *Hort. upf.* 271.

*Cyanus* foliis radicalibus: partim integris, partim pinnatis, bractea calycis ovali, flore sulphureo. *Hall. act. angl.* 1745. vol. 43. n. 472. p. 94.

*Habitat in Sibiria.* 2

*Differt a C. Scabiosa, cui simillima, non tantum Corolla sulphurea, sed præcipue Calyce, cujus foliola terminata squama ovata, ferruginea, ciliata, ciliis longitudine ipsius squamæ, pectinatis, cum in C. Scabiosa foliorum calycis margo niger ciliato-lacernis sit, nec in squamam eductus.*

M m m

- Stœbe.* 23. *CENTAUREA* calycibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 140.  
*Stœbe incana*, cyano similis, tenuifolia. *Bauh. pin.* 273.  
*Stœbe austriaca humilis.* *Clus. hist.* 2. p. 10.  
*Habitat in Austria.*
- caulis.* 24. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis lyratis, caule subnullo.  
*Crocodilium acaulon* ferme, calcitrapæ foliis crassis tomentosis. *Vaill. act.* 1718. p. 162?  
*Jacea acaulos* lutea, erucæ folio, squamarum ciliis candidis. *Shaw. spec.* 342. t. 342.  
*Habitat in Arabia.*  
 \* *Rhapontica calycinis squamis membranaceis, aridis, integerrimis, muticis.*
- Behen.* 25. *CENTAUREA* calycibus squamosis, foliis radicalibus lyratis: lobis oppositis, caulinis amplexicaulibus. *Mat. med.* 409.  
*Rhaponticoides* lutea, foliis inferioribus dissectis, cæteris connatis. *Vaill. act.* 1718. p. 229.  
*Behen album.* *Rauw. itin.* 288. t. 288. *Bauh. hist.* 3. p. 36. t. 37. *Bauh. pin.* 234.  
*Habitat in Asia minore, Libano. &*
- Jacea.* 26. *CENTAUREA* calycibus squamosis, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 421. *Fl. suec.* 709. *Roy. lugdb.* 142. *Dalib. parif.* 265.  
*Jacea nigra pratensis* latifolia. *Bauh. pin.* 271.  
*Jacea nigra.* *Paul. dan.* t. 256.  
*Habitat in Europa septentrionali. &*
- alba.* 27. *CENTAUREA* calycibus squamosis mucronatis, foliis pinnato-dentatis.  
*Jacea*, calyculis argenteis, minor. *Tournef. inst.* 444.  
*Jacea alba.* *Tabern. ic.* 153.  
*Stœbe*, calyculis argenteis, minor. *Bauh. pin.* 273.  
*Habitat in Hispania.*  
*Caulis paniculatus, angulatus. Folia linearia, pinnato-dentata, acuminata: superiora tantum dentata; suprema linearia, simplicissima. Calyces terminales, ovati, parvi, Squamis membranaceis, laxis, mucronatis.*
- splendens.* 28. *CENTAUREA* calycibus squamosis obrutis, foliis radicalibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis dentibus lanceolatis. *Roy. lugdb.* 142. *Sauv. meth.* 289.

- Jacea, calyculis argenteis, major. *Tournef. inst.* 444.  
 Stœbe caliculis argenteis. *Bauh. pin.* 273.  
 Stœbe salmantica 3. *Clus. hist.* 2. p. 10.  
*Habitat in Helvetia, Hispania, Sibiria, &*
29. CENTAUREA calycibus squamosis, foliis ovato-Rhapontica.  
 oblongis denticulatis integris petiolatis: subtus tomen-  
 tosis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 142.  
 Rhaponticum folio helenii incano. *Bauh. pin.* 117.  
 Rha f. Rhei ut exultimatur. *Dod. pempt.* 389.  
*Habitat in Alpibus Helveticis, Veronæ.*
30. CENTAUREA calycibus squamosis, foliis indivisis glastifolia.  
 integerrimis decurrentibus. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.*  
 142. *Gmel. fib.* 2. p. 83.  
 Centaurium majus orientale erectum, glasti folio, flore  
 luteo. *Comm. rar.* 39 t. 39.  
*Habitat in Oriente, Sibiria. &*
31. CENTAUREA calycibus squamosis, foliis tomen-conifera-  
 tosis: radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, cau-  
 le simplici. *Roy. lugdb.* 142. *Hort. upf.* 271. *Sauv.*  
*monsp.* 289.  
 Jacea montana incana, capite pini. *Bauh. pin.* 272.  
 Chamæleon non aculeatus. *Lob. ic.* 7.  
*Habitat Monspelii in saxosis glareosis. &*
- \* Stœbæ calycinis spinis palmatis.
32. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis de-fouchifolia.  
 currentibus spinulosis repando-dentatis. *Hort. cliff.*  
 423. n. 22. *Roy. lugdb.* 140.  
 Jacea latifolia, caule alato, capite magno turbinato:  
 multiplici aculeo deflexo e squamis cuspidatis orto.  
*Pluk. alm.* 191. t. 38. f. 1.  
 Jacea laciniata, fouchi folio, f. Jacea latifolia purpurea,  
 capite spinoso. *Bauh. pin.* 272. *prodr.* 128. *Herm.*  
*lugdb.* 331. t. 675.  
*Habitat in maritimis maris Mediterranei. ☉*
33. CENTAUREA calycibus palmato-spinosis, foliis seridis.  
 decurrentibus tomentosis oblongis: infimis sinuato-  
 dentatis. *Sauv. meth.* 288.  
 Jacea, foliis seridis candicantibus, purpurea. *Bauh. pin.*  
 272.  
 Jacea purpurea hispanica muricata. *Bauh. hist.* 3. p. 33:  
*descr.*

916 SYNGENESIA: POLYGAM. FRUSTRAN.

*Jacea latifolia*, spinosis capitulis pulchris, flore purpureo.  
*Bauh. hist.* 3. p. 33. *Raj. hist.* 320.  
*Habitat in Hispania.*

- romana.* 34. *CENTAUREA* calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus inermibus: radicalibus pinnatifidis: impari maximo. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 141.  
*Jacea spinosa cretica.* *Zan. hist.* 141. t. 42.  
*Cyanus erucæ folio*, flore rubro. *Barr. rar.* 87. t. 504.  
*Habitat in Campania Romana.* ☉

- sphærocephala.* 35. *CENTAUREA* calycibus palmato-spinosis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. *Hort. cliff.* 423.  
*Roy. lugdb.* 140.  
*Jacea sphærocephala spinosa tingitana.* *Herm. lugdb.* 332. t. 333. *Morif. hist.* 3. p. 143. f. 7. t. 27. f. 9.  
*Habitat in Mauritania.*

- isnardi.* 36. *CENTAUREA* calycibus palmato-spinosis, foliis lyrato-dentatis hispidis subamplexicaulibus, floribus sessilibus terminalibus.  
*Calcitrapoides procumbens*, cichorii folio, flore purpureo. *Isn. parif.* 1719. p. 164. t. 9.  
*Habitat in Europa australi?* &

- napifolia.* 37. *CENTAUREA* calycibus palmato-spinosis: setis æqualibus, foliis decurrentibus sinuatis spinulosis. *Roy. lugdb.* 141. *Hort. nps.* 272. \*  
*Jacea cyanoides altera*, alato caule. *Herm. par.* 189. t. 189. *bon.*  
*Jacea peregrina napifolia*, echinatis capitulis, caule alato. *Pluk. alm.* 192. t. 94. f. 2. *Morif. hist.* 3. p. 154. f. 7. t. 26. f. 20.  
*Habitat in Greta.*

- aspera.* 38. *CENTAUREA* calycibus squamis palmato-quinquespinosis, foliis lanceolatis dentatis. *Sauv. monsp.* 289.  
*Centaurea calycibus spinosis*, foliis lanceolatis dentatis. *Roy. lugdb.* 142.  
*Stœbe squamis asperis.* *Bauh. pin.* 273. *Raj. hist.* 319.  
*Jacea cum spinosis capitulis*, purpurea tenuifolia. *Bauh. hist.* 3. p. 33.  
*Habitat Montipellii, inque Hetruria, Lusitania.*

- \* *Calcitrapæ calycinis spinis compositis.*  
*criophora.* 39. *CENTAUREA* calycibus duplicato-spinosis lanatis,



tis, foliis semidecurrentibus integris sinuatisque. *Hort. upf.* 272. \* *Roy. lugdb.* 140.

*Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis decurrentibus integris. Hort. cliff.* 423.

*Calcitrapa lutea, alato caule, capite eriophoro. Vaill. act.* 1718. p. 212.

*Carduus lusitanicus canescens, alato caule, capite lanuginoso, Tournef. inst.* 441.

*Habitat in Lusitania. ☉*

40. *CENTAUREA* calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis. *Hort. upf.* 273. \* *Calcitrapa.*

*Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 140.

*Gort. gelr.* 496. *Dalib. paris.* 266. *Sauv. monsp.* 288.

*Carduus stellatus* f. *Calcitrapa. Baub. bist.* 3. p. 89.

*Carduus stellatus, foliis papaveris erratici. Baub. pin.* 387. *Raj. bist.* 317.

*Carduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. Clus. bist.* 2. p. 7.

*Hippophæstum. Col. phytob.* 85. t. 24.

*Habitat in Helvetia, Anglia & Europa australiori secus vias. ☉*

*Flos hinc purpureus, nec ut in Solstitiali, Melitensi aut Siculo luteus.*

41. *CENTAUREA* calycibus duplicato-spinosis, foliis solstitialis. rameis decurrentibus inermibus lanceolatis; caulinis lyrato-pinnatifidis. *Hort. cliff.* 423. n. 21. *Hort. upf.* 272. \* *Roy. lugdb.* 140. *Dalib. paris.* 267. *Sauv. monsp.* 288.

*Carduus stellatus luteus, foliis cyani. Baub. pin.* 387. *Raj. bist.* 317.

*Carduus stellatus mitior apulus. Col. ecphr.* 1. p. 30. & 31.

*Habitat in Gallia, Anglia, Italia. ☉*

*Flores terminales, sæpius conferti, foliis lanceolato-linearibus obvallati.*

42. *CENTAUREA* calycibus duplicato-spinosis subrotundis lateralibus, foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus. *Roy. lugdb.* 140. *Sauv. monsp.* 288.

*Jacea melitensis, capitulis conglobatis. Bocc. sic.* 65. t. 35. *Moris. bist.* 3. p. 145. *Raj. bist.* 323.

*Habitat in Melita. ☉*

*Folia viscida, mollia: ima sinuata, spatulata. Sauv.*

918 SYNGENESIA: POLYGAM. FRUSTRAN.

*scula.*

43. *CENTAUREA* calycibus ciliato-spinosis, foliis lyratis inermibus incanis, capitulis terminalibus. *Sauv. monsp.* 290.

*Jacea* sicula, cichorii folio, flore luteo, capite spinoso. *Magn. monsp.* 138. *Morif. bist.* 3. p. 144 f. 7. t. 28. f. 26. *Habitat in Sicilia.* 2

- Centauroides* 44. *CENTAUREA* calycibus cillatis spinosis, foliis pinatifidis; laciniis superioribus majoribus. *Roy. lugdb.* 141. n. 27.

*Jacea* lutea spinosa centauroides. *Bauh. pin.* 272.

*Jacea* laevis maxima centauroides apula. *Col. ecphr.* 1. p. 33. t. 35.

*Habitat in Italia.*

*Collina.*

45. *CENTAUREA* calycibus ciliatis spinosis, foliis bipinnatifidis.

*Jacea* lutea, capite spinosa. *Bauh. pin.* 272.

*Jacea* lutea VI. *Tabern. bist.* 436.

*Habitat in Italia, Hispania.*

\* *Crocodiloidea spinis simplicibus.*

*salmantica.*

46. *CENTAUREA* calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatifidis serratis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 138. *Sauv. monsp.* 287.

*Jacea* major, foliis cichoraceis mollibus, flore stamineo. *Morif. bist.* 3. p. 140. f. 7. t. 26. f. 14.

*Jacea* major, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis. *Bauh. pin.* 273.

*Storbe salmantica* 1. *Clas. bist.* 2. p. 9. *Raj. bist.* 324.

*Habitat in Europa australi.* 2.

*Squamae calycinae ita parvae sunt, ut vix manifestae.*

*muricata.*

47. *CENTAUREA* calycibus simplicissime spinosis, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceolatis, pedunculis longissimis. *Roy. lugdb.* 141.

*Jacea* cyanoides, echinato capite. *Bauh. pin.* 272. *Morif. bist.* 3. p. 145.

*Cyanoides* flos. *Dod. pempt.* 251.

*Habitat in Hispania.* ☉

*peregrina.*

48. *CENTAUREA* calycibus setaceo-spinosis, foliis lanceolatis petiolatis; inferne dentatis. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 141.

*Centaureum* majus, folio molli acuto laciniato, flore aureo magno, calyce spinoso. *Boerb. lugdb.* 1. p. 144.

*Habitat in Europa australi.* 3

## SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 919

49. **CENTAUREA** calycibus simplicissime spinosis, fo- *Crocodylium*  
liis pinnatifidis integerrimis: lacinia extima majore  
dentata.

Cyanus purpureus, capite spinoso, syriacus. *Barr. rar.*

927. t. 503. *bon.*

*Habitat in Syria.*

50. **CENTAUREA** calycibus setaceo-spinosis, foliis de- *galactium*  
currentibus sinuatis spinosis. *Hort. cliff.* 424. *Roy.*  
*lugdb.* 141. *Sauv. monsp.* 289.

Carduus tomentosus, capitulo minore. *Baub. pin.* 382.

Carduus galactines. *Baub. hist.* 3. p. 54.

- β. Carduus creticus non maculatus, caule alato. *Tournef.*

*cor.* 31

*Habitat in Europa australi. &*

## POLYGAMIA NECESSARIA.

### MILLERIA.

1. **MILLERIA** foliis cordatis, pedunculis dichotomis. *quinquefida*

*Hort. cliff.* 425. \* *Roy. lugdb.* 182.

*Milleria annua erecta, floribus spicatis luteis. Mart. cent.*

41. t. 41.

- β. *Milleria annua ramosior, foliis maculatis profundius fex-*  
*ratis. Mart. cent.* 47. t. 47. f. 2.

*Habitat in Panama, Vera Cruce.*

2. **MILLERIA** foliis ovatis, pedunculis simplicissimis. *biflora.*

*Hort. cliff.* 425. t. 25. \* *Hort. nps.* 275. *Roy. lugdb.* 182.

*Milleria annua erecta minor, foliis parietariæ, floribus*  
*ex foliorum alis. Mart. cent.* 47. t. 47. f. 1.

*Habitat in Campechia. ☉*

### SILPHIUM.

1. **SILPHIUM** foliis alternis pinnato-sinuatis.

*lociniatur.*

*Bidens americana frutescens, sphondylii folio & facie.*

*Plum. spec.* 10.

*Habitat in America septentrionali, Mississipi. Collinson &*

*Radix perennis. Caulis bis humanae altitudinis, cassio*  
*pollicis, simplicissimus, inferne laevis, superne tuber-*  
*culis fuscis pilisque patulis albis scaber, teres. Folia*  
*alterna, petiolata, bipedalia longitudine, pedalia lati-*  
*tudine, basi amplexicaulia, pinnatifida: Lacinii*  
*strisque 4 s. 5, distantibus, angustis, dentato-fimbriatis*

M m m 4

360

*scabra, costis utrinque elevatis solidissimis; margo foliorum superiorum purpurascens. Cal. ex squamis 10, in magnas subulatas spinas excurrentibus. Petala radii 30, longitudine calycis; Stylo bifido, tenui. Flosculi disci multi, flavi, paleis distincti, basi attenuati, Stylo simplici. Semina in radio membranacea, ovalia, emarginata, aristis 2 parvis. Semina disci columnaria, tetragona, abortientia.*

- Asteriscus.* 2. **SILPHIUM** foliis indivisis sessilibus oppositis; inferioribus alternis.  
*Silphium foliis oppositis. Roy. lugdb. 181.*  
*Silphium. Hort. cliff. 494. Gron. virg. 106.*  
*Asteriscus coronæ solis folio & facie. Dill. elth. 42. t. 37. f. 42.*  
*Habitat in Virginia, Carolina. 2*

- Helianthoides.* 3. **SILPHIUM** foliis oppositis petiolatis serratis. *Gron. virg. 181.*  
*Chrysanthemum marianum, virgæ aureæ americanæ foliis, florum petalis tridentatis. Pluk. mant. 46.*  
*Habitat in Virginia.*

- Solidagineoides.* 4. **SILPHIUM** foliis oppositis lanceolatis petiolatis acute serratis.  
*Habitat in Virginia. D. Gronovius.*  
*Caulis glaber. Folia subtus glabra: Calyx serie duplici foliorum. Radii petala leviter trifida; Disci abortientia.*

- trifoliatum.* 5. **SILPHIUM** foliis ternis. *Roy. lugdb. 181.*  
*Chrysanthemum virginianum, foliis asperis tribus f. quaternis ad genicula litis. Moris. hist. 3. p. 24. f. 6. t. 3. p. 68. Raj. suppl. 211.*  
*Habitat in Virginia. 2*

### CHRYSOGONUM.

- virginianum* 1. **CHRYSOGONUM** petiolis folio longioribus.  
*Chrysogonum. Hort. cliff. 424. Gron. virg. 106.*  
*Chrysanthemum virginianum villosum, disco luteo: quinque petalis crenato. Pluk. alm. 100. t. 83. f. 4. t. 242. f. 3. Raj. suppl. 213.*  
*Habitat in Virginia.*

- peruvianum.* 2. **CHRYSOGONUM** foliis sessilibus amplexicaulibus calycibus sessilibus squamosis.  
*Eupatoriophalacron folio trinervi subrotundo, flore minore luteo radiato. Few. peruv. 2. p. 266. t. 50.*  
*Ha*

*Habitat in Peru. D. Jussieu. ☉*

Caulis teres, erectus, compositus. Folia opposita, sessilia, amplexicaulia, cordato-oblonga, glabra, subtrinervia, integerrima, margine scabra. Calyx terminalis, sessilis, solitarius, glaber, cylindrico-oblongus, imbricatus squamis raris, obtusis. Corolla lutea; Radius pentapetalus, longitudine calycis, pistillis bifidis. Discus fuscus & paleis distinctus. Rami ex alis (non flori proximis) caulis similes.

## MELAMPODIUM.

### 1. MELAMPODIUM. *Hort. cliff. 425.\**

*Habitat in Vera Cruce.*

*americanum*

## CALENDULA.

### 1. CALENDULA feminibus radii cymbiformibus echi-officinalis.

natis: disci bicornibus. *Hort. cliff. 425. Hort. upf. 274. Fl. succ. 712. Mat. 407. Roy. lugdb. 177. Dailib. paris. 268.*

*Caltha vulgaris, Baub. pin. 275.*

6. *Caltha arvensis. Baub. pin. 275.*

7. *Caltha polyanthos major. Baub. pin. 275.*

8. *Caltha floribus reflexis. Baub. pin. 275.*

9. *Caltha prolifera, majoribus s. minoribus floribus. Baub. pin. 275.*

*Habitat in Europæ arvis. ☉*

### 2. CALENDULA foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis filiformibus. *Hort. upf. 274.*

*Calendula foliis dentatis. Roy. lugdb. 177.*

*Calendula feminibus radii obsolete serratis; disci cordatis. Hort. cliff. 425.*

*Calendula humilis africana, flore intus albo, foris violaceo simplici. Herm. lugdb. 104. t. 105. Breyn. ic. 26. f. 14. Stiff. bot. 59. t. 59.*

*Habitat in Æthiopia. ☉*

### 3. CALENDULA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis superne incrassatis. *Hort. cliff. 274.*

*Calendula foliis radicalibus sinuatis, caulinis superne denticulatis. Roy. lugdb. 177.*

*Cardispermum africanum pubescens, foliis incis, parvo flore. Trant. act. paris. 1724. p. 39. t. 2.*

*Habitat in Æthiopia. ☿*

M m m 5

4. CA-

*nudicaulis.*

4. CALENDULA foliis lanceolatis sinuato-dentatis, caule nudo.

Calendula africana, foliis scabiosæ argenteæ viridibus.

*Herm. afr. 5.*

Bellis florum pediculis pene aphyllis, foliis incis. *Comm. hort. 2. p. 66. t. 33.*

Caltha africana, flore intus albo extus leviter violaceo, semine plano cordato. *Boerb. lugdb. 1. p. 113.*

*Habitat in Æthiopia.*

*graminifolia* 5. CALENDULA foliis linearibus subintegerrimis, caule subnudo.

Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis.

*Roy. lugdb. 177.*

Calendula africana, foliis gramineis rarius dentatis aureis. *Herm. afr. 5.*

Caltha africana, foliis croci angustis, florum petalis externe purpurascens interne albis. *Boerb. lugdb. 1. p. 113.*

Dimorphotheca statice folio. *Vaill. act. 1720. p. 280.*

Bellis africana, florum pediculis foliosis foliis angustis & integris. *Comm. hort. 2. p. 67. t. 34.*

*Habitat in Æthiopia.*

*Anne hæc posteriores 3. 4. 5. & C. pluviali olim ortæ sunt? Sic suadet locus, semina, color corollæ, habitus.*

## ARCTOTIS.

*trifida.*

1. ARCTOTIS flosculis radiantibus vicenis tripartitis.

Arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profunde trifidis. *Roy. lugdb. 179.*

Anemonospermus afra, foliis & facie taraxaci incanis. *Breyn. ic. 27. t. 15.*

*Habitat in Æthiopia. ☉*

*Calendula.*

2. ARCTOTIS flosculis radiantibus duodenis subintegris.

Arctotis foliis ovatis dentatis: petiolis longissimis superne dentatis, caule ramoso. *Hort. cliff. 412. Roy. lugdb. 178.*

Anemonospermus africana, jacobææ maritimæ foliis, flore sulphureo. *Comm. rar. 36. t. 36.*

*Habitat in Æthiopia. ☉*

*aspera.*

3. ARCTOTIS foliis pinnato-sinuatis: laciniis oblongis dentatis. *Hort. cliff. 412. Hort. ups. 275. Roy. lugdb. 178.*

Ar

*Arctotheca jacobææ* folio, radiis florum intus luteis, extus purpureis. *Vaill. act.* 1720. p. 428.

*Anemonospermus africana*, foliis cardui benedicti, florum radiis intus sulphureis. *Comm. hort.* 2. p. 43. t. 22.

β. *Anemonospermus afra*, folio jacobææ tenuiter laciniato, flore aurantio pulcherrimo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 100. t. 100.

*Habitat in Æthiopia.*

4. *ARCTOTIS* foliis lanceolato-linearibus integris den-angustifolia. ticulatis. *Hort. cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 178.

*Anemonospermus afra*, folio serrato rigido, flore intus sulphureo extus puniceo, *Boerb. lugdb.* 1. p. 100.

*Habitat in Æthiopia.*

## OSTEOSPERMUM.

1. *OSTEOSPERMUM* foliis oppositis palmatis. *Hort. Uvedalia. cliff.* 424. *Hort. ups.* 274. *Roy. lugdb.* 179. *Gron. virg.* 106.

*Chrysanthemum*, angulosis platani foliis, virginianum. *Pluk. alm.* 99. t. 83. f. 3.

*Chrysanthemum perenne virginianum majus*, platani orientalis folio. *Morif. hist.* 3. p. 22. f. 6. t. 7. f. 55.

*Habitat in Virginia.* 4. b.

2. *OSTEOSPERMUM* spinis ramosis. *Hort. cliff.* 424. *spinosum. Roy. lugdb.* 179.

*Chrysanthemoides osteospermum africanum odoratum spinosum & viscosum.* *Comm. hort.* 2. p. 85. t. 43.

*Chrysanthemum africanum frutescens spinosum.* *Volk. norib.* 105. t. 105.

*Habitat in Æthiopia.* b.

3. *OSTEOSPERMUM* foliis ovalibus serratis. *Hort. moniliferum cliff.* 424. *Roy. lugdb.* 179.

*Chrysanthemoides afrum*, populi albæ foliis. *T. Dill. elsh.* 80. t. 68. f. 79.

*Chrysanthemum africanum frutescens, telephii fere foliis crassius, osteocarpon.* *Pluk. amalsb.* 55. t. 382. f. 4.

*Chrysanthemum arborescens æthiopicum*, foliis populi albæ. *Breyn. cent.* 195. t. 76.

*Habitat in Æthiopia.* b.

*polygaloides.* 4. **OSTEOSPERMUM** foliis lanceolatis imbricatis sessilibus. *Roy. lugdb.* 179.

*Monilifera polygalæ* foliis. *Vaill. act.* 1720. p. 374.

*Chrysanthemum fruticosum*, *polygoni* foliis, africanum, caulibus scabris, flore minore. *Pluk. mant.* 47. t. 382.

*Habitat in Æthiopia.* h

## OTHONNA.

\* *Herbaceæ.*

*geifolia.* 1. **OTHONNA** foliis reniformibus suborbiculatis denticulatis petiolatis.

*Solidago* foliis reniformibus suborbiculatis denticulatis.

*Hort. cliff.* 410.

*Jacobæa africana*, *hederæ terrestris* folio, repens. *Comm. mel. hort.* 2. p. 145. t. 73.

*Habitat in Æthiopia.* 2

*bulbosa.* 2. **OTHONNA** foliis ovatis integerrimis, caule herbaceo.

*Jacobææ* affinis planta tuberosa capitis b. *spei. Breyn. cent.* t. 66. *Morif. hist.* 3. p. 111. f. 7. t. 18. f. 33.

*Habitat in Æthiopia.* 2

*sonchifolia.* 3. **OTHONNA** foliis amplexicaulibus sinuatis difformibus.

*Jacobæa*, *sonchi* folio, flore purpureo amplo, africana.

*Breyn. ic.* 31. t. 21. f. 1.

*Habitat in Æthiopia.*

*sibirica.* 4. **OTHONNA** foliis subcordatis, caule subnudo simplicissimo. *Hort. ups.* 273.

*Iacobæastrum cacaliæ* folio. *Amm. ruth.* 221. t. 24.

*Jacobæa orientalis*, *cacaliæ* folio. *Tournef. cor.* 37.

*Jacobæoides ari* folio crenato. *Vaill. act.* 1720. p. 300.

*Solidago* foliis cordatis subrotundis dentatis petiolatis.

*Gmel. sib.* 2. p. 169.

*Habitat in Sibiria.* 2

*palustris.* 5. **OTHONNA** foliis lanceolatis dentato-sinuatis.

*Othonna palustris.* *It. scan.* 241. 95. \*

*Solidago* foliis inferioribus lanceolatis serrato-sinuatis; superioribus integris amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 410.

*Fl. suæc.* 687. *Roy. lugdb.* 162. *Gmel. sib.* 2. p. 158. t. 72.

*Jacobæa aquatica* elatior, foliis magis dissectis. *Morif. hist.* 3. p. 110. f. 7. t. 19. f. 24.

Cony.



SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 925

*Conyza aquatica laciniata. Bauh. pin. 266.*

*Habitat in Europæ paludibus maritimis. 2*

6. OTHONNA foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, integrifolia.  
floribus umbellatis.

*Solidago foliis lanceolatis sessilibus integris denticulatis,  
floribus umbellatis, involucrio setaceo. Gmel. sib. 2.*

*p. 154. t. 71.*

*Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata. Bauh pin. 131. Moris. hist. 3. p. 111. f. 7. t. 12.  
f. 28.*

*Jacobæa pannonica 2. Clus. hist. 2. p. 22.*

*Habitat in Alpibus Pyrenaicis, Helveticis, Austriacis,  
Sibiricis. 2*

7. OTHONNA foliis lanceolatis integris subdentatis vil-  
losis, floribus umbellatis.

*Conyza incana. Bauh. pin. 265.*

*Conyza helenitis mellita incana. Lob. ic. 347. sec. figuram.*

*Habitat in Sibiria. D. Gmelin. Gallia. 2*

*Caulis sesquipedalis, simplicissimus. Folia lanceolata,  
sursum sensim minora, albis villis utrinque subhirsuta,  
margine minimis dentibus notata. Umbella termina-  
lis: pedunculis simplicissimis, unifloris, intermedio  
brevissimo. Corolla lutea. Ex Sibiria.*

8. OTHONNA foliis pinnatifidis subvillosis: laciniis si-  
nuatis, caule herbaceo.

*Jacobæa maritima f. Cineraria latifolia. Bauh. pin. 131.  
prodr. 69.*

*Habitat in Canada.*

*Simillima O. maritima, at Folia non tomentosa, sed  
parum villosa præsertim subtus; Corollæ radius non  
recurvatus, sed patens. Caulis non fruticans. Calyx  
simillimus maritimæ, sed apice parum sphacelatus,  
quod illa non habet.*

\* *Fruticosa.*

9. OTHONNA foliis pinnatifidis tomentosis, laciniis si-  
nuatis, caule fruticoso. *Hort. ups. 273.*

*Solidago foliis pinnatifidis: laciniis sinuatis, corymbis  
racemosis. Hort. cliff. 410.*

*Jacobæa maritima. Bauh. pin. 131.*

*Cineraria. Dod. pempt. 642.*

*Habitat ad Maris inferi littora. 3*

## 926 SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA.

- pectinata.* 10. OTHONNA foliis pinnatifidis: laciniis linearibus parallelis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.  
*Jacobæa africana* frutescens, foliis absinthii umbelliferi incanis. *Comm. hort.* 2. p. 137. t. 69. *Raj. suppl.*
- β. *Jacobæa absinthites*, tomentosis cinerariæ foliis, æthiopica, calice integro summis oris dentato. *Pluk. alm.* 106.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- abrotanifolia* 11. OTHONNA foliis multifido-pinnatis linearibus. *Roy. lugdb.* 380.  
*Jacobæa africana* fruticans, foliis abrotani s. crithmi, major & minor. *Volk. norib.* 225. t. 225. *Raj. suppl.* 179.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- coronopifolia* 12. OTHONNA foliis infimis lanceolatis integerrimis, superioribus sinuato-dentatis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.  
*Jacobæa africana* frutescens, coronopi folio. *Comm. hort.* 2. p. 139. t. 70. *Raj. suppl.* 175.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- cheirifolia.* 13. OTHONNA foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 419. *Roy. lugdb.* 179.  
*Jacobæa africana* frutescens, crassius & succulentis foliis. *Comm. hort.* 2. p. 147. t. 74. *Raj. suppl.* 174.  
 β. *Aster fruticosus africanus* luteus, foliis thymeleæ. *Raj. suppl.* 167.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- dentata.* 14. OTHONNA foliis ovato-cuneiformibus dentatis. *Solidago* foliis oblongis dentatis glabris, floribus magnis umbellatis. *Burm. afr.* 164. t. 59.  
*Jacobæa africana* lutea, folio obtuso dentato. *Herm. afr.* 14.  
*Habitat in Æthiopia.*

## POLYMNIA.

- canadensis.* 1. POLYMNIA. *Gen. nov.* 1181. t. 1. f. 5. \*  
*Habitat in Canada.* *Kalm.* 2

## ERIOCEPHALUS.

- africanus.* 1. ERIOCEPHALUS.  
*Eriocephalus* foliis integris divisisque. *Hort. cliff.* 424. *Roy. lugdb.* 178.  
*Eriocephalus sempervirens*, foliis fasciculatis & digitatis. *Dill. elsb.* 132. t. 110. f. 134.

Abro-

# SYNGENESIA: POLYGAM. NECESSARIA. 927

*Abrotanum africanum*, folio tereti tridentato. *Walsh.*  
*hort.* 1. t. 1.

*Habitat in Æthiopia.* b

## FILAGO.

1. **FILAGO** floribus sessilibus terminalibus, foliis floris *pygmae*.  
 libus majoribus.

*Gnaphalium* caule simplicissimo, foliis superioribus majoribus. *Roy. lugdb.* 147.

*Gnaphalium* (species omnes). *Vaill. art.* 1719. p. 314.

*Gnaphalium roseum hortense.* *Bauh. pin.* 263. *prodr.* 122. *Barr. ic.* 127.

*Habitat in Europa australi.* c

2. **FILAGO** tomentosa, corymbo subramoso, foliis oblongis obtusis crenatis. *maritima.*

*Santolina* corymbo terminali subdiviso, foliis oblongis integerrimis obtusis. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 147.

*Sauv. monsp.* 80.

*Gnaphalium maritimum.* *Bauh. pin.* 263.

*Chrysanthemum* perenne gnaphaloides maritimum. *Morif. bist.* 3. p. 81. f. 6. t. 4. f. 47.

*Habitat in Europæ australis, marisque mediterraneæ littoribus.*

3. v. appenda *prodr. indic. et 119.0.*

## MICROPUS.

1. **MICROPUS.** *Hort. ups.* 275. *Roy. lugdb.* 145. *supinum.*

*Gnaphalium* *supinum*, echinato semine. *Pluk. alm.* 171.

t. 187. f. 6. *Raj. suppl.* 191.

*Pseudo-Gnaphalium* *supinum*, semine echinato. *Morif. bist.* 3. p. 93.

*Habitat in Lusitaniz maritimis.* c: vide add. post ind.

## SPHÆRANTHUS.

1. **SPHÆRANTHUS.** *Roy. lugdb.* 145. *Fl. zeyl.* 312. *indicus.*

*Sphæranthus* purpurea alata ferrata. *Burm. zeyl.* 220. t.

94. f. 3.

*Scabiola indica* major, caule & pediculis foliosis. *Pluk.*

*phyt.* 312. f. 6. t. 108. f. 7. *Raj. suppl.* 235.

*Adaca-maujen.* *Rheed. mal.* 10. p. 85. t. 43. *Raj. suppl.*

241.

*Habitat in India.*

MQ-

## MONOGAMIA.

## SERIPHIMUM.

- cinereum.* 1. SERIPHIMUM floribus racemosis, foliis patentibus.  
 Artemisia floribus simplicibus. *Hort. cliff.* 403. \*  
 Breynia cineroides capensis. *Pet. gaz.* 2. t. 3. f. 9.  
 Tamariscus æthiopicus, coridis folio glabro, herbæ im-  
 piæ capitulis in spicam sessilibus. *Pluk. mant.* 178.  
 t. 297. f. 1.  
 Frutex cinereus muscosus, herbæ impiæ capitulis in spi-  
 cam sessilibus. *Pluk. alm.* 159. *mant.* 85.  
*Habitat in Æthiopia.* b
- plumosum.* 2. SERIPHIMUM floribus spicatis, foliis linearibus.  
 Stœbe floribus spicatis, calycibus unifloris. *Roy. lugdb.*  
 145.  
 Breynia capensis, capitulis albis plumosis. *Pet. gaz.* 9.  
 t. 5. f. 4.  
*Habitat in Æthiopia.* b
- fuscum.* 3. SERIPHIMUM floribus capitatis, foliis imbricatis.  
 Eupatorium ericoides capitis bonæ spei. *Breyn. cent.* 1.  
 69. *Morif. hist.* 3. p. 97 f. 7. t. 18. f. 10.  
 Abrotanoides capensis, ericæ folio. *Pet. gaz.* 9. t. 5.  
 f. 2.  
*Habitat in Æthiopia.* b  
*Habitus Erica magnitudine, foliis, flosculis. Fruticulus*  
*Ramis lignosis, teretibus, inequalibus. Folia acerosa,*  
*brevissima, filiformia, conserta, imbricata, tomentosa.*  
*Capitula florum terminalia, globosa ex pluribus, ses-*  
*silia. Calyces glabri, nigricantes.*

## CORYMBIUM.

- africanum.* 1. CORYMBIUM. *Hort. cliff.* 494.  
 Corymbium foliis ad radicem longissimis liratis. *Burm*  
*afr.* 189. t. 70. f. 1.  
 Bupleurifolia, semine papposo, valerianoides umbellata  
 cauliculo scabro. *Pluk. alm.* 73. t. 272. f. 5.  
 Bupleuri similis planta æthiopica, ad caulium nodos to-  
 mentosa. *Pluk. alm.* 73. t. 272. f. 4.  
*Habitat in Æthiopia.* 2

## JASIONE.

- montana.* 1. JASIONE.

Jasior

*Jasione* foliis linearilanceolatis obsolete ferratis. *Hort. cliff.* 426. *Fl. suec.* 713. *Roy. lugdb.* 191. *Hall. belv.* 496. *Dalib. parif.* 268.

*Rapunculus* scabiosæ capitulo cæruleo. *Bauh. pin.* 92.

*Rapuntium* montanum capitatum leptophyllum. *Col. ecphr.* 1 p. 226. t. 227.

*Aphyllanthes.* *Dalech. hist.* 864.

*Habitat in Europæ collibus siccissimis.* ☉

## LOBELIA.

\* *Foliis integerrimis.*

1. LOBELIA frutescens, foliis ovali-oblongis integer-plumierii. *rimis.* *Fl. zeyl.* 313.

*Lobelia* frutescens, portulacæ folio. *Plum. gen.* 21.

*Catesb. car.* 1. p. 79. t. 79.

*Habitat in Indiis.* ☿

*Racemus dichotomus, bracteis subulatis, oppositis, interne ad basin villosis. Fructus bilocularis.*

2. LOBELIA fruticosa, foliis linearibus confertis integer-pinifolia. *gerrimis.* *Roy. lugdb.* 241.

*Rapunculus* æthiopicus, violaceo galeato flore, foliis pinastri. *Breyn. cent.* 173. t. 87.

*Rapunculus* fruticosus, foliis nervosis acutis, floribus in ramulorum summo. *Burm. afr.* 111. t. 41. f. 2.

*Rapunculus* flore cæruleo galericulato, rosmarini folio angustiore. *Raj. suppl.* 384.

*Rapuntium* æthiopicum, violaceo galeato flore, foliis pinastri. *Raj. suppl.* 385.

*Habitat in Æthiopia.* ☿

3. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, *Dortmanna:* caule subnudo. *Fl. suec.* 714.

*Lobelia* foliis bilocularibus subulatis. *Fl. lapp.* 279.

*Hort. cliff.* 426.

*Dortmanna* lacustris, floribus sparsis pendulis. *Rudb.*

*act. nps.* 1720. p. 97. t. 2. \*

*Gladiolus* stagnalis f. lacustris. *Rudb. elys.* 2. p. 202. f. 15.

*Gladiolus* stagnalis dortmanni. *Clus. car.* 40. *Raj. hist.* 1911. \*

*Habitat in Europæ frigidissimæ lacubus & ripis.* 2

4. LOBELIA foliis lanceolatis integerrimis, racemo spicato. *Trapa.*

Rapuntium spicatum, foliis auritis, vulgo *Trapa*. *Few.*  
*peruv.* 2. p. 739. t. 29.  
*Habitat in Peru.*

*kalmii.*

5. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolato-linearibus obtusiusculis alternis integerrimis, racemo terminali. Rapuntium canadense pumilum, linearis folio. *Tournef. inst.* 164.

*Habitat in Canada. Kalm.* ☉

Planta pedalis, Caule tereti, vix ramoso. Folia linearilanceolata inferne, superne linearia, integerrima, obtusiuscula, nuda, sessilia. Racemus terminalis, latus, Pedunculis alternis, unifloris, ex alis supremorum foliorum, foliolo instructis. Flores caerulei.

*paniculata.*

6. LOBELIA foliis linearibus integerrimis, panicula dichotoma.

Rapuntium, foliis linearibus acutis, floribus gemellis, polyanthos. *Burm. afr.* 106. t. 38. f. 3.

*Habitat in Æthiopia.*

*cornuta.*

7. LOBELIA foliis ovatis petiolatis, staminibus florum longissimis.

*Habitat in Cayenna.*

Plantam apud D. Royennum vidi, utrum Folia integerrima e memoria excidit.

\* Caule erecto, foliis incis.

*Phytanma.*

8. LOBELIA foliis ovatis crenatis, caule subnudo, antheris hirsutis distinctis.

*Habitat in Æthiopia.*

*longiflora.*

9. LOBELIA foliis lanceolatis dentatis, pedunculis brevissimis lateralibus, tubo corollae filiformi longissimo. *Roy. lugdb.* 241.

Rapunculus aquaticus, foliis cichorei, flore albo: tubo longissimo. *Sloan. jam.* 58. *hist.* 1. p. 158. t. 101. f. 2. *Raj. suppl.* 383.

*Habitat in Jamaica ad ripas.*

*Cardinalis.*

10. LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis serratis, spica terminali. *Hort. cliff.* 426. *Hort. ups.* 276. *Roy. lugdb.* 241. *Gron. virg.* 107.

Rapuntium galeatum virginianum, coccineo flore majore. *Morif. hist.* 2. p. 466. f. 5. t. 5. f. 54.

Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. *Herm. mex.* 879. t. 880.

*Habitat in Virginia. &*

11. LO.

11. LOBELIA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis *siphilitica* crenatis, calycum sinibus reflexis. *Hort. cliff.* 426. \*  
*Roy. lugdb.* 241.  
 Rapunculus galeatus virginianus, flore violaceo majore.  
*Morif. hist.* 2. p. 466. f. 5. t. 5. f. 55.  
 Trachelium americanum, flore cæruleo. *Lob. ic.*  
*Habitat in Virginia*
12. LOBELIA caule erecto, foliis ovatis subserratis *per inflatæ* pedunculo longioribus, capsulis inflatis. *Hort. upf.* 276.  
*Act. upf.* 1741. p. 23. t. 1.  
 Lobelia caule erecto brachiato, foliis ovato-lanceolatis obsolete incis, capsulis inflatis. *Hort. cliff.* 500. *Roy. lugdb.* 528.  
*Habitat in Virginia, Canada.* ☉
13. LOBELIA caule erecto, foliis cordatis obsolete den- *cliffortiana*, tatis petiolatis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 426. t. 26. \* *Gron. virg.* 107.  
 Rapuntium trachelii folio, flore purpurascens. *Plam. spec.* 5.  
*Habitat in Virginia. Canada.* ☉  
 \* *Caule prostrato, foliis incis.*
14. LOBELIA caule erecto, foliis inferioribus subrotun- *urem*, dis crenatis, superioribus lanceolatis serratis, floribus racemosis.  
 Lobelia foliis oblongo-ovatis, floribus laxè spicatis.  
*Gvett. stamp.* 1. p. 35. *Dalib. paris.* 268.  
 Rapunculus galeatus blesensis s. solonienſis, flore violaceo minore. *Morif. hist.* 2. p. 407. f. 5. t. 5. f. 56.  
 Rapuntium urens solonienſe. *Morif. bles.* 300. *Bocc. sic.* 20. t. 11. *Raj. hist.* 746.  
 Draba flore cæruleo galeato. *Bank. prodr.* 53. pin. 110  
*Habitat in Gallia.* ☉
15. LOBELIA caule prostrato, foliis lanceolatis ovalibus *Laurentia*, crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis.  
 Laurentia annua minima, flore cæruleo. *Mich. gen.* 18. t. 14.  
 Rapunculus aquaticus repens, flore cæruleo inapeto.  
*Raj. suppl.* 383. *Bocc. mſ.* 35. t. 27.  
*Habitat in Italia.* ☉

- Erinus.* 16. LOBELIA caule patulo, foliis lanceolatis subdentatis, caule erecto ramoso, pedunculis longissimis. Campanula minor africana, erini facie, flore violaceo, caulibus erectis. *Herm. lugdb.* 110. t. 111.  
*Habitat in Æthiopia.* ☉  
Caulis *spithameus*, filiformis, inferne ramosus. Folia radicalia ovalia,, caulina lanceolata, omnia glabra, subdentata. Pedunculi axillares, nudi, foliis triplo longiores, uniflori. Corollæ cæruleæ.
- erinoïdes.* 17. LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateralibus. *Hort. cliff.* 426. Campanula minor africana, erini facie, caulibus procumbentibus. *Herm. lugdb.* 108. t. 109.  
*Habitat in Æthiopia.* ☉
- ceylanica.* 18. LOBELIA caule repente, foliis ovatis ferratis: inferioribus obtusis, superioribus acutis, pedunculis unifloris, capsulisque subvillosis. Campanula ceylanica, senecionis folio, flore purpureo. *Seb. thes.* 1. p. 37. t. 22. f. 12?  
*Habitat in China.* *Osbeck.*  
Planta parva, facie *Veronica chamædryos*. Caulis repens. Folia alterna, ovata, petiolata, fere glabra: inferiora obtusa crenata; superiora acuta, argute serrata. Pedunculi axillares, subsolitarii, folio longiores, uniflori, pubescentes. Calyx subvillosus.
- hirta.* 19. LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis ovatis subserratis, pedunculis solitariis glabris longioribus, germinibus hirsutis.  
*Habitat in Æthiopia.*  
Caules procumbentes. Folia ovata, glabra, obtuse serrata, remota, petiolata. Ex alis singulis Ramulus & Pedunculus capillaris, longus, Germine piloso.
- lutea,* 20. LOBELIA caulibus procumbentibus, foliis lanceolatis ferratis, floribus sessilibus subspicatis. Rapuntium foliis oblongis dentatis, flore luteo spicato, flagellis procumbentibus. *Burm. afr.* 101. t. 39. f. 1. Rapunculus africanus ramosus, foliis dentatis, floribus gladioli lacustris. *Herm. afr.* 18. *Raj. suppl.* 248.  
*Habitat in Æthiopia.*
- hirsuta.* 21. LOBELIA foliis ovalibus erenatis lanatis, floribus lateralibus solitariis.  
Rapuntium foliis subrotundis hirtis, flore ex alis solitario. *Burm. afr.* 105. t. 40. f. 2. Ra



*Rapuntium africanum galeatum*, foliis oblongo-rotundis dentatis villosis. *Raj. suppl.* 385.

*Rapunculus galeatus æthiopicus cæruleus*, hirsutis & subrotundis crenatis foliis. *Pluk. alm.* 316.

*Habitat in Æthiopia.*

22. *LOBELIA* foliis lanceolatis dentatis, pedunculis *coronopifolia* longissimis.

*Rapuntium folio longo profunde dentato*, florum petalis longissimis. *Burm. afr.* 98. t. 38. f. 1.

*Rapuntium æthiopicum*, flore cæruleo galeato, foliis coronopi. *Herm. afr.* 18. *Breyn. cent.* t. 88.

*Habitat in Æthiopia.* 2.

23. *LOBELIA* foliis linearibus dentatis, spica terminali *comosa* foliosa. *Hort. cliff.* 500.

*Habitat in Æthiopia.* ☉

24. *LOBELIA* caulibus erectis, foliis ovatis dentatis. *Cheiranthus*

*Cheiranthus africana*, flore luteo. *Comm. hort.* 2. p.

83. t. 42.

*Habitat in Africa.*

25. *LOBELIA* foliis inferioribus pedatis. *bulbosa.*

*Rapuntium tuberosum*, foliis multifidis, floribus spicatis. *Burm. afr.* 99. t. 38. f. 2.

*Habitat in Æthiopia.*

## VIOLA.

### \* *Acaules.*

1. *VIOLA* acaulis, foliis palmatis quinquelobis dentatis *palmata* indivisisque.

*Viola foliis palmatis sinuatis*, stolonum reniformibus.

*Gron. virg.* 182.

*Viola virginiana*, platani fere foliis parvis & incanis.

*Pluk. mant.* 187.

*Viola alba*, folio securis romanæ effigie, floridana. *Pluk.*

*amalt.* 209. t. 447. f. 1.

*Habitat in Virginia.* 2.

2. *VIOLA* acaulis, foliis pedatis septempartitis. *pedata.*

*Viola foliis palmatis.* *Gron. virg.* 107.

*Viola virginiana tricolor*, foliis multifidis, cauliculo aphylo. *Pluk. alm.* 388. t. 114. f. 7.

*Viola mariana*, folio digitato. *Pet. ficc.* 20.

*Habitat in Virginia.* 2.

N n n 3

3. VIO-

*pinnata.* 3. *VIOLA* acaulis, foliis pinnatifidis.  
*Viola alpina*, folio in plures partes dissecto. *Bauh. pin.* 199.  
*Viola montana*, folio multifido. *Bauh. hist.* 3. p. 544.  
*Habitat in Sibiria & Alpibus Europæ.*

*lanceolata.* 4. *VIOLA* acaulis, foliis lanceolatis crenatis.  
*Viola acadensis*, folio longo sinuata. *Dierv.*  
*Habitat in Canada, Sibiria.*  
*Planta Canadensis a D. Kalin. allata.* Folia habuit angusta, longe petiolata, nervis alternis, parallelis, obsolete serrata; Sibirica a D. Gmelino: Folia habuit ovato-lanceolata, petiolis folio dimidio brevioribus, minus striata & Flores majores.

*primulifolia* 5. *VIOLA* acaulis, foliis oblongis subcordatis: petiolis membranaceis.  
*Viola acaulis*, foliis ovatis crenatis glabris. *Gron. virg.* 182.  
*Habitat in Sibiria, Virginia.*  
Folia cordata, oblonga, obtusissima, crenata, basi decurrentia per petiolum, aemulo ut in *Primula officinali*.

*hirta.* 6. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis piloso-hispidis. *Fl. succ.* 718. *Dalib. parif.* 269.  
*Viola martia* hirsuta inodora. *Morif. hist.* 2. p. 475. f. 5. t. 35. f. 4.  
*Viola trachelii* folio. *Raj. hist.* 1051.  
*Viola.* *Brunff. herb.* 1. p. 137. f. 3.  
*Habitat in Europæ frigidioris nemoribus.* 2

*palustris.* 7. *VIOLA* acaulis, foliis reniformibus. *Hall. belv.* 501.  
*Fl. succ.* 717. *Dalib. parif.* 270.  
*Viola* foliis subrotundo-cordatis; pedunculis radicalibus.  
*Fl. lapp.* 278.  
*Viola palustris* rotundifolia glabra. *Morif. hist.* 2. p. 475. f. 5. t. 35. f. 5.  
*Habitat in Europæ frigidioris paludibus.* 2

*odorata.* 8. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus.  
*Viola acaulis*, stolonibus teretibus repantibus, pedunculis radicalibus. *Hort. cliff.* 427. *Fl. succ.* 719. *Mat. med.* 410. *Dalib. parif.* 268.  
*Viola martia* purpurea, flore simplici odoro. *Bauh. pin.* 119.  
*Viola odorata.* *Reuchm. spec.* 141. t. 140.  
*Viola nigra* s. purpurea. *Dod. pempt.* 156. t. 1. 2.  
β. *Viola martia* alba. *Bauh. pin.* 199.  
γ. *Viola martia*, multiplici flore. *Bauh. pin.* 199.  
*Habitat in Europæ nemoribus.* 2

\* Can-

\* *Caulescentes.*

9. VIOLA caule demum adscendente, foliis oblongo-*canina*-cordatis.  
*Viola* caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis.  
*Hort. cliff.* 427. *Fl. suec.* 716. *Roy. lugdb.* 430. *Gron. virg.* 182. *Hall. belv.* 501. *Dalib. paris.* 269.  
*Viola* foliis cordatis oblongis, pedunculis subradicatis.  
*Fl. lapp.* 277.  
*Viola* martia inodora sylvestris. *Baub. pin.* 199.  
*Viola* cærulea martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens. *Baub. hist.* 3. p. 543.  
*Habitat in Europæ apricis.* 2
10. VIOLA caulibus erectis, foliis cordatis oblongis. *montana*.  
*Viola* foliis ovato-lanceolatis, caule erecto, stipulis dentatis. *Roy. lugdb.* 430. *Dalib. paris.* 269.  
*Viola* martia arborescens purpurea. *Baub. pin.* 199.  
*Viola* erecta, flore cæruleo & albo. *Morif. hist.* 2. p. 475. f. 5. t. 7. f. 7.  
*Viola* arborescens, *Cam. epit.* 911.  
*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Baldo.* 2
11. VIOLA caule fruticoso foliis lanceolatis integerrimis. *arborescens*.  
*Viola* hispanica fruticosa longifolia. *Tournef. inst.* 421.  
*Viola* hispanica fruticans. *Barr. ic.* 568.  
*Habitat in Hispania.* 5
12. VIOLA caule abbreviato, florum nectario subulato *calcarata*.  
petalis longiore, foliis subovatis.  
*Viola* alpina purpurea, exiguis foliis. *Baub. pin.* 199.  
*Viola* montana cærulea grandiflora. *Tournef. inst.* 420.  
*Melanium montanum.* *Dalech. hist.* 1204.
- β. VIOLA pyrenaica longius caudata, teucris follo. *Tournef. inst.* 421.  
*Viola* pyrenaica, folio teucris, serotina. *Tournef. schol.* 131. *Raj. suppl.* 510.  
*Habitat in Pyrenæis.*  
*Quæ demit natura ex herba V. tricolore, adjecit floribus in hac planta.*
13. VIOLA caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisi-*tricolor*-cis, stipulis dentatis. *Fl. suec.* 721. *Dalib. paris.* 269.  
*Viola* pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 527.

*Viola bicolor arvensis. Bauh. pin. 200.*

*Trinitatis herba. Fuchf. hist. 803.*

*Jacea altera. Cam epit. 913.*

β. *Viola tricolor hortensis repens. Bauh. pin. 199.*

*Viola tricolor. Renealm. spec. 144. t. 140.*

*Jacea f. Flos trinitatis. Cam. epit. 912.*

*Habitat in Europæ cultis. ☉*

*canadensis.* 14. *VIOLA* caule erecto, foliis cordatis acuminatis.

*Viola caulescens, foliis cordatis oblongis acuminatis. Amæn. acad. 1. p. 157. \**

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Caulis erectus, spithameus, teretiusculus. Folia alterna, reniformi-cordata, acuminata, serrata, levia, subtus pallida, petiolis folio dimidio brevioribus, in summis adhuc minoribus. Stipulæ binæ, erectæ, lanceolatae, marcescentes. Pedunculi ex singulis alis solitarii, nudi, longitudine foliorum. Flores corollati. Differt a sequenti Foliis magis mucronatis & Floribus caulinis corollatis, Caulibus firmioribus majoribus.*

*mirabilis.* 15. *VIOLA* caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis.

*Viola floribus radicalibus corollatis abortientibus, caulinis apetalis seminiferis. Hort. cliff. 427. It. æl. 81. \* Fl. succ. 719.*

*Viola montana latifolia, flores e radice, semina in cacumine ferens. Dill. elth. 408. t. 303. f. 390.*

*Habitat in Germaniæ, Sueciæ nemoribus. ♀*

*biflora.* 16. *VIOLA* caule biflora, foliis reniformibus serratis.

*Viola foliis reniformibus, pedunculis caulinis. Fl. lapp. 276. Fl. succ. 720. Hort. cliff. 427. Roy. lugdb. 431.*

*Viola alpina rotundifolia lutea. Bauh. pin. 199.*

*Viola rotundifolia montana major. Pluk. alm. 388. t. 234. f. 1.*

*Viola alpina rotundifolia minor lutea. Pluk. alm. 388. t. 233. f. 7.*

*Habitat in Alpinis Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ, Angliæ. ♀*

*uniflora.* 17. *VIOLA* caule uniflora, foliis cordatis dentatis.

*Habitat in Sibiria. ♀*

*Caulis vix spithameus, nudus, firmus, apice ferens Folia tria, subalterna, cordata, dentata, subvillosa, petiolis*

*tiolis brevissimis insidentia. Flos unicus, pedunculo brevissimo, luteus, foliis major.*

18. VIOLA caule basi ramosissimo, foliis lanceolato-linneaesperma nearibus integerrimis distantibus, calycibus pone æqualibus. *Fl. zeyl.* 317. \*

Herba indica, flore monopetalo labiato, capsula e rotundo trilaterali octosperma. *Raj. suppl.* 402.

Nelam-parenda *Rheed. mal.* 9. p. 117. t. 60.

*Habitat in India.* 4

19. VIOLA caule procumbente, foliis lanceolatis sub-suffruticosa. ferratis confertis, calycibus pone æqualibus. *Fl. zeyl.* 318. \*

*Habitat in India.* 5

### IMPATIENS.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. IMPATIENS pedunculis unifloris solitariis, foliis chinensis. oppositis ovatis, nectariis arcuatis.

*Habitat in China.* ☉

Caulis alternatim ramosus, ruber. Folia opposita, sessilia, ovata, subserrata. Pedunculi axillares, solitarii, folio longiores, uniflori. Flos purpureus. Nectarium valde arcuatum, crassum.

2. IMPATIENS pedunculis unifloris solitariis, foliis ovalifolia. vatis; ferraturis lanceolatis, nectariis flore longioribus.

Valli-onapu. *Rheed. mal.* 9. p. 91. t. 48.

*Habitat in India.* ☉

Folia lanceolata, alterna, crenata, e singula crena mucrone prominente. Pedunculi solitarii, uniflori, longitudine fere foliorum. Flos magnitudine f. Balsamina, at Calcar subulatum, longitudine fere pedunculi.

3. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis oppositifolia. oppositis linearibus. *Fl. zeyl.* 314. \*

Kondam-pallu. *Rheed. mal.* 9. p. 57. t. 31?

*Habitat in Zeylonæ arenosis.*

4. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis cornuta. lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Fl. zeyl.* 316. \*

Balsamina latifolia, floris calcari longissimo. *Burm.* zeyl. 41. t. 16. f. 1.

*Habitat in Zeylona.* ☉

*Balsamina.* 5. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus. *Hort. ups.* 276. Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Hort. cliff.* 428.

Balsamina femina. *Bauh. pin.* 306.

Balsamina. *Dod. pempt.* 671.

*Habitat in India.* ☉

\* *Pedunculis multifloris.*

*triflora.* 6. IMPATIENS pedunculis trifloris solitariis, foliis angusto-lanceolatis, *Fl. zeyl.* 315.\*

Balsamina angustifolia, floribus ternis communi pedunculo ortis. *Burm. zeyl.* 41. t. 16. f. 2.

Balsamina erecta s. femina, persicæ angusto folio, zeylanica. *Herm. par.* 105. t. 105.

*Habitat in Zeylonæ paludosis.*

*noli tangere.* 7. IMPATIENS pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Fl. succ.* 722. *Dalib. paris* 270.

Impatiens pedunculis solitariis multifloris. *Hort. cliff.* 428. *Roy. lugdb.* 431. *Hall. helv.* 405. caule angulato. *Gort. gelr.* 502.

Balsamina lutea s. Noli me tangere. *Bauh. pin.* 306.

Noli me tangere. *Col. ecphr.* 1, p. 149. t. 150.

*Habitat in Europæ, Canadæ nemoribus.* ☉

## Classis XX.

## GYNANDRIA.

## DIANDRIA.

## ORCHIS.

*Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii alis amplioribus ciliatis. *Suffruct.*  
*Orchis amboinensis, floribus albis fimbriatis. Herm. parad. 209. t. 209.*  
*Habitat in Amboina.*
2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato ciliato; cornu longissimo. *Act. upf. 1741. p. 6.*  
*Orchis nectarii labio lanceolato ciliato, seta germine in- torto longiore. Ray. lugdb. 15. Gron. virg. 183.*  
*Orchis palmata elegans lutea americana, cum longis calcaribus luteis. Moris. hist. 3. p. 499.*  
*Orchis marilandica grandis & procera, floribus luteis, calcaribus longissimis; lobulo fimbriato. Ray. suppl. 588.*  
*Habitat in Virginia, Canada. &*
3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato bifolio, integerrimo; cornu longissimo petalis patentibus. *Act. upf. 1740. p. 5. Fl. suec. 723. Dalib. parif. 273. Mat. med. 411.*  
*Orchis alba bifolia minor, calcaribus oblongo. Baub. pin. 83. Vaill. parif. 151. t. 30. f. 7. Segn. ver. t. 15. f. 10.*  
*Testiculi species V. Cam. epit. 625.*
- β. *Orchis trifolia minor. Baub. pin. 83.*
- γ. *Orchis bifolia altera. Baub. pin. 82.*  
*Orchis bifolia latissima, Baub. pin. 82.*  
*Habitat in Europæ pascuis asperis. &*
4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido, petalis confluentibus, caule nudo.  
*Orchis radice rotunda, cucullo tridentato: Gmel. fib. 1. p. 16. t. 3. f. 2.*  
*Habitat in Sibiria. &*  
*Folia radicalia ovata, bina.*

r. OR-

- pyramidalis*. 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido antice bidentato: cornu longo, petalis acuminatis. *Aët. upf.* 1740. p. 7. *Dalib. paris.* 273.  
 Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. *Hort. cliff.* 429.  
 Orchis spica densa brevi; petalis caudatis. *Hall. it. belv.* 46. 9. 3j.  
 Orchis purpurea, spica congesta pyramidalis. *Raj. angl.* 3. p. 377. t. 48. *Segu. ver. t. 15. f. 11.*  
 Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata *Bauh. pin.* 81. *prodr.* 28.  
 6. Orchis globofo flore. *Bauh. pin.* 81.  
 7. Orchis latifolia, hiantе cucullo, altera. *Bauh. pin.* 81.  
 8. Cynosorchis latifolia, spica compacta. *Bauh. pin.* 81.  
*Habitat in Helvetiæ, Belgii, Angliæ, Galliæ arenosis, cretaceis, &*
- coriophora*. 6. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Aët. upf.* 1740. p. 8. *Dalib. paris.* 272.  
 Orchis bulbis indivisis, labello trifido punctato: lacinula media longiore, cornu germinibus breviorе. *Sauv. monsp.* 23.  
 Orchis odore hirci minor *Bauh. pin.* 82. *Vaill. paris.* 149. t. 31. f. 30. 31. 32. *Hall. it. herc.* 7.  
 Tragorchis minor, flore fuliginoso. *Raj. hist.* 1213.  
 Tragorchis minor & verior gemmæ. *Lob. ic.* 177.  
 6. Orchis odore hirci minor, spica purpurascente. *Bauh. pin.* 82.  
*Habitat in Europæ australioris pascuis. &*
- cubitalis*. 7. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido filiformi: intermedia ovata: cornu germinibus breviorе. *Fl. zeyl.* 320. \*  
*Habitat in Zeylona. &*
- morio*. 8. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso. *Aët. upf.* 1740. p. 8. *Mat. med.* 412. *Fl. suec.* 724. *Dalib. paris.* 273.  
 Orchis radicibus subrotundis, nectarii labio quadrifido æquali crenulato: cornu obtuso. *Roy. lugdb.* 15.  
 Orchis morio femina. *Bauh. pin.* 82. *Vaill. paris.* t. 31. f. 13. 14. *Segu. ver. t. 15. f. 7.*  
 Triorchis serapias mas. *Fuchs. hist.* 559.  
*angustifolius*. 6. Orchis angustifolia. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. paris.* t. 31. f. 33. 34.  
 7. Or-



- γ. *Orchis papilionem referens angustifolia alba. Baub. pin.*  
84.
- δ. *Orchis morio mas, foliis maculatis. Baub. pin. 81. masculus.*  
*Testiculis IV. Cam. epit. 624.*
- ε. *Orchis foliis sessilibus non maculatis. Baub. pin. 82.*  
*Habitat in Europæ nemoribus. 2*  
α. *Labium æquale, calcar emarginatum, galea con-*  
*nivens obtusa.*  
β. γ. *Labium medio brevius, calcar obtusum, galea*  
*alis reflexis obtusis.*  
δ. ε. *Labium æquale, calcar integrum, galea alis*  
*reflexis acutis.*
9. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Act. upf.*  
1741. p. 11. *Fl. suec. 726. It. xl. 45. \* Dalib. parif.*  
272.  
*Orchis militaris præteritis humilior. T. Vaill. parif. 149.*  
*t. 31. f. 35. 36. Segn. ver. 2. 15. f. 4.*  
*Orchis pannonica IV. Clus. hist. 1. p. 268.*  
*Cynosorchis militaris præteritis humilior. Baub. pin. 81.*  
*Habitat in Europæ temperatæ pratis. 2*
10. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. *Act. upf. 1740. p. 11. Fl. suec. 725. It. xl. 45. \* Dalib. parif. 271.*  
*Orchis galea & alis cinereis. Baub. hist. 2. p. 755.*  
*Orchis mas latifolia. Fuchs. hist. 554.*  
*Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. Baub. pin. 80.*  
β. *Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante.*  
*I. B. Raj. angl. 3. p. 378. t. 19. f. 2.*  
γ. *Orchis latifolia, hiante cucullo, minor. T. Vaill. parif. 2. 31. f. 22. 23. 24.*  
*Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. Baub. pin. 81.*  
δ. *Orchis militaris major. Tournef. inst. 438. t. 247.*  
*Vaill. parif. 148. t. 31. f. 21. 27. 28.*  
*Cynosorchis militaris major. Baub. pin. 81.*  
*Habitat in Europæ temperatæ pratis. 2*  
\* *Bulbis palmatis.*
11. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Act. upf. 1740. p. 15. Fl. suec. 728. It. xl. 48. \* Dalib. parif. 274.* Or-

*Orchis radicebus palmatis, bracteis flore longioribus, nectararii labio trifido, cornu geminibus brevioribus. Hort-cliff. 429.*

*Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus. Bauh. pin. 85. Vaill. parif. t. 31. f. 1. 2. 3. 4. 5.*

*β. Orchis palmata palustris latifolia. Bauh. pin. 86.*

*γ. Orchis palmata montana altera. Bauh. pin. 86.*

*δ. Orchis palmata sambuci odore. Bauh. pin. 86.*

*ε. Orchis palmata palustris maculata. Bauh. pin. 86.*

*Habitat in Europæ pratis. 2*

*Petala 2 lateralibus sursum flexa; tria vero conniventia. Nectararii labium lateribus reflexum.*

*maculata.* 12. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectararii cornu germinibus brevioribus: labio plano, petalis dorsalibus erectis. *Act. xps. 1740. p. 14. Fl. succ. 729. Is. vol. 48. \* Dalib. parif. 274.*

*Orchis palmata pratensis maculata. Bauh. pin. 85.*

*Orchis palmata montana maculata. Bauh. pin. 86. Vaill. parif. t. 31. f. 9. 10.*

*Satyrium basilicum femina. Dod. pempt. 240.*

*Habitat in Europæ pratis succulentis. 2*

*Petala 3 exteriora erecta; 2 interiora conniventia. Nectararii labium trifidum, planum: lobis lateralibus majoribus crenatis: intermedio angustissimo, integerrimo.*

*conopsea.* 13. ORCHIS bulbis palmatis, nectararii cornu setaceo germinibus longiore: labio crenato. *Act. xps. 1740. p. 13. Fl. succ. 727. \* Dalib. parif. 275.*

*Orchis radicebus palmatis, bracteis longitudine floris, nectararii labio trifido, seta germinibus longiore. Hort-cliff. 429.*

*Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. Bauh. pin. 85. Vaill. parif. t. 30. f. 8. 8.*

*Satyrium basilicum mas. Fuchs. hist. 712.*

*β. Orchis palmata angustifolia minor. Bauh. pin. 85.*

*γ. Orchis palmata pratensis maxima. Bauh. pin. 85.*

*Habitat in Europæ pratis montosis. 2*

*flava.* 14. ORCHIS bulbis palmatis, nectararii cornu filiformi longitudine germinis, labio trifido integerrimo. *Gron. virg. 183.*

*Habitat in Virginia. 2*

*Folia inferiora palmaria, lanceolata, magna. Spica angusta; Flores obsolete latei.*

\* Bul-

\* *Bulbis fasciculatis.*

15. ORCHIS bulbis fasciculatis, nectarii cornu longitu- *suscens,*  
dine germinis, labio ovato basi dentato.  
Orchis radicibus multis, labello quasi alato, calcare ger-  
minis longitudine. *Gmel. fib. 1. p. 20. t. 4. f. 2.*  
*Habitat in Sibiria. 2*
16. ORCHIS bulbis fasciculatis, nectarii labio bilobo inte- *stratum*  
gerrimo, cornu longitudine germinis. *Fl. zeyl. 319. ca.*  
*Habitat in Zeylona. 2*
17. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio *abortiva,*  
ovato integerrimo. *Act. upf. 1740. p. 17. Dalib.*  
*parif. 275.*  
Orchis radicibus cylindricis, bracteis flore brevioribus,  
labello trifido obtuso, seta germinibus brevior. *Sauv.*  
*monsp. 23.*  
Orchis abortiva violacea. *Bauh. pin. 86.*  
PseudoLimodorum. *Clus. hist. 1. p. 279.*  
*Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia, Italia. 2*
18. ORCHIS nectarii cornu setaceo longitudine germinis: *psycoder.*  
labio tripartito ciliari.  
Orchis marilandica, spica brevi conferta, floribus parvis:  
calcaribus longissimis. *Raj. supp. 582.*  
Orchis floribus aureis, spica habitiore congestis, bracteis  
longitudinis floris, labio inferiore nectarii fimbriato ca-  
pillaceo. *Gron. virg. 184*  
*Habitat in Canada. Kalm.*  
Habitus *Orchidis maculatae*. Caulis foliis linearibus, a-  
cuminatis, sparsis. Spica longa, densa. Corollae petala  
5, conniventia: quorum tria exteriora ovata: duo  
interiora oblonga, subciliata. Labium reflexum, tripar-  
titum: laciniis basi angustissimis, cuneiformibus, a-  
pice ciliatis.
19. ORCHIS nectarii cornu longitudine germinis, labio *specabilis,*  
ovali emarginato, caule aphylo, foliis ovalibus.  
Orchis flore pulcherrimo magno specioso, nectarii ga-  
lea saturate caerulea, calcari niveo, foliis amplis ob-  
longo-ovatis saturate viridibus. *Clayt.*  
Orchis foliis inferioribus ovatis: superioribus ovato-ob-  
longis, floribus ex alis superioribus. *Gron. virg. 109.*  
*Habitat in Virginia. D. Gronovius.*  
Folia radicalia bina, ovalia, petiolata, obtusa, longitudi-  
ne fere plantae. Caulis nudus. Spica ex. 5 f. 6. flo-  
ribus. Bractee lanceolato-ovales, longitudine germi-  
nis.

*nis. Florum petala 2 exteriora patula, viridia; 3 conniventia teneriora. Labium ovale, emarginatum: apicibus divaricatis.*

## SATYRIUM.

*hircinum.*

1. SATYRIUM bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia lineari obliqua præmorsa. *Act. upf. 1740. t. 18. Dalib. parif. 275.*  
*Orchis barbata fœtida. Baub. hist. 2. p. 756. Vaill. parif. t. 30. f. 6. Segn. ver. t. 15. f. 1.*  
*Orchis barbata, odore hirci, brevior latioreque folio. Baub. pin. 20. Moris. hist. 3. p. 491. f. 12. t. 12. f. 9.*  
*Habitat in Galliæ, Cantii campestribus. 2*

*viride.*

2. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis: nectarii labio lineari trifido: intermedia obsoleta. *Act. upf. 1740 p. 18. Fl. succ. 730. Dalib. parif. 276.*  
*Satyrium foliis oblongis caulinis. Fl. lapp. 313.*  
*Orchis palmata, flore viridi. Baub. pin. 86. prodr. 30.*  
*Orchis palmata, flore galericulato dilute viridi. Læf. pruss. 182. t. 56. f. 6.*  
  - β. *Orchis palmata batrachites. Baub. pin. 86. Vaill. parif. 153. t. 31. f. 6. 7. 8.*  
*Habitat in Europæ frigidioris asperis. 2*

*nigrum.*

3. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio resupinato trilobo: intermedia majore. *Act. upf. 1740. p. 19. Fl. succ. 731.*  
*Satyrium foliis linearibus. Roy. prodr. 14.*  
*Orchis palmata angustifolia alpina, nigro flore. Baub. pin. 86.*  
*Palma christi minor. Cam. epit. 627.*  
*Palmata angustifolia, flore supinato, calcare brevissimo. Hall it. helv. 47.*  
*Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis. 2*

*albidum.*

4. SATYRIUM bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto: intermedia majore. *Act. upf. 1740. p. 19. Fl. succ. 733.*  
*Satyrium scanense. It. scan. 153. \**  
*Orchis palmata alpina, spica densa albo viridi. Hall. It. herc. 68.*  
*PseudoOrchis alpina, flore herbaceo. Mich. gen. 30. t. 26.*  
*Limodorum montanum, flore albo dilute virefcente. Chem. act. parif. 1705. p. 517.*

*Habi-*

*Habitat in Scania, Germaniæ, Helvetiæ, Avernæ pratis sylvaticis. 2*

5. SATYRIUM bulbo ramoso, caule vaginato, corollis *Epipogium*.  
 resupinatis: nectarii labio indiviso.

*Epipogium. Gmel. fib. 1. p. 12. t. 2. f. 2.*

*Habitat in Sibiria montibus arenosis. 2*

6. SATYRIUM bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, *repens*.  
 floribus secundis. *Act. nps. 1740. p. 20. Fl. suec.*  
*732. Dalib. paris. 278.*

*Satyrion foliis ovatis radicalibus. Fl. lapp. 314.*

*Orchis minor, floribus albis, f. radice repente. Cam. hort.*  
*111. t. 35.*

*PseudoOrchis. Baub. pin. 84.*

*Pyrola angustifolia polyanthos, radice geniculata. Læf.*  
*pruss. 210. t. 68.*

*Epipactis foliis ovatis radicalibus. Gmel. fib. 1. p. 13.*

- β. *Orchis radice repente, foliis maculis nigris & albis ad-*  
*spersis. Mentz. pug. t. 3. f. 4. 5. 1. Pseud-Orchis.*

*Habitat in Suecia, Angliæ, Sibiria, Helvetiæ sylvis.*

## OPHRYS.

\* *Bulbis ramosis.*

1. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, *Nidus avis*.  
 nectarii labio bifido.

*Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. Act.*

*nps. 1740. p. 33. Fl. suec. 742. Dalib. paris. 277.*

*Orchis abortiva fusca. Baub. pin. 80.*

*Nidus avis. Lob. ic. 195,*

*Habitat in Suecia, Germaniæ, Galliæ nemoribus.*

2. OPHRYS bulbis ramosis flexuosis, caule vaginato, *Corallorhiza*  
 nectarii labio trifido.

*Neottia bulbis reticulatis, nectarii labio trifido. Act. nps.*

*1740. p. 34. Fl. suec. 743.*

*Neottia radice reticulata. Fl. lapp. 315.*

*Orobanche radice coralloide. Baub. pin. 88.*

*Orobanche sueconum radice coralloide, flore albo. Rndb.*

*elys. 2. p. 234. f. 16.*

*Orobanche spuria f. Corallorhiza. Rupp. jen. 284. t. 2.*

*Habitat in Europæ borealis desertis. 2*

3. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule subfolio-*spiralis*.  
 so, floribus secundis, nectarii labio indiviso. *Act. nps.*

*1740. p. 32. Dalib. paris. 277.*

O o o

Tri-

*Triorchis alba odorata minor. Baub. pin. 84.*  
*Satyrium odoriferum. Brunff. herb. 1. p. 105.*  
*Testiculus odoratus. Lob. ic. 186.*

β. *Triorchis* f. *Tetrorchis alba odorata major. Baub. pin. 84.*

γ. *Orchialtrum æstivum palustre album odoratum. Mich. gen. 30. t. 26.*

*Habitat in Italiæ, Galliæ, Angliæ graminosis.*

*cernua.*

4. *OPHRYS* bulbis fasciculatis, caule folioso, floribus cernuis, nectarii labio oblongo integro acuto.

*Habitat in Virginia, Canada.*

*Radix fibris plurimis, crassis. Folia radicalia, linearia, longa. Caulina vaginantis, brevissima. Spica densa, oblonga. Flores arcte recurvati, cernui. Corollæ parvæ petalis superioribus confluentibus; labio inferiore oblongo, acuto, integro.*

*ovata.*

5. *OPHRYS* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido.

*Ophrys foliis ovatis. Hort. cliff. 429. Act. upf. 1740. p. 28. Fl. succ. 738. Roy. lugdb. 15. Hall. belv. 277.*

*Gmel. sib. 1. p. 25. Dalib. parif. 278.*

*Ophris bifolia. Baub. pin. 87.*

*Ophris. Fuchf. hist. 565.*

β. *Ophris trifolia. Baub. pin. 87.*

*Habitat in Europæ subhumidis pratis. &*

*cordata.*

6. *OPHRYS* bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis.

*Ophrys foliis cordatis. Fl. lapp. 247. Fl. succ. 739. Act. upf. 1740. p. 29. Gmel. sib. 1. p. 25.*

*Ophrys minima. Baub. pin. 87. prodr. 31.*

*Bifolium minimum. Baub. hist. 3. p. 534.*

β. *Ophris minima, floribus purpureo-croceis. Mentz. pug. 1. 9. f. 2.*

*Habitat in Europæ frigida sylvis humentibus.*

\* *Bulbis rotundis.*

*lilifolia.*

7. *OPHRYS* bulbo subrotundo, caule nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linearibus.

*Ophrys scapo nudo, foliis radicalibus ovato-oblongis dimidii scapi longitudine. Gron. virg. 185.*

*Ophrys radicibus ovatis tunicatis, scapo nudo. Hort. cliff. 429. (vix memini)?*

*Habitat in Virginia, Canada, Sueciæ paludibus. &*

*Præla*

*Planta virginica sexies major nostrate, at structura eadem, notabilis flore: petalis exterioribus linearibus.*

8. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, ne-*Læslii*.  
nectarii labello ovato.

*Ophris diphyllus bulbosa. Læf. pruss. 180. t. 58.*

*Habitat in Sueciæ, Borussia paludibus.*

*Radix bulbus ascendens ramo. Folia lanceolata, bina, longitudine fere scapi. Scapus nudus, superne triquet. Petala angusta reflexa. Nectarii labium ovatum magnum respectu reliquorum. Flores in scapo 5 ad 8, nec ultra.*

9. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo subnudo pentago-*paludosa*.  
no, foliorum apicibus scabris, nectarii labio integro.

*Habitat in Sueciæ paludibus turfosis. Bergius.*

*Bulbus ovatus, incurvus, infra radicans. Scapus pentagonus, maxima parte nudus. Folia radicalia 3. f. 4, spathulata, alterna, apice præsertim in pagina interiore scabra, exteriora breviora. Flores in racemo plurimi, virides, flavescentes. Petala 2 lateralibus ovato-oblonga, reflexo-erecta, 2 interiora lateralibus linearia, recurva; 1 supremum rectum, fornicem staminum formans. Labium nectarii lanceolato-ovatum, reflexum, integrum. Bulbi coherent deorsum quasi catenatim ramulo interstincti. Differt ab *O. Læslii* floribus pluribus, labio floris angusto; ab *O. monophyllo* foliis non ovatis apice scabris, pedicellis non capillaceis.*

10. OPHRYS bulbo rotundo, caule nudo, folio ovato, *monophyllos*  
nectarii labio integro.

*Ophris monophyllos bulbosa. Læf. pruss. 180. t. 57.*

*Monochris ophioglossoides. Menz. pug. t. 5. f. 1. 2.*

*PseudoOchris monophyllos. Clus. hist. 1. p. 269.*

*Habitat in Borussia, Medelpadiæ paludibus sylvaticis. 2*

11. OPHRYS bulbo globoso, caule nudo, nectarii labio *Monochris*.  
trifido. *Act. upf. 1740. p. 29. Fl. succ. 740.*

*Herminium bulbo supra radicato, nectarii labio trifido.*

*Fl. succ. 740. Act. upf. 1740. p. 29.*

*Herminium radice globosa. Fl. lapp. 317.*

*Orchis radice subrotunda, labello hastato. Gmel. fib. 1.*

*p. 18. t. 4. f. 1.*

*Orchis odorata moschata f. Monorchis. Bank. pin. 84.*

○ ○ ○ 2

Or-

Orchis coleo unico f. Monorchis flosculis pallide viridibus. *Læf. pruss.* 184. s. 61.

Monorchis. *Mich. gen* 30. t. 26. *Rupp. jem.* 421. t. 2.

β. Orchis lutea, hirsuto folio. *Bauh. pin.* 84.

γ. Triorchis lutea, folio glabro. *Bauh. pin.* 84.

δ. Triorchis lutea altera. *Bauh. pin.* 84.

ε. Monorchis bifolia, floribus viridibus moschum olentibus, alpina. *Mentz. pug.* t. 5. f. 3. 4. 5.

*Habitat in Europæ pratis uliginosis.*

*alpina.*

12. OPHRYS bulbis ovatis, caule nudo, foliis subulatis, nectarii labio indiviso.

*ChamaeOrchis alpina*, folio gramineo. *Bauh. pin.* 81. *prodr.* 29.

Orchis radicibus subrotundis, calcare nullo, foliis longis & perangustis. *Hall. helv.* 269.

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. &*

*Radix Bulbis duobus, subrotundis (nec uno infra radicato, ut præcedentes tres), supra radicatis. Folia radicalia sæpius 4, filiformi, subulata, pollicem longa. Caulis nudus, longitudine foliorum; Spica floribus 4 f. 5 alternis. Petala 5, conniventia: barba ovato-oblonga, integra, vix petalis longiore. Vaginæ 2 obversæ sunt basin plantæ & includunt folia cum scapo inferne.*

*camtschatea.* 13. OPHRYS bulbis - - - caule filiformi vaginato, racemo laxo, nectarii labio lineari bifido.

*Neottia nectarii labio bifido lineari. Amæn. acad.* 2. p. 361. t. 4. f. 24. \*

*Habitat in Sibiria.*

*anthropophora.*

14. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii labio lineari tripartito: medio elongato bifido.

*Neottia bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido. Act. upf.* 1740. p. 32. *Dalib. parif.* 277.

Orchis, flore nudi hominis effigiem repræsentans, femina. *Bauh. pin.* 82. *Vaill. parif.* 147. t. 31. f. 19. 20.

Orchis antropophora oreades. *Col. ecphr.* 1. p. 320.

*Habitat in Italia, Lusitania, Gallia.*

*insectifera.*

15. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii labio subquinelobo.

*Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis caulinis. Act. upf.* 1740. p. 26. *Fl. succ.* 737. *it. oel.* 44. 121.

*myodes.*

α. Orchis muscæ corpus referens, minor, galea & alis herbidis. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. parif.* 147. t. 31. f. 17. 18.

©



- Orchis myodes prima, floribus muscam exprimens.  
*Lob. ic.* 181.
- β. Orchis muscam referens major. *Bauh. pin.* 83.
- γ. Orchis muscam referens lutea. *Bauh. pin.* 83.
- δ. Orchis muscam cæruleam majorem repræsentans.  
*Breyn. Moris. hist.* 3. p. 494. f. 12. t. 13. f. 11.
- ε. Orchis myodes lutea lusitanica. *Breyn. cent.* 75. *Moris. hist.* 3. p. 495. f. 12. t. 13. f. 15.
- ζ. Orchis myodes fusca lusitanica. *Breyn. cent.* 41.
- η. Orchis araneam referens. *Bauh. pin.* 94. *Tournef. inst. adrachnites* 434. t. 247. f. C. *Vaill. parif. t.* 30. f. 10. 11. 12. 13.
- Orchis adrachnitis. *Lob. ic.* 135.
- θ. Orchis fucum referens: colore rubiginoso. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. parif.* 146. t. 31. f. 15. 16.
- ι. Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis & purpurascens. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. parif.* 146. t. 30. f. 9.
- Orchis fucum referens, flore subvirente. *Bauh. pin.* 83.
- κ. Orchis scarabæum referens. *Breyn. Moris. hist.* 3. p. 494. f. 12. t. 13. f. 10.
- λ. Orchis cercopithecum exprimens lusitanica. *Breyn. Moris. hist.* 3. p. 494. f. 12. t. 13. f. 4.
- Habnat in Europa temperiori. 2*
- Varietates Myodes α. & Arachnites γ fugitivis oculis insipienti diversissimæ adparent, qui vero has confert cum congeneribus, omnesque varietates simul inspicit, primam originem ex una facile perspiciat, nec limites distinguendas obtinebit, quamvis constantes persistant.*

SERAPIAS.

1. SERAPIAS bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis brevior. *Act. xps.* 1740. p. 21. *Fl. jucc.* 734. *It. al.* 144. *It. gotl.* 225. 197. 230. *Dalib. parif.* 276.
- α. Serapias caule multifolio multifloro. *Hort. cliff.* 429. latifolia. *Gmel. lib.* 1. p. 8.
- Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186.
- Epipactis f. Helleborine. *Cam. epit.* 889.
- β Helleborine flore carneo. *Bauh. pin.* 187.
- γ. Helleborine montana angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 187.
- δ. Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Bauh. pin.* 187.
- ε. Helleborine altera, attrubente flore. *Bauh. pin.* 186.

- longifolia.  $\zeta$ . *Serapias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso petalis brevioribus, foliis ensiformibus. It. æl. 144.*  
*Helleborine foliis prælongis angustis, floribus candidis. Vaill. parif. 97.*
- palustris.  $\eta$ . *Serapias angustifolia tomentosa, floribus herbaceis intus albis. Sauv. monsp. 42.*  
*Helleborine palustris f. pratensis nostras. Morif. hist. 3. p. 487. Raj. hist. 1231.*  
*Helleborine angustifolia palustris f. pratensis. Baub. pin. 87.*  
*Habitat in Europæ asperis. &*  
*Limites inter latifoliam & longifoliam & palustrem non reperi, diversitatem vidi.*
- Lingua.  $\alpha$ . **SERAPIAS** bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato petalis longiore. *Act. upf. 1740. p. 23.*  
*Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso monopetalo: labello ovato-lanceolato. Sauv. monsp. 24.\**  
*Orchis montana italica, flore ferrugineo, lingua oblonga. Baub. pin. 84. prodr. 29.*
- $\beta$ . *Orchis montana italica, lingua oblonga altera. Baub. pin. 84.*  
*Orchis macrophylla. Cal. esphr. 2. p. 321. t. 322.*  
*Habitat in Italia, Lusitania. &*

## LIMODORUM.

- tuberosum.  $\iota$ . **LIMODORUM.** *Roy. lugdb. 16. Gron. virg. 110.*  
*Act. upf. 1740. p. 21.*  
*Helleborine americana, radice tuberosa, foliis longis angustis, caule nudo, floribus ex rubro pallide purpuriscentibus. Mart. cent. 40. t. 50.*  
*Habitat in America septentrionali. &*  
*Plumierii species americana australis plurimas non vidi.*

## ARETHUSA.

- bulbosa.  $\iota$ . **ARETHUSA** radice globosa, scapo vaginato, spatha diphylla. *Gen. nov. 1082.*  
*Arethusa. Gron. virg. 184.*  
*Serapias bulbis subrotundis, caule unifloro. Act. upf. 1740. p. 24.*  
*Orchidi affinis aquatica verna exigua. Gron. virg. 110.*  
*Helleborine mariana monanthos, flore longo purpuriscente liliaceo. Pluk. mant. 100. t. 348. f. 7.*  
*Habitat in Virginia, Canada. &*

2. ARE-

2. **ARETHUSA** radice fibrosa, scapi folio ovali, foliolo *ophioglossoides*,  
 spathaceo lanceolato. *Gen. nov.* 1083.  
*Cypripedium* folio caulino ovato-oblongo terminali lanceolato plano. *Hort. cliff.* 430. *Gron. virg.* 110.  
*Helleborine virginiana*, *ophioglossi* folio. *Pluk. alm.* 182. t. 93. f. 2.  
*Helleborine virginiana* diphylla. *Morif. bist.* 3. p. 488. f. 12. t. 11. f. 15. mala.  
*Habitat in* Virginia, Canada. 2

3. **ARETHUSA** radice subpalmata, scapi folio foliolo-*divaricata*,  
 que spathaceo lanceolatis petalis, exterioribus adscendentibus.  
*Serapias* radicibus palmato-fibrosis, caule unifloro. *Gron. virg.* 184.  
*Helleborine lillii* folio caulem ambiente, flore unico hexapetalo: tribus petalis longis angustis obscure purpureis, cæteris brevioribus rosaceis. *Catesb. car.* 1. p. 58. t. 58.  
*Habitat in* Americæ borealis paludosis. 2

### CYPRIPEDIUM.

1. **CYPRIPEDIUM** radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis. *Act. ups.* 1740. p. 24. *Fl. succ.* 735. *Calceolus*,  
*Cypripedium* foliis ovato-lanceolatis. *Fl. lapp.* 318. *Gron. virg.* 111.  
*Calceolus* foliis ovato-lanceolatis. *Gmel. fib.* 1. p. 2. t. 1.  
*Calceolus marianus*. *Död. pempt.* 180. f. 1. 2.  
*Helleborine* flore rotundo f. *Calceolus*. *Banh. pin.* 187.  
 β. *Helleborine* *Calceolus dicta mariana*, caule folioso, flore luteo minore. *Pluk. mant.* 101. t. 418. f. 2.  
*Helleborine virginiana* f. *Calceolus* flore luteo majore. *Morif. bist.* 3. p. 488. f. 12. t. 11. f. 15.  
 γ. *Calceolus marianus canadensis*. *Corn. canad.* 204.  
*Helleborine* flore majore purpureo. *Morif. bist.* 3. p. 488. f. 12. t. 11. f. 17.  
 δ. *Calceolus minor*, flore vario. *Amm. ruth.* 133. t. 22.  
*Calceolus* foliis ovatis binis. *Gmel. fib.* 1. p. 5.  
*Habitat in* Europæ, Asiæ, Americæ septentrionalibus.  
 2. **CYPRIPEDIUM** bulbo subrotundo, folio subrotundo radicali. *Act. ups.* 1740. p. 25. *Fl. succ.* 736. *bulbosum*,  
*Cypripedium* folio subrotundo. *Fl. lapp.* 319. t. 12. f. 5.  
*Serapias* scapo unifloro. *Gmel. fib.* 1. p. 7. t. 2. f. 5.  
*Orchis lapponensis monofolia*. *Rudb. elys.* 2. p. 209. f. 10.  
*Habitat in* Lapponia, Russia, Sibiria. 2

## EPIDENDRUM.

\* *Scandentes.*

- Vanilla.* 1. **EPIDENDRUM** foliis ovato-oblongis nervosis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. *Roy. ligdb.* 13. *At.* *upf.* 1740. p. 13. *Mat. med.* 418.  
*Vanillas piperis arbori jamaicensis innascens. Pluk. alm.* 381. t. 320. f. 4.  
*Vanille. Merian. surin.* 25. t. 25.  
*Volubilis siliquosa, plantaginis folio. Catesb. car.* 3. p. 7. t. 7.  
*Lobus aromaticus subfuscus terebinthi corniculis simili. Baub. pin.* 404.  
*Habitat in America australi. b*

- domesticum.* 2. **EPIDENDRUM** caule scandente tereti subramoso, foliis lanceolatis, petalis lanceolatis. *At. upf.* 1740. p. 37.  
*Angurék warna. Kämpf. amœn.* 867. t. 867.  
*Habitat in Indiæ orientalis Bataviæ arboribus, parasitica.*

- Flor. ærit.* 3. **EPIDENDRUM** caule scandente tereti subramoso, foliis lanceolatis, petalis linearibus obtusis. *At. upf.* 1740. p. 37.  
*Kolong gling. Kämpf. amœn.* 868. t. 868.  
*Habitat in Java, parasitica.*

\* *Caule erecto folioso.*

- tenuifolium.* 4. **EPIDENDRUM** foliis caulinis subulatis canaliculatis. *Tsierou-mau-maravara. Rheed. mal.* 12. p. 11. t. 5.  
*Habitat in India.*

- spatulatum.* 5. **EPIDENDRUM** foliis caulinis oblongis alternis obtusis.  
*Ponnampou-maravara, Rheed. mal.* 12. p. 7. t. 3. *fibrosa.*  
*Habitat in India.*  
*Confer Viscum caryophylloides, foliis longis in apice incis, floris labello albo trifido, petalis luteis longis angustissimis. Catesb. car.* 2. p. 68. t. 68. *bulbosum.*

- ovatum.* 6. **EPIDENDRUM** foliis caulinis ovatis acutis amplexicaulibus.  
*Anantali-maravara. Rheed. mal.* 12. p. 15. t. 7.  
*Habitat in India.*

\* *Sea-*

\* *Scapo nudo, foliis radicalibus.*

7. EPIDENDRUM foliis radicalibus subulatis acutis: *nodosum*.  
 nodo radicatis. *Act. upf.* 1740. p. 36.  
*Epidendron* foliis subulatis. *Hort. cliff.* 430.  
*Epidendron curassavicum* orchidi affinis, folio crasso  
 sulcato. *Herm. parad.* 187. t. 187.  
*Viscum arboreum* f. *Epidendron*, flore albo specioso, a-  
 mericanum, folio forma siliquarum nerii. *Pluk. alm.*  
 390. t. 117. f. 6.  
*Viscum delphinii* flore minus, petalis angustioribus, radice  
 fibrosa. *Sloan. jam.* 120. *hist.* 1. p. 251. t. 125. f. 3.  
 β. *Viscum* radice bulbosa minus, delphinii flore rubro spe-  
 cioso. *Sloan. jam.* 119. *hist.* 1. p. 250. t. 121 f. 2.  
*Habitat in America meridionali, parasitica.*
8. EPIDENDRUM foliis oblongis obtusis compressis ar- *carinatum*.  
 ticulatis. *Act. upf.* 1740. p. 36.  
*Bontia luzonica*, geniculis inferioribus carinulatis. *Pet.*  
*gaz.* 44. f. 10.  
*Habitat in Insulis Luzonum, parasitica.*
9. EPIDENDRUM foliis radicalibus oblongis obtusis su- *aloifolium*.  
 perne latioribus. *Act. upf.* 1740. p. 36.  
*Orchis abortiva*, flore majore rubro, folio aloes. *Rudb.*  
*elys.* 2. p. 224,  
*Kanlijram-maravara*. *Rheed. mal.* 12. p. 17. t. 8. *Raj.*  
*suppl.* 572.  
*Habitat in Malabarix arboribus, parasitica.*
10. EPIDENDRUM foliis radicalibus lanceolatis cana- *guttatum*.  
 liculatis, petalis cuneiformibus retusis.  
*Epidendrum* caule tereti erecto nudo, foliis lanceolatis,  
 petalis cuneiformibus obtusis. *Act. upf.* 1740. p. 37.  
*Viscum*, delphinii flore albo guttato, minus, radice fibro-  
 sa. *Sloan. jam.* 120. *hist.* 1. p. 251. t. 148. f. 2.  
*Habitat in Jamaica, parasitica.*
11. EPIDENDRUM foliis radicalibus linearibus apice *retusum*.  
 bifariam retusis.  
*Angeli-maravara*. *Rheed. mal.* 12. p. 1. t. 1.  
 β. *Biti-maram-maravara*. *Rheed. mal.* 12. p. 5. t. 2.  
*Habitat in India.*
12. EPIDENDRUM foliis radicalibus lato-lanceolatis, *amabile*.  
 petalis lateralibus orbiculatis.  
*Habitat in India. Osbeck.*  
*Radices crassæ, saniformes, supra arborea scandentes. For-*

lia Crinis. Scilla officinalis, lata, lanceolata, carnosae, semipedalia. Culmus bipedalis, nudus, cinctus aliquot squamis acutis brevissimis. Flores nivei Orchidis Sijanae emuli, s. magnitudine narcissi: constantes petalis 5, quorum 2 lateralia orbiculata, reliqua ovata. Cucullus alter triphyllus: lateralibus oblongis, intermedio hastato, bifido setis duabus subulatis.

*ensiform.* 13. EPIDENDRUM caule tereti laevi, foliis ensiformibus petalis lanceolatis glabris.

*Habitat in China. Osbeck.*

Planta terrestris nec parasitica. Folia angusta, striata, acuta, numerosa, non carnosae. Scapus anceps, bipedalis, teres, nudus, Bracteis aliquot, alternis, membranaceis, amplexicaulibus, acuminatis. Flores alterni, ex alis bracteatum solitarii, pedunculati, Pedunculis longitudine floris. Corolla ex petalis 5, lanceolatis, patentibus, laevibus; sexto latiore recurvato. Flos fragrantissimus.

*moniliforme* 14. EPIDENDRUM caule tereti articulado striato moniliformi nudo simplicissimo. *Aët. upf. 1740. p. 37.*

*Fu Ran. Kämpf. amœn. 864. t. 864.*

*Habitat in japoniae rupibus & arboribus parasitica.*

## TRIANDRIA.

### SISYRINCHIUM.

*Bermudiana* 1. SISYRINCHIUM caule foliisque ancipitibus. *Hort. cliff. 431. Hort. upf. 278. Gron. virg. 111. Roy. lugdb. 19.*

Sisyrrinchium caeruleum parvum, gladiato caule, virginianum. *Pluk. alm. 348. t. 61. f. 1*

Bermudiana graminea, flore minore caeruleo. *Dill. elth. 49. t. 41. f. 49.*

β. Sisyrrinchium bermudienfe, floribus parvis ex caeruleo & aureo mixtis. *Pluk. alm. 348. t. 61. f. 2.*

Bermudiana iridis folio, radice fibrosa. T. *Dill. elth. 48. t. 41. f. 48.*

*Habitat α in Virginia, β in Bermudis. 2*

Planta α, in loco natali, Folia saepe & scapum filiformia gerit; at si probe examinetur, tamen ancipitia, haec per gradus ad culta staturam adscendere observatur.

TE.

## TETRANDRIA.

### NEPENTHES.

1. NEPENTHES. *Hort. cliff.* 431. \* *Fl. zeyl.* 321. *distillatoria*.  
*Utricularia vegetabilis zeylanensis*. *Pluk. alm.* 394. t.  
 237. f. 3.  
*Bandura zeylanica*, in extremo foliorum folliculorum  
 peniformem expansum habens. *Burm. zeyl.* 42. t. 17.  
 Planta mirabilis destillatoria. *Grim. E. N. C. an.* 1.  
*Dec.* 2. p. 363. f. 363.  
*Habitat in Zeylona.*

## PENTANDRIA.

### PASSIFLORA

\* *Foliis indivisis.*

1. PASSIFLORA foliis indivisis serratis. *Amœn. acad. serratifolia*.  
*1. p.* 217. f. 1. \*  
*Passiflora foliis ovato-lanceolatis integris serratis. Hort.*  
*cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 260.  
*Granadilla americana*, folio oblongo leviter serrato, pe-  
 talis ex viridi rubescentibus. *Mart. cent.* 36. t. 36.  
*Habitat Surinami.*
2. PASSIFLORA foliis indivisis ovatis integerrimis: pe- *pallida*.  
 tiolis biglandulosis. *Amœn. acad.* 1. p. 218. f. 2. \*  
*Clematis indica alia*, flore minore pallido. *Plum. a-*  
*mer.* 74. t. 89.  
*Clematis Murucuja pyriformis minor. Morif. hist.* 3.  
*p.* 7. f. 1. t. 2. f. 4.  
*Habitat in Dominica, Brasilia.*
3. PASSIFLORA foliis indivisis ovatis integerrimis: pe- *cuprea*.  
 tiolis æqualibus. *Amœn. acad.* 1. p. 219. f. 3. \*  
*Granadilla flore cupreo, fructu oliviformi. Dill. elth.*  
*165. t. 138. f. 165. fructu.*  
*Granadilla americana*, fructu subrotundo, corolla flo-  
 ris erecta, petalis amœne fulvis, foliis integris. *Mart.*  
*cent.* 37. t. 37.  
*Granadilla foliis sarsaparillæ trinerviis, flore purpureo,*  
*fructu olivæformi cæruleo. Catesb. cur.* 2. p. 93. t.  
 93.  
*Habitat in Providentia, Bahama.*

4. PAS-

- tiliaefolia.* 4. PASSIFLORA foliis indivisis cordatis integerrimis: petiolis æqualibus. *Amœn. acad.* 1. p. 219. f. 4.  
Granadilla pomifera, tiliæ folio. *Few. peruv.* 1. p. 720. t. 12.

*Habitat in Peru, Lima.*

- maliformis.* 5. PASSIFLORA foliis indivisis cordato-oblongis integerrimis: petiolis biglandulosis, involucri integerrimis. *Amœn. acad.* 1. p. 220. f. 5. \*  
Passiflora foliis cordato-oblongis integerrimis, floribus solitariis, involucro tripartito integerrimo. *Roy. lugdb.* 261.

Clematis indica latifolia, flore clavato, fructu maliformi. *Plum. amer.* 67. t. 82. *Raj. suppl.* 340.

*Habitat in Dominica & de la Tortue.*

- laurifolia.* 6. PASSIFLORA foliis indivisis integerrimis, involucris dentatis. *Amœn. acad.* 1. p. 220. f. 6. \*  
Passiflora foliis solitariis oblongis integerrimis, floribus solitariis, involucro tripartito dentato. *Roy. lugdb.* 532.

Passiflora arborea, laurinis foliis, americana. *Pluk. alm.* 282. t. 211. f. 3.

Clematis indica, fructu citriformi, foliis oblongis. *Plum. amer.* 64. t. 80. *Raj. suppl.* 341.

Marquias. *Mer. surin.* 21. t. 21.

*Habitat in Surinamo.*

- multiflora.* 7. PASSIFLORA foliis indivisis oblongis integerrimis, floribus confertis. *Amœn. acad.* 1. p. 221. f. 7. \*  
Passiflora, laurinis foliis, polyanthos americana. *Pluk. alm.* 282.

Granadilla, flore minore corymboso. *Plum spec.* 7.

Clematis indica polyanthos odoratissima. *Plum. amer.* 75. t. 90. *Raj. suppl.* 343.

*Habitat in Dominica.*

\* *Folijis bilobis.*

- perfoliata.* 8. PASSIFLORA foliis bilobis oblongis transversis amplexicaulibus. *Amœn. acad.* 1. p. 222. f. 8. \*

Flos passionis perfoliatus s. periclymeni perfoliati folio. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 230. t. 142. f. 3. 4. *Raj. suppl.* 342.

*Habitat in Jamaicae sylvis saxosis.*

- rubra.* 9. PASSIFLORA foliis bilobis basi emarginatis petiolatis. *Amœn. acad.* 1. p. 222. f. 9. \*

Cle-



- Clematis indica*, flore clavato suaverubente, fructu hexagono coccineo, folio bicorni. *Plum. amer.* 68. t. 83. *Raj. suppl.* 341.  
Flos passionis folii media lacinia quasi abscissa; flore minore carneo. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 229.  
*Habitat in* Jamaica, Dominica, Martinica, Cayenna.
10. PASSIFLORA foliis bilobis obtusis basi indivisis, nectariis monophyllis. *Amæn. acad.* 1. p. 223. f. 10. \*  
*Passiflora* foliis bilobis obtusis, nectariis indivisis. *Roy. lugdb.* 261.  
*Clematis indica*, flore puniceo, folio lunato. *Plum. amer.* 72. t. 87. *Raj. suppl.* 342.  
*Habitat in* Dominica.
11. PASSIFLORA foliis bilobis cuneiformibus basi bivestitis, glandulosis: lobis acutis divaricatis. *Amæn. acad.* 1. p. 223. f. 11. \*  
*Passiflora* foliis obverse lunulatis: punctis duobus meliferis sub basi. *Virid. cliff.* 91. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 260.  
*Granadilla bicornis*, flore candido, filamentis intortis. *Dill. elth.* 164. t. 137. f. 164.  
*Habitat in* America.
12. PASSIFLORA foliis bilobis cordatis oblongis pericapsularis, tiolatis.  
*Granadilla* fructu rubente, folio bicorni. *Plum. spec.* 6. *Barr. obs. præf.* 1. titul. f. 1.  
*Habitat in* Gallia æquinoctiali.  
\* *Foliis trilobis.*
13. PASSIFLORA foliis subtrilobis obtusis subrotundis, villosis.  
*Granadilla* folio hederaceo, flore albo, fructu globoso villoso. *Plum. spec.* 6. *Barr. obs. præf.* 1. titul. f. 2.  
*Habitat in* America australiori.
14. PASSIFLORA foliis trilobis oblongis subtus punctatis: intermedio minore. *Amæn. acad.* 1. p. 224. f. 12. \*  
*Passiflora* foliis bilobis obtusis, nectario multifido. *Roy. lugdb.* 260.  
*Granadilla* folio tricuspidi obtuso & oculato. *Few. peruv.* 1. p. 718. t. 11. *Hort. angl.* 25.  
*Habitat in* Peru. 2
15. PAS-

*lutea.*

15. PASSIFLORA foliis trilobis cordatis æqualibus obtusis glabris integerrimis. *Amæn. acad.* 1. p. 224. f. 13. \*

Passiflora foliis cordatis trilobis integerrimis glabris: lateribus angulatis. *Hort. cliff.* 431. *Roy. lugdb.* 261.

Passiflora foliis trilobis integerrimis: laciniis semiovatis acutis integerrimis glabris. *Gron. virg.* 112.

Clematis passionalis triphyllus, flore luteo. *Morif. hist.* 1. p. 7. f. 1. t. 2. f.

Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas, minus profundas diviso. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 231.

*Habitat in* Virginiz, Jamaicæ glareosis, saxosis. 2.

*suberosa.*

16. PASSIFLORA foliis trilobis subpeltatis, cortice suberoso. *Amæn. acad.* 1. p. 226. f. 14.

Passiflora foliis trilobis peltatis integris: glandulis duabus sub dorso basi convexis. *Roy. lugdb.* 261.

Clematis indica, folio hederaceo, major, fructu olivæformi. *Plum. amer.* 70. t. 84. *Raj. suppl.* 339.

Passifloræ affinis, hederæ folio, americana. *Pluk. alm.* 202. t. 210. f. 4.

- β. Clematis indica, folio angusto trifido, fructu olivæformi. *Plum. amer.* 70. t. 85.

Flos passionis minor, foliis in tres lacinias non serratas profundius divisus, flore luteo. *Sloan. jam.* 104. *hist.* 1. p. 320.

*Habitat in* Dominica, Antillis. 5

Caulis perennis: Cortice suberoso, fisso, albo. Flores axillares, gemini, albi, apetalis. Bacca violacea.

*holosericea.*

17. PASSIFLORA foliis trilobis: basi utrinque denticulo reflexo. *Amæn. acad.* 1. p. 226. f. 15. \*

Passiflora foliis cordato-trilobis integerrimis: basi utrinque denticulo reflexo. *Hort. cliff.* 432. *Roy. lugdb.* 261.

Granadilla folio hastato holosericeo, petalis candicantibus: fimbriis ex purpureo & luteo variis. *Mart. cent.* 51. t. 51.

*Habitat in* Vera Cruce.

*hirsuta.*

18. PASSIFLORA foliis trilobis villosis, floribus oppositis. *Amæn. acad.* 1. p. 227. f. 16. \*

Passiflora non crenata americana triphylla. *Pluk. alm.* 282. t. 212. f. 1.

Clematis indica, flore minimo pallido. *Plum. amer.* 73. t. 88.

Flos

- Flos passionis albus, folio ibisci sericeo trilobato. *Herm. par. 176. t. 176.*  
*Habitat in* Dominica, Curaçao.
19. PASSIFLORA foliis trilobis cordatis pilosis, involucri-  
 lucris multifido-capillaribus. *Amæn. acad. 1. p. 228.*  
*f. 17. \* Phil. bot. 260. \**  
*Passiflora* florum involucri triphyllis multifido-capilla-  
 ribus. *Hort. cliff. 431. Roy. lugdb. 261.*  
 Flos passionis albus reticulatus. *Herm. par. 173. t. 173.*  
 Clematis indica hirsuta fœtida. *Plum. amer. 71. t. 86.*  
 β. *Passiflora* vesicaria hederacea, foliis lanuginosis, odore  
 tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variega-  
 tis. *Pluk. alm. 382. t. 104. f. 1.*  
*Habitat in* Dominica, Martinica, Curaçao. ☉
20. PASSIFLORA foliis trilobis integerrimis: lobis sub-  
 lanceolatis: intermedio productiore. *Amæn. acad. 1.*  
*p. 229. f. 18.*  
*Passiflora* f. Flos passionis curaçavicus, folio glabro tri-  
 lobato & angusto, flore flavescente omnium minimo.  
*Pluk. alm. 282. t. 210. f. 3.*  
*Habitat in* Curaçao.
21. PASSIFLORA foliis trilobis ferratis. *Amæn. acad. internata.*  
*1. p. 230. \* Hort. upf. 278.*  
*Passiflora* foliis semitrifidis ferratis: basi duabus glandu-  
 lis convexis: lobis ovatis. *Hort. cliff. 432. Gron. virg.*  
*112. Roy. lugdb. 260.*  
*Granadilla* hispanis, Flos passionis italis. *Herm. mex.*  
*888. t. 888. Raj. hist. 649.*  
*Clematis* trifolia, flore roseo clavato. *Baub. pin. 301.*  
*Clematis* trifolia, f. Flos Passionalis, flore viridi. *Morif.*  
*hist. 2. p. 6. f. 1. t. 1. f. 9.*  
*Balsamina* indica repens triphylla, f. folio hastato. *Ambr.*  
*phyr. 89. t. 90.*  
*Habitat in* Virginia, Brasilia, Peru. 2
- \* *Foliis multifidis.*
22. PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. *Amæn. carnlea.*  
*acad. 1. p. 231. f. 20. Hort. upf. 278.*  
*Passiflora* foliis palmatis quinquepartitis integerrimis, in-  
 volucri cordatis triphyllis. *Hort. cliff. 432. Roy.*  
*lugdb. 260.*  
*Clematis* quinquefolia americana, f. Flos passionis.  
*Rob. ic.*

Flos

Flos passionis major pentaphyllus. *Sloan. jam. 104. hist. 1. p. 229. Raj. suppl. 339.*  
*Habitat in Brasilia. h*

*serratodigitata.* 23. PASSIFLORA foliis palmatis serratis. *Amœn. acad. 1. p. 232. f. 21.*

Clematis indica polyphylla major, flore clavato, fructu colocynthidis. *Plum. amer. 62. t. 79. Raj. suppl. 340.*

*Habitat in Martinica.*

*pedata.* 24. PASSIFLORA foliis pedatis serratis. *Amœn. acad. 1. p. 233. f. 22. \**

Clematis indica polyphylla, flore crispato. *Plum. amer. 66. t. 81. Raj. suppl. 341.*

*Habitat in Dominica.*

## HEXANDRIA.

### ARISTOLOCHIA.

*bilobata.* 1. ARISTOLOCHIA foliis bilobis.  
 Aristolochia longa scandens, foliis ferri equini effigie.  
*Plum. spec. 5. amer. 91. t. 106. Raj. suppl. 395.*  
*Habitat in Dominica.*

*trilobata.* 2. ARISTOLOCHIA foliis trilobis.  
 Aristolochia folio hederaceo trifido, maximo flore, radice repente. *Plum. spec. 5.*  
*Ambuyaembo. Marcgr. bras. 15.*  
*Habitat in America meridionali.*

*peltata.* 3. ARISTOLOCHIA foliis reniformibus peltatis.  
 Aristolochia asari folio umbilicato, flore longissimo, radice repente. *Plum. spec. 5.*  
*Habitat in America meridionali.*

*arborescens.* 4. ARISTOLOCHIA foliis cordato-lanceolatis, caule erecto fruticoso.  
 Aristolochia caule erecto fruticoso, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff. 433.*  
 Aristolochia polyrhizos, auriculatis foliis, virginiana.  
*Pluk. alm. 50. t. 78. f. 1. ?*  
*Habitat in America. h*

*indica.* 5. ARISTOLOCHIA foliis cordato-oblongis, caule volubili, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl. 323. \**

Cate-

Catela-vegon. *Rheed. mal.* 8. p. 48. t. 25. *Raj. suppl.* 394.

β. *Aristolochia* caule volubili, foliis cordato-oblongis, fructu pendulo, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* 433.

*Aristolochia* scandens odoratissima, floris labello purpureo, semine cordato. *Sloan. jam.* 60. *hist.* 1. p. 162. t. 104. f. 1. *Raj. suppl.* 394.

*Aristolochia* mexicana, folio acutiore. *Morif. hist.* 3. p. 508. f. 12. t. 17. f. 7.

*Habitat in India.* 2

6. *ARISTOLOCHIA* foliis cordatis acutiusculis, caule *batica*, volubili, pedunculis solitariis petiolo longioribus.

*Aristolochia* Clematidis serpens. *Bauh. pin.* 307. *Morif. hist.* 3. p. 509. f. 12. t. 17. f. 6.

*Aristolochia* Clematidis *batica*. *Clus. hist.* 2. p. 71.

*Habitat in Hispania, Creta, arbores scandens.*

7. *ARISTOLOCHIA* hirta, floribus solitariis pendulis *Mitra* recurvatis sublabiatis.

*Aristolochia* longa subhirsuta, folio oblongo, flore (minimo male *Tournef. cor.* 8.) maximo. *Tournef. itin.* 1. p. 147. t. 147.

*Habitat in Chio.* 2

Limbus corollae non elongatus in labium.

8. *ARISTOLOCHIA* foliis cordato-oblongis undatis, *sempervirens* caule infirmo, floribus solitariis.

*Aristolochia* caulibus infirmis, foliis cordato-oblongis undulatis, floribus recurvis solitariis pendulis. *Hort. cliff.* 432. *Sauv. monsp.* 111.

*Pistilochia* cretica. *Bauh. pin.* 307. *Morif. hist.* 3. p. 510. f. 12. t. 17. f. 16.

*Pistilochia* altera. *Clus. hist.* 2. p. 260.

*Habitat in Creta.* 5

9. *ARISTOLOCHIA* foliis cordato-oblongis planis, *Serpentaria* caulibus infirmis flexuosis teretibus, floribus solitariis.

*Aristolochia* caulibus infirmis angulosis flexuosis, foliis cordato-oblongis planis, floribus recurvis solitariis. *Gron. virg.* 112. *Mat. med.* 416.

*Aristolochia* *Pistilochia* f. *Serpentaria* virginiana, caule nodoso. *Pluk. alm.* 50. t. 143. f. 5. *Catesb. car.* 1. p. 29. t. 29.

*Aristolochia* *Pistilochia* caule nodoso; f. *Serpentaria* virginiana. *Raj. suppl.* 394.

*Aristolochia polyrrhizos virginiana*, fructu parvo pentangulari. *Morif. hist.* 3. p. 510. f. 12. t. 17. f. 14.  
*Habitat in* Virginia. &

*Pistolochia.* 10. **ARISTOLOCHIA** foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis.

*Aristolochia* caule infirmo ramoso, foliis cordatis obsolete dentatis, floribus solitariis erectis. *Hort. cliff.* 433. *Sauv. monsp.* 111.

*Aristolochia Pistolochia dicta.* *Bauh. pin.* 307.

*Pistolochia.* *Clus. hist.* 2. p. 72. *Dod. pempt.* 525.

*Habitat in* Hispania, G. Narbonensi. &

*rotunda.* 11. **ARISTOLOCHIA** foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis.

*Aristolochia*, caule infirmo ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis. *Hort. cliff.* 432. *Mat. med.* 414. *Sauv. monsp.* 111.

*Aristolochia rotunda*, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.* 307.

*Aristolochia rotunda* 1. *Clus. hist.* 2. p. 70.

*Aristolochia.* *Cam. epit.* 419.

β. *Aristolochia rotunda*, flore ex albo purpurascens. *Bauh. pin.* 307.

*Habitat in* Italia, Hispania, G. Narbonensi. &

*longa.* 12. **ARISTOLOCHIA** foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo floribus solitariis.

*Aristolochia* caule infirmo ramoso, foliis cordatis integerrimis longe petiolatis, floribus solitariis. *Sauv. monsp.* 111.

*Aristolochia longa vera.* *Bauh. pin.* 307.

*Aristolochia longa.* *Clus. hist.* 2. p. 70.

β. *Aristolochia longa hispanica.* *Bauh. pin.* 307.

*Habitat in* Hispania, Italia.

*clematidis.* 13. **ARISTOLOCHIA** foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. nps.* 279. *Mat. med.* 415. *Dalib. parif.* 279.

*Aristolochia* caule erecto simplicissimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort. cliff.* 432. *Sauv. monsp.* 111.

*Aristolochia Clematidis recta.* *Bauh. pin.* 307.

*Aristolochia Clematidis vulgaris.* *Clus. hist.* 2. p. 71.

*Aristolochia rotunda.* *Fuchs. hist.* 90.

*Habitat in* Gallia, Tataria. &

## PISTIA.

1. *PISTIA* foliis obcordatis. *Fl. zeyl.* 321. *Stratiotes.*  
 Koddapail palustris, folio oblongo specioso. *Plum. gen.*  
 30.  
 Koddapail. *Rheed. mal.* 11. p. 63. t. 32.  
 β. *Stratiotes ægyptia.* *Bauh. hist.* 3. p. 787. *Morif. hist.* 3.  
 p. 619. f. 15. t. 4. f. infer. *Vest. ægypt.* 44. t. 45.  
*Raj. hist.* 1324.  
*Stratiotes* Hai-alem maovi. *Alp. ægypt.* 106. t. 108.  
*Lenticula palustris* VI. f. *ægyptia*, L. *Stratiotes aquatica*,  
 foliis sedo majore latioribus. *Bauh. pin.* 362. *Sloan.*  
*jam.* 11. *hist.* 1. p. 15. t. 2. f. 2.  
*Habitat in* Asiæ, Africæ, Americæ meridionalibus,  
*natans.*  
 Flores sicci mihi satis non fecere, examinent autopte  
 accuratius.

## DECANDRIA.

## HELICTERES.

1. *HELICTERES* foliis cordatis serratis, fructu com- *Ifora.*  
 posito contorto.  
*Helicteres.* *Hort. cliff.* 433.  
*Helicteres arbor* indiæ orientalis, siliqua varicosa & fu-  
 niculi in modum contortuplicata. *Pluk. alm.* 181.  
 t. 245. f. 2.  
*Frutex indicus*, fructu e styli apice egresso sextuplici fu-  
 niculo in spiram convoluto constante. *Raj. hist.* 1765.  
*Ifora Murri.* *Rheed. mal.* 6. p. 55. t. 30.  
 β. *Helicteres arbor* Indiæ occidentalis, fructu majore.  
*Pluk. alm.* 182. t. 245. f. 3.  
*Abutilo* affinis arbor, altheæ folio, cujus fructus est  
 styli apex acutus quatuor f. quinque sillquis hirsutis,  
 funis ad instar in spiram convolutis. *Sloan. jam.* 97.  
*hist.* 1. p. 22.  
*Habitat in* Malabarîa, Jamaica. &  
 2. *HELICTERES* foliis lanceolatis integerrimis, fructu angustifolia.  
 ovato recto.  
*Habitat in* China. *Osbeck.* &  
*Arbor.* Folia lanceolata, supra nuda, subtus tomentosa,  
 petiolata, integerrima, acuminata. Flores petalis  
 sparsi. Calyx tomentosus. Petala quinque, ad basin la-  
 minarum utrinque dente aucta. Receptaculum longi-  
 tudin-

*tudine floris, filiforme, cujus apici stamina 10 parva, & Stylus unicus. Capsula ovata, tomentosa, minime contorta, sed ex Capsulis 5, parallelis, rectis, approximatis composita.*

## POLYANDRIA.

### GREWIA.

*occidentalis.* 1. GREWIA foliis subovatis.

*Grewia corollis acutis. Hort. cliff. 433.*

*Ulmifolia arbor africana baccifera, floribus purpureis.*

*Pluk. alm. 393. t. 237. f. 1.*

*Ulmī facie arbulcula æthiopica, ramulis alatis, floribus purpurascens. Comm. hort. 1. p. 165. t. 85. Seb.*

*thes. 1. p. 46. t. 29. f. 3. Raj. dendr. 13.*

*Habitat in Æthiopia, Curacao. 5*

*orientalis.* 2. GREWIA foliis sublanceolatis: *Fl. zeyl. 324. \**

*Grewia corollis obtusis. Roy. lugdb. 476. Hort. cliff. 433.*

*Pai-parcea f. Couradi. Rheed. mal. 5. p. 91. t. 46. Raj. hist. 1624.*

*Habitat in India. 5*

### ARUM.

*\* Acaulia: foliis compositis.*

*Dracunculus.*

1. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. *Roy. lugdb. 7*

*Arum foliis palmatis: foliolis undecim lanceolatis integerrimis: intermediis majoribus, spadice clavato Hort. cliff. 344.*

*Dracunculus polyphyllus. Bauh. pin. 195. Moris. hist. 3. p. 548. f. 13. t. 5. f. 46.*

*Dracontium. Dod. pempt. 329.*

*Habitat in Europa australi.*

*Dracontium* 2. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis superantibus spatham spadice breviorē. *Roy. lugdb. 7.*

*Arum polyphyllum minus & humilius. Herm. lugdb. 60.*

β. Arum f. Arisarum virginianum, dracontii folio, perenne viridi longo acuminato. *Pluk. alm. 52. t. 271. f. 1.*

*Habitat in America.*

*pentaphyllum.*

3. ARUM acaule, foliis quinatis.

Arum



*Arum pentaphyllum indicum. Moris. hist. 3. p. 540. f. 13. t. 5. f. 27. mal.*

*Romphal planta indiæ orientalis. Zan. hist. 205. fig. mal.*

*Habitat in India.*

4. ARUM acaule, foliis ternatis. *Gron. virg. 113. triphyllum.*

*Dracunculus f. Serpentaria triphylla brasiliiana. Bauh. pin. 195. prodr. 101. Dod. mem. 81.*

β. *Arum minus triphyllum f. Arisarum, pene viridi, virginianum. Moris. hist. 3. p. 547. f. 13. t. 5. f. 43.*

γ. *Arum f. Arisarum triphyllum minus, pene atrorubente, virginianum. Pluk. alm. 52. t. 77. f. 5.*

*Habitat in Virginia, Brasilia. 2*

*Plantæ brasiliianæ foliola lateralìa extrorsum lobata, virginianæ autem tantum gibba, eandem tamen suadet Floris structura.*

\* *Acaulia, foliis simplicibus.*

5. ARUM acaule, foliis trilobis, flore sessili. *Fl. zeyl. trilobatum. 326. \**

*Arum, trilobato folio, humilius & minus zeylanicum.*

*Herm. par. 78. t. 78. Raj. suppl. 575.*

*Arum humile zeylanicum latifolium, pistillo coccineo.*

*Comm. hort. 1. p. 97. f. 51.*

*Habitat in Zeylona. 2*

6. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis repandis: basi semibifidis. *Colocasia. Hort. cliff. 434. n. 4. Hort. upf. 280. Roy. lugdb. 7.*

*Arum maximum ægyptium quod vulgo Colocasia.*

*Bauh. pin. 195.*

*Arum ægypticum. Col. ecphr. 2. p. 1. t. 1.*

*Colocasia. Clus. hist. 2. p. 75.*

*Habitat in Cretæ, Cypri, Syriæ, Ægypti aquosis. 2*

7. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis integerrimis: basi esculentum. *ternibifidis. Hort. cliff. 435. Hort. upf. 880. Roy. lugdb. 7.*

*Arum minus, nymphææ folio, esculentum. Sloan. jam.*

*62. hist. 1. p. 167. t. 106. f. 1.*

*Brassica brasiliiana, foliis nymphææ. Bauh. pin. 111.*

*Habitat in America. 2*

8. ARUM acaule, foliis peltatis cordatis repandis: basi bipartitis. *Fl. zeyl. 327. Roy. lugdb. 7. macrorrhizon.*

*Arum maximum macrorrhizon zeylanicum. Herm. par.*  
*73. t. 73. Raj. suppl. 574.*  
*Habitat in Zeylona. &*

*peregrinum.* 9. *ARUM* acaule, foliis cordatis obtusis mucronatis, anguliculis rotundatis *Hort. cliff. 435. \**  
*Habitat in America. &*

*divaricatum* 10. *ARUM* acaule, foliis cordatis angulatis divaricatis.  
*Arum acaule, foliis subhastatis. Fl. zeyl. 325. \**  
*Neienschena major. Rheed, mal. 11. p. 39. t. 20.*  
*Habitat in India, &*

*sagittifolium.* 11. *ARUM* acaule, foliis sagittatis triangulis: angulis divaricatis acutis, *Hort. cliff. 345. Roy. lugdb. 8.*  
*Arum minus esculentum, sagittariae foliis viridi nigricantibus. Sloan. jam. 63. hist. 1, p. 167, t. 106. f. 2.*  
*Arum minus, sagittariae foliis. Pluk. phyt. 149. f. 2.*  
*Habitat in Brasilia, Jamaica, Barbados. &*

*maculatum,* 12. *ARUM* acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato, *Hort. cliff. 8, Hort. ups. 279. Mat. med. 417. Roy. lugdb. 8. Dalib. paris. 279.*  
*Arum vulgare non maculatum, Baub. pin. 195.*  
*Arum, Fuchsf. hist. 69. Lob. ic. 597.*  
*Arum venis albis. Baub. pin. 195.*  
*Arum maculatum, maculis candidis s. nigris, Baub. pin. 195.*  
*Habitat in Europa australiore. &*

*virginicum,* 13. *ARUM* acaule, foliis hastato-cordatis acutis: angulis obtusis. *Hort. cliff. 434. \* Gron. virg. 112.*  
*Habitat in Virginia, &*

*proboſcideum,* 14. *ARUM* acaule, foliis hastatis, spatha declinata filiformi-subulata. †  
*Arisarum flore in tenuem caudam abeunte, Tournef. inst. 161.*  
*Arisarum minus proboſcideum, Boec. mus. 2. p. 61. t. 50.*  
*Arisarum latifolium minus repens cespitosum. Barr. rar. 182. t. 1150.*  
*Habitat in Apenninis,*

*Arisarum,* 15. *ARUM* acaule, foliis cordato-oblongis, spatha bifida, spadice incurvo, *Hort. cliff. 435. Roy. lugdb. 7.*  
*Arisarum latifolium majus. Baub. pin. 196.*  
*Arisarum latifolium alterum, Baub. pin. 196.*

A-

*Arisarum latifolium.* *Clus. hist.* 2. p. 73. *Lob. ic.* 598.  
*Habitat in* Mauritaniæ, Italiæ, Lusitaniæ, Hispaniæ, Gal-  
 loprovinciæ *memoribus.*

16. ARUM acaule, foliis ovato-oblongis. ovatum.  
*Karimpola. Rheed. mal.* 11. p. 45. t. 23.  
*Habitat in* India.

17. ARUM acaule, foliis lanceolatis, spadice setaceo de- tenuifolium.  
 clinato. *Hort. cliff.* 345. *Roy. lugdb.* 8. *Sauv. monsp.*  
 16.

*Arum angustifolium.* *Bauh. pin.* 196. *Clus. hist.* 2. p.  
 74. *Morif. hist.* 3. p. 545. f. 13. t. 6. f. 21.  
*Habitat in* Dalmatia, Romæ, Monspelii. &

\* *Caulescens.*

18. ARUM caulescens, foliis sagittatis. arborescens.  
*Arum arborescens, sagittariæ foliis.* *Plum. amer.* 44. t.  
 51. g. & 60.  
*Habitat in* America meridionali. &  
 Numerosa cohors *Ari* apud Plumierum, *Rheed;* *Her-*  
*mannum, nundum sufficienter genere distincta est.*

DRACONTIUM.

1. DRACONTIUM scapo brevissimo, petiolo radicato *polyphyllum*  
 lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis. *Hort.*  
*cliff.* 434. \* *Roy. lugdb.* 6  
*Arum polyphyllum, caule scabro punicante.* *Herm.*  
*par.* 93. t. 93.  
*Arum polyphyllum sirinamense, caule atrorubente gla-*  
*bro & eleganter variegato.* *Pluk. alm.* 52. t. 149.  
 f. 1.  
*Habitat* Surinami. &  
 2. DRACONTIUM foliis sagittatis, pedunculis petio- *spinosum.*  
 lisque aculeatis. *Fl. zeyl.* 328.  
*Arum zeylanicum spinosum, sagittæ foliis.* *Herm. par.*  
 75.  
*Arum minus zeylanicum, sagittariæ foliis.* *Raj. suppl.*  
 575.  
*Habitat in* Zeylona.  
 3. DRACONTIUM foliis subrotundis. *Cold. noveb.* 214. \* *setidum.*  
*Calla aquatilis odore allii vehemente prædita.* *Gron. virg.*  
 186. \*  
*Habitat in* Virginia.

*camischat-  
cense.*

4. **DRACONTIUM** foliis lanceolatis. *Amœn. acad.* 2.  
p. 360. \*  
*Habitat in Sibiria.*

*pertusum.*

5. **DRACONTIUM** foliis pertusis, caule scandente.  
Arum hederaceum, amplis foliis perforatis. *Plum. amer.*  
40. t. 56. 57.  
*Habitat in America meridionali. h*

### CALLA.

*æthiopica.*

1. **CALLA** foliis sagittato-cordatis, spatha cucullata, spadice superne masculo. *Hort. cliff.* 435.  
Arum æthiopicum, flore albo odorato moschum olente.  
*Comm. hort.* 1. p. 95. t. 59.  
*Habitat in Æthiopia.*

*palustris.*

2. **CALLA** foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. *Hort. cliff.* 436. *Fl. succ.* 744.  
*Calla foliis cordatis. Fl. lapp.* 320.  
*Dracunculus palustris* f. radice arundinacea. *Bauh. pin.* 195.  
*Dracunculus aquatilis. Dod. pempt.* 330.  
*Provenzalina palustris. Petit. gen.* 45.  
*Habitat in Europæ borealis paludibus.*

### POTHOS.

*scandens.*

1. **POTHOS.** *Fl. zeyl.* 329. \*  
*Potha. Burm. zeyl.* 197.  
*Habitat in Zeylona. h*

### ZOSTERA.

*marina.*

1. **ZOSTERA.** *It. wgarth.* 166, t. 4. f. 1.  
*Ruppia foliis linearibus obtusis. Moëbr. act. angl.* 1741.  
p. 217.  
*Alga angustifolia vitriariorum. Bauh. pin.* 464. *Fl. succ.* 1137.  
*Fructus* f. *Alga marina graminea angustifolia seminifera ramosior. Raj. angl.* 3. p. 52.  
*Habitat in mari Balthico, Oceano,*

## Classis XXI.

## MONOECIA.

## MONANDRIA.

## ZANNICHELLIA.

1. ZANNICHELLIA. *Fl. lapp.* 321. *Fl. suec.* 745. *palustris.*  
*Hort. cliff.* 437. *Roy. lugdb.* 9.  
*Zannichellia palustris major*, foliis gramineis. *Michb.*  
*gen.* 71. t. 34. f. 1. 2.  
*Algoides vulgaris.* *Vaih. act.* 1719. p. 15. t. 1. f. 1.  
*Potamogeton capillaceum*, capitulis ad alas trifidis.  
*Bauh. pin.* 193. *prodr.* 101.  
*Potamogetoni similis graminifolia ramosa & ad genicu-*  
*la polyceratos.* *Pluk. alm.* 305. t. 192. f. 7.  
*Habitat in Europæ, Virginie fossis, fluviiis.* ☉

CALLITRICHE. *Syst.* 844.

1. CALLITRICHE. *Gen. nav.* 1104. *palustris.*  
*Callitriche plinii.* *Col. cephr.* 315. t. 316.  
*Corispermum foliis oppositis.* *Fl. lapp.* 2. *Fl. suec.* 3.  
*Hort. cliff.* 3. *Gran. virg.* 3. *Roy. lugdb.* 205.  
*Stellaria foliis omnibus subrotundis.* *Hall. helv.* 199. minima.  
*Lenticula palustris bifolia*, fructu tetragono. *Bauh. pin.*  
 362.  
 β. *Stellaria foliis omnibus angustis: apice resecto.* *Hall. bifida.*  
*helv.* 198.  
*Lenticula palustris angustifolia*, folio in apice dissecto.  
*Læs. pruss.* 140. t. 38.  
 γ. *Stellaria foliis ad caulem angustis; in summitate subro-*  
*tundis.* *Hall. helv.* 108.  
*Stellaria aquatica.* *Bauh. pin.* 141.  
*Habitat in Europæ fossis paludibus.* ☉

## CERATOCARPUS.

1. CERATOCARPUS. *Amœn. acad.* 1. p. 412. *Hort. arenarum.*  
*upf.* 281. \* *Buxb. act.* 1. p. 241.  
*Habitat in Tatarie arenosis.* ☉

## CYNOMORIUM.

*coccineum.* 1. CYNOMORIUM. *Mat. med.* 534.

Cynomorium purpureum officinarum. *Mich. gen.* 17. f. 12.

Fungus mauritanicus verrucosus ruber. *Petiv. gaz. t.* 39. f. 8

Fungus typhoides coccineus tuberosus melitensis. *Bocc. mus. 2. p.* 69. *fig.* 80. *t.* 81.

Fungus typhoides liburnensis. *Till. pis.* 64. *t.* 25.

*Habitat in Sicilia, Melita, Mauritania parasiticum terrestris.*

## DIANDRIA.

## LEMNA

*trifolca.* 1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. *Fl. lapp.* 470. *Fl. suec.* 1000. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 516.

Lemna foliis lanceolatis: extremis decussatis. *Sauv. monsp.* 91.

Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. f. 5.

Lenticula aquatica trifolca. *Baub. pin.* 362.

Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.

*Habitat in Europæ sub aquis pigris puris.*

*minor.* 2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. suec.* 999. *Roy. lugdb.* 516.

Lenticula minor monorhiza, foliis subrotundis utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. f. 3.

Lens palustris. *Cam. epit.* 852. *Raj. angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. f. 1

*Habitat in Europæ aquis quietis.*

*gibba.* 3. LEMNA foliis sessilibus subtus hemisphæricis, radicibus solitariis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. suec.* 998.

Lenticula palustris major: inferne magis convexa, fructu polyspermo. *Mich. gen.* 15. *t.* 11. f. 2

*Habitat in Europæ aquis jegenibus.*

*polyrhiza.* 4. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. *Hort. cliff.* 417. *Fl. suec.* 997. *Roy. lugdb.* 516.

Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. f. 1.

Len-

*Lenticula palustris major. Raj. angl. 3. p. 129. t. 4 f. 2.*  
*Habitat in Europæ paludibus, fossis.*

## TRIANDRIA.

## TYPHA.

1. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femi-latifolia  
 neaque approximatis. *It. scan. 168.*  
*Typha palustris major. Baub. pin. 20. Moris. hist. 3.*  
*p. 246. f. 8. t. 13. f. 1.*  
*Habitat in paludibus Europæ.*
2. TYPHA foliis semicylindricis, spica mascula feminea-angustifolia  
 que remotis. *It. scan. 198.*  
*Typha. Hort. cliff. 439. Fl. suec. 772. Roy. lugdb. 73.*  
*Gmel. sib. 1. p. 133. Fuchsf. hist. 822.*  
*Typha palustris, clava gracili. Baub. pin. 20.*  
*Typha palustris media. Moris. hist. 3. p. 246. f. 8.*  
*t. 13. f. 2.*  
*Habitat in Europæ paludibus. &*

## SPARGANIUM.

1. SPARGANIUM foliis erectis triquetris. *Fl. lapp. erectum.*  
*345. Fl. suec. 770. Hort. cliff. 439. Roy. lugdb. 73.*  
*Gron. virg. 114. Gmel. sib. 1. p. 133.*  
*Sparganium ramosum. Baub. pin. 15. theatr. 228.*  
*Platanaria s. Butomon. Dod. pempt. 601.*
- β. Sparganium non ramosum. *Baub. pin. 15. theatr. 231.*  
*Habitat in Zonæ frigida septentrionalis aquosis. &*
2. SPARGANIUM foliis decumbentibus planis. natans.  
*Sparganium foliis natantibus plano-convexis. Fl. lapp.*  
*345. Fl. suec. 771.*  
*Sparganium non ramosum minus. Dill. giff. 130.*  
*spec. 58.*  
*Sparganium minimum. Raj. hist. 1910. angl. 3. p. 437.*  
*Habitat in Europæ borealis lacubus, paludibus. &*

## ZEA.

1. ZEA. *Hort. cliff. 437. Hort. ups. 281. Roy. lugdb. 73. Mays.*  
*Frumentum indicum Mays dictum. Baub. pin. 25.*  
*theatr. 490.*

Fru-

Frumentum indicum. *Cam. epit.* 186. *Dod. pempt.* 509.  
*Habitat in America.* ☉  
*Varietates hujus plurimæ existunt.*

## COIX.

*Lacryma  
 Jobi.*

1. COIX seminibus ovatis. *Hort. cliff.* 437.. *Hort. ups.* 281. *Fl. zeyl.* 330. *Gron. virg.* 114. *Roy. lugdb.* 72.  
 Lithospermum arundinaceum. *Bauh pin.* 258.  
*Lacryma Jobi. Clus. hist.* 2. p. 216.  
*Habitat in Indiis.* 2

*dactylodes.*

2. COIX seminibus angulatis. *Hort. cliff.* 438. *Roy. lugdb.* 72.  
 Gramen Dactylon maximum americanum. *Pluk. alm.* 178 t. 190. f. 2.  
 Gramen Dactylon indicum esculentum, spica articulata. *Ambr. phyt.* 1. p. 545. t. 546. 547. *Morif. hist.* 3. p. 185. f. 8. t. 3. f. 11. *Scheuch. gram.* 108.  
 Sesamum perenne indicum, spica frumentaeca. *Zan. hist.* 181. t. 68.  
*Habitat in America.* 2

## CAREX.

\* *Spica unica simplici.*

*dioica.*

1. CAREX spica simplici dioica. *Hort. cliff.* 438. *Fl. suec.* 746.  
 Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuissimis triangularibus, spica longiore (& subrotunda), capsulis oblongis. *Micb. gen.* 56. t. 32. f. 1. 2.  
 Gramen cyperoides minimum, spica simplici casta. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. ult. (mas). *Scheuch. gram.* 497. t. 11. f. 9.  
 Gramen cyperoides minimum, ranunculi capitulo simplici asperiore rotundo. *Morif. hist.* 3. p. 245. f. 8. t. 12. f. 36.  
*Habitat in Europæ pratis humidis.* 2

*pulicaris.*

2. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis.  
 Carex spica simplici androgyna. *Hort. cliff.* 438. *Fl. suec.* 747. *It. gotl.* 240. *Dalib. parif.* 287. *Gmel. sib.* 1. p. 144.  
 Carex spica unica. *Fl. lapp.* 747. 1399  
 Carex minima, caulibus & foliis capillaceis, capitulo singulari



singulari tenuiori, capsulis oblongis utrinque acuminatis & deorsum flexis. *Mich. gen.* 66. t. 33. f. 1.

Gramen cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis puliciformibus. *Raj. hist.* 1298. *Pluk. phyt.* 34. f. 10. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 21.

*Habitat in Europæ paludibus limosis.* 2

3. CAREX spica simplici androgyna: inferne mascula, *squarrosa*. capsulis imbricatis horizontalibus.

*Habitat in Canada. Kalm.*

Spica oblonga, cylindrica, crassa, constans Capsulis horizontalibus, imbricatis, apice lineari longitudine ipsius capsulae prominentibus; inferne Spica paleis exaridis masculis tegitur. Inter Carices majores numeranda.

\* *Spicis androgynis.*

4. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus, foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *It. æl.* 139. *Fl. suec.* 749. \*

Carex maritima humilis, radice repente, caule triquetro, spica spadicea. *Mich. gen.* 67. t. 33. f. 4.

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha. *Scheuch. gram.* 496. t. 11. f. 6.

Gramen cyperoides minus repens, spica divisa. *Loef. pruss.* 116. t. 31.

*Habitat in Europæ arena, præsertim mobili.* 2

5. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo tereti. *Fl. suec.* 748.

*Habitat in Sueciæ paludibus sylvaticis.*

6. CAREX spica composita, spiculis ovaris sessilibus *leporina*, approximatis alternis androgynis nudis. *Fl. suec.* 751.

*Gmel. fib.* 1. p. 147.

Carex spicis ternis sessilibus confertis androgynis. *Fl. lapp.* 322.

Gramen Cyperoides, spica e pluribus spicis mollibus composita. *Scheuch. gram.* 456. t. 10. f. 15.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa. *Banh. pin.* 6. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 29.

*Habitat in Europæ pratis udis.* 2

7. CAREX spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovaris sessilibus glomeratis: superne masculis

masculis. *Hort. cliff.* 438. *Fl. suec.* 750. *Dalib. paris.* 286. *Roy. lugdb.* 74. *Gmel. fib.* 1. p. 146. t. 32.

*Carex palustris* major, radice fibrosa, caule exquifite triangulari, spica brevi habituere compacta. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 13. 14.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica compacta. *Bauh. pin.* 6. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 14.

*Habitat in Europæ paludibus nemorosis.*

*muricata.*

8. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Fl. suec.* 752. *Gmel. fib.* 1. p. 148.

*Carex* spica androgyna, spiculis compactis obscure alternis, culmo nudo compresso. *Gvett. stamp.* 1. p. 149.

*Carex nemorosa*, fibrosa radice, angustifolia minima, caule exquifite triangulari, spica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 11.

Gramen Cyperoides spicatum minimum, spica divulsa aculeata. *Scheuch. gram.* 485. t. 11. f. 3.

Gramen nemorosum, spicis parvis asperis. *Bauh. pin.* 7. *Morif. hist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 27.

*Habitat in Europæ nemoribus humentibus. 2*

*loliacea.*

9. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis; capsulis ovatis teretiusculis muticis divaricatis.

*Habitat in Svecia.*

*Radix repens.* Folia graminea, tenera, lævia. Culmus lævis, superne nudus. Spiculæ 4 f. 8, ovatae, parvae, ad apicem culmi sparse, albide. Semina ovata, obtusa, mutica demto pistillo, subius rotundata. Differt a *C. muricata*, cui simillima, quod dimidio minor, quod capsula minus divaricata, obtusa, nec margine acuta; ad hanc nostram propius accedunt figura. *Morif. hist.* f. 8. t. 12. f. 26. *Pluk. phyt.* 34. t. 4. quam ad alias.

*elongata.*

10. CAREX spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. *Fl. suec.* 753.

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuch. gram.* 487. t. 11. f. 4.

*Habitat in Europa. 2*

*canescens.*

11. CAREX spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis, capsulis ovatis obtusiusculis. *Fl. suec.* 745. *Dalib. paris.* 287.

*Carex* spica androgyna, spiculis compactis obscure alternis, culmo nudo compresso. *Gvett. stamp.* 149.

Ca.

*Carex* spicis plurimis remotis sessilibus subrotundis tur-  
gidis. *Fl. lapp.* 332.

Gramen Cyperoides spicis curtis divulsis. *Læs. pruss.*  
117. t. 32.

*Habitat in Europæ septentrionali. 2*

\* *Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.*

12. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis: *flava*.  
mascula linearis, capsulis acutis recurvis. *Fl. suec.* 755.  
*Dalib. parif.* 284.

*Carex* spicis ad apicem tribus sessilibus: femineis sub-  
rotundis, capsulis acutis recurvis. *Fl. lapp.* 334.

Gramen Cyperoides palustre aculeatum, capitulo bre-  
viore. *T. Scheuch. gram.* 426.

Gramen Cyperoides aculeatum germanicum s. minus.  
*Bauh. pin.* 7. *Morif. hist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 19.

*Habitat in Europæ paludibus.*

13. CAREX spicis remotis, femineis subsessilibus, ca-  
psulis hirtis. *Fl. lapp.* 335. *Fl. suec.* 757. *Dalib. parif.*  
282. *Roy. lugdb.* 74.

*Carex* pilosa, spicis erectis: masculis tribus sessilibus:  
secunda minore; femineis duabus remotis. *Hort.*  
*cliff.* 438.

Cyperoides polystachyon lanuginosum. *Morif. hist.* 3.  
p. 243. f. 8. t. 12. f. 10. *Pluk. alm.* 178. t. 34 f. 6.

*Habitat in Europæ sabulosis.* *Schz 472*

14. CAREX spicis linearibus erectis: mascula brevior digitata.  
inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus.  
*Fl. suec.* 758. *Hort. cliff.* 438. *Dalib. parif.* 285.  
*Roy. lugdb.* 75.

*Carex* spica mascula terminali, quam feminea suprema  
brevior, capsulis distantibus. *Fl. lapp.* 338.

Cyperoides montanum nemorosum, caule triquetro  
compresso, spicis ferrugineis tenuioribus inter se di-  
stantibus. *Mich. gen.* 65. t. 32. f. 9.

Gramen caryophyllatum montanum, spica varia. *Bauh.*  
*pin.* 4. *prodr.* 9. *Scheuch. gram.* 448. t. 10. f. 14.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu triangulari.  
*Læs. pruss.* 112. t. 27.

*Habitat in Europæ nemoribus. 2*

15. CAREX spicis femineis sessilibus subsolitariis ova-  
montana, ris masculæ approximatis, culmo nudo, seminibus  
glabris.

Cype-

- Cyperoides montanum*, foliis angustis parvis, spica spadicca divisa. *Scheuch. gram.* 419? t. 10. f. 8. 9.
- Cyperoides alpinum saxatile*, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, spica terminali nigricante plerumque unica. *Mich. gen.* 64. t. 32. f. 3.  
*Habitat in Europæ montanis apricis.* 2  
*Folia mollia, congenerum magis flavescentia.*
- globularis.* 16. CAREX spica mascula oblonga, feminea sessili ovata, foliolo florali breviori approximata. *Fl. succ.* 759.  
 Carex spica mascula a feminea in ala folioli remota. *Fl. lapp.* 336.  
*Habitat in Europa frigidiore.*
- filiformis.* 17. CAREX spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis, inferiore foliolo proprio brevior. *Fl. succ.* 760.  
*Cyperoides sylvaticum tenuifolium*, spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. *Scheuch. gram.* 425. t. 10. f. 11.  
*Habitat in Europæ nemoribus.*
- pilulifera.* 18. CAREX spicis terminalibus confertis subrotundis: masculina oblonga. *Roy. lugdb.* 75.  
 Gramen cyperoides tenuifolium, spicis ad summum caulis sessilibus globulorum æmulis. *Pluk. alm.* 178. t. 91. f. 8.  
*Habitat in Europa.*
- saxatilis.* 19. CAREX spicis tribus ovatis sessilibus alternis; mascula oblonga. *Fl. succ.* 756  
 Carex spicis tribus ad apicem sessilibus, femineis ovatis atris. *Fl. lapp.* 337.  
*Cyperoides alpinum saxatile*, caule cubitali rotundo-triquetro nudo, spicis brevibus binis s. ternis confertim nascentibus, squamis obtuse mucronatis. *Mich. gen.* 63. t. 32. f. 4?  
*Habitat in Europæ alpinis.*
- \* *Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.*
- atrata.* 20. CAREX spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Hort. cliff.* 438. *Gmel. sib.* 1. p. 149.  
 Carex spicis ad apicem culmi pendulis androgynis. *Fl. lapp.* 324. *Roy. lugdb.* 74.  
 Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris & tumentibus. *Scheuch. gram.* 481. f. 11. f. 1

Gramen

*Gramen Cyperoides alpinum majus, spicis atris plurimis simul junctis. Rudb. elyf. 1. p. 55. t. 23.*

*Habitat in Alpibus Europæ.*

21. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore; radice repente. *Hort. cliff. 439. n. 8. Fl. suec. 762. Gmel. sib. 1. p. 140.*

*Carex spicis versus apicem pendulis: masculis & feminis. Fl. lapp. 325.*

*Carex spicis lemniferis latis ovalibus pendulis. Hall. belv. 239.*

*Cyperoides spica pendula brevior: squamis e spadiceo f. fusco rutilante viridibus. Schenck. gram. 447. t. 10. f. 13. l. 13.*

*Habitat in Europæ frigida paludibus sylvaticis.*

22. CAREX spicis pendulis: mascula erecta, femineis obcapillari longis distichis, capsulis nudis acuminatis. *Fl. suec. 763. \* It. gotl. 240.*

*Carex spicis ex apice pendulis: masculina & femineis albis. Fl. lapp. 326.*

*Gramen Cyperoides pusillum, spica flavescente. Rudb. elyf. 1. p. 58. t. 40.*

*Habitat in Sueciæ pratis humidis.*

23. CAREX spicis pendulis: mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Fl. suec. 764. \* Gmel. sib. 1. p. 139.*

*Carex spicis tribus pedunculatis erectis remotis: mascula & femineis. Fl. lapp. 327. Roy. l. gdo. 75.*

*Cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. Pluk. alm. 178. t. 34. f. 5. Mich. gen. 61. t. 39. f. 13.*

*Habitat in Europæ paludibus. &*

24. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Fl. suec. 765. Dalib. paris. 283. Gmel. sib. 1. p. 136.*

*Carex spicis remotis sessilibus, capsulis globosis. Fl. lapp. 333.*

*Carex spicis maribus sessilibus, feminis turgidis & erectis. Hall. belv. 240.*

*Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis e rarioribus & tumidioribus vesicis compositis. Mich. gen. 61. t. 32. f. 11. Pluk. alm. 178. t. 91. f. 7.*

*Habitat in Europæ uliginosis. &*

- folliculata.* 25. CAREX spicis terminalibus pedunculatis: mascula femineaque, capsulis subulatis, longitudine spicæ.  
*Habitat in Canada. Kalm.*  
 Culmus triqueter, bipedalis, vestitus Foliis angustioribus. Spica terminalis mascula, oblonga, pedunculata. In eadem ala Spica feminea ex Capsulis 7-8, conicis subulatis, longitudine ipsius spicæ, in fundo semine fœtis, patulis.
- PseudoCyperus.* 26. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis.  
 Carex spicis pendulis: omnibus femineis: unica androgyna inferne mascula. *Hort. cliff.* 439. *Fl. suec.* 766. *Roy. lugdb.* 75. *Grøn. virg.* 114. *Dalib. paris.* 281.  
 Cyperoides spica pendula brevior. *Scheuch. gram.* 449.  
 Gramen Cyperoides spica pendula brevior. *Bauh. pin.* 6. *Morif. bist.* 3. p. 242. f. 8. t. 12. f. 5.  
 PseudoCyperus. *Dod. pempt.* 339.  
*Habitat in Europæ fœssis.*
- cespitosa.* 27. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro *Fl. suec.* 767. *Gmel. fib.* 1. p. 137.  
 Gramen Cyperoides cariophyllum, folio longiore & angustiore, spicis sessilibus compactis erectis. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 14.  
 Cyperoides sylvaticum angustifolium, spicis parvis tenuibus spadiceo viridibus. *Scheuch. gram.* 415. t. 10. fl.  
*Habitat in Europæ paludibus turfosiss.* &
- \* *Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.*
- acuta.* 28. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Fl. suec.* 769. *Dalib. paris.* 281.  
 Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis foliolo florali brevioribus: superioribus masculis. *Hort. cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 74.
- nigra.* a. Carex nigra verna vulgaris. *Fl. lapp.* 330.  
 Gramen Cyperoides, foliis cariophyllæis, vulgatissimum. *Raj. bist.* 1292.
- ruffa.* β. Carex spicis masculis superioribus numerosis, femineis inferioribus: intermedia unica androgyna. *Roy. lugdb.* 75.  
 Carex maxima, spicis plurimis remotis longis. *Fl. lapp.* 329.  
 Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis habitioribus: squamis curtis. *Misch. gen.* 62. t. 32. f. 12.

Cypc-

*Cyperoides latifolium*, spica ruffa f. caule triangulo.  
*Scheuch. gram.* 458.

Gramen *Cyperoides* spica ruffa, f. caule triangulo: *Bauh.*  
*pin.* 6.

*Habitat in Europæ ubique: α. in siccioribus, β. in aquosis.*

29. *CAREX* spicis masculis pluribus, femineis peduncu-  
latis, capsulis inflatis acuminatis. *Fl. succ.* 768. *Dalib.*  
*parif.* 282. *Gmel. sib.* 1. p. 143.

*Carex* spicis plurimis: florescentibus tenuibus, fructiferis  
crassis. *Fl. lapp.* 339.

*Cyperoides velicarium*, spicis viridantibus & subiuscis.  
*Scheuch. gram.* 470.

Gramen *Cyperoides angustifolium*, spicis longis ere-  
ctis. *Bauh. pin.* 6.

β. *Carex* culmo longissimo, spicis tenuibus remotis. *Fl.*  
*lapp.* 328. *Roy. lugdb.* 75.

Gramen *Cyperoides sylvarum* tenuius spicatum. *Raj.*  
*hist.* 1295. *Morif. hist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 9.  
*Scheuch. gram.* 418.

γ. *Carex* spicis femininis oblongis pedunculatis breviori-  
bus: masculis sessilibus, ultima longissima, capsulis  
inflatis acuminatis. *Roy. lugdb.* 76.

Gramen *Cyperoides majus præcox*, spicis rurgidis tere-  
tibus flavescentibus. *Morif. hist.* 3. p. 242.

*Habitat in Europæ nudi sylvaticis.*

## AXYRIS.

1. *AXYRIS* foliis lanceolatis tomentosis, floribus femi- *Ceratoides.*  
neis lanatis. *Gen. nov.* 1105.

*Urtica* foliis lanceolatis, <sup>†</sup>femininis hirsutis. *Roy. lugdb.*  
210. <sup>+ florib.</sup>

*Ceratoides orientalis* fruticosa, clægni folio. *Tournef.*  
*cor.* 52.

*Habitat in Tataria, Moravia.* β

2. *AXYRIS* foliis ovatis, caule erecto, spicis simplici- *Amaranthos:*  
bus. *Gen. nov.* 1105. *Det.*

*Atriplex montana* incanescens, latiusculo folio non si-  
nuato, fructu in thyrsulis squarrosis nigricante patu-  
lo. *Amm. ruth.* 230?

*Habitat in Dauria.* ☉

Folia scabra pilis stellatis. Rami fructiferi ad basin lon-  
ge nudi. Spica minima, subsessilis, simplicissima, ra-  
mos terminans.

- hybrida.* 3. *AXYRIS* foliis ovatis, caule erecto, spicis conglomeratis. *Gen. nov.* 1105.  
*Habitat in Sibiria.* ☉  
*Simillima precedenti, a qua differt Spica longe pedunculata, conglomerata s. secunda, torta, ramis fructiferis juxta caulem congestis Foliis, magisque asperis.*
- prostrata.* 4. *AXYRIS* foliis obovatis, caule subdiviso, floribus capitatis. *Gen. nov.* 1105.  
*Habitat in Sibiria.* ☉  
*Caulis ramosissimus, spithameus, diffusus. Folia obverse ovata, petiolata. Flores ad apices ramorum conglomerati, immixtis foliis numerosis.*

## TRAGIA.

- volubilis.* 1. *TRAGIA* foliis cordato-oblongis, caule volubili. *Tragia scandens*, longo betonica folio. *Plum. gen.* 14.  
*Urtica racemosa scandens angustifolia, fructu tricocco. Sloan. jam. 38. hist. 1. p. 123. t. 82. f. 1. Raj. suppl. 105.*  
*Habitat in Jamaica.* 2. ☿  
*Caulis volubilis, contra solem scandens. Folia cordata, oblongo-acuminata, argute serrata, petiolata, pilis rigidis adpersa. Racemi axillares, solitarii, masculi. Flores viridibus, trifidis. Antheris 3, luteis. Femineus flos axillaris, solitarius, insidens Pedunculo longo, articulado, incurvo. Capsula tricocca, setis rigidis urentibus tecta, singulo loculo extus ad basin notato punctis duobus prominentibus.*
- involucrata.* 2. *TRAGIA* involucri femineis pentaphyllis pinnatifidis.  
*Acalypha involucri femineis pentaphyllis pinnatifidis. Fl. zeyl. 340.*  
*Croton foliis ovato-lanceolatis serratis hispidis, caule fruticoso. Roy. lugdb. 201.*  
*Ricinocarpus zeylanicus hirsutus, foliis lanceolatis serratis. Burm. zeyl. 202. t. 92.*  
*Schorigeram. Rheed. mal. 2. p. 73. t. 39. Raj. hist. 160.*  
*Habitat in India.* ☿
- Mercurialis.* 3. *TRAGIA* foliis ovatis. *Fl. zeyl. 334.*  
*Mercurialis maderaspatensis tricoccus acetabulis destituta. Pluk. alm. 248. t. 205. f. 4.*



*Pec-cupameni. Rheed. mal. 10. t. 82. Raj. suppl. 205.*  
*Habitat in India.*

4. **TRAGIA** foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Fl. Chamælea. zeyl. 335. \**  
*Chamælea* foliis linearibus, flosculis spicatis, echinato fructu. *Burm. zeyl. 59. t. 25.*  
*Codi-avanacu. Rheed. mal. 2. p. 63. t. 34. Raj. hist. 1710.*  
*Habitat in India.*

## HERNANDIA.

1. **HERNANDIA.** *Hort. cliff. 485. t. 23. Fl. zeyl. senora. 423. \**  
*Hernandia* amplo hederæ folio umbilicato. *Plum. gen. 6.*  
*Nux vesicaria* oleosa, foliis umbilicatis. *Pluk. alm. 266. t. 208. f. 1.*  
*Habitat in Indiis. b*

## PHYLLANTHUS.

1. **PHYLLANTHUS** caule arboreo, foliis ovatis ob-*grandifolia*,  
 tusis integerrimis. *Hort. cliff. 440.*  
*Habitat in America. b*
2. **PHYLLANTHUS** foliis lanceolatis serratis: crenis *Epiphyllanthus*,  
 floriferis. *Hort. cliff. 439. Roy. lugdb. 200.*  
*Phyllanthus americana* planta, flores e singulis foliorum crenis proferens. *Comm. hort. 1. p. 199. t. 102.*  
*Seb. thes. 1. p. 21. t. 13. f. 2. Catesb. car. 2. p. 26. t. 26.*  
*Filicifolia* hemionitidi affinis americana epiphyllanthos, angustiori & longiori folio, ramosa caulescens. *Pluk. alm. 134. t. 247. f. 4.*  
*Habitat in America calidiore, Surinamo, Jamaica, Carolina, Porto Rico. b*
3. **PHYLLANTHUS** foliis pinnatis floriferis, floribus *Nirurt.*  
 pedunculatis, caule herbaceo erecto. *Fl. zeyl. 331. Hort. upf. 282.*  
*Phyllanthus* foliis alternis alternatim pinnatis, floribus dependentibus ex alis foliorum. *Hort. cliff. 440.*  
*Urinaria indica* erecta vulgaris. *Burm. zeyl. 230. t. 93. f. 2.*  
*Fruticulus* capsularis hexapetalos, casia poetarum foliis brevioribus. *Pluk. alm. 159. t. 183. f. 5.*

Niruri barbadense, folio ovali subtus glauco, petiolis  
florum brevissimis. *Mart. cent.* 9. t. 9.

Kirganeli. *Rheed. mal.* 10. p. 29. t. 15. *Raj. dendr.* 29.  
*Habitat in Indiis.* ☉

- Urinaria.* 4. **PHYLLANTHUS** foliis pinnatis floriferis, floribus  
sessilibus, caule herbaceo procumbente. *Fl. zeyl.* 332.  
Fruticulus capsularis hexapetalos, brevioribus foliis &  
angustis. *Pluk. alm.* 159. t. 183. f. 6.  
Tlieru-kirganeli. *Rheed. mal.* 10. p. 8. t. 16. *Raj.*  
*dendr.* 29.

*Habitat in India.* ☉

Folia in hac erecta, nec ut in antecedenti horizontalia.

- maderaspatis.* 5. **PHYLLANTHUS** foliolis alternis cuneiformibus  
mucronatis. *Roy. lugdb.* 200.  
Nirouri maderaspatis. sennæ folio longiore. *Pet. gaz.*  
*Habitat in India.*

- Emblica.* 6. **PHYLLANTHUS** foliis pinnatis floriferis, caule  
arboreo, fructu baccato. *Fl. Zeyl.* 333.  
Myrobalanus Emblica. *Baub. pin.* 445.  
Nellika. *Zan. bist.* 159. t. 61.  
Nelli-camarum. *Rheed. mal.* 1. p. 69. t. 38. *Raj. bist.*  
1556.

*Habitat in India.* ☿

## TETRANDRIA.

### BETULA.

- alba.* 1. **BETULA** foliis ovatis acuminatis serratis. *Hort. cliff.*  
442. *Fl. suec.* 776. *Amœn. acad.* 1. p. 2. *Roy. lugdb.*  
85. *Hall. belv.* 158. *Gmel. sib.* 1. p. 166.  
Betula foliis cordatis serratis. *Fl. lapp.* 341.  
Betula. *Baub. pin.* 427. *Cam. epit.* 69.  
*Habitat in Europa frigidior.* ☿
- nigra.* 2. **BETULA** foliis rhombeo-ovatis acuminatis duplica-  
to-serratis.  
Betula foliis ovatis oblongis acuminatis serratis. *Gros.*  
*virg.* 188.  
Betula nigra virginiana. *Pluk. alm.* 67. *Raj. dendr.* 12.  
*Habitat in Virginia, Canada.* ☿  
Folia ovata, serrata: serraturis majoribus profundioribus  
remotioribus & insuper minimis tenuissimis confertis:  
basis foliorum ex angulo obtuso integerrima. Ramuli  
pubescentes. Petioli villosi.

3. BE-

3. BETULA foliis cordatis oblongis acuminatis serratis. *lenta*.  
Betula julifera, fructu conoide, viminibus lentis. *Gron.*  
*virg.* 115.

*Habitat in Virginia, Canada.* b

Folia cordato-ovata, acuminata, tenuissime & argute  
serrata, glabra. Amentum fructus ovatum, sessile:  
squamis acuminatis, integris.

4. BETULA foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp.* 266. t. *nana*.  
6. f. 4. *Fl. succ.* 777. *Amæn. acad.* 1. p. 4. t. 1.  
*Hort. cliff.* 442. *Roy. lugdb.* 85. *Hall. belv.* 158.  
*Gmel. sib.* 1. p. 170.

Betula pumila, foliis subrotundis. *Amm. act.* 9. p. 314.  
t. 14. *ruth.* 209.

*Habitat in Alpihus Lapponicis, paludibus Sueciæ, Rus-*  
*siæ.* b

5. BETULA pedunculis ramosis.

*Alnus.*  
*Alnus.* *Fl. lapp.* 340. *Fl. succ.* 775. *Hort. cliff.* 441.  
*Roy. lugdb.* 85. *Gmel. sib.* 171.

- α. *Alnus* rotundifolia glutinosa viridis. *Bauh. pin.* 428. glutinosa.

*Alnus.* *Cam. epit.* 68. *Læf. pruss.* 10. t. 1.

- β. *Alnus* folio incano. *Bauh. pin.* 428: incana.

*Habitat in Europa.* b

*Limites inter Alnum & Betulam nullos a natura po-*  
*sitos esse docuere species 2 & 3.*

## BUXUS.

1. BUXUS. *Hort. cliff.* 441. *Hort. ups.* 283. *Mat. med.* *sempervi-*  
423. *Roy. lugdb.* 400. *rens.*

- α. Buxus arborefcens. *Bauh. pin.* 471. arborefcens

*Buxus.* *Dod. pempt.* 782.

- β. Buxus humilis. *Dod. pempt.* 782. suffruticosa.

*Buxus* foliis rotundioribus. *Bauh. pin.* 471.

*Habitat in Europa australi.*

## URTICA.

\* *Oppositifoliæ.*

1. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis. *pilulifera*.  
*Hort. cliff.* 440. *Hort. ups.* 282. *Roy. lugdb.* 209.

*Mat. med.* 420. *Sauv. monsp.* 307.

*Urtica* urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.

*Urtica* 1. d'o coridis semine lini. *Dod. mem.* 4. p. 323.

*Urtica* romana. *Lob. ic.* 522.

- β. *Urtica* altera pilulifera, parietariæ foliis. *Dod. mem.* 4. p.  
323. Q q q 4 *Urtica*

*Urtica pilulifera*, parietariæ facie, semine lini. *Morif. bist.* 3. p. 435.

*Habitat in Europa australi.* ☉

*pumila.*

2. *URTICA* foliis oppositis ovatis, racemis bipartitis. *Urtica* foliis lanceolato-ovatis petiolorum longitudine, racemis dichotomis petiolo brevioribus. *Gron. virg.*

114.

*Habitat in Canada.*

*Radix fibrosa.* Caulis digiti altitudine, simplex. Folia opposita, ovata, trinervia, nuda, serrata, petiolis ferè longitudine digiti. Racemi axillares, bipartiti vel etjam dichotomi, longitudine petiolorum.

*urens.*

3. *URTICA* foliis oppositis ovalibus.

*Urtica androgyna*, foliis ovalibus. *Hort. cliff.* 440. *Fl. suec.* 773. *Roy. lugdb.* 210. *Dalib. paris.* 288.

*Urtica* foliis ovatis, amentis cylindraceis androgynis. *Fl. lapp.* 375. *Hall. helv.* 178.

*Urtica urens minor.* *Bauh. pin.* 232.

*Urtica urens minima.* *Dod. pempt.* 152.

*Habitat in Europæ cultis.* ☉

*dioica.*

4. *URTICA* foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *Urtica dioica*, foliis oblongo-cordatis. *Hort. cliff.* 440.

*Fl. suec.* 774. *Mat. med.* 419. *Roy. lugdb.* 210. *Hall. helv.* 177. *Dalib. paris.* 289.

*Urtica* foliis cordatis, amentis cylindraceis, sexu distincta. *Fl. lapp.* 374.

*Urtica urens maxima.* *Bauh. pin.* 232.

*Urtica urens altera.* *Dod. pempt.* 151.

*Habitat in Europæ ruderatis.* ☿

*cannabina.*

5. *URTICA* foliis oppositis tripartitis incis. *Hort. ups.* 282.

*Urtica* foliis profunde laciniatis, semine lini. *Amm. ruth.* 249. t. 25.

*Habitat in Sibiria.* ☿

*cylindrica.*

6. *URTICA* foliis oppositis oblongis, amentis cylindricis solitariis indivisis.

*Urtica* foliis oblongis serratis nervosis petiolatis. *Gron. virg.* 187. \*

*Urtica racemosa humilior iners.* *Sloan. jam.* 38. *bist.* 1. p. 124. t. 82. f. 2.

*Habitat in Jamaica, Virginia, Canada.* ☿

7. *UR-*

7. URTICA foliis oppositis lanceolatis integerrimis: hinc *parietaria*, angustioribus. *Roy. lugdb.* 210.

*Parietaria* foliis ex adverso nascentibus, urticæ racemiferæ flore. *Sloan. jam. 50. hist. 1. p. 144. t. 93. f. 1.*

*Habitat in Jamaica.*

\* *Alternifoliæ.*

8. URTICA foliis alternis cordatis, glomerulis spicatis, *capitata*. *Habitat in Canada. Kalm.*

Caulis erectus, angulatus, nudus. Folia alterna, cordata, acuminata, equaliter serrata, nuda, petiolis duplo longiora, subtrinervia. Racemi glomerati plures in spicam simplicem dispositi, sessilem, solitariam. Differt a sexta foliis latioribus alternis.

9. URTICA foliis alternis ovatis, racemis compositis *divaricata*, divaricatis.

*Urtica racemosa* major virginiana mitior f. minus urens. *Pluk. alm. 293. t. 237. f. 2.*

*Habitat in Virginia Canada. 2*

10. URTICA foliis alternis cordato-ovatis, amentis *racemosa*, mosis distichis erectis. *Hort. cliff. 441. Roy. lugdb. 210.*

*Urtica canadensis* racemosa mitior f. minus urens. *Morif. hist. 3. p. 434. f. 11. t. 25. f. 2.*

*Habitat in Canada, Sibiria. 2*

11. URTICA foliis alternis ovato-cordatis serratis *petiolis*, tiolo sub brevioribus, spicis solitariis interruptis. *Fl. zeyl. 336.*

*Urtica lativa* spicata, foliis floribusque petiolis longissimis donatis. *Burm. zeyl. 232. t. 110. f. 1.*

*Urtica pilulifera*, foliis majoribus longissimis pediculis minoribus pediculis donatis. *Burm. zeyl. 232. t. 110. f. 1.*

*Lupulo* vulgari similis ind. oriental. floribus in spicam ex origine foliorum prodeuntem. *Pluk. alm. 229. t. 201. f. 5.*

*Batti-Schorigeram. Rheed. mal. 1. p. 75. t. 40.*

*Habitat in India.*

12. URTICA foliis alternis orbiculato utrinque acutis *nivea*, subtus tomentosis. *Hort. cliff. 441. Roy. lugdb. 210.*

*Urtica racemifera* maxima sinarum, foliis subtus argentea lanugine villosis. *Pluk. amaltb. 212.*

*Habitat in Chinæ muris. 2*

## MORUS.

alba.

1. MORUS foliis oblique cordatis lævibus. *Hort. cliff.* 441. *Hort. upf.* 283. *Roy. lugdb.* 211. *Dalib. paris.* 290.  
 Morus fructu albo. *Bauh. pin.* 459.  
 Morus candida. *Dod. pempt.* 810.  
*Habitat in China.* h

nigra.

2. MORUS foliis cordatis-scabris. *Hort. cliff.* 441. *Hort. upf.* 283. *Mat. med.* 422. *Roy. lugdb.* 211. *Dalib. paris.* 290.  
 Morus fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.  
 Morus. *Dod. pempt.* 810.  
*Habitat in Italiæ maritimis.* h

papyrifera.

3. MORUS foliis palmatis, fructibus hispidis.  
 Morus sativa, foliis urticæ mortuæ, cortice papyrifera. *Kämpf. amœn.* 471. t. 472.  
 Morus papyrifera sativa japonica. *Seb. thes.* 1. p. 44. t. 28. f. 3.  
*Habitat in Japonia.* h

rubra.

4. MORUS foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis.  
 Morus virginienſis arbor, loti arboris inſtar ramaſa, foliis ampliffimis. *Pluk. alm.* 253. t. 246. f. 4.  
*Habitat in Virginia.* h  
 Amenta longitudine *Betula alba*. Folia recentia ſubtus maxime tomentofa; ſape etjam palmata ſunt folia.

indica.

5. MORUS foliis ovato-oblongis utrinque æqualibus inæqualiter ſerratis. *Fl. zeyl.* 337. \*  
 Tinda-parua. *Rheed. mal.* 1. p. 87. t. 49.  
*Habitat in India.* h

tatarica.

6. MORUS foliis ovato-oblongis utrinque æqualibus æqualiter ſerratis.  
*Habitat ad Aſſoff.* h  
*Præcedenti maxime affinis, ſed pedunculis petiolisque longioribus, ſerraturis foliorum magis diſtinctis; fructus M. nigra.*

tinctoria.

7. MORUS foliis ovatis hirsutis.  
 Morus fructu viridi, ligno ſulphureo tinctorio. *Sloan. jam. hiſt.* 2. p. 3. t. 158. f. 1. *Raj. dendr.* 14.  
 Zanthoxylum aculeatum, carpinî foliis, americanum, cortice cinereo. *Pluk. alm.* 596. t. 239. f. 3.  
*Habitat in Braſilia, Jamaica.* h

PEN.

## PENTANDRIA.

## XANTHIUM.

1. XANTHIUM caule inermi. *Hort. cliff.* 443. *Hort. strumarium*  
*ups.* 284. *Fl. suec.* 778. *Fl. zeyl.* 569. *Mat. med.* 424.  
*Roy. lugdb.* 85. *Gron. virg.* 188. *Hall. belv.* 161.  
*Dalib. parif.* 290.  
*Xanthium. Fuchf. hist.* 579.  
*Lappa minor* f. *Xanthium dioscoridis.* *Bauh. pin.* 198.
- β. *Xanthium elatius* & *majus americanum*, fructu spinu-  
 lis aduncis armato. *Morif. hist.* 3. p. 604. f. 15. t. 2.  
 f. 2.  
*Xanthium majus canadense.* *Herm. lugdb.* 635.  
*Habitat in* Europa, Canada, Virginia, Jamaica, Zey-  
 lona, Japonia. ☉
2. XANTHIUM spinis ternatis. *Hort. ups.* 283. *spinosum.*  
*Xanthium spinis triplicibus.* *Hort. cliff.* 443. *Roy. lugdb.*  
 85.  
*Xanthium spinosum*, atriplicis folio. *Morif. hist.* 3. p. 604.  
 f. 15. t. 2. f. 3.  
*Xanthium lusitanicum spinosum.* *Pluk. alm.* 206. t. 239.  
 f. 1. *Herm. parad.* 246. t. 246. *Mugn. hort.* 208. t. 208.  
*Habitat in* Lusitania. ☉  
*Spinæ trifurcatæ sunt stipulæ, quarum altera fit fructus.*

## AMBROSIA.

1. AMBROSIA foliis trilobis ferratis. *Hort. ups.* 284. *trifida.*  
*Ambrosia foliis palmatis: laciniis lanceolatis ferratis.*  
*Hort. cliff.* 443. *Gron. virg.* 188. *Roy. lugdb.* 86.  
*Ambrosia virginiana maxima*, platini orientalis folio.  
*Morif. hist.* 3. p. 4. f. 6. t. 1. f. 4.
- β. *Ambrosia gigantea inodora*, foliis asperis trifidis. *Raj.*  
*suppl.* 109.  
*Habitat in* Virginia, Canada. ☉  
*Communis in Hortis planta foliis trilobis est, at varietas*  
*major, foliis inferioribus quinquelobis gaudet, cujus*  
*fructificationem non vidi.*
2. AMBROSIA foliis bipinnatifidis: racemis panicula- elatior.  
 tis terminalibus glabris. *Hort. ups.* 284.  
*Ambrosia foliis composito-multidis: internodiis re-*  
*motissimis.* *Gron. virg.* 188. *Cold. noveb.* 225.  
*Ambrosia maritima*, foliis artemisiæ inodoris, elatior.  
*Herm. lugdb.* 32. *Raj. suppl.* 109.

Am-

*Ambrosia virginiana elatior & viridior hortensis facie.*

*Morif. hist. 3. p. 4.*

*Habitat in Virginia, Canada. ☉*

*artemisiifolia.*

3. **AMBROSIA** foliis bipinnatifidis: primoribus ramulorum indivisis integerrimis.

*Ambrosia maxima inodora, marrubii aquatici foliis tenetur laciniatis, virginiana. Pluk. alm. 27. t. 10. f. 5. mala. Morif. hist. 3. p. 4. Raj. suppl. 108.*

*Habitat in Virginia, Pennsylvania. ☉*

*Diversa a precedenti: Folia prima ad exortum ramulorum indivisa, oblonga, integerrima. Caulis primarius vix pede altior, magis diffusus. Rami quadripedales, ascendentes supra racemos, ut racemi laterales evadant, nec terminent plantam, contra in precedente.*

*maritima.*

4. **AMBROSIA** foliis multifidis, racemis solitariis pilosis.

*Ambrosia foliis multifidis tripartitis. Hort. cliff. 443. Roy. lugdb. 85.*

*Ambrosia maritima. Baub. pin. 138.*

*Ambrosia. Dod. pempt. 35.*

*Habitat in Hetruriæ, Cappadociæ maritimis arenosis. ☉*

## PARTHENIUM.

*Hysterophorus.*

1. **PARTHENIUM** foliis composito-multifidis. *Hort. cliff. 442. Hort. upf. 285. Roy. lugdb. 86.*

*Partheniastrum americanum, ambrosiæ folio. Niff. ad. 1711. p. 423. t. 13. f. 2.*

*Abinthium crysimi folio, achovari alpini quoddammodo accedens. Pluk. alm. 8. t. 45. f. 3. mal.*

*Habitat in Jamaicæ glareosis ☉*

*integrifolium.*

2. **PARTHENIUM** foliis ovatis crenatis. *Hort. cliff. 442. Gron. virg. 115.*

*Partheniastrum helenii folio. Dill. elth. 302. t. 225. f. 292.*

*Parmica virginiana, scabiosæ austriacæ foliis dissectis.*

*Pluk. alm. 308. t. 53. f. 5. & t. 219. f. 1.*

*Habitat in Virginia. ☉. &*

*Ingruente nocte comam reflectit.*

## IVA.

*artia.*

1. **IVA** foliis lanceolato-ovatis, caule herbaceo. *Hort. upf. 285. Gen. nov. 1106.*

Tar-



*Tarchonanthos* foliis cordatis serratis trinerviis. *Roy. lugdb.* 538.

*Habitat in America meridionali. D. B. Jussieu.* ☉

2. *IVA* foliis lanceolatis, caule fruticoso. *Gen. nov.* 1106. *frutescens.*

*Parthenium* foliis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 443.

*Gron. virg.* 115. *Roy. lugdb.* 86.

*Agerato* affinis peruviana frutescens. *Pluk alm.* 12. t. 27 f. 1.

*Elichryso* affinis peruviana frutescens. *Herm. lugdb.* 666.

*Pseudo-Helichrysum* frutescens peruvianum, foliis longis serratis. *Morif. hist.* 3. p. 90.

*Habitat in Virginia, Peru.* ☿

## AMARANTHUS.

\* *Triandri.*

1. *AMARANTHUS* capitellis triandris subrotundis *tricolor.*  
amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis.

*Amaranthus* capitalis subrotundis lateralibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Hort. cliff.* 444. *Hort. ups.* 286.

*Roy. lugdb.* 419.

*Amaranthus* folio variegato. *Bauh. pin.* 121.

*Amaranthus* tricolor. *Lob. ic.* 252.

*Habitat in India.* ☉

2. *AMARANTHUS* capitellis triandris subrotundis sessilibus, foliis lanceolatis spartis. *melancholicus.*

*Amaranthus* folio variegato C. B. colore obscuriori f. mas. *Tournef. inst.* 236.

*Amaranthus* verticillatus melancholicus, macula nigra in medio foliorum infectus. *Pluk. alm.* 27.

*Habitat in India.* ☉

*Differt a precedente: Foliis supremis minime in rosam confertim explicatis. Foliis purpurascentibus basi sanguineis absque luteo colore. Caule altiore, duriore, frigoris magis patiente. Florum capitellis neque amplexicaulibus, neque confluentibus.*

3. *AMARANTHUS* capitellis triandris subrotundis axillaribus, spicaque glomerata terminali, foliis ovato-cordatis petiolo brevioribus. *tristis.*

*Amaranthus* inermis, floribus lateralibus sessilibus confertis, foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 419?

*Habitat in China.* ☉

*Caulis inferne ramosus. Florum capitula sessilia, ad axillas glomerata, nec non plurima glomerata in spicam*

*cam terminalem laxam. Flosculi aristati. Folia parva, viridia, ovato-cordata, obtusa, longis petiolis insidentia.*

- lividus.* 4. **AMARANTHUS** spicis triandris erectis conglomeratis, foliis ovatis retusis.  
*Amaranthus* floribus virentibus densissima spica congestis, foliis amplis rugosis, caule rubro stricto. *Gron. virg.* 116.  
*Amaranthus* maximus, paniculis brevibus gracilissimis surrectis obsolete rubris. *Boerb. lugdb.* 1. p. 97.  
*Blitum* pulchrum rectum magnum rubrum. *Bauh. hist.* 2. p. 966. an?  
*Habitat in Virginia.* ☉  
*Planta alta colore hepatico-ruffo. Spicæ axillares nulle. Folia ovata: inferiora retusa s. emarginata; floralia acuta. Flores pallidi, nec rubri. Fructus major, compressus, obtusus.*
- græcicus.* 5. **AMARANTHUS** floribus triandris conglomeratis axillaribus, foliis lanceolatis obtusis.  
*Amaranthus* floribus lateralibus congestis, foliis lanceolatis obtusis. *Gron. virg.* 116.  
*Habitat in Virginia.* ☉
- Blitum.* 6. **AMARANTHUS** floribus glomeratis lateralibus, foliis ovatis retusis, caule diffuso.  
*Amaranthus* foliis ovatis emarginatis. *Hort. cliff.* 444.  
*Fl. suec.* 779. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. belv.* 176. *Dalib. parif.* 290.  
*Blitum* album minus. *Bauh. pin.* 118. *Cam. epit.* 236.  
*Habitat in Europa temperiore.* ☉
- \* *Pentandri.*
- caudatus.* 7. **AMARANTHUS** racemis pentandris cylindricis pendulis longissimis. *Hort. cliff.* 443. *Hort. ups.* 285.  
*Fl. zeyl.* 563. *Roy. lugdb.* 419.  
*Amaranthus* maximus. *Bauh. pin.* 120.  
*Blitum* majus peruvianum. *Clus. hist.* 2. p. 81.  
*Habitat in Peru, Persia, Zeylona.* ☉
- hybridus.* 8. **AMARANTHUS** racemis pentandris cylindricis horizontalibus, caule inermi.  
*Amaranthus* sylvestris maximus novæ anglie, spicis viridibus. *Raj. hist.* 201.  
*Amaranthus* major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro. *Barr. ic.* 648.  
*Habitat in Virginia.* ☉

# MONOECIA HEXANDRIA & HEPTAND. 991

9. **AMARANTHUS** racemis pentandris cylindricis e-<sup>hypochondri-</sup>  
rectis; caule inerimi. *Hort. cliff.* 444. *Hort. ups.* 286.  
*Amaranthus sylvestris maximus novæ angliaë*, spicis  
purpureis. *Tournef. inst.* 235.  
*Habitat in Virginia.* ☉  
*Caulis viridis. Folia valde acuta, ruffo-lurida, præfer-*  
*tim subtus. Spicæ erectæ flosculis purpuratissimis, Sta-*  
*mina 5, flava. Spicæ etjam ex alis longæ.*
10. **AMARANTHUS** racemis pentandris lateralibus <sup>retroflexis.</sup>  
terminalibusque, caule flexuoso; ramis retrocurvatis.  
*Habitat in Pensylvania. Kalm.* ☉  
*Planta pedalis. Caule firmo, subvillosa, flexuosa a folio*  
*ad folium. Rami inferiores primum recurvi, dein eri-*  
*guntur (sed basi divaricata), hinc retroflexi. Folia o-*  
*vata, acuta A. Bliti. Spicæ terminales & axillares,*  
*virides. Habitus A. tristis. Spicæ crassæ, erectæ. Ra-*  
*mi sub dio minus basi divaricati & retroflexi, quam*  
*in ollis Hortulanorum.*
11. **AMARANTHUS** racemis pentandris cylindricis e-<sup>spinosis.</sup>  
rectis, axillis spinosis. *Hort. cliff.* 444. *Fl. zeyl.* 338.  
*Gron. virg.* 188. *Roy. lugdb.* 419.  
*Amaranthus indicus spinosus, spica herbacea. Herm.*  
*lugdb.* 31. t. 33.  
*Habitat in Indiis.* ☉

## HEXANDRIA.

### ZIZANIA.

1. **ZIZANIA** panicula effusa. <sup>aquatica.</sup>  
*Zizania. Gron. virg.* 189.  
*Arundo alta gracilis, foliis e viridi cæruleis, locustis mi-*  
*noribus. Sloan. jam.* 33. *bist.* 1. p. 110. t. 67.  
*Habitat in Jamaicaë, Virginiaë inundatis.*
2. **ZIZANIA** panicula subracemosa. † <sup>terrestre.</sup>  
*Katou-Tsjolam. Rheed. mal.* 12. p. 113. t. 60.  
*Habitat in Malabariaë siccis.*

## HEPTANDRIA.

### GUETTARDA.

1. **GUETTARDA.** <sup>speciosa.</sup>  
*Habitat in Java. b*

Ar-

Arbor habitu *Hernandia*. Folia amplissima, ovata s. obovata, apice rotundata cum acumine, nuda, integerrima, venis alternis, petiolata: Petiolis folio longe brevioribus, compressis. Pedunculus e regione petioli, aut etjam Pedunculi (in summis ramis oppositi), terminatus Cyma brevissima, dichotoma. Flores masculi sessiles, alterni, a latere tantum superiore cymæ. Calyces subtomentosi, cylindrici, integerrimi, vix manifeste bilobi. Corolla infundibuliformis: Tubo longo, tomentoso, cylindrico. Limbo septempartito: lobis 4-5-lobis-oblongis, tubo triplo brevioribus. Stamina 7: Filamentis brevissimis, in fauce corollæ. Antheris oblongis, linearibus. Pistilli germen nullum. Stylus filiformis, tubo dimidio brevior. Stigma cylindrico-capitatum, obtusum. Feminei flores in eadem planta, masculis fere similes. Drupa sicca, subrotunda, torosa, ex Seminibus sex, magnis, lignosis, connexis.

## POLYANDRIA.

### CERATOPHYLLUM.

- demersum.* 1. CERATOPHYLLUM. *Hort. cliff.* 446. *Fl. suec.* 783. *Roy. lugdb.* 214. *Dalib. paris.* 292.  
*Hydroceratophyllum* folio aspero quatuor cornibus armato. *Vaill. act.* 1719, p. 21. t. 2. f. 2.  
*Equisetum* sub aqua repens, foliis bifurcis. *Læs. praff.* 67. t. 12.  
 2. *Hydroceratophyllum* folio lævi octo cornibus armato. *Vaill. ibid.*  
*Habitat in Europæ fossis majoribus sub aqua.*

### MYRIOPHYLLUM.

- spicatum.* 1. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interrupte spicatis. *Hort. cliff.* 446. *Fl. suec.* 781. *Roy. lugdb.* 312. *Dalib. paris.* 292. *Sauv. monsp.* 160.  
*Myriophyllum.* *Fl. lapp.* 343.  
*Millefolium aquaticum pennatum spicatum.* *Bauh. pin.* 141. *prodr.* 73. t. 73.  
*Habitat in Europæ aquis quietis.* &  
*verticillatum.* 2. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis. *Hort. cliff.* 446. *Fl. suec.* 782. *Roy. lugdb.* 213. *Dalib. paris.* 292. *Sauv. monsp.* 160.  
*Myriophyllum aquaticum minus.* *Clus. hist.* 2. p. 252.  
 Mil-

*Millefolium aquaticum*, flosculis ad foliorum nodos.

*Baub. pin.* 141.

*Habitat in Europæ inundatis.* 2

Vidi plantas floribus masculis & femineis distinctas, vidi & rarius floribus hermaphroditis.

## SAGITTARIA.

1. *SAGITTARIA* foliis sagittatis acutis. *Fl. lapp.* 344. *sagittifolia.*

*Fl. succ.* 780. *Roy. lugdb.* 493. *Gron. virg.* 116.

*Hall. belv.* 300. *Dalib. parif.* 297.

*Sagitta minor.* *Dod. pempt.* 588.

*Sagitta aquatica minor latifolia.* *Baub. pin.* 194.

- β. *Sagitta aquatica minor angustifolia.* *Baub. pin.* 194.

- γ. *Sagitta aquatica major.* *Baub. pin.* 194.

- δ. *Sagitta aquatica foliis variis.* *Læf. pruss.* 234. s. 74.

*Gramen bulbosum aquaticum.* *Baub. prodr.* 4.

*Habitat in Europæ, Americæ fluviis, lacubus argillosis.*

An sufficienter distincta *SAGITTARIA* foliis cordatis, quæ a *Morif. hist.* 3. f. 15. t. 4. f. 6. delineata.

2. *SAGITTARIA* foliis sagittatis obtusis.

*obtusifolia.*

*Sagittariæ foliis planta, glomerato fructu monoppyrene,*

*coriandri figura.* *Pluk. alm.* 326. t. 200. f. 7.

*Culitamaræ.* *Rheed. mal.* 11. p. 93. t. 45.

*Habitat in Asia.*

*Differt a precedente, Foliorum antica parte duplo latiore.*

3. *SAGITTARIA* foliis ternatis.

*trifolia.*

*Sagittaria chinensis, foliis ternis longissimis.* *Pet. gaz.*

29. t. 19. f. 3.

*Habitat in China.*

## THELIGONUM.

1. *THELIGONUM.* *Sauv. monsp.* 129.

*Cynocrambe.*

*Parietaræ affinis Cynocrambe dicta, floribus muscosis.*

*Pluk. alm.* 280.

*Cynocrambe diofcoridis.* *Baub. pin.* 122. *prodr.* 59. t.

59. *Magn. char.* 150.

*Cynocrambe alines foliis.* *Barr. ic.* 335.

*Alines facie planta nova.* *Col. phyt.* 2. p. 28.

*Alina fœtida fabio columnæ diofcoridea.* *Baub. hist.*

3. p. 365. *Raj. hist.* 206.

*Habitat in Italia, Monspelii.* 2

## POTERIUM.

*Sanguisorba*. 1. **POTERIUM** inerme, caulibus subangulosis. *Hort. cliff.* 446. *Hort. nps.* 288.

*Poterium* inerme. filamentis longissimis. *Roy. lugdb.* 129.  
*Dalib. parif.* 291.

*Pimpinella Sanguisorba* minor hirsuta. *Baub. pin.* 160.

*Pimpinella Sanguisorba*. *Cam. epit.* 777.

β. *Pimpinella Sanguisorba* minor lævis. *Baub. pin.* 160.

γ. *Pimpinella sanguisorba* inodora. *Baub. pin.* 160. *prodr.* 84.

*Habitat in Europæ australioris asperis.* 4

*hybridum*. 2. **POTERIUM** inerme, caulibus teretibus strictis.  
*Poterium* inerme, filamentis florem vix superantibus.  
*Roy. lugdb.* 280.

*Poterium agrimonoides* *Hort. nps.* 288.

*Pimpinella agrimonoides*. *Morif. bles.* 294. *umb.* 57. *bist.* 3. p. 264. f. 8. t. 18. f. 9. *Bocc. sic.* 57. t. 29.

*Pimpinella agrimonoides* odorata. *T. Barr. rar.* 18. 632.

*Habitat* Monspelii. 4

*spinosum*. 3. **POTERIUM** spinis ramosis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 240.

*Pimpinella spinosa*. *Morif. bist.* 3. p. 262. f. 8. t. 18. f. 5.

*Poterio* affinis, foliis pimpinellæ, spinosa. *Baub. pin.* 188.

*Stœbe legitima* dioscoridis. *Clus. bist.* 2. p. 303.

*Habitat in* Creta, Libano. b.

## QUERCUS.

*Phellos*. 1. **QUERCUS** foliis lanceolatis integerrimis glabris.  
*Gron. virg.* 117.

*Quercus* f. *Ilex marilandica*, folio longo angusto salicis. *Raj. dendr.* 8. *Catesb. car.* 1. p. 16. t. 16.

Q. *Quercus* foliis oblongis non sinuatis. *Catesb. car.* 1. p. 17. t. 17.

γ. *Quercus* humilis, salicis folio brevior. *Catesb. car.* 1. p. 22. t. 22.

*Habitat in* America septentrionali. b.

*Smilax*. 2. **QUERCUS** foliis oblongo-ovatis subtus tomentosis integerrimis. *Roy. lugdb.* 81. *Sauv. monsp.* 96.

*Ilex* folio angusto non serrato. *Baub. pin.* 424.

*Smilax dalech.* *Baub. bist.* 2. p. 101. fig.

*Habitat in Hispania & adjacentibus.*  
*Admodum affinis sequenti.*

3. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratisque, *Ilex*.  
 cortice integro. *Hort. cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 81.  
*Ilex* oblongo serrato folio. *Bauh. pin.* 424.  
*Ilex* arborea. *Bauh. hist.* 1. p. 95. \*  
*Habitat in Europa australi.* †  
*Variat foliis integerrimis & serratis, sepius etiam in*  
*eadem arbore; difficile sine cortice distinguitur a Su-*  
*bere.*
4. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratis *Suber*.  
 subtus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Hort. cliff.*  
 448. *Roy. lugdb.* 81. *Mat. med.* 427. *Sauv. monsp.*  
 96.  
*Suber latifolium sempervirens.* *Bauh. pin.* 424.  
*Habitat in Europa australi.* †
5. QUERCUS foliis oblongo-ovatis sinuato-spinosis *gramuntia*.  
 subtus tomentosis, glandibus pedunculatis. *Sauv.*  
*monsp.* 96. †  
*Ilex* foliis rotundioribus & spinosis, e luco *gramuntio*.  
*Magn. monsp.* 140.  
*Habitat Monspelii.* †
6. QUERCUS foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis gla- *Coccifera*  
 bris. *Roy. lugdb.* 8.  
*Quercus* foliis ovatis dentato-spinosis, glandibus sessili-  
 bus. *Sauv. monsp.* 96,  
*Ilex* aculeata cocciglandifera. *Bauh. pin.* 425.  
*Ilex coccifera.* *Cam. epit.* 774.  
*Habitat in G. Narbonensi, Hispania.* †
7. QUERCUS foliis obovatis utrinque acuminatis sinu- *Prinur*  
 ato-serratis: denticulis rotundatis uniformibus. *Hort.*  
*cliff.* 448. *Gron. virg.* 117. *Roy. lugdb.* 80.  
*Quercus*, castaneæ foliis, procera arbor, virginiana *Pluk.*  
*alm.* 309. t. 54. f. 3. *Raj. hist.* 1916. *Catesb. car.*  
 1. p. 18. t. 18.  
*Habitat in America boreali.* †
8. QUERCUS foliis cuneiformibus obsolete trilobis. *nigra*.  
*Gron. virg.* 117.  
*Quercus* folio non serrato in summitate quasi triangulo.  
*Catesb. car.* 1. p. 20. t. 20.

R r r 2

12. Quer-

- β. *Quercus marilandica* folio trifido ad *salisfrax* accedente. *Raj. Catesb. car.* 19. t. 19.  
*Habitat in America septentrionali.* ♀

robra

9. *QUERCUS* foliis obtuse-sinuatis setaceo-mucronatis.

*Quercus* foliorum sinibus obtusis: angulis lanceolatis seta terminatis integerrimis vix divis. *Gron. virg.* 117.

*Quercus* *esculi* divisura, foliis amplioribus aculeatis. *Pluk. alm.* 309. t. 54. f. 4. *Catesb. car.* 1. p. 23. t. 23.

- β. *Quercus* foliorum sinibus obtusis: angulis acutis seta terminatis: intermediis vix tridentatis margine integerrimo. *Hort. cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 80.

*Quercus* *carolinensis*, virentibus venis muricata. *Catesb. car.* 1. p. 21. t. 21. f. 1.

*Quercus* *virginiana* venis rubris muricata. *Pluk. alm.* 309. t. 54. f. 1.

*Habitat in Virginia, Carolina.* ♀

alba.

10. *QUERCUS* foliis oblique pinnatifidis: sinibus angulisque obtusis.

*Quercus* foliis superne latioribus opposite sinuatis, sinibus angulisque obtusis. *Gron. virg.* 117.

*Quercus* *alba* *virginiana*. *Catesb. car.* 1. p. 21. t. 21. f. 1.  
*Habitat in Virginia.* ♀

Esculm.

11. *QUERCUS* foliis pinnato-sinuatis lævibus, fructibus sessilibus. *Roy. lugdb.* 80.

*Quercus* *parva* f. *Fagus* *græcorum* & *Esculus*. *Bauh. pin.* 420.

*Habitat in Europa australi.* ♀

Robur.

12. *QUERCUS* foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus; angulis obtusis. *Hort. cliff.* 448. *Fl. succ.* 784. *Mat. med.* 426. *Hall. belv.* 159.

*Roy. lugdb.* 80. *Dalib. paris.* 293. *Gmel. sib.* 150.

*Quercus* cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.

*Quercus*. *Fuchf. hist.* 229. *Læs. pruss.* 211. t. 69.

*Habitat in Europa.* ♀

Ægilops.

13. *QUERCUS* foliis ovato-oblongis glabris serrato-repandis.

*Quercus* calyce echinato, glande majore. *Bauh. pin.* 420.

*Cerri* *glans* *Ægilops* aspris. *Bauh. hist.* 1. p. 77. *fructus.*

Ha.



*Habitat in Hispania. b*  
*Noscitur calyce maximo.*

14. QUERCUS foliis oblongis lyrato-pinnatifidis: laci- *Carr.*  
 nilis transversis acutis; subtus subtomentosis.

Quercus calice hispido, glande minore. *Bauh. pin.* 420.

Phagus s. Esculus. *Bauh. hist.* 1. p. 74. fig.

*Habitat in Hispania. b*

15. v. app. 1199.

## JUGLANS.

1. JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis sub- *regia.*  
 æqualibus. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 286. *Mat. med.*

430. *Roy. lugdb.* 81. *Dalib. parif.* 293.

Nux juglans s. regia vulgaris. *Bauh. pin.* 417.

Nux juglans. *Dod. pempt.* 816.

- β. Nux juglans fructu maximo. *Bauh. pin.* 417.

- γ. Nux juglans fructu teneri & fragili putamine. *Bauh.*  
*pin.* 417.

- δ. Nux juglans bifera. *Bauh. pin.* 417.

- ε. Nux juglans fructu serotino. *Bauh. pin.* 417.

*Habitat - - - b*

2. JUGLANS foliolis lanceolatis serratis: exterioribus *alba.*  
 latioribus.

Juglans alba, fructu ovato compresso profunde inscul-  
 pto durissimo: cavitate intus minima. *Gron. virg.* 190.

Nux juglans alba virginienfis. *Park. theatr.* 1414. *Catesb. car.* 1. p. 38. t. 38.

Nux juglans virginiana alba minor, fructu nucis mos-  
 chatæ simili: cortice glabro summo fastigio velut  
 in aculeum producto. *Pluk. alm.* 254. t. 309. f. 2.

*Habitat in Virginia. b*

Folia ex foliolis sæpius quinis.

3. JUGLANS foliolis lanceolatis argute serratis; exteri- *nigra.*  
 oribus minoribus. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 287.

*Gron. virg.* 189. *Roy. lugdb.* 82.

Nux juglans virginiana nigra. *Herm. lugdb.* 452. t. 453.

*Catesb. car.* 1. p. 67. t. 67.

*Habitat in Virginia, Marilandia. b*

Folia ex foliolis sæpius tredecim.

## FAGUS.

1. FAGUS foliis lanceolatis acuminato-serratis subtus *Castanea.*  
 nudis. *Hort. cliff.* 447. \* *Hort. upf.* 287. *Roy. lugdb.*

79. *Mat. med.* 429. *Dalib. parif.* 294.

R r r 3

Cast-

*Castanea sylvestris. Baub. pin. 419.*

*Castanea. Cam. epit. 118.*

β. *Castanea sativa. Baub. pin. 418.*

*Habitat in Italia & australioris Europæ montibus. h*

*pumila.*

2. *FAGUS* foliis lanceolato-ovatis acute serratis subtus tomentosis, amentis filiformibus nodosis. *Gron. virg. 118. \**

*Fagus foliis ovato-lanceolatis serratis. Roy. lugdb. 79.*

*Castanea pumila virginiana, racemoso fructu parvo in singulis capsulis echinatis unico. Pluk. alm. 90. Castesb. car. 1. p. 9. t. 9.*

*Castanea americana, foliis averſa parte argentea lanugine villosis. Pluk. alm. 90. t. 156. f. 2.*

*Habitat in America ſeptentrionali. h*

*ſylvatica.*

3. *FAGUS* foliis ovatis obſolete ſerratis. *Hort. cliff. 447. Fl. ſucc. 785. Roy. lugdb. 79. Mat. med. 428. Dalib. pariſ. 294.*

*Fagus. Baub. pin. 419. Cam. epit. 112.*

*Habitat in Europa. h*

## CARPINUS.

*Betulus.*

1. *CARPINUS* ſquamis ſtrobilorum planis. *Hort. cliff. 447. Fl. ſucc. 786. Roy. lugdb. 79. It. ſcan. 46. Dalib. pariſ. 294.*

*Carpinus. Dod. pempt. 841. Cam. epit. 71.*

*Ostrya ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis. Baub. pin. 427.*

*Habitat in Europa, Canada. h*

*Ostrya.*

2. *CARPINUS* ſquamis ſtrobilorum inflatis. *Hort. cliff. 447. Roy. lugdb. 80. Gron. virg. 118. Cold. moveb. 227.*

*Ostrya ulmo ſimilis, fructu racemoso lupulo ſimili. Baub. pin. 427.*

*Ostrya italica, carpinifolio, fructu longiore ſ. breviorē habitiore. Mich. gen. 223. t. 104. f. 1. 2.*

β. *Aceris cognata Ostrya dicta flaveſcens. Pluk. alm. 7. t. 156. f. 1.*

*Habitat in Italia, Virginia. h*

## CORYLUS.

*Avellana.*

1. *CORYLUS* ſtipulis ovatis obtuſis. *Hort. cliff. 448. Fl. ſucc. 787. Mat. med. 431. Hort. upſ. 286. Roy.*

*lugdb.*

*lugdb.* 81. *Hall. herb.* 159. *Dalib. parif.* 294 *Gmel.*  
*fib.* 1. p. 150.

*Corylus sylvestris.* *Baub. pin.* 418.

*Avellana nux sylvestris.* *Fuchf. hist.* 398.

β. *Corylus sativa*, fructu albo minore, f. vulgaris. *Baub.*  
*pin.* 418.

γ. *Corylus sativa*, fructu rotundo maximo. *Baub. pin.* 418.

δ. *Corylus sativa*, fructu oblongo rubente. *Baub. pin.* 418.

ε. *Corylus nucibus in racemum congestis.* *Baub. pin.* 418.

*Habitat in Europæ sepibus.* h

2. *CORYLUS* stipulis linearibus acutis. *Hort. cliff.* 448. *Calurna.*  
*Roy. lugdb.* 81.

*Corylus byzantina.* *Herm. lugdb.* 191.

*Avellana peregrina humilis.* *Baub. pin.* 418.

*Avellana pumila byzantina.* *Clus. hist.* 1. p. 11.

*Habitat Byzantii.* h

## PLATANUS,

1. *PLATANUS* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 447. *Roy. orientalis.*  
*lugdb.* 78.

*Platanus.* *Baub. pin.* 431. *Clus. hist.* 1. p. 9. *Dalech.*  
*hist.* 92. *Bell. itin.* 9.

*Platanus orientalis verus.* *Park. theatr.* 1427.

*Habitat in Asia, Tauro, Macedonia, Atho, Lemno,*  
*Creta, locis riguis.* h

2. *PLATANUS* foliis lobatis. *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb. occidentalis.*  
*7. Gron. virg.* 119. *Upp.* 287.

*Platanus occidentalis.* *Catesb. car.* 1. p. 56. t. 56.

*Platanus occidentalis* f. virginienfis. *Park. theatr.* 1428.

*Habitat in America septentrionali.* h

*Confer.* *Platanus orientalis.* *Pock. itin.* 2. t. 89.

## LIQUIDAMBAR.

1. *LIQUIDAMBAR* foliis palmato-angulatis. *Styraciflua.*

*Liquidambar.* *Baub. pin.* 502. *Gron. virg.* 190. *Hort.*  
*xps.* 287. *Mat. med.* 432. *Hort. cliff.* 486. *Roy.*  
*lugdb.* 534. *Cold. noveb.* 228.

*Liquidambar arbor* f. *Styraciflua aceris folio.* *Pluk. alm.*  
224. t. 42. f. 6. *Catesb. car.* 2. p. 65. t. 65.

*Styrax aceris folio.* *Raj. hist.* 1681. 1799.

*Habitat in Virginia, Mexico.* h

2. *LIQUIDAMBAR* foliis oblongis sinuatis.

*Habitat in Canada.*

*peregrina.*

## MONADELPHIA.

## PINUS.

\* *Foliis pluribus ex eadem basi vaginali.*

*Sylvestris.*

1. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis glabris. *Hort. cliff.* 450. *Fl. suec.* 788. *Mat. med.* 434. *Roy. lugdb.* 89. *Dalib. parif.* 295. *Gmel. fib.* 1. p. 178.

*Pinus sylvestris. Baub. pin.* 491. *Fl. lapp.* 346. *Dalech. hist.* 45.

- β. *Pinus maritima altera. Baub. pin.* 492.

- γ. *Pinaster latifolius, julis virefcentibus f. pallescentibus. Baub. pin.* 492.

- δ. *Pinaster tenuifolius, julio purpurascente. Baub. pin.* 492.

*Habitat in Europæ borealis sylvis glareosis. h*

*Pinæ.*

2. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *Hort. ups.* 288. *Mat. med.* 435. *Roy. lugdb.* 89.

*Pinus sativa. Baub. pin.* 490.

*Pinus officulis duris, foliis longis. Baub. hist.* 1. p. 248.

*Pinus. Cam. epit.* 93.

*Habitat in Italia. h*

*Tada.*

3. PINUS foliis ternis. *Gron. virg.* 190. \*

*Pinus foliis longissimis ex una theca ternis. Cold. noveb.* 230.

*Pinus virginiana tenuifolia tripilis, f. ternis plerumque ex uno folliculo setis, strobilis majoribus. Pluk. alm.* 297. *Raj. dendr.* 8.

*Habitat in Virginie, Canadæ paludosis. h*

*Cembra.*

4. PINUS foliis quinis lævibus. *It. scan.* 32. \*

*Pinus foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli. Hall. belv.* 150. *Gmel. fib.* 1. p. 179. t. 39.

*Pinus sativa, cortice fisso, foliis setosis subrigidis ab una vagina quinis. Amm. rusb.* 178.

*Pinus sylvestris montana tertia. Baub. pin.* 491.

*Pinus sylvestris Cembra. Cam. epit.* 42.

*Pinaster. Bell. conif.* 19. *Mich. gen.* 223. t. 19.

*Larix sempervirens, foliis quinis, nucleis edulibus. Breyn. E. N. C. cent.* 7. obs. 2.

*Habitat in Alpibus Sibirie, Tatarie, Helvetie, Valle-*  
lie

fiæ, Baldi, Allobrogum, Tirolensium, Tridentinorum. 5

5. PINUS foliis quinis scabris.

*Strobilus.*

Pinus foliis longissimis ex una theca quinis. *Cold. noveb.* 229.

Pinus virginiana, conis longis non ut in vulgari echinatis. *Pluk. alm.* 297.

*Habitat in Virginia, Canada.* 5

*Cotyledones 6 a 10. Folia quina, molliora, triquetra, scabra, angulis inconspicue ferratis. Strobili spithamæ: apice squamarum crassiore; hæc conjungit Pinum & Abietem Anthorum.*

6. PINUS foliis fasciculatis acutis.

*Cedrus.*

Abies foliis fasciculatis acuminatis. *Hort. cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 89.

Cedrus conifera, foliis laricis. *Bauh. pin.* 490. *Raj. hist.* 1404.

Cedrus libani. *Barr. ic.* 499. *Edward. ornith. t.* 188.

Cedrus phœnicea. *Reneal. spec.* 27.

Cedrus. *Bell. itin.* 162. *Cam. epit.* 57.

*Habitat in Syriæ, Libani, Amani, Tauri montibus.* 5

7. PINUS foliis fasciculatis obtusis.

*Larix.*

Abies foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450. *Mat. med.* 437. *Roy. lugdb.* 89. *Gmel. fib. 1. p.* 176.

Larix, folio deciduo, conifera. *Bauh. hist.* 1. p. 265. *Hort. anglic.* 43. f. 11.

Larix. *Bauh pin.* 493. *Dod. pempt.* 668. *Cam. epit.* 45. 46.

*Habitat in Alpibus Helveticis, Vallefiacis, Stiriacis, Corinthiacis, Tridentinis, Sibiricæ.* 5

\* *Foliis solitariis & basi distinctis.*

8. PINUS foliis solitariis emarginatis.

*Piceæ.*

Abies foliis solitariis apice emarginatis. *Hort. cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 89. *Gmel. fib. 1. p.* 176.

Abies taxì folio, fructu sursum spectante. *Tournef. inst.* 585.

Abies conis sursum spectantibus s. mas. *Bauh. pin.* 505.

Abies femina s. Elate teleja. *Bauh. hist.* 1. p. 231.

*Habitat in Alpibus Helveticæ, Sæviæ, Bavaricæ, Scythiæ.* 5

*Balsamea.* 9. PINUS foliis solitariis submarginatis: subtus linea duplici punctata.

Abies foliis solitariis confertis obtusis membranaceis.

*Gron. virg.* 191. \*

Abies minor, pectinatis foliis, virginiana, conis parvis subrotundis. *Pluk. alm.* 2. t. 121. f. 1. *Raj. dendr.* 8.

*Habitat in* Virginia, Canada. 2

*Habitus antecedentis, sed Folia latiora, obtusiora, utrinque per ramos pectinatim digesta, at duplici serie, superiore sc. breviora, subtus sunt picta linea duplici glauca: singula ex 8 ordinibus longitudinalibus punctorum alborum. Apex foliorum saepe bifidus.*

*Abies.* 10. PINUS foliis subulatis mucronatis laevibus bifariam versis.

Abies foliis solitariis apice acuminatis. *Hort. cliff.* 449.

*Mat. med.* 436. *Fl. succ.* 789. *Fl. lapp.* 347. *Roy.*

*lugdb.* 88. *Hall. belv.* 147. *Dalib. parif.* 295. *Gmel.*

*fib.* 1. p. 175.

*Picea. Cam. epit.* 47.

β. Picea major prima f. Abies rubra. *Bauh. pin.* 493.

γ. Abies alba f. femina. *Bauh. pin.* 505.

Abies minor. *Bauh. pin.* 493.

*Habitat in* Europæ, Asiæ borealibus humidiusculis. 5

## THUJA.

*occidentalis.* 1. THUJA strobilis laevibus: squamis obtusis. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 289. *Roy. lugdb.* 87. *Gmel. fib.* 1. p. 182.

Thuja theophrasti. *Bauh. pin.* 488.

Arbor-vitæ. *Clus. hist.* 1. p. 36. *Dod. pempt* 630.

*Habitat in* Canada, Sibiria. 5

*orientalis.* 2. THUJA strobilis squarrosis: squamis acuminatis reflexis. *Hort. upf.* 289.

Thuja strobilis uncinatis: squamis reflexo-acuminatis.

*Roy. lugdb.* 87. \* *Hort. cliff.* 449.

*Habitat in* China. 5

## CUPRESSUS.

*sempervirens* 1. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus quadrangulis.

Cupressus foliis imbricatis erectis. *Hort. cliff.* 449. *Hort. upf.* 288. *Mat. med.* 433. *Roy. lugdb.* 88. *Dalib.*

*parif.* 295.

Cu-

- Cupressus meta in fastigium convoluta f. *Femina*. *Tournef. inst.* 587.  
 Cupressus. *Baub. pin.* 488. *Cam. epit.* 52.  
 β. Cupressus ramos extra se spargens f. *Mas*. *Tournef. inst.* 587.  
*Habitat in Creta.* ♀  
 2. CUPRESSUS foliis distichis patentibus. *Hort. cliff. nistieba.* 499. *Hort. upf.* 289. *Gron. virg.* 119. *Roy. lugdb.* 88.  
 Cupressus americana. *Catesb. car.* 1. p. 11. t. 11.  
 Cupressus virginiana, foliis acaciæ deciduis. *Comm. hort.* 1. p. 113. t. 59.  
 Cupressus virginiana, foliis acaciæ cornigeræ paribus & deciduis. *Pluk. alm.* 125. t. 85. f. 6.  
*Habitat in Virginia, Carolina.* ♀  
 3. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. *Thyoides.*  
 Cupressus nana mariana, fructu cæruleo parvo. *Pluk. mant.* 61. t. 345. f. 1.  
*Habitat in Canada.* *Kalm.* ♀  
*Frons f. Rami cum foliis imbricati & compressi exacte eodem modo, quo Thuja, at fructus, magnitudine baccarum juniperi, finditur ut in Cupresso.*

# ACALYPHA.

1. ACALYPHA involucris femineis cordatis incis, fo- *virginica.*  
 liis ovato-lanceolatis petiolo longioribus. *Hort. upf.* 290. *Fl. zeyl.* 342. \*  
 Acalypa foliis ovato-lanceolatis, involucris femineis obtulis. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 116.  
 Mercurialis tricoccos hermaphroditica f. ad foliorum juncturas e foliolis cristatis julifera simul & fructum gerens. *Burm. zeyl.* 248. t. 99. f. 4.  
*Habitat in Zeylona, Virginia.* ☉  
 2. ACALYPHA involucris femineis cordatis subcrena- *Indica.*  
 tis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Fl. zeyl.* 341. \*  
 Mercurialis zeylanica tricoccos cum acetabulis. *Herm. lugdb.* 686. t. 687. *Raj. hist.* 1854. *suppl.* 108.  
 Cupameni. *Rheed. mal.* 10. p. 161. t. 81. *Raj. suppl.* 107.  
 β. Urtica minor iners spicata, folio subrotundo serrato, fructu tricocco. *Sloun. jam.* 38. *hist.* 1. p. 125. t. 82. f. 3.  
 Wellia-Cupameni. *Rheed. mal.* 10. p. 165. t. 82.  
*Habitat in Indiis ad Jimeta.* ☉

- austialis.* 3. ACALYPHA involucris femineis integerrimis, foliis lanceolatis obtusis.  
 Ricinoides castaneæ folio. *Plum. spec.* 207  
*Habitat in America meridionali.*

## CROTON.

- castaneifolium.* 1. CROTON foliis lanceolatis obtusis serratis petiolatis glabris. *Roy. lugdb.* 201.  
*Habitat in America meridionali.*
- palustre.* 2. CROTON foliis ovato-lanceolatis plicatis serratis scabris. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 201.  
 Ricinoides palustre, foliis oblongis serratis, fructu hispido. *Mart. cent.* 38. t. 38.  
*Habitat in Vera Cruce, locis paludosis.* ☉
- dicotyledonum.* 3. CROTON foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. ups.* 290. \* *Mat. med.* 441.  
 Croton foliis ovatis plicatis scabris, capsulis e pedunculo ramoso pendulis. *Roy. lugdb.* 532. *Sav. monsp.* 305.  
 Ricinoides ex qua paratur Tournesol gallorum. T. *Nissol. act.* 4712. p. 337. t. 17.  
 Heliotropium tricoccum. *Bauh. pin.* 253. *Raj. bist.* 165.  
*Habitat Monspeli.* ☉
- argentum.* 4. CROTON foliis ovatis tomentosis integris serratis. *Hort. cliff.* 444. \* *Roy. lugdb.* 201.  
*Habitat in America.* ☉
- sebiferum.* 5. CROTON foliis rhombico-rotundatis utrinque mucronatis integerrimis glabris.  
 Ricinus chinensis sebifera, populi nigrae folio. *Pet. gaz.* 53. t. 34. f. 3.  
 Arbor sebifera chinensis kiu yeu. *Martin le Compte. Ann. herb.* 375.  
*Habitat in Chinæ humidis.* Osbeck.  
 Glandulae duae supra basin foliorum. Folia figura Populi nigrae, sed minora, teneriora.
- Tiglium.* 6. CROTON foliis ovatis glabris acuminatis serratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 393. \* *Mat. med.* 440.  
 Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro Grana Tiglia officinis dicto. *Burm. zeyl.* 200. t. 90.  
 Pinus indica, nucleo purgante. *Bauh. pin.* 492.  
 Lignum moluccense, foliis malvae, fructu avellanae mino-



minore cortice molliore & nigricante, Pavana incolis. *Banh. pin.* 393.

Cadel-avanacu. *Rheed. mal.* 2. p. 61. t. 75. *Raj. hist.* 167. 1855. *suppl.* 112. 666.

*Habitat in India.* 5

7. CROTON foliis ovatis tomentosis ferrulatis petiola-*Lacciferum.*  
tis, calycibus tomentosis. *Fl. zeyl.* 344. \*

Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirsutis, floribus spicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. t. 91.

Ricinus aromaticus spicatus, folio circææ, spinis ad imum duplicatis armato, laccam in granis fundens.

*Pluk. alm.* 320. *Raj. suppl.* 113.

*Habitat in India.* 5

8. CROTON foliis cordatis scabris subserratis petiolatis, *aromaticum.*  
caule arboreo. *Fl. zeyl.* 345. \*

Ricinoides arbor aromatica, circææ foliis, media. *Herm. zeyl.* 202. 11.

*Habitat in Zeylona.*

9. CROTON foliis cordatis angulatis scabris subtus to-*moluccanum*  
mentosis. *Fl. zeyl.* 346.

Nux juglans moluccana bifida. *Burm. zeyl.* 170.

*Habitat in Zeylona, Moluccis.*

10. CROTON foliis trilobo-hastatis lanceolatis dentatis. *hastatum.*  
Ricinus asperior, alceæ venetæ foliis aliquatenus accedens.

*Pluk. alm.* 320. t. 220. f. 2.

*Habitat in India.*

11. CROTON foliis inermi-ferratis: inferioribus quin-*lobatum.*  
quelobis, superioribus trilobis. *Hort. cliff.* 445. *Roy.*

*Ingdb.* 201. *Zeyl.* 347.

Ricinoides herbaceum, foliis trifidis s. quinquefidis & ferratis. *Mart. cent.* 46. t. 46.

*Habitat in Vera Cruce.* ☉

12. CROTON foliis palmatis quinquelobis trilobisque *spinosum.*  
spinoso-ferratis, floribus cauli adpersis subsessilibus. *Fl.*

*zeyl. p.* 238.

Ricinus maderaspatanus, quinquefidis durioribus foliis margine spinosis. *Pluk. alm.* 320. t. 108. f. 3.

*Habitat in India.*

13. CROTON foliis ternatis ferratis lanceolatis. *urens.*

Ricinus urens, cannabinis foliis, triphyllos. *Pluk. alm.*

320. t. 120. f. 6.

*Habitat in India.*

JATRO-

14. v. 2/4. 1197.

## JATROPHA.

- gossypifolia*. 1. **JATROPHA** foliis quinquepartitis: lobis ovatis integris: setis glandulosis ramosis: *Roy. lugdb.* 202.  
*Ricinus minor*, *staphisagriae* folio; flore pentapetalo purpureo. *Sloan jam.* 41. *hist.* 1. p. 129. t. 84.  
*Ricinus americanus* perennis, floribus purpureis, *staphisagriae* foliis. *Comm. hort.* 1. p. 17. t. 9.  
*Ricinus americanus*, folio *staphisagriae*. *Bauh. pin.* 432. 518.  
*Habitat in America meridionali.* ♀  
*Fructificatio Masculi* floris: Perianthium semiquinquesdum: laciniis lanceolatis, ciliatis, acutis. Corolla pentapetala, rosacea: Petalis subrotundis, patentibus, convexis, subtus concavis, hinc revolutis. Nectarium ex glandulis 5, parvis; receptaculo insertis. Filamenta 10, subulata, in medio approximata: quinque alternis corolla brevioribus, erectis; Antheræ subrotundæ, versatiles. Pittilli rudimentum debile. Feminei Flores ex eadem umbella cum masculis: Calyx 5 Corolla ut in masculo. Germen subrotundum. Stylis 3, dichotomi. Stigmata simplicia. Capsula subrotunda, tricoeca, trilocularis. Semina solitaria, subrotunda. *D. Roenus.*
- moluccana*. 2. **JATROPHA** foliis ovatis integerrimis subdentatis. *Fl. zeyl.* 348. \*  
*Nux. moluccana*, folio instar ricini, semine nigro. *Herm. zeyl.* 34.  
*Habitat in Moluccis, Zeylona.* ♀
- Gurcas*. 3. **JATROPHA** foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff.* 445. *Mar. med.* 439. *Roy. lugdb.* 102.  
*Ricinus americanus* major, semine nigro. *Bauh. pin.* 432.  
*Ricinus ficus* folio; flore pentapetalo viridi, fructu lævi pendulo. *Sloan. jam.* 40.  
*Mundubignacu.* *Marcgr. bras.* 97.  
*Habitat in America calidiore.* ♀
- multifida*. 4. **JATROPHA** foliis multipartitis lævibus, stipulis setaceis multifidis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 202.  
*Ricinoides americanus*, tenuiter diviso folio. *Breyn. cent.* 116. t. 53. *Sloan. jam.* 40. *Raj. hist.* 167. *Morif. hist.* 3. p. 348. f. 10. t. 3. f. ult.  
*Avellana purgatrix.* *Bauh. pin.* 418.

Ma-

*Manihot* folio tenuitur diviso. *Dill. elth.* 217. *t.* 173.  
f. 213.

*Habitat in America meridionali.* ♀

5. *JATROPHA* foliis palmatis: lobis lanceolatis integer-*Manihot*  
rimis lævibus.

*Ricinus* minor, viticis obtuso folio, caule verrucoso,  
flore pentapetalo albido, ex cujus radice tuberosa, suc-  
co venenato turgida americani panem conficiunt.  
*Sloan. jam.* 41. *hist.* 1. p. 130. *t.* 85.

*Manihot* inodorum f. *Yucca* foliis cannabinis. *Bauh.*  
*pin.* 90. *Pluk. alm.* 241. *t.* 205. f. 1.

*Manihot* theveti, *Yucca* & *Cassavi*. *Bauh. hist.* 2. p. 794.  
Arbor succo venenato, radice esculenta. *Bauh. pin.* 512.

*Habitat in America australi.* ♀

6. *JATROPHA* foliis palmatis dentatis aculeatis. *Hort. urens*,  
*cliff.* 445. *Hort. upj.* 290. *Roy. lugdb.* 202.

*Ricinus* tithymaloides americanus lactescens & urens,  
floribus albis *Comm. hort.* 1. p. 19. *t.* 10.

*Ricinus* lactescens, fici foliis: spinulis mordaceis arma-  
tis. *Pluk. alm.* 320. *t.* 220. f. 3.

*Habitat in Brasilia.* ♀

7. *JATROPHA* aculeata, foliis trilobis, caule herbaceo. *herbacea*,  
*Roy. lugdb.* 202.

*Jussieuia* herbacea spinosissima urens, foliis digitatis &  
laciniatis. *Houft. Amm. herb.* 256.

*Habitat in Vera Cruce.* 2

## RICINUS.

1. *RICINUS.*

*communis.*

*Ricinus* foliis peltatis ferratis: petiolis glanduliferis. *Hort.*  
*cliff.* 450. *Hort. upj.* 289. *Fl. zeyl.* 339. *Mat. med.*  
438. *Roy. lugdb.*

*Ricinus* vulgaris. *Bauh. pin.* 439.

*Ricinus* gallis Palma christi. *Lob. hist.* 392.

- β. *Ricinus* africanus maximus, caule geniculato rutilante.  
*Tournef. inst.* 542.

*Habitat in India utraque, Africa, Europa australi.* ♂

## STERCULIA.

1. *STERCULIA* foliis ovatis integerrimis alternis petio- *Balanghar.*  
latis, floribus paniculatis. *Fl. zeyl.* 350.

*Nux* malabarica sulcata mucilaginosā fabacea. *Pluk.*  
*alm.* 266.

Ca-

Cavalam. *Rheed. mal.* 1. p. 89. t. 49. *Raj. hist.* 1754.

*Habitat in India.* ♀

*Fructus nutans, quinquelobus: lobis reflexis, more Pœonia debiscentibus.*

*fecunda.*

2. *STERCULIA* foliis digitatis. *Fl. zeyl.* 349.

*Nux zeylanica, folio multifido digitato. Pluk. alm.* 266. t. 208. f. 3.

*Karil. Rheed. mal.* 4. p. 75. t. 36. *Raj. hist.* 1564.

*Habitat in India.* ♀

### HURA.

*crepitans.*

1. *HURA. Hort. cliff.* 486. t. 34. *Roy. lugdb.* 232.

*Hura americana, abutili indici folio. Comm. hort.* 2. p. 131. t. 66.

*Burau ex pluribus nucibus arboris Huræ. Bank. hist.* 1. p. 333. *Sloan. jam.* 214.

*Arbor crepitans. Hern. mex.* 88.

*Habitat in Mexico, Guayava, Jamaica.* ♀

## SYNGENESIA.

### TRICHOSANTHES.

*Anguina.*

1. *TRICHOSANTHES* pomis teretibus oblongis incurvis. *Hort. cliff.* 450. *Roy. lugdb.* 262.

*Anguina sinensis, flore albo elegantissimo, fructu oblongo intorto. Mich. gen.* 12. t. 9.

*Cucurbita sinensis, fructu longo anguino vario, flore candido capillamentis tenuissimis ornato. Till. pis.* 49. t. 22.

*Habitat in China.* ☉

*nervifolia.*

2. *TRICHOSANTHES* pomis ovatis acutis, foliis cordatis oblongis trinerviis dentatis.

*Tota-pivi. Rheed. mal.* 8. p. 33. t. 17. *Raj. suppl.* 377.

*Habitat in India.*

*cucurbitaria.*

3. *TRICHOSANTHES* pomis ovatis acutis, foliis cordatis angulatis.

*Pada valam. Rheed. mal.* 8. p. 39. t. 15. *Raj. suppl.* 337.

*Habitat in India.*

*armata.*

4. *TRICHOSANTHES* pomis turbinato-ovatis.

*Colocynthis flore albo fimbriato, fructu oblongo. Plum. amer.* 86. t. 101. *Raj. suppl.* 332.

*Habitat in Domingo.* ☉

MOMOR-

## MOMORDICA.

1. MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis *Balsamina*.  
glabris patenti-palmatis. *Hort. cliff.* 451. *Hort. upf.*  
293. *Roy. lugdb.* 262.  
*Balsamina rotundifolia repens* f. mas. *Baub. pin.* 306.  
*Charantia*. *Dod. pempt.* 670.  
*Habitat in India.* ☉
2. MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis *Charantia*,  
villosis longitudinaliter palmatis. *Hort. cliff.* 457. *Fl.*  
*zeyl.* 351. *Roy. lugdb.* 262.  
*Balsamina cucumerina indica*, fructu majore flavescent-  
te. *Comm. hort.* 1. p. 103. t. 54.  
*Pandipavel*. *Rheed. mal.* 8. p. 17. t. 9.  
β. *Pavel*. *Rheed. mal.* 8. p. 18. t. 10.  
*Habitat in India.*  
*Involucrum cordatum, & amplexicaule urget summam*  
*affinitatem cum prima.*
3. MOMORDICA pomis oblongis: sulcis catenulatis, fo- *Luffa*.  
liis incis. *Hort. cliff.* 451. *Hort. upf.* 293. *Fl. zeyl.*  
352. *Roy. lugdb.* 262.  
*Cucumis ægyptius reticulatus* f. *Luffa arabum*. *Vest. æ-*  
*gypt.* 199. t. 58. 59. *Morif. hist.* 1. p. 35. f. 7. t. 7.  
f. 1. 2.  
*Habitat in Zeylona.* ☉  
*Semina albida. Cirrhi apice quasi umbellati ex plurimis*  
*minoribus cirrhis.*
4. MOMORDICA pomis cylindricis longissimis. *cylindrica*.  
*Pepo indicus reticulatus*, seminibus nigris. *Herm. lugdb.*  
482. *Pluk. alm.* 286.  
*Pepo reticulatus & sulcatus*, semine nigro. *Herm. parad.*  
*app.* 11. *Raj. suppl.* 332.  
*Habitat in Zeylona, China.* ☉  
*Caulis quinquangulatus. Folia cucumerina, angulata,*  
*basi serrato-dentata, angulis acutis: intermedia pro-*  
*ductiore, sinubus non ut in precedente ampliatis, sed*  
*angulis rectis instructis. Poma pedalia, subvillosa, cy-*  
*lindrica. Semina nigra. Flores lutei; Cirrhi ex a-*  
*xillis.*
5. MOMORDICA pomis striatis, foliis pedatis ferratis. *pedata*.  
*Momordica fructu striato lævi.* *Few. peruv.* 1. p. 754.  
t. 41.  
*Habitat in Peru.*

- Elaterrim.* 6. **MOMORDICA** pomis hispida, cirrhis nullis.  
 Momordica absque cirrhis. *Hort. ups.* 294. *Mat. med.* 447.  
 Momordica pomis ovalibus hispida, foliis cordatis integris plicato-dentatis. *Hort. cliff.* 451. *Roy. lugdb.* 262.  
 Cucumis sylvestris asininus dictus. *Bauh. pin.* 314.  
 Cucumis sylvestris. *Cam. epit.* 946.  
*Habitat in Europa australi.* ☉

## CUCURBITA.

- Lagenaria.* 1. **GUCURBITA** foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis.  
 Cucurbita feminibus obsolevere bicornibus. *Hort. cliff.* 451. *Hort. ups.* 291. *Mat. med.* 442. *Roy. lugdb.* 263.  
 Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 313.  
 Cucurbita lagenaria, flore albo. *Morif. hist.* 2. p. 23. f. 1. 2. 5. f. 3.  
*Habitat in America riguis.* ☉
- Pepo.* 2. **CUCURBITA** foliis lobatis, pomis laevibus.  
 Cucurbita seminum margine tumido. *Hort. cliff.* 452. *Hort. ups.* 291. *Roy. lugdb.* 263.  
 Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero. *Bauh. pin.* 213.  
 Cucurbita indica rotunda. *Dalech. hist.* 616.  
 ♂ *Pepo* oblongus. *Bauh. pin.* 311.  
*Habitat - - - - -* ☉
- verrucosa.* 3. **CUCURBITA** foliis lobatis, pomis nodoso-verrucosis.  
 Cucurbita verrucosa. *Bauh. hist.* 2. p. 222.  
 Melopepo verrucosus. *Tournef. inst.* 106.  
*Habitat - - - - -* ☉
- Melopepo.* 4. **CUCURBITA** foliis lobatis, caule erecto, pomis depresso-nodosis.  
 Melopepo clypeiformis. *Bauh. pin.* 312.  
 Cucurbita clypeiformis f. Siciliana. *Bauh. hist.* 2. p. 224.  
*Habitat - - - - -* ☉  
 Cirrhi sunt in caule, quamvis non scandat, nec procumbat.
- Citrullus.* 5. **CUCURBITA** foliis multipartitis. *Hort. ups.* 3. *Mat. med.* 443. p. 292. Cu.

*Cucurbita seminum margine basi dilatato. Hort. cliff.*

452. *Roy. lugdb.* 264.

*Anguria Citrullus dicta. Bauh. pin.* 312.

*Citrullus folio colocynthis secto, semine nigro. Bauh.*

*hist.* 2. p. 235.

*Habitat in* Apulia, Calabria, Sicilia. ☉

## CUCUMIS.

1. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globosis glabris. *Colocynthis.*

*Hort. ups.* 293. *Mat. med.* 446. *Roy. lugdb.* 263.

*Cucumis foliis multifidis. Roy. lugdb.* 263.

*Colocynthis, fructu rotundo, major. Bauh. pin.* 313.

*Colocynthis. Cam. epit.* 982.

*Habitat* - - - ☉

2. CUCUMIS foliis palmato-sinuatis, pomis subovatis *Anguria.*

*echinatis. Hort. ups.* 292.

*Cucumis foliis palmatis. Roy. lugdb.* 263.

*Cucumis sylvestris americanus, anguriae folio, fructu ovi figura: spinosis tuberculis momordicae instar muricato. Pluk. phyt.* 170. f. 3.

*Cucumis anguriae folio latiore aspero, fructu minore candido, spinulis obtusis muricato. Sloan. jam.* 103.

*Habitat in* Jamaica. ☉

3. CUCUMIS foliis rotundato-angulatis, pomis acut-angulatis, angulis.

*Cucumis longus indicus. Grew. mus.* 229. t. 17. f. 2.

*Cucumis indicus striatus operculo donatus: corticoseo putamine tectus. Pluk. alm.* 123. t. 172. f. 1?

*Habitat in* Tataria, China. ☉

*Flores lutei in pedunculis multifloris. Poma oblonga: angulis 10, compressis. Folia cordata, acute angulata, serrato-dentata. Caulis pentagonus, acutus, scandens.*

4. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Melo.*

*Hort. cliff.* 451. *Hort. ups.* 292. *Mat. med.*

444. *Roy. lugdb.* 263.

*Melo vulgaris. Bauh. pin.* 310.

*Melo. Bauh. hist.* 2. p. 242.

*Habitat* - - - ☉

5. CUCUMIS hirsutus, foliorum angulis rotundatis, pomis subglobosis. *Dudaim.*

*Melo variegatus, aurantii figura, odoratissimus. Dill.*

*elib.* 223. t. 177. f. 218.

S f f 2

Melo

*Melo ægyptius minor.* *Tournef. inst.* 105.

*Melo perticus minimus odoratissimus.* *Raj. suppl.* 333.

*Cucumis orientalis, fructu citriforimi.* *Waltb. hort.* 133.  
t. 21?

*Habitat in Ægypto, Arabia.* *Hasselquist.* ☉

*Sola pilositate differt (an sufficienter) a Melone.* Caul-  
les decumbentes, cirrhosi, obsolete pentagoni: Pili al-  
bis, pellucidis, erectis adpersi sunt Caules, Folia,  
Calyces & omnia externa, qui pili valde molles &  
conferti; itaque tota planta ejusmodi mollibus pilis  
vestita omnino est, ac germen in Melone vulgari, qui  
reliquis partibus hispidus & scaber pilis conicis, rigi-  
dusculis, distantibus, ab hac differt.

*fativus.*

6. CUCUMIS foliorum angulis rectis, pomis oblongis  
scabris. *Hort. cliff.* 451. *Hort. ups.* 292. *Mat. med.*  
445. *Roy. lugdb.* 263.

*Cucumis fativus vulgaris.* *Bauh. pin.* 310.

*Cucumis vulgaris.* *Dod. pempt.* 66.

*Habitat - - -* ☉

*maderaspata-  
tans.*

7. CUCUMIS foliis cordatis integris denticulatis, po-  
mis globosis glabris. *Hort. ups.* 293.

*Bryonia foliis cordatis oblongis angulatis dentatis gla-  
bris.* *Fl. zeyl.* 356. \*

*Cucumis maderaspataensis, fructu minimo.* *Pluk. alm.*  
123. t. 170. f. 2.

*Habitat in India.* ☉

## BRYONIA.

*alba.*

1. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-scabris.  
*Hort. cliff.* 453. *Fl. suec.* 790. *Roy. lugdb.* 264. *Mat.*  
*med.* 448. *Dalib. paris.* 296.

*Bryonia alba, baccis nigris.* *Bauh. pin.* 297.

*Vitis alba, baccis nigris.* *Fuchs hist.* 94. *Cam. epit.* 987.

*Habitat in Europa ad pagos & sepes.* &

*palmata.*

2. BRYONIA foliis palmatis lævibus quinquepartitis: la-  
ciniis lanceolatis repando-ferratis *Fl. zeyl.* 353. \*

*Bryonia zeylanica, folio quinquepartito.* *Burm. zeyl.*  
353.

*Habitat in Zeylona.* &

*cordifolia.*

3. BRYONIA foliis cordatis oblongis quinquangulatis  
dentatis scabris. *Fl. zeyl.* 354. \*

*Habitat in Zeylona.*

4. BRYO



4. BRYONIA foliis palmatis scabris: laciniis lanceola-<sup>laciniosa.</sup>  
tis ferratis: lateralibus minimis. *Hort. cliff.* 452. *Fl.*  
*zeyl.* 355. *Roy. lugdb.* 264.  
Bryonia zeylanica, foliis profunde laciniatis. *Herm.*  
*lugdb.* 95. *t.* 95.  
Bryonia zeylanica, flore luteo, fructu rubro. *Herm. pa-*  
*rad.* 103. *t.* 107.  
*Habitat in Zeylona.* 2
5. BRYONIA foliis palmatis quinquepartitis utrinque læ-<sup>africana,</sup>  
vibus: laciniis pinnatifidis.  
Bryonia foliis palmatis quinquepartitis: subtus punctato-  
callosis; supra lævibus, lobis laciniatis. *Hort. cliff.*  
453. \* *Roy. lugdb.* 264.  
Bryonia africana laciniata, tuberosa radice, floribus her-  
baceis. *Herm. parad.* 107. *t.* 108.  
*Habitat in Æthiopia.* 2
6. BRYONIA foliis palmatis supra calloso-punctatis. <sup>cretica.</sup>  
*Hort. cliff.* 453. \* *Roy. lugdb.* 264.  
Bryonia cretica maculata. *Baub. pin.* 297. *prodr.* 135.  
Bryonia alba maculata. *Baub. hist.* 2. *p.* 146.  
*Habitat in Creta.*

SICYOS.

1. SICYOS foliis angulatis. *Hort. cliff.* 452. *Hort. xps.* <sup>angulata,</sup>  
291. *Roy. lugdb.* 265.  
Bryonioides flore & fructu minore. *Dill. elsh.* 58. *t.* 51.  
*f.* 59.
- β. Cucumis canadensis monospermos, fructu echinato.  
*Herm. par.* 108. *t.* 133.  
*Habitat in Canada, Mexico.* ☉
2. SICYOS foliis laciniatis.  
Sicioides fructu echinato, foliis laciniatis. *Plum. spec.* 3. <sup>laciniata.</sup>  
*Habitat in America calidiori.*
3. SICYOS foliis ternatis incis. *Roy. lugdb.* 265. <sup>trifoliata.</sup>  
Bryonia alba triphylla geniculata, foliis crassis acidis.  
*Sloan. jam.* 106. *hist.* 1. *p.* 233. *t.* 142. *f.* 56.  
*Habitat in Jamaica.* 2

FEVILLEA.

1. FEVILLEA foliis cordatis angulatis. <sup>cordifolia.</sup>  
Nhandiroba scandens, foliis hederaceis angulosis. *Plum.*  
*gen.* 20.  
*Habitat in America calidiore.*

S f f 3

2. FE-

*trilobata.*

## 2. FEVILLEA foliis trilobis.

Ghandiroba f. Nhandiroba. *Maregr. bras.* 46. *Sloan. jam.* 84. *bist.* 1. p. 200. *Raj. bist.* 1875.

*Habitat in* Brasilia, Jamaica.

## GYNANDRIA.

## ANDRACHNE.

*Telephioides* 1. ANDRACHNE procumbens herbacea.

Andrachne. *Hort. cliff.* 443. *Hort. ups.* 285.

Telephioides græcum humifusum, flore albo. *Tournef. cor.* 50. *Dill. elth.* 377. t. 282. f. 364. *Buxb. cent.* 2. p. 20. t. 12. f. 2.

Glauz procumbens, myrti tarentini folio. *Bocc. mns.* 2. p. 168. t. 119.

*Habitat in* Italia, Græcia, Media. ☉

*fruticosa.*

## 2. ANDRACHNE erecta arborea.

*Habitat in* China. *Osbeck.*

Caules fruticosi Ramis alternis, ad ramulos compressis. Folia ovata, integerrima, petiolata, glabra. Flores axillares, conferti.

## Classis XXII.

## DIOECIA.

## MONANDRIA.

## NAJAS.

1. NAJAS. *Hort. cliff.* 437. *Fl. succ.* 791. *Roy. lugdb. marina.*  
103.

Fluvialis vulgaris latifolia. *Vaill. a2.* 1719. p. 17. t. f. 2.

Fluvialis latifolia (& angustifolia), fructu monoispermo.

*Mich. gen.* 11. t. 8. f. 1. 2.

Potamogeton fluviatile fargazo simile lucens, foliis margine dentatis. *Pluk. alm.* 304. t. 216. f. 4. *Raj. suppl.* 121.

- β. Fluvialis species, angusto brevique folio, undequaque spinis infecta. *Raj. suppl.* 132.

- γ. Fluvialis species, folio angusto ad margines denticulis spinosis inciso, Flagellum Christi dicta. *Raj. suppl.* 121.

*Habitat in Europæ maribus.*

## DIANDRIA.

## VALLISNERIA.

1. VALLISNERIA. *Fl. lapp.* 371. *Hort. cliff.* 454. *Roy. spiralis.*  
*lugdb.* 9. *Dalib. parif.* 296.

- ♀ Vallisneria palustris, algæ folio, italica, foliis in summitate denticulatis, flore purpurascente. *Mich. gen.* 12. t. 10. f. 1.

Potamogeton, algæ folio, pisanum. *Bocc. mus.* 1. p. 29.

- ♂ Vallisnerioides palustre, algæ folio, italicum, foliis in summitate tenuissime denticulatis, floribus albis vix conspicuis. *Mich. gen.* 3. t. 10. f. 2.

*Habitat in Pisæ & Florentiæ fossis.*

Folia hujus ni fallor vidi in Suecia & alibi, sed nunquam nobis licuit desideratissimos intueri flores.

## SALIX.

\* *Foliis glabris serratis.*

1. SALIX foliis serratis glabris, floribus hermaphroditis  
diandris. *Habi- hermaphroditica.*

*Habitat Upsaliæ. b*

Convenit cum *S. pentandra* Foliis glabris, obtuse glandulis serratis, convolutis, senis sæpius ex singulagemma, flavescentibus. Amentis villosis, magnitudine & habitu iisdem. Differt vero ab eadem Ramis pallidiorescentibus, nec purpurascens. Foliis pagina superiore venis exaratis, nec venis elevatis. Glandulis ad basin petiolorum exuberantibus. Tempore prius florendi & gallis copiosioribus, quam sequentis.

*triandra.*

2. *SALIX* foliis serratis glabris, floribus triandris.

*Salix* foliis elliptico-lanceolatis utrinque glabris serratis appendiculatis. *Hall. belv.* 152. *Gmel. sib.* 1. p. 155. t. 34. f. 3. (n. 3)

*Salix* folio auriculato splendente flexillis. *Raj. hist.* 1420.

*Habitat in Helvetia, Sibiria. b*

Perquam affinis antecedenti & sequenti.

*pentandra*

3. *SALIX* foliis serratis glabris, flosculis pentandris. *Hort. cliff.* 454. *Fl. suec.* 792. *Gmel. sib.* 1. p. 153. t. 34. f. 1.

*Salix pentandra. Fl. lapp.* 370. t. 8. f. 3.

*Salix* folio laureo f. lato glabro odorato. *Raj. hist.* 1420.

*Salix* spontanea, folio amygdalino, fragilis non auriculata. *Bauh. hist.* 1. p. 214.

*Habitat in Europæ paludibus montosis duris. b*

*phylicifolia.*

4. *SALIX* foliis serratis glabris lanceolatis: crenis undatis. *Fl. lapp.* 358. t. 8. f. D. *Fl. suec.* 793.

β. *Salix* foliis serratis glabris oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 350. t. 8. f. C.

*Habitat in Sueciæ borealibus.*

*vitellina.*

5. *SALIX* foliis serratis ovatis acutis glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Hort. ups.* 295.

*Salix* foliis lineari-lanceolatis acuminatis. *Gvett. stamp.* 1. p. 206.

*Salix* sativa lutea, folio crenato. *Bauh. pin.* 473.

*Habitat in Europa temperatiore.*

*amygdalina.*

6. *SALIX* foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Roy. lugdb.* 83. *Fl. suec.* 794. *Dalib. paris.* 297.

*Salix* foliis serratis glabris acuminatis appendiculatis. *Fl. lapp.* 349. γ.

*Salix* folio amygdalino utrinque virente aurito. *Bauh. pin.* 43.

*Salix*

*Salix folio auriculato splendente flexilis. Raj. cant. 144.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*

7. SALIX foliis serratis glabris subovatis acutis sessilibus, *hastata*.  
 stipulis subcordatis.

*Salix foliis serratis glabris subovatis sessilibus appendiculatis. Fl. lapp. 354. t. 8. f. G. Fl. succ. 797.*

*Salix foliis glabris ovatis serratis, appendicibus latissimis.*  
*Hall. belv. 151. n. 1*

*Habitat in Lapponia, Helvetia. b*

8. SALIX foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petio-fragilis.  
 lis dentato-glandulosis. *Fl. lapp. 349. t. 8. f. B. Fl. succ. 795.*

*Salix foliis serratis glabris lanceolatis acuminatis appendiculatis. Roy. lugdb. 83.*

*Salix, folio longo latoque splendente, fragilis. Raj. angl. 3. p. 448. cantabr. 143. It. scan. 200. \**

*Habitat in Europæ borealibus. b*

*Arbor procera Amenta ad basin pedunculi gerunt foliola 2. f. 3, sepius caduca. Rami digito concussi ad genicula annotina diffiliunt.*

9. SALIX foliis serratis glabris lineari-lanceolatis, ramis *babylonica*.  
 pendulis. *Hort. cliff. 454. Roy. lugdb. 84.*

*Salix orientalis, flagellis deorsum pulchre pendentibus.*  
*Tournef. cor. 41.*

*Habitat in Oriente, b*

10. SALIX foliis serratis glabris lanceolatis: inferioribus *purpurea*.  
 oppositis. *It. scan. 252. \**

*Salix folio longo subluteo non auriculata, viminibus rubris. Raj. angl. 3. p. 450.*

*Habitat in Europæ australioribus. b*

*Rami sæpe sanguineo-corallini. Gemmæ univalves promunt Folia 3, transversim cauli applicata (contra in plerisque) ex 2. exterioribus transversim positis.*

11. SALIX foliis serratis glabris lanceolato-linearibus: su- *Helix*.  
 perioribus oppositis obliquis. *Roy. lugdb. 83. n. 4. Dalib. paris. 299.*

*Salix foliis utrinque lævibus: inferne glaucis, squamis & capsulis tomentosis. Hall. belv. 153.*

*Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex adverso binis. Raj. hist. 1421. cant. 144. angl. 3. p. 448.*

*Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis.*  
*Bauh. hist. 1. p. 213. f. 2.*

S f f 5

Sa-

*Salix Helice theophrasti. Dalech. hist. 277.*

*Habitat in Europa australiori ad sepes, locis aquosis. & Rami angulosi. Folia adulta subtus glauca, superiora opposita.*

*myrsinites.* 12. *SALIX* foliis ferratis glabris ovatis venosis. *Fl. lapp.* 353. t. 8. f. F. & t. 7. f. 6. *Fl. succ.* 799.

*Salix myrtilli folio, spica crassissima. Hall. belv. 153.*

*Salix alpina pumila myrsinites. Pont. comp. 149.*

*Salix alpina, foliis angustioribus splendentibus ferratis. Scheuch. alp. 340.*

*Salix alpina pumila repens, foliis oblongis exiguis: superne splendentibus, interne cinereis creberrimis & tenuissimis crenis. Till. pis. 151.*

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Italiæ. &*

*arbuscula.* 13. *SALIX* foliis subserratis glabris subdiaphanis subtus glaucis, caule suffruticoso. *Fl. succ.* 798. *Gmel. fib.* 1. p. 166.

*Salix foliis ferratis glabris obovatis. Fl. lapp. 352. t. 8. f. E.*

β. *Salix foliis integris glabris ovatis confertis pellucidis. Fl. lapp. 356.*

γ. *Salix foliis ferratis glabris lanceolatis utrinque acutis. Fl. lapp. 360. t. 8. f. M.*

*Habitat in Lapponiæ campis arenosis. &*

*herbacea.* 14. *SALIX* foliis ferratis glabris orbiculatis. *Fl. lapp. 355. t. 8. f. N. & t. 7. f. 3. 4. Fl. succ.* 800. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv. 155. n. 14.*

*Salix saxatilis minima. Baub. pin. 474. prodr. 159.*

*Salix alpina lucida repens, alni rotundæ folio. Bocc. mus. 2. p. 19. t. 11. f. ult. Raj. suppl. 12. angl. 3. p. 448.*

*Herba facie pyrolæ. Mart. spitsb. 47. t. G. f. B.*

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. &*

\* *Foliis glabris integerrimis.*

*reticulata.* 15. *SALIX* foliis integerrimis glabris ovatis obtusis. *Salix foliis integris glabris ovatis subtus reticulatis. Fl. lapp. 359. t. 8. f. L. & t. 7. f. 1. 2. Fl. succ.* 801.

*Salix pumila, folio rotundo. Baub. hist. 1. p. 217. Scheuch. alp. 43. 340. Raj. hist. 1423.*

*Salix pumila, folio rotundo integerrimo, julo gracili. Hall. belv. 154.*

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ. &*

*Gem-*

Gemmæ promunt Folia 3, ovata, obtusa, petiolata, integerrima, obsolete pilosa: supra viridia rugosa; subtus glauca reticulata: venis primum rubris demum viridibus. Spica ex eadem gemma.

16. SALIX foliis integris glabris ovatis acutis. *wyrttilloides.*

Salix foliis integris glabris ovatis alternis. *Fl. lapp.*

357. t. 8. f. J. K. *Fl. succ.* 804.

Habitat in Suecia septentrionali. b

17. SALIX foliis integerrimis, subtus tenuissime villosis, glauca, ovato-oblongis. *Fl. lapp.* 363. t. 7. f. 5. & t. 8. f. P. *Fl. succ.* 802.

Salix alpina pyrenaica. *Baub. pin.* 474. *prodr.* 159.

*Burf. XXIV:* 120.

Habitat in Alpibus Lapponicis & Pyrenaicis. *Sauv.* b

\* Foliis integerrimis, villosis.

18. SALIX foliis integerrimis utrinque villosis obovatis aurita, appendiculatis. *Fl. lapp.* 369. t. 8. f. T. *Fl. succ.* 810. *Roy. lugdb.* 84.

Salix folio rotundo minore. *Dill. app.* 37. *Raj. angl.*

3. p. 450.

Habitat in Europæ borealis sylvis. b

19. SALIX foliis utrinque lanatis subrotundis acutis. *Fl. lanata, lapp.* 368. t. 8. f. X. & t. 7. f. 7. *Fl. succ.* 809.

Salix humilis latifolia erecta. *Baub. pin.* 474. *prodr.* 159.

*Raj. hist.* 1426. *Hall. helv.* 154.

Habitat in Alpibus Lapponicis. b

Folia conferta, ovata, utrinque lanata, integerrima, subseffilia.

20. SALIX foliis integerrimis hirsutis lanceolatis. *Fl. lapp. Lapponum.* 366. t. 8. f. T. *Fl. succ.* 808. *Hall. helv.* 155. t. 5.

Habitat in Alpibus Lapponiæ ubique, Helvetiæ. b

21. SALIX foliis integris ovatis acutis supra subvillosis; arcuaria, subtus tomentosis. *Fl. succ.* 806. *It. gotl.* 206.

Salix foliis integris subtus villosis ovatis acutis *Fl. lapp.*

362. t. 8. f. O. Q.

Salix foliis integris utrinque hirsutis lanceolatis. *Hall. helv.* 155. t. 5. f. 2.

Salix putnilla, foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. *Baub. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. p. 447. *Gmel. fib.* 1.

p. 164. t. 36. f. 1.

Habitat in Europæ paludibus. 4-b.

22. SA-

*incubacea.*

22. SALIX foliis integerrimis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. *Fl. suec.* 807.

Salix foliis ovato-lanceolatis integerrimis, ramis decumbentibus, radice reptatrice. *Roy. lugdb.* 84. *Dalib. paris.* 299.

Salix pumila, foliis ellipticis integerrimis: subtus glaucis, spica rotundiore. *Hall. belv.* 153.

Habitat in Europæ pascuis duriusculis, uliginosis. 2. b.

*repens.*

23. SALIX foliis integerrimis lanceolatis utrinque subpilosis, caule repente. *Fl. suec.* 814.

Habitat inter montes Sueciæ, locis humidis. 2. b

Caulis crassitie digiti. Rami virgati, decumbentes. Ramuli adpersi villis albis. Folia ovata s. ovato-oblonga, integerrima, utrinque glabra, subtus glauca, petiolata, stipulis nullis: infima opposita transversim & parum pilosa. Amenta lateralisa. Feminis capsula rufescentes.

*fulca.*

24. SALIX foliis integerrimis ovatis: subtus villosis nitidis. *Fl. lapp.* 364. t. 8. f. R. *Fl. suec.* 803. \* *Roy. lugdb.* 84.

Salix pumila, folio utrinque glabro. *Baub. hist.* 1. p. 217.

Habitat in Europæ pascuis humidis. 2. b

Gemma univalvis, bipartita: Amentum absque foliis.

*repens.*

25. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus strictis sessilibus subtus tomentosis. *Roy. lugdb.* 84. n. 13.

*repens.*

Salix humilis angustifolia. *Baub. pin.* 474.

Salix humilis repens angustifolia. *Lob. ic.* 2. p. 137.

*Baub. hist.* 1. p. 214.

Habitat in Europæ campis depressis. 2. b

Folia subtus nitida, sericea, villosa.

\* Foliis subservatis, villosis.

*Caprea.*

26. SALIX foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, undatis superne denticulatis. *Roy. lugdb.* 83. *Fl. suec.* 811. *Gmel. fib.* 1. p. 811. *Dalib. paris.* 298.

Salix foliis subcrenatis utrinque villosis ovato-oblongis. *Fl. lapp.* 365. t. 8. f. S. *Roy. lugdb.* 83. *Dalib. paris.* 298.

Salix folio rugoso obiter serrato subtus lanuginoso, julo crassissimo. *Hall. belv.* 155.

Salix latifolia rotunda. *Baub. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. p. 449.

- β. Salix foliis integris, subtus villosis, ovato-lanceolatis utrinque acutis. *Fl. lapp.* 365. t. 8. f. N.



*Salix folio rotundo acuminato integerrimo subtus sericeo. Hall. helv. 154.*

γ. *Salix foliis oblongis subtus villosis: inferioribus crenatis, superioribus integris. Fl. lapp. 367. f. 8. f. U.*

δ. *Salix foliis elliptico-lanceolatis subtus sericeis appendiculatis. Gmel. fib. 1. p. 169.*

*Habitat in Europæ siccis. h*

*Gemmæ inferiores Folia, superiores Amenta non foliacea producunt. h*

27. *SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus viminalis, longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. Fl. suec. 813. Dalib. paris. 297.*

*Salix foliis undulatis linearilanceolatis subtus tomentosis. Roy. lugdb. 84.*

*Salix folio longissimo angustissimo utrinque albedo. Bauh. pin. 474.*

*Salix folio longissimo. Raj angl. 3. p. 450.*

*Salix foliis angustis & longissimis, fissis crispis: subtus albicantibus. Bauh. hist. 1. p. 212.*

β. *Salix foliis ex linearilanceolatis integris subtus incanis. Gmel. fib. 1. p. 163.*

*Habitat in Europæ ad pagos. h*

*Frutex junceus, altissimus. Gemmæ foliaceæ & floriferae distinctæ ut in Caprea. Folia ante expansionem in hac revoluta.*

28. *SALIX foliis subserratis oblongo-ovatis: subtus subcinerea, villosis, stipulis dimidiato-cordatis. Fl. suec. 805.*

*Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. Fl. lapp. 358.*

*Habitat in Europæ nemoribus paludosis subhumidis: h Amenta florum fusca, infra folia collocata, Pedunculo Foliolis aliquot minimis, lanceolatis. Stipulae dimidiato-cordatae, utrinque serratae glandulis tribus.*

29. *SALIX foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque alba, pubescentibus: serraturis intimis glandulosis. Hort. cliff. 473. Fl. suec. 812. Mat. med. 449. Dalib. paris. 297. Roy. lugdb. 83.*

*Salix foliis elliptico-lanceolatis serratis subtus sericeis, vimine fragili. Hall. helv. 152.*

*Salix vulgaris alba arborescens. Bauh. pin. 473.*

*Salix alba. It. scan. 200.*

*Habitat ad pagos & urbes Europæ. h*

*Est arbor maxima cum Salice fragili.*

Spe-



Species hujus generis difficillime extricantur. Solum palustre, arenosum, alpestre, calidum mutat mirametamorphosi species, ut de iisdem hæsitarint sæpius Botanici; accessit Descriptio ubique imperfecta & barbara. Incipienda itaque harum historia e novo; quod fit, si rejiciantur veterum nomina, ne confundant synonyma dubia certas plantas, & in Floris & Hedeporicis describantur 1. Geminæ univalves s. multivalves. 2. Foliatio intra gemmas situ & plicatione. 3. Amenta ex eadem vel distincta gemma, supra aut infra folia. 4. Folia serrata aut integerrima: paginis nudis aut villosis; 5. Staminum numerus. 6. Arbores frutices, repentes.

## TRIANDRIA.

### EMPETRUM.

album.

1. EMPETRUM erectum. Hort. cliff. 470. Roy. lugdb. 206.

Empetrum lusitanicum, fructu albo. Tournef. inst. 579.

Erica erecta, baccis candidis. Baub. pin. 486.

Erica ceris folio X. Clus. hist. 1. p. 45.

Habitat in Lusitania. ♀

Sequenti nimis affinis.

nigrum.

2. EMPETRUM procumbens. Hort. cliff. 470. Fl. suec. 832. Roy. lugdb. 206. Hall. belv. 162.

Empetrum. Fl. lapp. 379.

Erica baccifera procumbens nigra. Baub. pin. 436.

Erica baccifera. Clus. pan. 29.

Habitat in Europæ frigidissima montosis paludosis. ♀

### OSYRIS.

alba.

1. OSYRIS. Roy. lugdb. 202. Sauv. monsp. 56.

Osyris frutescens baccifera. Baub. pin. 212.

Callia poetica montpelitensium. Cam. epit. 26. Lob. ic. 432.

Callia latinorum. Alp. exor. 41.

Habitat in Italia, Hispania, Monspeli. ♀

Femina potius hermaphrodita, cum staminibus gaudeat, tamen sine mare sterilis.

Obli. Osyris foliis obtusis. Hort. ups. 295. est similis s. Nitraria, cujus flores nondum vidi, Frutex Lycii similis, sed foliis conjugatis sessilibus.

TE.

## TETRANDRIA.

## VISCUM.

1. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, *album*.  
 spicis axillaribus.  
*Viscum. Hort. cliff. 441. Fl. suec. 816. Mat. med. 450.*  
*Roy. Ingdb. 400. Hall. belv. 162. Dalib. parisi. 300.*  
*Viscum baccis albis. Bauh. pin. 423.*  
*Viscum. Cam. epit. 555.*  
*Habitat in Europæ arboribus, parasitica. h.*
2. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, spicis lateralibus. *rubrum*.  
*Viscum foliis longioribus, baccis rubris. Catesb. car.*  
*2. p. 81. t. 81.*  
*Habitat in Carolina parasitica. h.*
3. VISCUM foliis obovatis, racemis lateralibus. *purpureum*.  
*Viscum foliis latioribus, baccis purpureis, pediculis in-*  
*identibus. Catesb. car. 2. p. 95. t. 95.*  
*Habitat in Carolina, parasitica. h.*
4. VISCUM caule prolifero ramosissimo aphylo com-*opuntioides*,  
 presso.  
*Viscum opuntioides ramulis compressis. Sloan. jam. 168.*  
*hist. 2. p. 93. t. 201. f. 1. Raj. dendr. 52.*  
*Habitat in Jamaica, parasitica. h.*
5. VISCUM caule verticillato. *verticilla-*  
*tum.*  
*Viscum ramulis & foliis longis densissimis striatis & ra-*  
*diatis. Sloan. jam. 168. hist. 2. p. 93. t. 201. f. 2. Raj.*  
*dendr. 52.*  
*Habitat in Jamaica, parasitica. h.*
6. VISCUM caule herbaceo tetragono brachiato, foliis *terrestre*.  
 lanceolatis.  
*Habitat in Philadelphia pratis subhumidis. Kalm. IX.*  
 32.  
*Caulis herbaceus, pedalis, lævis, brachiatus, tetragonus.*  
*Folia lanceolata, petiolata, lævia, integerrima, ave-*  
*nia inferiora minora. Spicæ axillares, sessiles, car-*  
*nosæ, oblongæ. Fructificatio imperfecta: flores seminei*  
*a me tantum visi. Fructus mihi ignotus; de genere*  
*itaque dubium.*

## HIPPOPHAE.

1. HIPPOPHAE foliis lanceolatis.

*Rhamnoides*

Hip-

- Hippophaë. *Fl. lapp.* 372. *Fl. suec.* 815. *Hort. cliff.* 454.  
*Roy. lugdb.* 207.  
 Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescente.  
*Bauh. pin.* 755.  
 Rhamni species. *Cam. epit.* 81.  
 Rhamnoides florifera, salicis folio. *Tournef. cor.* 53.  
*Habitat in Europæ maritimis arenosis. h*

*canadensis.* 2. HIPPOPHAE foliis ovatis.

*Habitat in Canada. Kalm. h*

Frutex facie antecedentis, sed Folia latiora, dimidio breviora, ovata s. oblongo-ovata. Rami oppositi. Racemi simplices inter folia prima, erecti, foliis dimidio breviores. Folia supra viridia, adpersa pilis fasciculatis, divergentibus, nudo oculo vix discernendis. Subtus folia pilis & squamis argentea, adpersa squamis s. punctis ferrugineis.

### MYRICA.

*Gale.*

1. MYRICA foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso.

Myrica foliis lanceolatis, fructu sicco. *Fl. lapp.* 373.  
*Mat. med.* 451. *Fl. suec.* 817. *Hort. cliff.* 455. *Roy. lugdb.* 527. *Dalib. paris.* 300.

Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.

Chamæleagnus. *Dod. pempt.* 780. app.

*Habitat in Europæ septentrionalis uliginosis. h*

*curifera.*

2. MYRICA foliis lanceolatis subserratis, caule arborecente.

Myrica foliis lanceolatis subserratis, fructu baccato. *Hort. cliff.* 455. *Hort. upf.* 295. *Gron. virg.* 120. *Roy. lugdb.* 527.

Myrtus brabanticae similis carolinienfis baccifera, fructu racemoso sessili monopyreno. *Pluk. alm.* 250. t. 48. f. 9. *Catesb. car.* 1. p. 69. t. 69.

β. Myrtus brabanticae similis carolinienfis humilior, foliis latoribus & magis serratis. *Catesb. car.* 1. p. 13. t. 13.

*Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania. h*

*asplenifolia.*

3. MYRICA foliis oblongis alternatim sinuatis. *Hort. cliff.* 456. *Gron. virg.* 192. *Cold. noveb.* 224.

Gale mariana, asplenii folio. *Pet. mus.* 773.

Myrti brabanticae affinis americana, foliorum laciniis asplenii modo divis. *Pluk. alm.* 250. t. 100. f. 6. 7.

*Habitat in America septentrionali. h*

4. MY-

4. MYRICA foliis oblongis oppositis sinuatis. *Hort. cliff. quercifolia.*  
456. *Roy. lugdb.* 527.  
Coriotragnetodendros africana, botryos amplioribus  
foliis densis. *Pluk. amalb.* 65.  
Laurus africana minor, folio quercus. *Comm. hort.* 2. p.  
161. t. 81. *Raj. dendr.* 85.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
5. MYRICA foliis subcordatis ferratis sessilibus. *Hort. cordifolia.*  
*cliff.* 456. *Roy. lugdb.* 527.  
Alaternoides ilicis folio crasso hirsuto. *Walth. hort.* 3.  
t. 3.  
Tithymali facie planta æthiopica, ilicis aculeato folio.  
*Pluk. alm.* 373. t. 319. f. 7.  
Gale capensis, ilicis cocciferæ folio. *Pet. mus.* 774.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀

## PISTACIA.

1. PISTACIA foliis subternatis. *Hort. cliff.* 456. *Roy. trifolia.*  
*lugdb.* 78. *Sauv. meth.* 219.  
Pistacium mas ficulum, folio nigricante. *Bocc. mus.* 2.  
p. 139. t. 93.  
Terebinthus f. Pistacia trifolia. *Tournef. inst.* 580.  
*Habitat in Sicilia.* ♀
2. PISTACIA foliis pinnatis ternatisque suborbiculatis. *narbonensis.*  
Pistacia foliis sæpius quinatis orbiculatis. *Sauv. monsp.* 219.  
Terebinthus peregrina, fructu majore pistaciis simili e-  
duli. *Bauh. pin.* 400. *Tournef. inst.* 579.  
Terebinthus indica major, fructu rotundo. *Bauh. hist.*  
1. p. 278.
3. Terebinthus major, pistaciæ folio. *Lob. adv.* 412.  
*Habitat Monspelii.* ♀
3. PISTACIA foliis impari pinnatis: foliolis subovatis *vera*  
recurvis. *Mat. med.* 454.  
Pistacia peregrina, fructu racemoso f. Terebinthina indi-  
ca. *Bauh. pin.* 401.  
Pistacia. *Bauh. hist.* 1. p. 275.  
Terebinthus indica theophrasti, Pistacia dioseoridis. *Lob.*  
*adv.* 413. *Tournef. inst.* 580.  
*Habitat in Persia, Arabia, Syria, India.* ♀
4. PISTACIA foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lan- *Terebinthus*  
ceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Mat. med.* 452. *Hort. ups.*  
296. *Roy. lugdb.* 78. *Sauv. monsp.* 219.

T t t

Tere-

*Terebinthus vulgaris.* *Baub. pin* 400. *Tournef. inst.* 57.  
*Terebinthus.* *Clus. hist.* 1. p. 15. *Dod. pempt.* 871.  
*Habitat in Europa australi, Africa boreali, India.* 1  
*Confer* *Terebinthus peregrina*, fructu minore cœruleo  
 eduli. *C. B.* 296.

*Lentiscus.* 5. *PISTACIA* foliis abrupte pinnatis : foliolis lanceolatis. *Hort. cliff* 456. *Hort. ups.* 296. *Mat. med.* 45.  
*Roy. lugdb.* 79. *Sauv. monsp.* 219.  
*Lentiscus vulgaris.* *Baub. pin.* 399. *Tournef. inst.* 58.  
*Lentiscus.* *Clus. hist.* 1. p. 14. *Dod. pempt.* 871.  
*Habitat in Hispania, Lusitania, Italia.* 5  
*Confer* *Lentiscus ex chio*, ex qua fluit mastiche. *Tournef. it.* 1. p. 285.

*Simaruba.* 6. *PISTACIA* foliis pinnatis deciduis : foliolis ovatis.  
*Terebinthus major*, betulæ cortice, fructu triangulari.  
*Sloan. jam. hist.* 2. p. 89. t. 199. *Catesb. car.* 1. p. 30 t. 30?  
*Simaruba.* *Mat. med.* 535.  
*Habitat in Jamaica, Carolina.* 5

## CERATONIA.

*Siliqua.* 1. *CERATONIA.* *Hort. ups.* 296. *Mat. med.* 455. *Roy. lugdb.* 225.  
*Siliqua edulis.* *Baub. pin.* 400.  
 2. *Siliqua.* *Cam. epit.* 139.  
*Habitat in Apulia, Sicilia, Creta, Cipro, Syria, Palestina.* 5

## PISONIA.

*aculeata.* 1. *PISONIA aculeata.*  
*Pisonia.* *Hort. cliff.* 457.  
*Pisonia aculeis rigidissimis hamatis, floribus racemosis.*  
*Amm. herb.* 581.  
*Pisonia aculeata*, fructu glutinoso & racemoso. *Plumgen.* 7.  
*Rhamnus f. Lycium Fringeo jamaicensibus dictum.*  
*Pluk. alm.* 318. t. 108. f. 2.  
*Paliuro affinis arbor spinosa, flore herbaceo pentapetaloide, fructu sicco nudo cannulato lappaceo.* *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2. p. 25. t. 167. *Raj. dendr.* 95.  
*Habitat in America meridionali.* 5  
*mitis.* 2. *PISONIA inermis.*  
*Pisonia malabarica non spinosa.* *Amm. herb.* 581.  
 Kato

Katu-kara-walli. *Rheed. mal.* 7. p. 33. t. 17.

*Habitat in India.* ☿

## ANTIDESMA.

1. ANTIDESMA. *Fl. zeyl.* 357. \* *alexiteria.*  
 Arbor indica, ovali folio, flosculis plurimis in spicis summo ramulo dispositis, acinifera. *Pluk. mant.* 22. t. 329. f. 1.  
 Noeliectali. *Rheed, mal.* 4. p. 19. t. 56. *Raj. hist.* 1616.  
 ♂ Baccifera maderaspatana, ribis more floribus muscosis juli instar. *Pet. mus.* 621. *Raj. dendr.* 27.  
*Habitat in India.* ☿

## SPINACIA.

1. SPINACIA. *Hort. cliff.* 457. *Hort. ups.* 296. *Mat. oleracea. med.* 556. *Roy. lugdh.* 220.  
 Spinacia mas. *Dalech. hist.* 543. ♀  
 Spinacia femine spinoso. *Morif. hist.* 2. p. 598.  
 Lapathum hortense f. spinacia femine spinoso. *Bauh. pin.* 114.  
 Spinachia femina. *Dalech. hist.* 543. ♂  
 ♀ Lapathum hortense f. Spinacia femine non spinoso. *Bauh. pin.* 115.  
*Habitat* - - - ☉

## ACNIDA.

1. ACNIDA. *Mitch. gen.* 28. *Gen. nov.* 1091. *cannabina.*  
 Cannabis foliis simplicibus. *Gron. virg.* 192. \*  
 Cannabis virginiana. *Bauh. pin.* 320.  
*Habitat in Virginie paludibus salis.*

## CANNABIS.

1. CANNABIS. *fativa.*  
 Cannabis foliis digitatis. *Hort. cliff.* 457. *Hort. ups.* 297. *Mat. med.* 457. *Dalib. paris.* 300. *Roy. lugdh.* 221.  
 Cannabis fativa. *Bauh. pin.* 320. ♀  
 Cannabis mas. *Dalech. hist.* 497. ♀  
 Cannabis erratica. *Bauh. pin.* 320. ♂  
 Cannabis femina. *Dalech. hist.* 497. ♂  
*Habitat in India.* ☉

## HUMULUS.

*Lupulus.*

1. HUMULUS. *Hort. cliff.* 458. *Fl. suec.* 818. *Mat. med.* 458. *Dalib. parif.* 301. *Roy. lugdb.* 222.  
 ♀ *Lupulus mas. Baub. pin.* 298.  
*Lupulus salictarius Fuchf. hist.* 124.  
 ♂ *Lupulus femina. Baub. pin.* 298. *Cam. epit.* 954.  
*Habitat in Europæ sepibus & ad radices montium. &*

## ZANONIA.

*indica.*

## 1. ZANONIA.

- Penar-valli mascula. Rheed. mal.* 8. p. 39. t. 49.  
*Penar-valli femina. Rheed. mal.* 8. p. 31. t. 47. 48.  
*Habitat in Malabaria.*

## HEXANDRIA.

## TAMUS.

*communis.*

1. TAMUS foliis cordatis indivisis. *Hort. cliff.* 458.  
*Roy. lugdb.* 228. *Hall. belv.* 165.  
*Bryonia lævis f. nigra racemosa, cujus baccae rufescunt f. nigrescunt. Baub. pin.* 297.  
*Bryonia sylvestris baccifera. Baub. prodr.* 135.  
 ♂ *Bryonia lævis f. nigra racemosa. Baub. pin.* 297.  
 ♀ *Bryonia lævis f. nigra baccifera. Baub. pin.* 297.  
*Vitis sylvestris f. Tamus. Dod. pempt.* 400.  
*Habitat in Europa australi. &*

*cretica.*

## 2. TAMUS foliis trilobis.

- Tamnus cretica, trifido folio. Tournef. cor.* 3.  
*Habitat in Creta. &*

## SMILAX.

\* *Caule aculeato; angulato.**aspera.*

1. SMILAX caule aculeato angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis.  
*Smilax caule angulato aculeato, foliis cordato-oblongis acutis aculeatis. Hort. cliff.* 458. *Roy. lugdb.* 228.  
*Smilax aspera, fructu rubente. Baub. pin.* 296.  
*Smilax aspera, rutilo fructu. Clusf. hist.* 1. p. 112.  
 ♂ *Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro. Baub. pin.* 236.  
*Smilax aspera, nigro fructu. Clusf. hist.* 1. p. 113.  
 ♀ *Smilax viticulis aspera, foliis longis angustis mucronatis.*



lævibus: auriculis ad basin rotundioribus. *Pluk. alm.* 348. t. 110. f. 3.

*Habitat in Hispaniæ, Italiæ, Siciliæ sepibus* h.

2. SMILAX caule aculeato angulato, foliis inermibus *excelsa*, sagittatis.

*Smilax* caule angulato aculeato alternatim inflexo, foliis sagittatis acutis inermibus. *Roy. lugdb.* 228.

*Smilax orientalis*, sarmentis aculeatis excelsas arbores scandens, foliis non spinosis. *Tournef. cor.* 45. *Buxb. cent.* 1. p. 18. t. 27. *mal.*

*Smilax aspera. Alp. aegypt.* 140. t. 141?

*Habitat in Oriente, Syria.* h.

3. SMILAX caule aculeato angulato: foliis inermibus: *zeylanica*, caulinis cordatis; ramis ovato-oblongis. *Fl. Zeyl.* 364.\*

*Smilax indica* spinosa, folio cinnamomi, Pseudo China quibusdam. *Burm. zeyl.* 22.

*Habitat in Zeylona.* h.

4. SMILAX caule aculeato angulato, foliis inermibus *Sarsaparilla*, ovatis retuso-mucronatis.

*Smilax* caule angulato aculeato, foliis ovatis acutis inermibus. *Roy. lugdb.* 228.

*Smilax* caule angulato aculeato; foliis dilato-cordatis inermibus acutis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120. *Mat. med.* 460.

*Smilax viticulis asperis virginiana*, folio hederaceo leni Zarza nobilissima. *Pluk. alm.* 348. t. 111. f. 2. *Raj. suppl.* 345.

*Smilax aspera peruviana*, f. *Sarsaparilla. Bauh. pin.* 296.

*Habitat in Peru, Brasilia, Mexico, Virginia.* h.

\* *Caule aculeato, tereti.*

5. SMILAX caule aculeato teretiusculo, foliis inermi- *China*, bus ovato-cordatis.

*Smilax* caule aculeato; foliis orbiculato-ovatis inermibus quinquenerviis. *Mat. med.* 461.

*Smilax minus spinosa*, fructu rubicundo, radice virtuosa China dicta f. *Sankiva. Kämpf. amon.* 781. t. 782.

*China radix. Bauh. pin.* 896.

Fruticulus convolvulaceus spinosus sinicus, floribus parvis umbellatis. *Pluk. amalb.* 101. t. 408. f. 1.

*Habitat in China, Japonia.* h.

*Petiolibidentati. Folia ovato-cordata, obtusa cum acumine.*

- rotundifolia.* 6. *SMILAX* caule aculeato tereti, foliis inermibus reniformi-cordatis acutis.  
*Habitat in* Canada. *Kalm.* 5  
 Caulis *teres, nudus, flexuosus, aculeis rectis rarioribus.*  
*Folia cordata, inermia, nuda, quinquenervia, latiora quam longa, acuta petiolis brevibus innixa; e petiolo Cirrhi duo, filiformes.*
- laurifolia.* 7. *SMILAX* caule aculeato tereti, foliis inermibus ovato-lanceolatis trinerviis. *Gron. virg.* 193.  
*Smilax lævis, lauri folio, baccis nigris. Catesb. car.* 1. p. 15. t. 15.  
*Habitat in* Virginia, Carolina. 5  
*Folia, quoad consistentiam, crassissima in suo genere.*
- samnoides.* 8. *SMILAX* caule aculeato tereti, foliis inermibus cordatis oblongis multinerviis.  
*Smilax bryoniæ nigræ foliis, caule spinoso, baccis nigris. Catesb. car.* 1. p. 52. t. 52.  
*Habitat in* Carolina, Virginia, Pennsylvania.
- caduca.* 9. *SMILAX* caule aculeato tereti, foliis inermibus ovatis.  
*Habitat in* Canada. *Kalm.* 5  
 Caulis *teres, nudus, flexuosus, aculeis rectis rarioribus apice nigris.* *Folia ovata, trinervia, annua, acuta:*  
*Petiolis brevibus e quibus Cirrhi duo, capillares. Umbellæ infra folia pedunculis vix petiolo longioribus infidentes.*
- \* *Canle inermi, angulato.*
- bona nox.* 10. *SMILAX* caule inermi angulato, foliis ciliato-aculeatis.  
*Smilax aspera indiæ occidentalis. Bauh. pin.* 296.  
*Smilax, foliis latis in margine spinosis, caroliniana, stipite quadrato. Pluk. alm.* 348. t. 111. f. 1.  
 β. *Smilax caroliniana, stipite quadrato leni, foliis angustis asperis auriculatis ad basin angulositis. Pluk. alm.* 348. t. 111. f. 3.  
*Habitat in* Carolina.
- herbacea.* 11. *SMILAX* caule inermi angulato, foliis inermibus ovatis. *Gron. virg.* 193.  
*Smilax lævis marilandica, foliis hederæ nervosis prælongis pediculis intidentibus, flosculis minimis in umbellam parvam congestis. Raj. suppl.* 345.

Smi-

*Smilax claviculata*, hederæ folio, tota lævis, e terra mariana. *Pluk. alm.* 348. t. 110. f. 4?

*Habitat in Virginia, Marilandia. 2*

\* *Caule inermi, tereti.*

12. *SMILAX* caule inermi tereti, foliis inermibus lanceolatis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120.

*Smilax*, viticulis asperis, virginiana, foliis angustis lævibus nullis auriculis prædita. *Pluk. alm.* 349. t. 110. f. 4? *Raj. suppl.* 344?

*Habitat in Virginia.*

*Differt nostra a Plukenetiana aculeorum absentia.*

13. *SMILAX* caule inermi tereti, foliis inermibus: caulinis cordatis, racemis ovato-oblongis. *Pseudo China.*

*Smilax* caule tereti inermi, foliis inermibus: caulinis cordatis, ramorum lanceolatis, pedunculis longissimis. *Gron. virg.* 193.

*Smilax* caule tereti inermi, foliis cordato-ovatis acutis inermibus, petiolis bidentatis. *Hort. cliff.* 459. *Gron. virg.* 120.

*Smilax virginiana*, spinis innocuis armata, latis canellæ foliis, radice arundinacea crassa nodosa & carnosa. *Pluk. alm.* 349. t. 110. f. 5.

*Smilax aspera*, fructu nigro, radice nodosa magna lævi farinacea. *Sloan. jam.* 105. *hist.* 1. p. 231. t. 143. f. 1.

*China spuria nodosa. Bauh. pin.* 297

*Habitat in Virginia, Jamaica.*

## CISSAMPELOS.

1. *CISSAMPELOS* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Pavitra. Mat. med.* 459.

*Clematis baccifera* glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. t. 93. *fil. t.* 183. *Sloan. jam.* 85. *hist.* 1. p. 200.

*Convolvulus brasiliensis*, flore octopetalo, monococos. *Raj. hist.* 1331.

*Hedera monophyllos virginiana*, umbilicatis foliis, baccata, officulo compresso lunato singulari. *Pluk. mant.* 99.

*Caapeba* folio orbiculari & umbilicato lævi. *Plum. gen.* 33.

*Caapeba brasiliensibus. Marcgr. brasit.* 24. *Pis. bras.* 94.

T t t 4

β. Caa-

- β. *Caapeba* folio orbiculari umbilicato & tomentoso.  
*Plum. gen.* 33.  
*Habitat in America meridionali.*

- caapeba.* 2. *CISSAMPELOS* foliis margine petiolatis integris.  
*Caapeba* folio orbiculari non umbilicato. *Plum. gen.* 33.  
*Habitat in America meridionali.*

- Smilacina.* 3. *CISSAMPELOS* foliis cordatis acutis angulatis.  
*Smilax* ? lenis folio anguloso hederaceo. *Catesb. car.* 1.  
*p.* 51. *t.* 51.  
*Habitat in Carolina.*  
*Fructificationem perfectam non vidi.*

## RAJANIA.

- basata.* 1. *RAJANIA* foliis hastato-cordatis. *Hort. cliff.* 458. \*  
*Jan-Raja* scandens, folio oblongo angusto auriculato.  
*Plum. gen.* 33.  
*Bryonia* fructu alato, foliis auriculatis. *Plum. amer.* 84.  
*t.* 98. *fil.* *t.* 178.  
*Habitat in Domingo.*

- cordata.* 2. *RAJANIA* foliis cordatis septinerviis.  
*Jan-Raja* scandens, folio tamini. *Plum. gen.* 33.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Folia cordata, oblonga, acuminata, reticulata. Flores*  
*racemosi.*

- quinquefolia* 3. *RAJANIA* foliis quinis.  
*Jan-Raja* scandens quinquefolia. *Plum. gen.* 33.  
*Habitat in America.*  
*Folia ad singula genicula quina, ovato-lanceolata, obtu-*  
*siuscula, petiolata. Racemi ex medio internodiorum,*  
*non autem ex axillis.*

## DIOSCOREA.

- pentaphylla.* 1. *DIOSCOREA* foliis digitatis. *Hort. cliff.* 459. *Fl.*  
*zeyl.* 363.  
*Ricophora* pentaphyllos, caule spinoso, fructu oblongo  
 triquetro, malabaræa. *Pluk. alm.* 321.  
*Nureni-kelengu. Rheed. mal.* 7. *p.* 67. *t.* 35.  
*Habitat in India.*

- triphylla.* 2. *DIOSCOREA* foliis ternatis. *Hort. cliff.* 459.  
*Tsiageri-nuren. Rheed. mal.* 7. *p.* 63. *t.* 33.  
*Habitat in Malabaræa.*  
*Præcedenti maxime affinis, an satis distincta?*

3. DIO-

3. *DIOSCOREA* foliis cordatis, caule aculeato bulbifera-*aculeata*.  
*ro. Hort. cliff. 459.*  
*Dioscorea* ind. orient. folio tamni longiore, floribus spicatis, spicis plurimis ex uno pedunculo exeuntibus, scapo eorum medio geniculato. *Amm. herb. 257.*  
*Kattu-kalengu. Rheed. mal. 7. p. 71. t. 37.*  
*Cara. Francisc. gart. t. 25. f. 8. ♀*  
*Habitat in Malabaria.*
4. *DIOSCOREA* foliis cordatis, caule alato bulbifero. *alata*.  
*Fl. zeyl. 360. \**  
*Volubilis rubra, caule membranulis exstantibus alato, folio cordato nervoso. Sloan. jam. 46. bist. 1. p. 139.*  
*Katfil-kelengu. Rheed. mal. 7. p. 71. t. 38. Raj-suppl. 134.*  
*Habitat in Indiis.*
5. *DIOSCOREA* foliis cordatis, caule lævi bulbifero. *bulbifera*.  
*Hort. cliff. 459. Fl. zeyl. 359. \**  
*Rhizophora zeylanica, scammonii folio singulari, radice rotunda. Herm. par. 217. t. 217.*  
*Rhizophora indica, bryoniæ nigræ similis, ad foliorum ortum verrucosa. Pluk. alm. 321. t. 220. f. 6.*  
*Katu-katfil. Rheed. mal. 7. p. 69. t. 36.*  
*Habitat in Indiis.*
6. *DIOSCOREA* foliis cordatis alternis, caule lævi. *fativa*.  
*Hort. cliff. 459. t. 28. Fl. zeyl. 358. Roy. lugdb. 527.*  
*Dioscorea scandens, foliis tamni, fructu racemoso. Plum. gen. 9.*  
*Volubilis nigra, folio cordato nervoso. Sloan. jam. 46. bist. 1. p. 140.*  
*Mu-kelengu. Rheed. mal. 8. p. 97. t. 51.*  
*Habitat in Indiis. 2*
7. *DIOSCOREA* foliis cordatis alternis oppositisque, *villosa*.  
*caule lævi.*  
*Dioscorea foliis cordatis acuminatis: nervis lateralibus ad medium folii terminatis. Gron. virg. 121.*  
*Bryoniæ similis floridana, muscosis floribus quernis, foliis subtus lanugine villosis: medio nervo in spinulam abeunte. Pluk. alm. 46. t. 375. f. 5.*  
*Habitat in Virginia, Florida.*
8. *DIOSCOREA* foliis oppositis ovatis acuminatis. *Fl. oppositifolia*.  
*zeyl. 361. \**

Inhame maderas p. foliis binis pulchre venosis. *Pet. gaz.*  
 50. t. 31. f. 6.  
*Habitat in India.* 2

## OCTANDRIA.

### POPULUS.

*alba.*

1. **POPULUS** foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 460. *Fl. suec.* 820. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv.* 156. *Gmel. fib.* 1. p. 151. *Dalib. parif.* 302.  
*Populus alba*, majoribus foliis. *Bauh. pin.* 429.  
*Populus alba.* *Dod. pempt.* 835.  
*Habitat in Europa temperatori.* 5

*tremula.*

2. **POPULUS** foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Hort. cliff.* 460. *Fl. suec.* 819. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv.* 156. *Gmel. fib.* 1. p. 151. *Dalib. parif.* 301.  
*Populus tremula.* *Bauh. pin.* 429.  
*Populus lybica.* *Dod. pempt.* 836.  
*Habitat in Europæ frigidioribus.* 5  
*Folia involuta basi interne glandula duplici.* 5

*nigra.*

3. **POPULUS** foliis deltoidibus acuminatis ferratis. *Hort. cliff.* 460. *Fl. suec.* 821. *Mat. med.* 462. *Roy. lugdb.* 82. *Gron. virg.* 194. *Hall. belv.* 156. *Gmel. fib.* 1. p. 151. *Dalib. parif.* 301.  
*Populus nigra.* *Bauh. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.  
*Habitat in Europa temperiore.* 5  
*Folia involuta absque glandulis ad basin, hinc diversa a precedenti.*

*balsamifera.*

4. **POPULUS** foliis subcordatis oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82.  
*Populus foliis cordatis crenatis basi nudis, petiolis terebintibus.* *Wach. altr.* 294.  
*Populus nigra*, folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. *Catesb. car.* 1. p. 34. t. 34.  
*Populus foliis ovatis acutis ferratis.* *Gmel. fib.* 1. p. 152. t. 33.  
*Habitat in America septentrionali.* 5

- heterophylla.* 5. **POPULUS** foliis cordatis subrotundisque: primoribus villosis.

Po-

*Populus* foliis cordatis obsolete ferratis: infimis ferraturis glandulosis, petiolis lateraliter utrinque planis.  
*Wach. ultr.* 294?

*Populus* magna, foliis amplis: aliis cordiformibus; aliis subrotundis: primoribus tomentosis. *Gron. virg.* 194.  
*Habitat in* Virginia. ♀

## RHODIOLA.

1. RHODIOLA. *Fl. lapp.* 378. *Fl. suec.* 831. *Mat. med. Rosca.* 477. *Hort. cliff.* 470. *Roy. lugdb.* 457.

*Rhodia* radix. *Bauh. pin.* 286. *Clus. hist.* 2. p. 65. *Raj. hist.* 690.

*Telephium* luteum minus, radice rosam redolente. *Morif. hist.* 3. p. 468. f. 12. t. 10. f. 8.

*Habitat in* Alpibus Lapponiæ, Austriæ, Helvetiæ, Britanniciæ. ♀

## ENNEANDRIA.

## MERCURIALIS.

1. MERCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. *perennis.*  
*Hort. cliff.* 461. *Fl. suec.* 823. *Roy. lugdb.* 203. *Dalib. parif.* 302.

♀ *Mercurialis* montana testiculata. *Bauh. pin.* 122.

*Cynocrambe* mas. *Cam. epit.* 999.

♂ *Mercurialis* montana spicata. *Bauh. pin.* 122.

*Cynocrambe* femina. *Cam. epit.* 999.

*Habitat in* Europæ nemoribus. ♀

2. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris. *Hort. annua.*  
*cliff.* 461. *Hort. ups.* 298. *Mat. med.* 464. *Roy. lugdb.* 263. *Dalib. parif.* 302.

*Mercurialis* testiculata f. mas. *Bauh. pin.* 121. ♀

*Mercurialis* mas. *Dod. pempt.* 658. ♀

♂ *Mercurialis* spicata f. femina, *Dod. pempt.* 658.

*Habitat in* Europæ temperatæ umbrosis. ☉

3. MERCURIALIS caule subfruticoso, foliis tomentosis. *tomentosa.*  
*Hort. cliff.* 461. *Roy. lugdb.* 203. *Sauv. monsp.* 128.

*Phyllon* testiculatum. *Bauh. pin.* 122. ♀

*Phyllum* marificum. *Clus. hist.* 2. p. 48. ♀

♂ *Phyllon* spicatum. *Bauh. pin.* 122.

Phyl-

Phyllon feminificum. *Clus. hist.* 2. p. 48.

*Habitat in* G. Narbonensi, Hispania. *h*

*procumbens.* 4. MERCURIALIS androgyna. *Virid. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 203.

Mercurialis procumbens dicoccos africana, foliis violæ tricoloris. *Herm. app.* 10.

Ricinocarpus afra. *Boerb. lugdb.* 1. p. 254.

*Habitat in* Africa.

## HYDROCHARIS.

*Morsus ranæ.* 1. HYDROCHARIS. *Hort. cliff.* 460. *Fl. succ.* 822. *Roy. lugdb.* 10. *Hall. belv.* 301. *Dalib. paris.* 303.

Nymphæa alba minima. *Bauh. pin.* 193.

Ranæ morsus. *Dod. pempt.* 583. f. 2. ♂; 1. ♀

β. Morsus ranæ flore pleno odoratissimo. *Raj. cent.* 101. ♂

γ. Nymphæa alba minor. *Bauh. pin.* 193.

*Habitat in* Europæ fossis limosis. ☉ &

*Gemmifera s. bulbifera est.*

## DECANDRIA.

### CARICA.

*Papaya.* 1. CARICA foliorum lobis sinuatis. *Hort. cliff.* 461. *Fl. zeyl.* 365. *Roy. lugdb.* 225.

Arbor platani folio, fructu peponis magnitudine, eduli. *Bauh. pin.* 131.

Ficus arbor utriusque indiæ, platani foliis, monopeteches. *Pluk. alm.* 145. t. 278. f. 1.

Papaya-maram. *Rheed. mal.* 1. p. 23. t. 15. f. 1. ♀

♂ Ambapaya. *Rheed. mal.* 1. p. 21. t. 15. f. 2.

Papaya. *Ehret. t.* 3. f. 1.

*Habitat in* Indiis. *h*

*Posoposa.* 2. CARICA foliorum lobis integris. *Hort. cliff.* 462. \* *Roy. lugdb.* 225.

Papaya ramosa, fructu pyriformi. *Few. peruv.* 2. p. 52. t. 39. f. 1.

Ficus arbor papaje sylvestris nomine missa. *Pluk. alm.* 146. t. 278. f. 2<sup>p</sup>

Platani folio Posoposo philippensis. *Pet. gaz.* 68. t. 43. f. 2<sup>p</sup>

*Habitat* Surinami. *h*



## KIGGELARIA.

1. KIGGELARIA. *Hort. cliff.* 462. *t.* 29. \* *Roy. lugdb. africana*, 478.

*Laurus* non odorata, fructu globofo, africana. *Sterb. citr.* 246. *t.* 12. *f.* B. C. D.

*Evonymo* affinis *æthiopica* sempervirens, fructu globofo scabro, foliis salicis rigidis ferratis. *Herm. lugdb.* 139. *Pluk. alm.* 139. *t.* 176. *f.* 3.

*Habitat in Æthiopia.* 5

## CORIARIA.

1. CORIARIA foliis ovato-oblongis. *Hort. ups.* 299. *myrtifolia*. *Sauv. monsp.* 151.

*Coriaria*. *Hort. cliff.* 462. *Roy. lugdb.* 222.

*Rhus myrtifolia* monspeliaca. *Bauh. pin.* 414. *Angl. hortul.* 64. *t.* 20. *f.* 1.

*Rhus plinii myrtifolia* monspeliensium. *Lob. ic.* 2. *p.* 98.

*Habitat Monspeli* 5

2. CORIARIA foliis cordato-ovatis sessilibus. *ruscifolia*. *Coriaria ruscifolia*, vulgo Deu. *Few. peruv.* 3. *p.* 17. *t.* 12.

*Habitat in Peru.* 5

## DATISCA.

1. DATISCA caule lævi. *Cannabina*. *Cannabis* foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 221.

*Cannabis lutea* fertilis. *Alp. exot.* 300. *t.* 298. *Morif. bist.* 3. *p.* 432. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 4.

*Luteola* herba sterilis. *Bauh. pin.* 100.

*Cannabis lutea* cretica. *Alp. exot.* 296. *t.* 295.

*Cannabis lutea* sterilis. *Alp. exot.* 301. *t.* 300.

*Luteola* herba foliis cannabinis. *Bauh. pin.* 100.

*Habitat in Creta.* 2

2. DATISCA caule hirsuto. *hirta*. *Habitat in Philadelphia.* *Kalm.*

*Hæc species major*; *Caulis exstantibus pilis undique hirsutus. Folia pinnata, præcedentis quodammodo similia, at Foliola majora, magis alterna & magis basi decurrentia ac confluentia.*

## POLYANDRIA.

## CLIFFORTIA.

- ilicifolia.* 1. **CLIFFORTIA** foliis subcordatis dentatis.  
*Cliffortia* foliis dentatis. *Hort. cliff.* 463. *t.* 30. *Roy. lugdb.* 252.  
 Arbuscula afra, folio acuto ilicis caulem amplexo rigido. *Dill. elth.* 36. *t.* 31. *f.* 35.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- ruficifolia.* 2. **CLIFFORTIA** foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 463. *t.* 31. *Roy. lugdb.* 252.  
 Frutex æthiopicus conifer, fructu parvo sparsim intra folia rufci, seminibus cylindraceis. *Pluk. alm.* 159. *t.* 297. *f.* 2.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- polygonifolia.* 3. **CLIFFORTIA** foliis linearibus pilosis. *Hort. cliff.* 501. *t.* 32.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀
- trifoliata.* 4. **CLIFFORTIA** foliis ternatis: intermedio tridentato. *Roy. lugdb.* 253.  
*Myrica* foliis ternatis: intermediis cuneiformibus tridentatis. *Hort. cliff.* 456.  
*Thymelæa*? affinis æthiopica, foliis tridentatis & ex omni parte hirsutis pubescentibus. *Pluk. alm.* 367. *t.* 319. *f.* 4.  
 Arbuscula afra, foliolis trifoliatis sine pedunculo ad caulem natis, semine papposo. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 262.  
*Habitat in Æthiopia.* ♀

## MONADELPHIA.

## JUNIPERUS.

- Oxycedrus.* 1. **JUNIPERUS** foliis quaternis patentibus subulatis mucronatis. *Sauv. act. monsp.* 1743. *p.* 52.  
*Juniperus* foliis quaternis patentibus subulatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 90.  
*Juniperus* foliis ternis patentibus subulatis pungentibus trinerviis. *Sauv. monsp.* 169.  
*Juniperus* major, bacca rufescente. *Bauh. pin.* 489.  
*Oxycedrus.* *Clus. hist.* 1. *p.* 39.  
*Habitat in Hispania, G. Narbonensi.* ♀

2. JU-

2. JUNIPERUS foliis quadrifariam imbricatis acutis. *thurifera*.  
*Roy. lugdb.* 90.  
*Cedrus hispanica* procerior, fructu maximo nigro.  
*Tournef. inst.* 588.  
*Habitat in Hispania.* ♀
3. JUNIPERUS foliis undique imbricatis ovatis obtusis. *lycia*.  
*Roy. lugdb.* 90. *Mat. med.* 466. *Sauv. monsp.* 169. *Gmel. fib.* 1. p. 182.  
*Cedrus*, folio cupressi, media, majoribus baccis. *Bauh. pin.* 488.  
*Cedrus phœnicea* altera plinii & theophrasti. *Lob. ic.* 221.  
*Habitat in Gallia, Sibiria,* ♀
4. JUNIPERUS foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, senioribus acutis. *barbadensis*.  
*Roy. lugdb.* 90.  
*Juniperus barbadensis*, cupressi foliis, ramulis quadratis.  
*Pluk. alm.* 201. t. 197. f. 4.  
*Juniperus bermudiana.* *Hort. angl.* 42. t. 1. f. 1. *ex figura.*  
*Habitat in America.* ♀
5. JUNIPERUS foliis inferioribus ternis: superioribus *bermudiana*, binis decurrentibus subulatis patulis acutis. *Roy. lugdb.* 90.  
*Juniperus bermudiana.* *Herm. lugdb.* 345. t. 347.  
*Habitat in America.* ♀
6. JUNIPERUS foliis oppositis erectis decurrentibus: *Sabina*, oppositionibus pyxidatis.  
*Juniperus* foliis interne adnatis: oppositionibus concatenatis. *Hort. cliff.* 464. *Hort. upf.* 299. *Mat. med.* 467. *Roy. lugdb.* 90. *Gmel. fib.* 1. p. 183.  
*Sabina* folio cupressi. *Bauh. pin.* 487.  
*Sabina.* *Dod. pempt.* 854.
- ♂. *Sabina* folio tamarisci dioscoridis. *Bauh. pin.* 487.  
*Habitat in Italia, Sibiria, Olympo, Ararat, Luthania.* ♀
7. JUNIPERUS foliis ternis basi adnatis: junioribus *virginiana*, imbricatis, senioribus patulis. *Hort. cliff.* 464. *Roy. lugdb.* 90. *Gron. virg.* 194.  
*Juniperus major americana.* *Raj. hist.* 1413. 1414.  
*Juniperus maxima*, cupressi folio minimo, cortice exterioriore in tenues phylaras spirales ductili. *Sloan. jam.* 128. *hist.* 2. p. 2. t. 157. f. 3. *Raj. dendr.* 12.  
*Habitat in Virginia, Carolina.* ♀

8. JU-

*communis.*

8. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis.  
 Juniperus foliis patentibus. *Hort. cliff.* 465. *Fl. succ.* 824.  
*Mat. med.* 465. *Roy. lugab.* 89. *Hall. belv.* 146.  
*Gmel. fib.* 1. p. 182. *Dalib. paris.* 303. binerviis. *Sauv.*  
*monsp.* 169.  
 Juniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488.  
 9. Juniperus vulgaris arbor, *Baub. pin.* 488.  
 7. Juniperus minor montana, folio latiore, fructu longiore.  
*Baub. pin.* 489.  
*Habitat in Europæ septentrionalis sylvis. h*

*phænicea.*

9. JUNIPERUS foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis.  
 Cedrus, foliis cupressi, major, fructu flavescente. *Baub.*  
*pin.* 487.  
 Juniperus major. *Clus. hist.* 1. p. 38.  
*Habitat in Europa australi, Monspelii. h*

## TAXUS.

*baccata.*

1. TAXUS foliis approximatis.  
 Taxus. *Hort. cliff.* 464. *Fl. succ.* 825. *Roy. lugab.* 87.  
*Hall. belv.* 146. *Dalib. paris.* 303.  
 Taxus. *Baub. pin.* 505. *Cam. epit.* 840. *Dod. pempt.*  
 859.  
*Habitat in Europa, Canada. h*

*nucifera.*

2. TAXUS foliis distantibus. †  
 Taxus nucifera. *Kampf. amœn.* 814. t. 815.  
*Habitat in Japonia. h*

## EPHEDRA.

*distachya.*

1. EPHEDRA pedunculis oppositis: amentis geminis.  
*Hort. cliff.* 465.  
 Polygonum bacciferum maritimum minus. *Baub. pin.*  
 15.  
 Tragum. *Cam. hort.* 171. t. 46.  
*Habitat in G. Narbonensis, Hispaniæ saxosis collibus*  
*marinis. h*

*monostachya*

2. EPHEDRA pedunculis pluribus: amentis solitariis.  
*Gmel. fib.* 1. p. 171. t. 38. f. 1.  
 Ephedra minima, flagellis brevioribus & tenuioribus.  
*Amm. ruth.* 254. t. 26.  
 Ephedra monospermos. *Amm. ruth.* 255.  
*Habitat in Sibiriciæ montibus apricis, sterilissimis. h*

SYN.

## SYNGENESIA.

## RUSCUS.

1. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. *Hort. cliff. aculeatus.*  
 463. *Hort. upf.* 300. *Mat. med.* 768. *Dalib. parif.*  
 304. *Roy. lugdb.* 227.  
*Ruscus myrtifolius aculeatus. Tournef. inst.* 79.  
*Ruscus. Baub. pin.* 470.  
*Ruscum. Dod. pempt.* 474.  
*Habitat in Gallia, Italia nemorosis asperis. h*
2. RUSCUS foliis subtus floriferis nudis. *Hort. cliff. Hypophyl-  
 lum.*  
 465. *Hort. upf.* 300. *Roy. lugdb.* 227.  
*Laurus alexandrina, fructu folio insidente. Baub. pin.*  
 305.  
*Laurus alexandrina, Chamædaphne. Col. ecphr.* 1. p.  
 164. t. 165. f. 1.  
 β *Ruscus latifolius, fructu ex medio foliorum extra pen-  
 dente. Dill. elth.* 333. t. 251. f. 303.  
*Habitat in Italia ad latera collium. z*
3. RUSCUS foliis subtus floriferis sub foliolo. *Hort. Hypoglossum  
 cliff.* 466. *Hort. upf.* 300. *Mat. med.* 469. *Roy. lugdb.*  
 227.  
*Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. Baub.  
 pin.* 304.  
*Hypoglossum dioscoridis; Laurotaxa plinii. Col. ecphr.*  
 1. p. 166. t. 165. f. 2.  
*Habitat in Hungaria, Liguria, Italia montibus um-  
 brosis. z*
4. RUSCUS foliis margine floriferis. *Hort. cliff.* 464. *Androgynus*  
*Ruscus latifolius e foliorum sinu florifer & bacchifer.*  
*Dill. elth.* 332. t. 250. f. 332.  
*Habitat in Canariis. h*
5. RUSCUS racemo terminali hermaphroditico. *Hort. racemosus.*  
*cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 227.  
*Laurus alexandrina ramosa, fructu e summitate cauli-  
 um prodennte. Herm. lugdb.* 360. 379. t. 681.  
*Laurus alexandrina, fructu longis pediculis caulis  
 allegato. Morif. blef.* 279.  
*Habitat - - -*  
*Calyx & Corolla coalita in unum corpus carnosum,  
 conniventia.*

## GYNANDRIA.

## CLUTIA.

- alaternoides* 1. CLUTIA foliis sessilibus lanceolatis. *Hort. cliff.* 500.  
*Roy. lugdb.* 203.  
 Croton foliis lineari-lanceolatis. *Hort. cliff.* 444. ♀  
 Chamælea foliis oblongis. *Burm. afr.* 116. t. 43. f. 1.  
 Chamælea foliis latis oblongis, floribus ex alis in spicam erectis. *Burm. afric.* 118. t. 43. f. 3. ♂  
 Alaternoides africana, telephii legitimi imperati folio.  
*Comm. hort.* 2. p. 3. t. 9.  
*Habitat in Æthiopia.* b
- guthella.* 2. CLUTIA foliis ovatis integerrimis, floribus lateralibus.  
 Clutia foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 500. 431. *Roy. lugdb.* 202.  
 Frutex æthiopicus, portulacæ folio, flore ex albo viriscente. *Comm. hort.* 1. p. 177. t. 91.  
*Habitat in Æthiopia.* b
- retusa.* 3. CLUTIA foliis ovalibus retusis, floribus racemosis axillaribus. *Fl. zeyl.* 367. \*  
 Corni f. Sorbi species. *Bont. jav.* 103.  
 Scherunam-cottam. *Rheed. mal.* 2. p. 23. t. 18. male.  
*Raj. hist.* 1623.  
*Habitat in India.* b
- Eluteria.* 4. CLUTIA foliis cordato-lanceolatis. *Fl. zeyl.* 366.  
*Mat. med.* 470.  
 Eluteria. *Hort. cliff.* 486.  
 Ricinus dulcis arborefcens americanus, populnea fronde argentea. *Pluk. alm.* 321. t. 220. f. 5. *Seb. thes.* 1. p. 56. t. 35. f. 3.  
*Habitat in Indiis.* b
- Cascarilla.* 5. CLUTIA foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis. †  
 Ricinoides æleagni folio. *Catesb. car.* 2. p. 46. t. 46.  
*Habitat in Carolina.* b

Clas-

## Classis XXIII.

## POLYGAMIA.

## MONOECIA.

## MUSA.

1. MUSA spadice nutante. paradisifera.  
*Musa racemo simplicissimo. Hort. cliff. 467. Hort. ups.*  
*301. Fl. zeyl. 368. Roy. lugdb. 10.*  
*Musa cliffortiana. Linn. mus. 1. t. 1.*  
*Musa. Clus. exot. 229. Sterb. citr. t. 4.*  
*Ficus indica, fructu racemoso, folio oblongo. Bauh.*  
*pin. 508.*  
*Palma humilis, longis latisque foliis. Bauh. pin. 107.*  
*Habitat in India. 2*
2. MUSA spadice erecto. Bihai.  
*Bihai amplissimis foliis, florum vasculis variegatis.*  
*Plum. gen. 50.*  
*Bihai. Ovid. l. 8. c. 9.*
3. Bihai amplissimis foliis, florum vasculis coccineis.  
*Plum. gen. 50*
- γ. Bihai amplissimis foliis, florum vasculis subnigris. *Plum.*  
*gen. 50.*  
*Habitat in America calidiore.*

## OPHIOXYLON.

1. OPHIOXYLON. serpentinum  
*Plum. zeyl. p. 239.*  
*Ophioxylon foliis quaternis. Fl. zeyl. 398. \* Mat. med.*  
*474.*  
*Ligustrum foliis ad singula genicula ternis. Burm. zeyl.*  
*141. t. 64.*  
*Clematis indica, persicæ foliis, fructu periclymeni. Bauh.*  
*pin. 304.*  
*Habitat in Zeylona. 5*

## CELTIS.

1. CELTIS foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 39. Roy. australis.*  
*lugdb. 207. Dalib. paris. 304.*  
*Lotus fructu cerasi. Bauh. pin. 447.*  
*Lotus f. Celtis. Cam. epit. 155.*

U u u 2

Lotus

Lotus arbor: *Lob. ic.* 186.

*Habitat in Europa australi & Africa citeriore. h*

- orientalis.* 2. *CELTIS* foliis oblique cordatis serratis: subtus villosis. *Fl. zeyl.* 369.  
*Ulmus* fructu baccato. *Hort. cliff.* 83.  
*Salvifolia* arbor *orientalis*, foliis tenuissime crenatis.  
*Pluk. alm.* 329. t. 221. f. 4.  
*Mallam-toddali.* *Rheed. mal.* 4. p. 83. t. 40.  
*Habitat in Indiis. h*

- occidentalis.* 3. *CELTIS* foliis oblique ovatis serratis acuminatis.  
*Celtis* procera, foliis ovato-lanceolatis serratis, fructu pullo. *Gron. virg.* 195.  
*Lotus* arbor virginiana, fructu rubro. *Raj. hist.* 1917.  
*Habitat in Virginia. h*  
*Folia tenera, ovato-lanceolata, parum pubescentia; adulta lato-ovata, acuminata, acumine & basi integerrima, ceterum serrata, nuda, nervoso-venosa, latere postico duplo minore. Maxime affinis prima.*

## VERATRUM.

- album.* 1. *VERATRUM* racemo supradecomposito, corollis erectis.  
*Veratrum* caule ramoso. *Mat. med.* 471.  
*Veratrum* pedunculis corolla erecta patente brevioribus.  
*Gmel. fib.* 1. p. 75.  
*Helleborus* albus, flore subviridi. *Bauh. pin.* 186.  
*Elleborus* albus, exalbido flore. *Clus. hist.* 1. p. 274.  
*Habitat in Russia, Sibiria, Austria, Helvetia, Italia, Græcia montosis. &*
- nigrum.* 2. *VERATRUM* racemo composito, corollis patentissimis.  
*Veratrum* pedunculis corolla patentissima longioribus.  
*Gmel. fib.* 1. p. 76.  
*Helleborus* albus, flore atro-rubente. *Bauh. pin.* 186.  
*Morif. hist.* 3. p. 485. f. 12. t. 4. f. 1.  
*Habitat in Hungaria, Sibiria apricis siccis. &*  
*Præcedenti maxime affinis, diversa loco, colore, pedunculis villosis, corolla patente nec erecta, racemo composito, nec subdiviso in paniculam.*
- luteum.* 3. *VERATRUM* racemo simplicissimo, foliis sessilibus.  
*Veratrum* caule simplicissimo. *Gron. virg.* 195. *Genov.* p. 16. f. 2.

Reseda



*Reseda* foliis lanceolatis, caule simplicissimo. *Gron. virg.* 59.

*Habitat in* Virginia, Canada.

*Radix bulbosa*. Folia radicalia plura, lato-lanceolata, nervosa, firma, glabra. Caulis pedalis, simplicissimus. Folia caulina nonnulla, inaequaliter posita, angusta, lanceolata, sessilia, nec ut in reliquis vaginantia, parva. Racemus terminalis, simplicissimus, primum ovarius, demum longitudine caulis, densus, flosculis parvis, flavis.

## ANDROPOGON.

1. ANDROPOGON spica solitaria, floribus inferiori-contortum, bus muticis.

*Ægilops maderaspatana*, glumis pilosis aristatis. *P. Scheuch. gram.* 92.

*Gramen secalinum indicum*, spica gracili tomentosa: longioribus aristis ad se invicem intortis. *Pluk. alm.* 173. t. 191. f. 5. *Morif. hist.* 3. p. 180. f. 8. t. 4. f. ult.

*Habitat in* India.

2. ANDROPOGON spica oblonga, floribus lanatis re-divaricatum motis divaricatis: arista flexuosa nuda.

*Lagurus humilior*, panicula conica laxa nutante culmum terminante. *Gron. virg.* 135.

*Habitat in* Virginia.

3. ANDROPOGON panicula nutante, aristis tortuosis nutantibus, glumis calycinis hirsutis.

*Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculis lateralibus oppositis unifloris: aristis flexuosis.* *Gron. virg.* 133.

*Gramen avenaceum*, panicula minus sparsa, glumis alba sericea lanugine obductis. *Sloan. jam.* 35. *hist.* 1. p. 43. t. 14. f. 2.

*Habitat in* Virginia, Jamaica.

4. ANDROPOGON panicula laxa, aristis tortuosis. *alopecuroides*

*Andropogon culmo paniculato.* *Gron. virg.* 133.

*Gramen Dactylon alopecuroidis facie*, panicula longissima e spicis plurimis tomentosis constante. *Sloan. jam.* 3. *hist.* 1. p. 113. t. 14. t. 70. f. 1.

*Habitat in* America septentrionaliore.

distachyon.

5. ANDROPOGON spicis binis terminalibus, culmo indiviso.

*Habitat in Helvetia. Burser.*

Culmi plus quam pedales. Folia plana. Rami nulli. Spicæ duæ, æquales, oblongæ, erectiusculæ, culmum terminantes: singulæ ex flosculis viginti pluribus. Pedicelli arcti, brevissimi, planiusculi, basi pilosi, superne latiores. Flores solitarii. Calyces uniflori: gluma exterior flore fere longior latiorque apice bifido: aristâ longa, articulata, patente. Gluma calycina interior minima.

Schænanthus.

6. ANDROPOGON paniculæ spicis conjugatis ovatis.

*Fl. zeyl. 465. (sub Laguro) Mat. med. 31.*

Juncus odoratus aromaticus. *Baub. pin. 11. theatr. 163.*

Gramen ad junceum accedens aromaticum majus syriacum. *Morif. hist. 3. p. 229. f. 8. t. 9. f. 25.*

Gramen Dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevibus tomento candicantibus ex eodem pediculo binis, *Pluk. alm. 175. t. 190. f. 1.*

*Habitat in India, Arabia.*

virginicum.

7. ANDROPOGON paniculæ spicis conjugatis, pedunculis medio villosis, spicis lana brevioribus.

*Roy. lugdb. 53 \* Gron. virg. 132.*

*Habitat in America.*

bicorne.

8. ANDROPOGON paniculæ spicis conjugatis, flosculis basi lanatis folio spataneo obvolutis.

Lagurus spicis oblongis pedunculatis e singula ala pluribus. *Hort. cliff. 25. Gron. virg. 135.*

Gramen Dactylon bicorne tomentosum maximum, spicis numerosis. *Sloan. hist. 1. p. 42.*

*Habitat in Brasilia, Jamaica.*

hirtum.

9. ANDROPOGON paniculæ spicis conjugatis, calycibus hirsutis. *Roy. lugdb. 53. Gron. virg. 133.*

Festuca juncea folio, spica gemina. *Baub. pin. 9. prodr. 19. theatr. 145.*

Gramen Dactylon spica gemina. *T. Scheuch. gram. 95.*

Gramen Dactylon siculam, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis. *Pluk. alm. 175. t. 92. f. 1.*

*Habitat in Lusitania, Sicilia, Smyrna.*

Nivdus.

10. ANDROPOGON paniculæ ramis supradecompositis proliferis. *Fl. zeyl. 45. \* (sub Laguro) Mat. med. 32.*

Calamus odoratus matthioli. *Baub. pin. 17. theatr. 263.*

*Habitat in India.*

- 11. ANDROPOGON** spicis digitatis plurimis, flosculis *Ischæmum*, sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis.  
*Ischæmum* panicula digitata, spiculis oppositis disjunctisve, florum serie duplici, culmo tereti. *Guett. stamp.* 187. *Dalib. parif.* 288.  
 Gramen dactylon spicis villosis. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 116. *Scheuch. gram.* 94.  
 Gramen Dactylon spicis aristatis geniculatis. *Barr. ic.* 753. f. 2.  
*Habitat in Europæ australioris aridis.*  
 Flosculi in singula spicæ dente gemini: altero aristato, altero mutico masculino.
- 12. ANDROPOGON** spicis digitatis plurimis erectiusculis articulatæ lævibus: flosculis utrinque aristatis. *fasciculatum*  
 Gramen Dactylon indicum, spicis villosis subrubescens. *Morif. hist.* 3. p. 185. f. 8. t. 3. f. 15.  
 Gramen Dactylon elatius, spicis plurimis tomentosis. *Sloan. jam.* 33. *hist.* 1. p. 111. t. 65. f. 2?  
*Habitat in Indiis*  
 Spicæ in meis specimenibus glabræ sunt.

## HOLCUS.

- 1. HOLCUS** glumis villosis, seminibus aristatis. *Hort. Sorghum.* *upf.* 301. *Zeyl.* 370.  
*Holcus* glumis glabris. *Hort. cliff.* 468.  
 Milium arundinaceum, subrotundo semine, Sorgho nominatum. *Bauh. pin.* 26. *Morif. hist.* 3. p. 196. f. 8. t. 5. f. 7.  
 Sorghi. *Bauh. hist.* 2. p. 447.  
*Habitat in India.* ☉  
*Arista inferne fusca, superne lævis albida.*
- 2. HOLCUS** glumis glabris, seminibus muticis. *saccharatus.*  
 Milium indicum, arundinaceo caule, granis flavescentibus. *Herm. lugdb.* 425. \*  
 Milium indicum sacchariferum altissimum, semine ferrugineo. *Breyn. prodr.* 2.  
 Frumentum indicum quod Milium indicum vocant. *Bauh. theatr.* 488.  
*Habitat in India.* ♂  
*Altitudo humana. Folia facie Sacchari linea longitudinali alba. Radices ex infimis caulibus geniculis descendunt in terram. Flores masculi vix se aperiant.*
- 3. HOLCUS** glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis, femineo aristato. *balapensis.*

Gramen arundinaceum halepense, tragopoginis folio, panicula miliacea. *Pluk. alm.* 176. t. 32. f. 1.

Gramen paniculatum arundinaceum syriacum Hülliaun dictum. *Morif. hist.* 3. p. 201.

*Habitat in Syria, Mauritania. &*

*Singulo flori femineo adstant flores duo masculi pedicellati.*

*lanatum.*

4. HOLCUS glumis bifloris villosis: hermaphrodito mutico, masculo arista recurva.

Aira foliis pubescentibus, panicula contracta: flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata, calyce brevior. *Fl. suec.* 67. *It. æl.* 122.

Aira flosculo masculo aristato, femineo mutico. *Hort. cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 66.

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 27. *Schench. gram.* 234.

Gramen lanatum. *Dalech. hist.* 425.

*Habitat in Europæ pascuis arenosis. &*

*odoratus.*

5. HOLCUS glumis trifloris muticis glabris: hermaphrodito diandro.

Hierocloe. *Gmel. sib.* 1. p. 101.

Aira foliis planis, floribus trifloris aristatis: flosculo intermedio mutico diandro. *Fl. suec.* 70.

Poa spiculis bifloris cordatis. *Fl. lapp.* 53.

Gramen paniculatum odoratum. *Baub. pin.* 7. *prodr.* 7. *Schench. gram.* 236.

Gramen mariæ borussorum. *Læf. prass.* 111. t. 26.

*Habitat in Europæ frigidioris pascuis humentibus. &*

*Flosculi duo laterales masculi triandri: intermedius f. tertius hermaphroditus diandrus.*

*laxus.*

6. HOLCUS glumis glabris bifloris muticis acuminatis, panicula filiformi debili.

Aira calycibus trivalvibus trifloris. *Gron. virg.* 136.

*Habitat in Virginia, Canada.*

Habitus *Airæ ceruleæ*. Culmi bipedales, angusti, subnutantes. Folia plura, lævia, margine scabra, ore piloso. Panicula filiformis, parum admodum ramosa, subnutans, debilis; pedunculi sæpius biflori. Flosculo masculo ovato, crasso.

*striatus.*

7. HOLCUS glumis striatis bifloris muticis acuminatis, panicula conferta oblonga.

Aira panicula oblonga, floribus muticis: hermaphrodito masculoque, calycibus diphyllis. *Gron. virg.* 135.

*Habi-*

*Habitat in Virginæ paludibus.*

*Folia plana, longa, vaginis crassiusculis striatis. Panicula attenuata: Pedunculis brevissimis, confertis, ramosis. Glumæ oblongæ, striatæ, acuminatæ. Calyx monophyllus, minimus.*

## ISCHÆMUM.

### 1. ISCHÆMUM seminibus muticis.

*muticum.*

*Tagadi. Rheed. mal. 12. p. 91. t. 49.*

*Habitat in India. 2*

*Spica bipartita, imbricata: pedunculis alternis, simplicibus, bifloris, angulatis, culmo adpressis. Flos alter singulum pedunculum terminat Hermaphroditus ex Calyce biglumi unifloro; alter vero f. inferior Flos androgynus, basi exteriori unicuique pedunculo sessilis insertus, ex Calyce bivalvi, duriusculo, longitudine flosculorum, continens flosculos duos: alterum Masculum, alterum Feminæum. Pistillorum stigmata crassa, barbata. Semina mutica. Pedunculus spicæ foliis vestitus.*

### 2. ISCHÆMUM seminibus aristatis.

*aristatum.*

*Habitat in China. Osbeck.*

*Structura spicæ & florum omnino eadem cum precedente, at Culmus altior, Spica longior & Pedunculus spicæ nudus. Semina arista intorta flosculis longiore armata.*

## CENCHRUS.

### 1. CENCHRUS panicula spicata, glumis muricatis setaceis ciliaribus. *Guett. stamp. 2. p. 188. Dalib. parif. 305. Sauv. monsp. 40.*

*Gramen caninum maritimum, spica echinata. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 76.*

*Gramen caninum maritimum asperum. Bauh. prodr. 2. 2.*

*Gramen caninum maritimum spicatum, echinatis glumis. Barr. ic. 718.*

*Habitat in Europæ australioris maritimis.*

### 2. CENCHRUS spica ovata simplici. *Roy. Lugdb. 71. capitatus. Sauv. monsp. 40.*

*Gramen spica subrotunda echinata. Bauh. pin. 7. Scheuch. gram. 74.*

U u u 5

Gra-

Gramen montanum echinatum tribuloides capitatum.

*Col. ecphr.* 1. p. 340 t. 338. f. 1.

Gramen minimum, spica globosa echinata. *Barr. rar.* 1176. t. 28. f. 1. & t. 862. f. 2.

*Habitat in* G. Narbonensi, Italia.

*echinatus.*

3. CENCHRUS spica oblonga conglomerata. *Roy. lugdb.* 72.

Panicastrella americana major annua, spica laxa purpurascens. *Mich. gen.* 36.

Gramen locustis tumidioribus echinatis. *Schenck. gram.* 77.

Gramen americanum, spica echinata, majoribus locustis. *Pluk. alm.* 177. t. 92. f. 3.

Gramen echinatum maximum, spica rubra f. alba. *Sloan. jam.* 30. *hist.* 1. p. 108. *Raj. suppl.* 602.

Gramen americanum, spica echinata, majoribus glumis. *T. Morif. hist.* 3. p. 195.

*Habitat in* Jamaica, Curassao. ☉

*tribuloides*

4. CENCHRUS glumis femineis globosis muricato-spinosis hirsutis.

Cenchrus capitulis spinosis tomentosis. *Gron. virg.* 122.

Panicastrella americana minor annua, spica angusta densa albicante. *Mich. gen.* 37.

Gramen maritimum echinatum procumbens, culmo longiori, spicis strigosioribus. *Sloan. jam.* 30. *hist.* 1. p. 108. t. 65. f. 1. *Raj. suppl.* 602.

Gramen tribuloides spicatum maximum virginianum. *Pluk. alm.* 177.

Gramen echinatum spicatum, locustis crassioribus, tribuloides virginianum. *Morif. hist.* 3. p. 195. f. 8. t. 5. f. 4.

*Habitat in* Virginiae maritimis. ☉

*frutescens.*

5. CENCHRUS capitulis lateralibus sessilibus, foliis mucronatis, caule fruticoso.

Arundo graminea aculeata. *Alp. exot.* 105. t. 104.

Gramen orientale spicatum fruticosum spinosum, spicis echinatis in capitulum congestis. *Tournef. cor.* 39.

*Habitat in* America. b

## ÆGILOPS.

*ovata.*

1. ÆGILOPS spica ovata aristis brevioribus. *Hort. ups.* 301. *Dalib. parif.* 304. *Saxv. monsp.* 40.

*Ægi-*

- Ægilops. Roy. lugdb. 72. Dod. pempt. 73. Cam. epit.*  
 928. f. 2.  
*Festuca altera, capitulis duris. Bauh. pin. 10. theatr.*  
 151.  
*Gramen spicatum, durioribus & crassioribus locustis,*  
*spica brevi. Scheuch. gram. 11.*  
*Habitat in Europa australi. ♂*
2. *ÆGILOPS* spica subulata scabra, flosculo ultimo *caudata.*  
 tantum aristato.  
*Gramen creticum, spica gracili in duas aristas longissi-*  
*mas & asperas abeunte. Tournef. cor. 29.*  
*Habitat in Creta.*  
*Glumæ omnes, excepta ultima, bidentatæ sunt.*
3. *ÆGILOPS* spica subulata aristis longiore. *squarrosa.*  
*il habitat in Oriente. Tournefort.*
4. *ÆGILOPS* spica subulata scabra, aristis longitudine *triuncialis.*  
*spicæ.*  
*Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali. Bauh.*  
*pin. 10.*  
*Gramen spicatum, durioribus & crassioribus locustis,*  
*spica longissima. T. Scheuch. gram. 12.*  
*Habitat in Monspelii, Massiliæ, Smyrnæ aridis.*
5. *ÆGILOPS* spica subulata mutica incurva. *incurva.*  
*Habitat in Oriente. Tournefort.*

## VALANTIA.

1. *VALANTIA* floribus masculis trifidis hermaphrodi- *muralis,*  
 tici germi-  
 ni insidentibus. *Hort. ups. 302. Sauv. monsp.*  
 162.
2. *Valantia* procumbens glabra. *Hort. cliff 468. Roy.*  
*lugdb. 258.*  
*Valantia annua quadrifolia verticillata, floribus ex viri-*  
*di-pallescentibus, fructu echinato. Mich. gen. 13. t. 7.*  
*Rubeola echinata saxatilis. Bauh. pin. 334.*  
*Cruciata muralis minima romana. Col. ecphr. 1. p. 298.*  
*t. 297. Moris. hist. 3. p. 328. f. 9. t. 21. f. 2.*
3. *Valantia erecta hispida. Hort. cliff. 460. \* Roy. lugdb.*  
 258.  
*Habitat in G. Narbonensis, Italiæ, muris. ☉*
4. *VALANTIA* floribus masculis trifidis hermaphrodi- *Aparine.*  
 ci pedunculo  
 insidentibus. *Hort. ups. 302. \*. Dalib.*  
*paris. 305. Sauv. monsp. 162. Apa-*

Aparine femine lævi. *Vaill. parif. 18. t. 4. f. 3.*  
*Habitat inter Germaniæ, Galliæ, Siciliæ fegetos. ☉*

- articulata.* 3. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, pedunculis nudis. *Hort. upf. 303. \* Dalib. parif. 305.*  
 Cruciatâ orientalis latifolia erecta glabra. *Tournef. cor. 4.*  
*Habitat in Ægypto, Syria. ☉*
- Cruciatâ.* 4. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Hort. upf. 303. Sauv. monsp. 163. Dalib. parif. 305.*  
 Galium foliis quaternis, flosculis in alis confertis. *Hort. cliff. 34. Hall. helv. 462.*  
 Cruciatâ hirsuta. *Banh. pin. 335.*  
 Cruciatâ. *Dod. pempt. 257.*  
*Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. ♀*

## PARIETARIA.

- officinalis.* 1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis alternis. *Hort. cliff. 469. Hort. upf. 302. Mat. med. 472. Roy. lugdb. 210. Dalib. parif. 305. Gort. gelr. 554.*  
 Parietaria officinarum & dioscoridis. *Banh. pin. 321. Helxine. Cam. epit. 849.*  
*Habitat in Europæ temperationis ruderatis. ♀*
- lusitanica.* 2. PARIETARIA foliis ovatis obtusis, caulibus filiformibus procumbentibus.  
 Parietaria lusitanica annua minima. *Tournef. inst. 509. Raj. suppl. 129.*  
 Parietaria sicula, alfine folio. *Bocc. sic. 47. t. 24.*  
*Habitat in Lusitania, Hispania. ☉*
- cretica.* 3. PARIETARIA foliis subovatis, involucris fructiferis quinquefidis compressis: laciniis lateralibus majoribus.  
 Parietaria cretica minor, capsulis seminum alatis. *Tournef. cor. 38.*  
*Habitat in Creta.*
- zeylanica.* 4. PARIETARIA foliis oppositis. *Fl. zeyl. 371. \**  
*Habitat in Zeylona.*

## ATRIPLEX.

- Halimus.* 1. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis deltoidibus integris. *Hort. cliff. 469. Gron. virg. 195. Roy. lugdb. 218.*  
 Hali-



*Halimus latifolius* f. fruticosus, *Bauh. pin.* 120.

*Halimus. Clus. hist.* 1. p. 53.

*Habitat in Hispaniâ, Lusitaniâ, Virginîæ sepibus maritimis.* ☉

2. **ATRIPLEX** caule fruticoso, foliis obovatis. *Fl. succ. Portulacoides.* 829.

*Atriplex* caule fruticoso, foliis lanceolatis obtusis. *Roy. lugdb.* 218. —

*Halimus* f. *Portulaca marina.* *Bauh. pin.* 120.

*Portulaca marina.* *Dod. pempt.* 771.

*Habitat in Oceani: Europæ septentrionalis littoribus.* ☉

3. **ATRIPLEX** caule herbaceo, foliis deltoidibus sinuatis undulatis alternis. *Hort. ups.* 303. \*

*Habitat in Tataria.* ☉

4. **ATRIPLEX** caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *Hort. ups.* 303. *Mat. med.* 473. *Roy. lugdb.* 217.

*Atriplex hortensis alba* f. pallide virens. *Bauh. pin.* 119.

*Atriplex hortensis.* *Dod. pempt.* 615.

- β. *Atriplex hortensis rubra.* *Bauh. pin.* 119.

*Habitat in Tataria.* ☉

5. **ATRIPLEX** caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis obtuse-dentatis subtus farinaceis. *Hort. cliff.* 469. *Fl. succ.* 826. *Gron. virg.* 120. *Roy. lugdb.* 218.

*Atriplex maritima laciniata.* *Bauh. pin.* 120.

*Atriplex marina.* *Dod. pempt.* 615.

*Habitat ad Europæ & Virginîæ septentrionalis littora marina.* ☉

6. **ATRIPLEX** caule herbaceo: valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis. *Fl. succ.* 361. *It. æl.* 88. *Dalib. paris.* 305.

*Atriplex sylvestris*, folio hastato f. deltoide. *Morif. bles.* 237. *Raj. hist.* 192.

*Atriplex sylvestris annua*, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato hastæ cuspidis simili. *Morif. hist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 14.

*Habitat in Europa frigidiori.* ☉

7. **ATRIPLEX** caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus feminum disco dentatis.

*Atriplex* caule herbaceo, valvulis femineis feminum disco dentatis. *Fl. succ.* 828. *Dalib. paris.* 306.

Attri-

*Atriplex* caule herbaceo, foliis superioribus lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 218.

*Atriplex* angusto oblongo folio. *Bauh. pin.* 219.

*Atriplex* sylvestris, polygoni f. helxines foliis. *Lob. ic.* 257.

*Habitat in Europæ cultis, ruderatis.* ☉

*littoralis.*

8. *ATRIPLEX* caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 218. *Is. scan.* 199.\*

*Atriplex* angustissimo & longissimo folio. *Herm. lugdb.* 79.

*Habitat in Europæ septentrionalis littoribus maris.* ☉

### DALECHAMPIA.

*scandens.*

1. *DALECHAMPIA.* *Hort. cliff.* 485.

*Dalechampia* scandens, lupuli foliis, fructu hispido tricocco. *Plum. gen.* 17.

*Lupulus* folio trifido, fructu tricocco hispido. *Plum. amer.* 89. t. 101.

*Convolvulo-Tithymalus.* *Boerb. lugdb.* 2. p. 268.\*

*Habitat in America meridionali.*

Conf. *DALECHAMPIA* scandens, aristolochiæ foliis, fructu pruriginoso. *Barr. equin.* 47. *hujus an Plukenetia?*

*Qui viderit vivam plantam utrum sufficienter distinet ab Euphorbia determinet.*

### ACER.

*sibiricum.*

1. *ACER* foliis cordatis indivisis serratis: lobis obsoletis, floribus racemosis.

*Acer* foliis oblonge cordatis inæqualiter serratis. *Krausen. act. petr.* 1749. p. 285. t. 13.

*Habitat in Tataria.* ♀

Frutex altus. Folia carpinis, lobis vix manifestis. Flores racemosi, ut in sequente, sed petaloides.

*Pseudo-Platanus.*

2. *ACER* foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis.

*Acer* foliis quinquelobis acutis obtuse serratis, petiolis canaliculatis. *Hort. ups.* 93. *Saxu. monsp.* 212.

*Acer* foliis palmatis obtuse serratis, floribus subapetalis racemosis. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 457. *Gort. gelr.* 78.

*Acer montanum candidum.* *Bauh. pin.* 430.

*Acer majus.* *Dod. pempt.* 840.

*Habitat in Helvetiæ, Austriæ montanis.*

3. ACER foliis quinquelobis subdentatis subtus glaucis, <sup>tristatum.</sup>  
pedunculis simplicissimis aggregatis.  
Acer foliis quinquelobis acuminatis acute serratis, peti-  
olis teretibus. *Hort. wps.* 94.  
Acer foliis palmato-angulatis, floribus subapetalis sessili-  
bus, fructu pedunculato corymboso. *Gron. virg.* 41.  
*Cold. noveb.* 85.  
Acer virginianum, folio subtus incano, flosculis viri-  
di rubentibus. *Herm. par.* 1. t. 1.  
Acer virginianum, folio majore: subtus argenteo supra  
viridi splendente. *Pluk. alm.* 7. t. 2. f. 2. *Catesb. car.*  
1. p. 62. t. 62.  
*Habitat in Virginia, Pennsylvania.*
4. ACER foliis quinquepartito-palmatis acuminato-den-<sup>saccharinum</sup>  
tatis.  
*Habitat in Pennsylvania. Kalm.* 5  
Folia in hoc profundius & versus basin divisa, acumi-  
nata apicibus & dentibus, venosa etiam & subtus  
glauca, a precedente distinctissima. Flores mihi i-  
gnoti.
5. ACER foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis <sup>Platanoides.</sup>  
glabris, floribus corymbosis. *Fl. succ.* 303.  
Acer foliis palmatis acute dentatis, floribus corollatis  
dichotomo-corymbosis. *Hort. cliff.* 143.  
Acer montanum, tenuissimis & acutissimis foliis. *Bauh.*  
*pin.* 431.  
Acer major. *Cam. epit.* 63.  
Acer montanum, orientalis platani foliis atrovirentibus.  
*Pluk. alm.* 7. t. 252. f. 1.  
*Habitat in Europa boreali.*
6. ACER foliis trilobis acuminatis serrulatis, floribus ra-<sup>pen-sylvani-</sup>  
cemosis.  
*Habitat in Pennsylvania. Kalm.*  
Folia in tres lobos integros maxime acuminatos divisa,  
margine tenuissime inaequaliter & argute serrata.
7. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis. <sup>campestre.</sup>  
Acer foliis tripartito-palmatis: laciniis utrinque emargi-  
natis obtusis, cortice sulcato. *Hort. cliff.* 147. *Roy.*  
*lugdb.* 459. *Gors. gelr.* 78.  
Acer foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis *Hall. belv.*  
212.  
Acer campestre & minus. *Bauh. pin.* 431.

Acer

- Acer minus.* *Dod. pempt.* 840.  
 β. *Acer campestre* & *minus* mas f. sterile. *Vaill. parif.*  
*Habitat in Scania & australiori Europa.*
- monspessul-* 8. *ACER* foliis trilobis integerrimis. *Roy. lugdb.* 459.  
*vinum.* *Acer trifolium.* *Bauh. pin.* 431. *Pluk. alm.* 7. t. 251.  
 f. 3.  
 β. *Acer orientalis*, *hederæ* folio. *Tournef. cor.* 43. *Pav-*  
*cock. orient.* 191. t. 85.  
*Acer cretica.* *Alp. exot.* 9. t. 8.  
*Habitat Monspeliū & in Creta.* 5
- Negundo.* 9. *ACER* foliis compositis, floribus racemosis. *Hort. cliff.*  
 144. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 460.  
*Acer maximum*, foliis trifidis & quinquesidis, virginia-  
 num. *Pluk. alm.* 7. t. 123. f. 45.  
*Habitat in Virginia.* 5

## BEGONIA.

- obliqua.* 1. *BEGONIA.*  
*Begonia nivea maxima*, folio aurito. *Plum. spec.* 21.  
*Aceris* fructu herba anomala, flore tetrapetalo albo.  
*Sloan. jam.* 83. *hist.* 1. p. 199. t. 127. f. 1. 2.  
*Begonia purpurea maxima*, folio aurito. *Plum. spec.* 20.  
 β. *Begonia*, roseo flore, folio aurito, minor & glabra.  
*Plum. spec.* 20.  
 γ. *Begonia*, roseo flore, folio aurito, minor & hirsuta.  
*Plum. spec.* 20.  
 δ. *Begonia* roseo flore, folio orbiculari. *Plum. spec.* 20.  
 ε. *Begonia* roseo flore, foliis acutioribus auritis & late cre-  
 natis. *Plum. spec.* 20.  
 ζ. *Begonia* hirsuta, flore albo, folio aurito, fructu crema-  
 to. *Barr. æquin.* 21.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Folia cordata altero latere oblitterato.*

## DIOECIA.

## GLEDITSIA.

- triacanthos.* 1. *GLEDITSIA.* *Gron. virg.* 183. *Hort. ups.* 298.  
*Melilobus.* *Michx. gen.* 15.  
*Cæsalpinoides* foliis pinnatis ac duplicato-pinnatis. *Hort.*  
*cliff.* 489.

*Acacia americana*, abruæ folio, triacanthos. *Pluk. mant.*

1. *Hort. angl.* t. 21.

β. *Acacia*, abruæ folio, triacanthos, capsula ovali unicum semen claudente. *Catesb. car.* 1. p. 43. t. 43.

*Habitat in Virginia.* β

## FRAVINUS.

1. *FRAVINUS* foliolis ferratis, floribus apetalis. *excelsior.*

*Fraxinus* floribus nudis. *Hort. cliff.* 469. *Fl. suec.* 830.

*Mat. med.* 475. *Roy. lugdb.* 396. *Dalib. parif.* 306.

*Fraxinus excelsior.* *Baub. pin.* 416.

*Fraxinus.* *Dod. pempt.* 771.

*Habitat in Europæ sepibus.* β

2. *FRAVINUS* foliolis ferratis, floribus corollatis. *Ornus.*

*Fraxinus* floribus completis. *Hort. ups.* 304. *Hort. cliff.*

470. *Roy. lugdb.* 396. *Mat. med.* 476.

*Fraxinus humilior* f. altera theophrasti, minore & tenuiore folio. *Baub. pin.* 416.

*Fraxinus florifera botryoides.* *Moris. præl.* 265. *Hort. angl.* 33. t. 9

*Fraxinus tenuiore & minore folio.* *Baub. hist.* 1. p. 177.

*Habitat in Europa australi.* β

3. *FRAVINUS* foliolis integerrimis, petiolis teretibus. *americana.*

*Gron. virg.* 122. *Roy. lugdb.* 533.

*Fraxinus carolinienfis*, foliis angustioribus utrinque acuminatis pendulis. *Catesb. car.* 1. p. 80. t. 80.

*Habitat in Carolina Virginia.* β

## DIOSPYROS.

1. *DIOSPYROS* foliorum paginis discoloribus. *Lotus.*

*Diospyros* foliis utrinque bicoloribus. *Roy. lugdb.* 441.

*Diospyros* foliis utrinque diverse coloratis. *Hort. cliff.* 149.

*Lotus africana latifolia.* *Baub. pin.* 447.

*Pseudo-Lotus.* *Cam. epit.* 156.

β. *Lotus africana angustifolia* f. femina. *Baub. pin.* 447.

*Lotus africana altera.* *Cam. epit.* 157. *ban.*

*Habitat in G. Narbonensi, Italia, Mauritania.* β

*Confr.* Si f. Kaki. *Kempf. amon.* 85. t. 86.

2. *DIOSPYROS* foliorum paginis concoloribus. *virginiana.*

*Diospyros* foliis utrinque concoloribus. *Hort. cliff.*

149. *Roy. lugdb.* 441.

*Diospyros* floribus dioicis. *Gron. virg.* 156.

X x x

Gua-

Guajacana loto arbori affinis virginiana Pishamia dicta  
*Pluk. alm.* 180. *t.* 244. *f.* 5. *Raj. hist.* 1918.  
 Guajacana. *Catesb. car.* 2. *p.* 76. *t.* 76.  
 Loto africanæ similis indica. *Bauh. pin.* 448.  
*Habitat in America septentrionali. h*

## NYSSA.

aquatica.

## 1. NYSSA.

*Nyssa foliis integerrimis. Hort. cliff.* 462.

*Nyssa pedunculis multifloris. Gron. virg.* 121.

Arbor in aqua nascens, foliis latis acuminatis & dentatis, fructu elæagni majore. *Catesb. car.* 1. *p.* 60. *t.* 60.

Arbor in aqua nascens, foliis latis acuminatis & non dentatis, fructu elæagni minore. *Catesb. car.* 1. *p.* 41. *t.* 41.

♀ *Nyssa pedunculis unifloris. Gron. virg.* 121.

*Cynoxylon americanum*, folio crassiusculo molli & tenaci. *Pluk. alm.* 127. *t.* 172. *f.* 6.

*Habitat in Americæ septentrionalis aquis.*

## ANTHOSPERMUM.

æthiopicum.

1. ANTHOSPERMUM. *Hort. cliff.* 455. *t.* 27. \* *Raj. lugdb.* 208.

Frutex africanus ambaram spirans. *Pluk. alm.* 159. *t.* 183. *f.* 1. *Waltb. hort.* 24. *t.* 9.

*Habitat in Æthiopia h*

## ARCTOPUS.

echinatus.

1. ARCTOPUS. *Hort. cliff.* 495. \*

*Valerianoides cortusæ matthioli* facie planta æthiopica foliorum ad lacinias superna parte spicis stelliformiter echinata & ad oras pilis longioribus simbriata. *Pluk. mant.* 185. *t.* 271. *f.* 5.

♂ *Arctopus foliis superne spinis stelliformibus echinatis lacinatis & in cilia diductis, floribus umbellatis. Barn.*

*asfr.* 1. *p.* 1. *t.* 1.

*Habitat in Æthiopia. z*

## PANAX.

quinquefolium.

1. PANAX foliis ternis quinatis. *Gron. virg.* 147. *Med.* 116.

*Aureliana canadensis. Lefsch. gins.* 51. *t.* 1. *Catesb. car.* 3. *p.* 16. *t.* 16.

A

*Araliastrum*, quinquefolii folio, majus Ninfin vocatum.

*Vaill. sex.* 43.

*Habitat in* Canada, Pensylvania, Virginia. &

*Semina producant folium ternatum absque cotyledonibus uti monocotyledones.*

2. *PANAX* foliis ternis ternatis. *Gron. virg.* 35. trifolium.

*Araliastrum*, fragariæ folio, minus. *Vaill. sex.* 43.

*Nasturtium marianum*, anemones sylvaticæ foliis, enneaphyllon, floribus exiguis. *Pluk. mant.* 135. t. 435. f. 7.

*Habitat in* Virginia. &

*Præcedenti maxime affinis & forte varietas, mari prioris facie & parvitate.*

## POLYOECIA.

### FICUS.

1. *FICUS* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *Hort. ups.* 305. *Carica.*

*Mat. med.* 478. *Amœn. acad.* 1. p. 24. *Roy. lugdb.* 211.

*Ficus communis.* *Bauh. pin.* 457.

*Ficus.* *Dod. pempt.* 812.

♂ *Caprificus.* *Bauh. hist.* 1. p. 134.

♀ *Ficus humilis.* *Bauh. pin.* 457.

*Habitat in* Europa australi, Asia. ♀

1. *FICUS* foliis cordatis subrotundis integerrimis. *Hort. Sycomorus.*

*cliff.* 471. \* *Roy. lugdb.* 211. *Amœn. acad.* 1. p. 26.

*Ficus folio mori*, fructum in caudice ferens. *Bauh. pin.* 459

*Moro-Ficus.* *Bauh. hist.* 1. p. 124. f. 1. 2.

*Sycomor*, *Ficus pharaonis.* *Cam. march.* 103. f. 3.

*Habitat in* Ægypto. ♀

*Confer.* *Ficus indica*, tilix folio subtus albo & villosa, polyrhizos. *Pluk. phys.* 178. f. 3.

1. *FICUS* foliis cordatis integerrimis acuminatis. *Hort. religiosa.*

*cliff.* 471. *Fl. zeyl.* 372. *Amœn. acad.* 1. p. 30.

*Ficus malabariensis*, folio cuspidato, fructu rotundo

parvo gemino. *Pluk. alm.* 144. t. 178. f. 2.

*Arealu.* *Rheed mal.* 1. p. 47. t. 27.

*Habitat in* India.

1. *FICUS* foliis ovatis integerrimis obtusis, caule infer-benghalensis.

ne radicato. *Hort. cliff.* 471. *Amœn. acad.* 1. p. 29.

*Roy. lugdb.* 212.

X x x 2

*Ficus*

*Ficus benghalensis*, folio subrotundo, fructu orbiculato.

*Comm. hort.* 1. p. 119. t. 62.

*Peralu. Rheed. mal.* 1. p. 49. t. 28.

*Habitat in India.* h

*indica.*

7. *FICUS* foliis lanceolatis petiolatis, pedunculis aggregatis, ramis radican-  
tibus.

*Ficus indica*, foliis mali cotoneæ similibus, fructu sic-  
bus simili. *Bauh. pin.* 457.

*Ficus indica theophrasti.* *Tabern. hist.* 1370. *Amæn. a-*  
*cad.* 1. p. 27. \*

*Kalou-alou. Rheed. mal.* 3. p. 73. t. 57. *Raj. hist.* 1437.

β. *Ficus* foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 471.  
*Roy. lugdb.* 212.

*Ficus indica maxima*, folio oblongo, funiculis e sum-  
mis ramis dimissis radices agentibus se propagans, fru-  
ctu minori sphaerico sanguineo. *Sloan. jam.* 189. *biff.*  
2. p. 140. t. 223. *Raj. dendr.* 16.

*Ficus americana*, arbuti foliis non serratis, fructu pili  
magnitudine. *Pluk. alm.* 144. t. 1788.

*Ficus citri* folio, fructu parvo purpureo. *Catesb. car.*  
3. p. 18. t. 18.

*Tiela. Rheed. mal.* 3. p. 85. t. 63.

*Habitat in Indiis.* h

β. *eiusdem esse speciei cum α docuit ramorum proprie-*  
*tas radican-*, flores rubri, *Catesbei* & *antioptar-*  
*um notæ.*

*racemosa,*

6. *FICUS* foliis ovatis acutis integerrimis, caule arbo-  
reo, fructu racemoso. *Amæn. acad.* 1. p. 30.

*Alty-alu. Rheed. mal.* 1. p. 43. t. 25. *Raj. hist.* 1434.

*Habitat in India.* h

*pumila.*

7. *FICUS* foliis ovatis acutis integerrimis, caule repente.  
*Amæn. acad.* 1. p. 30.

*Ficus sylvestris procumbens*, folio simplici. *Kempf. a-*  
*man.* 803. t. 804.

*Habitat in China, Japonia.* 2

*Ficum a Cryptogamia ad Polygamiam amandavi, su-  
dente fructificationis structura, receptaculi umbilico  
in quibusdam patulo, diffinitate sequentium; Inasui-  
lustriss. D. O. Munchausen. L. B. Botanici veter-  
entissimi.*

Clas-



## Classis XXIV.

## CRYPTOGAMIA.

## FILICES.

## EQUISETUM.

1. EQUISETUM caule spicato, frondibus compositis. *sylvaticum*.

*Fl. suec.* 834.

Equisetum setis ramosis internodio multoties longioribus. *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum sylvaticum. *Fl. lapp.* 391. *Tabern. hist.* 562.

Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 145.

*Habitat in Europæ septentrionalis pratis sylvaticis.* 2

2. EQUISETUM scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *arvense*.

Equisetum scapo fructificante nudo, caule sterili ramis compositis. *Fl. suec.* 833. *Mat. med.* 479. *Dalib. parif.* 308.

Equisetum setis quadrangularibus internodio longioribus, caulibus reptantibus. *Guett. stamp.* 1. p. 201.

Equisetum setis simplicibus internodio multoties longioribus. *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum arvense. *Fl. lapp.* 390. *Hort. cliff.* 471. *Gron. virg.* 123.

Equisetum arvense, longioribus setis. *Bauh. pin.* 16.

Equisetum minus. *Fuchf. hist.* 323.

*Habitat in Europæ agris, pratis.* 2

3. EQUISETUM caule angulato, frondibus simplicibus. *palustre*.

Equisetum setis simplicibus internodia vix superantibus.

*Roy. lugdb.* 496. *Fl. suec.* 835. *Dalib. parif.* 307.

Equisetum palustre, *Fl. lapp.* 392.

Equisetum palustre, brevioribus setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 242.

3. Equisetum palustre minus polystachyon. *Bauh. pin.* 16.

*prodr.* 24. *Raj angl.* 3. p. 131. t. 5. f. 3.

*Habitat in Europæ aquosis.* 24.

*fluviatile.*

4. **EQUISSETUM** caule striato, frondibus subsimpli-  
cibus.

Equisetum caule non sulcato latissimo, verticillis densissimis. *Hall. belv.* 144. *Fl. suec.* 836. *Dalib. parif.* 307.

Equisetum fluviatile. *Fl. lapp.* 393.

Equisetum palustre longioribus setis. *Baub. pin.* 15. *theat.* 242.

*Habitat in Europa ad ripas lacuum, fluviorum.* 2

*limosum.*

5. **EQUISSETUM** caule subnudo lævi. *Fl. suec.* 837. *Dalib. parif.* 308.

Equisetum scapo nudo simplicissimo. *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum nudum lævius nostras. *Raf. angl.* 3. p. 131. t. 5. f. 2.

*Habitat in Europæ paludibus turfosiss, profundis.* 2

*hyemale.*

6. **EQUISSETUM** caule nudo scabro basi subramoso. *Fl. suec.* 838. *Dalib. parif.* 308.

Equisetum scapo nudo simplicissimo. *Roy. lugdb.* 496. *Gron. virg.* 196.

Equisetum hyemale. *Fl. lapp.* 394.

Equisetum foliis nudum ramosum. *Baub. pin.* 16.

Equisetum nudum minus variegatum basilicense. *Baub. pin.* 16. *prodr.* 25.

Equisetum. *Cam. epit.* 770. f. A.

*Habitat in Europæ sylvis, asperis, uliginosis.* 2

## ONOCLEA.

*sensibilis.*

1. **ONOCLEA.** *Gen. nov.* 1093.

Angiopteris. *Mitch. gen.* 29.

Osmunda frondibus pinnatis: foliolis superioribus basi coadunatis: omnibus lanceolatis pinnato subulatis.

*Hort. cliff.* 272. *Gron. virg.* 196.

Filix mariana, osmundæ faciæ, racemifera. *Pluk. mant.* 80. t. 404. f. 2.

Polypodium virginianum majus, osmundæ faciæ, tenuius. *Morif. bist.* 3. p. 563. f. 14. t. 2. f. 10.

Filix indica, polypodii faciæ. *Mentz. pug.* 6. t. 10.

*Habitat in Virginia.* 2

## OPHIOGLOSSUM.

*vulgatum.*

1. **OPHIOGLOSSUM** fronde ovata. *Fl. suec.* 839. *Dalib. parif.* 309,

Ophioglossum folio ovato, spica disticha. *Hort. cliff.* 472.

Ophio.

*Ophioglossum vulgatum*. *Baub. pin.* 354. *Plum. fil.* XXXVI. t. B. f. 5.

*Ophioglossum*. *Baub. pin.* 364.

β. *Ophioglossum minus*, subrotundo folio. *Baub. pin.* 354. *prodr.* 150.

*Habitat in Europæ pratis sylvaticis.*

2. *OPHIOGLOSSUM* fronde lanceolata.

*lusitanicum.*

*Ophioglossum pumilum autumnale*. *Grisl. Insit.*

*Ophioglossum angustifolium minimum*. *Barr. rar.* 1280.

t. 252. f. 2.

*Habitat in Lusitania.*

3. *OPHIOGLOSSUM* fronde cordata.

*reticulatum.*

*Ophioglossum cordatum & reticulatum*. *Plum. fil.* 141.

t. 164.

*Ophioglossum vulgaris facie*. *Pet. fil.* 179. t. 10. f. 4.

*Habitat in America meridionali.*

4. *OPHIOGLOSSUM* fronde palmata basi spicifera. *palmatum.*

*Ophioglossum palmatum*. *Plum. fil.* 139. t. 163. *Pet.*

*fil.* 178. t. 11. f. 2.

*Habitat in America meridionali.*

5. *OPHIOGLOSSUM* caule flexuoso tereti, frondibus scandens.

oppositis pinnatis: foliolis utrinque spiciferis. *Hort.*

*cliff.* 473. *Fl. zeyl.* 374. \*

*Filix scandens pulchra brasiliiana*. *Breyn. cens.* 185. t. 96.

*Lonchitis scandens brasiliiana*, pinnulis eleganter lacinatis. *Morif. hist.* 3. p. 568 f. 14. t. 3. f. 15.

*Tsieru-valli-panna*. *Rheed. mal.* 12. p. 65. t. 33.

*Habitat in India.* β

6. *OPHIOGLOSSUM* caule flexuoso angulato, frondibus diphyllis: pinnis trifido-palmatis. *flexuosum.*

*Fl. zeyl.* 375. \*

*Valli-panna*. *Rheed. mal.* 12. p. 6. t. 32.

*Habitat in India.* β.

*Præcedenti nimis affinis.*

## OSMUNDA.

\* *Scapis insidentibus cauli ad basin foliis.*

1. *OSMUNDA* scapo caulino solitario, frondibus verticillatis lanceolatis indivisis. *zeylanica.*

*Osmunda frondibus lanceolatis indivisis verticillato-terminalibus*. *Fl. zeyl.* 373. \*

*Habitat in Zeylona.*

X 3 x 4

2. OS-

Lunaria.

2. OSMUNDA scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Fl. suec.* 842. *Daisb. parif.* 309.  
 Osmunda fronde pinnata caulina: pinnis lunulatis. *Hort. cliff.* 472.  
 Osmunda folio pinnatifido: pinnis lunulatis. *Fl. lapp.* 389.  
 Lunaria racemosa minor & vulgaris. *Baub. pin.* 354.  
 Lunaria minor. *Cam. epit.* 643.  
 β. Lunaria racemosa ramosa major. *Baub. pin* 355.  
 Lunaria rarior species. *Cam. epit.* 644.  
 γ. Lunaria racemosa minor, adianti folio. *Breyn. cent.* 183. t. 93.  
 δ. Lunaria minor, rutaceo folio. *Baub. pin.* 355.  
*Habitat in Europa.*

virginiana.

3. OSMUNDA scapo caulino solitario, fronde supradecomposito.  
 Osmunda fronde pinnata caulina, fructificationibus spicatis. *Gron. virg.* 196.  
 Osmunda asphodeli radice. *Plum. fil.* 136. t. 159. *Pet. fil.* 168. t. 9. f. 2.  
*Habitat in America.*

phyllitidis.

4. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde pinnata, caule lævi.  
 Osmunda lanceolata & subtiliter serrata. *Plum. fil.* 133. t. 156.  
 Osmunda racemifera, phyllitidis folio vix crenato. *Pet. fil.* 163. t. 8. f. 15.  
*Habitat in America meridionali.*

hirta.

5. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde pinnata, caule hirta.  
 Osmunda spicis geminis. *Pet. fil.* 164. t. 14. f. 5.  
 Osmunda hirsuta, lonchitidis folio. *Plum. fil.* 114. t. 157.  
 Lunaria hirsuta, lonchitidis folio, spica gemella. *Raj. suppl.* 102.  
 Lunaria elatior americana hirsuta, pinnis lonchitidis integris, duplici spica. *Morif. hist.* 3. p. 598.  
 Lonchitis hirsuta florida. *Plum. amer.* 18. t. 26.  
*Habitat in Martinica.*

hirsuta.

6. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde bipinnata hirsuta.  
 Osmunda, spicis geminis, villosa. *Pet. fil.* 165. t. 8. f. 16.

Of

*Osmunda molliter hirsuta & profunde laciniata. Plum. fil. 138. t. 162.*

*Lunaria elatior, matricariæ folio, spica duplici. Sloan. jam. 14. hist. 1. p. 71. t. 25. f. 6. Moris. hist. 3. p. 395. Raj. suppl. 101.*

*Habitat in Americæ meridionalis rupibus.*

7. OSMUNDA scapis caulinis geminis, fronde supra-*adiantifolia.*  
decomposita.

*Osmunda, filiculæ folio, major. Plum. fil. 135. t. 158.*

*Osmunda adianti nigri facie. Pet. fil. 167. t. 9. f. 1.*

*Lunaria elatior, adianti albi folio, duplici spica. Sloan.*

*jam. 14. hist. 1. p. 71. Moris. hist. 3. p. 395.*

*Adiantum saxosum floridum. Plum. amer. 29. t. 43.*

*Raj. suppl. 101.*

*Habitat in Dominicæ, Jamaicæ rupibus.*

\* *Scapis nudis, e radice enatis.*

8. OSMUNDA scapis radicatis: racemis verticillatis, *verticillata.*  
fronde supradecomposita.

*Osmunda verticillata. Plum. fil. 137. t. 160. Pet. fil.*

*171. t. 12. f. 4.*

*Habitat in America meridionali.*

9. OSMUNDA scapo radicato, fronde pinnata: pinnis *cervina.*  
integerrimis.

*Osmunda linguæ cervinæ folio. Plum. fil. 132. t. 154.*

*Osmunda racemifera, phyllidis folio. Pet. fil. 162. t.*

*8. f. 3.*

*Habitat in America meridionali.*

10. OSMUNDA scapo radicato, fronde pinnata: pinnis *bispinnata.*  
pinnatifidis.

*Osmunda latis crenis incisa. Plum. fil. 133. t. 155.*

*Habitat in America meridionali.*

11. OSMUNDA scapo radicato paniculato, fronde *sub-filiculifolia.*  
pradecomposita.

*Osmunda frondibus radicatis quater alternatim pinnatis,*  
*scapo nudo, pedunculis alternis alternatim spicatis.*

*Hort. cliff. 172.*

*Osmunda, filiculæ folio, altera. Plum. fil. 138. t. 161.*

*Osmunda cicutæ folio. Pet. fil. 170. t. 9. f. 3.*

*Habitat in America meridionali.*

\* *Fronde ipsa fructificationes ferente.*

12. OSMUNDA fronde bipinnata apice racemifera. *regalis.*

X x x 5

Of

*Osmunda* scapo paniculato polyphylo. *Fl. succ.* 840.  
*Dalib. parif.* 308.

*Osmunda* frondibus caulinis simpliciter pinnatis: pinnis lanceolatis. *Hort. cliff.* 472.

*Osmunda* regalis s. *Filix florida*. *Plum. fl.* 35. t. B. f. 4.

*Filix* ramosa non dentata florida. *Baub. pin.* 357.

*Filix* palustris. *Dod. pempt.* 473.

β. *Filix florida* s. *Osmunda regalis*, foliis alternis, surculis seminiferis. *Gron. virg.* 123.

*Filix* non dentata florida, foliis alternis & in summo caule seminibus occultatis. *Pluk alm.* 156. t. 181. f. 1.

*Filix botryites* s. *floridana* major *virginiana*, pinnulis non dentatis alternatim positis. *Morif. hist.* 3. p. 593.

*Habitat in Europa, Virginia ad fluvios.*

*claytoniana*. 13. *OSMUNDA* fronde pinnata: pinnis pinnatifidis apice coarctato-fructificantibus.

*Osmunda* frondibus pinnatis ex adverso binis: foliolis oppositis integris decurrentibus, spicis seminiferis e superiore parte caulis ad modum & formam frondium binatim egressis. *Clayt.*

*Habitat in Virginia.*

*Coniungit* O. *Regalis* *precedentes cum hac planta & hac sequentes cum precedenti ut separari nequeant.*

\* *Frondibus aliis foliaceis, aliis fructificantibus.*

*cinnamomea*. 14. *OSMUNDA* fronde pinnata: pinnis pinnatifidis: scapis hirsutis, racemis oppositis compositis.

*Osmunda* mariana, dryopteris folio, in medio caulis florifera. *Pet. mus.* 86.

*Osmunda* non ramosa, tarsis floriferis imo folii scapo infra foliosos adnascantibus. *Raj. suppl.* 86.

*Habitat in Marilandia,*

*Sterchiopteris*. 15. *OSMUNDA* frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis, scapo fructificante ditricho. *Fl. succ.* 841.

*Filix* palustris altera, fusco pulvere hirsuta. *Baub. pin.* 358.

*Filicestrum* septentrionale & palustre. *Amm. rusb.* 175.

*Habitat in Suecia, Helvetia, Russia, Norvegia. &*

*Syrtant.* 16. *OSMUNDA* frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis contuentibus integerrimis parallelis.

*Pteris* fronde pinnata lanceolata, laciniis parallelis integerrimis. *Fl. succ.* 844. *Dalib. parif.* 310.

*Pteris*

*Pteris fronde pinnata: foliolis linearibus parallelis. Roy. lugdb. 497.*

*Lonchitis minor. Baub. pin. 359.*

*Lonchitis aspera minor. Cam. epit. 665.*

*Habitat in Europa.*

17. **OSMUNDA** frondibus supradecompositis: pinnis al-<sup>crispa.</sup>  
ternis subrotundis incitis.

*Adiantum foliis minutim in oblongum scissis, pediculo viridi. Baub. pin. 755.*

*Adiantum album tenuifolium, rutæ murariæ accedens. Baub. hist. 3. p. 743. Raj. hist. 147.*

*Adiantum album alpinum crispum. Raj. hist. 47. angl. 3. p. 126.*

*Adiantum album floridum f. Filicula petræa crispa. Pluk. alm. 9. t. 3. f. 2.*

*Filix botryoides f. Filicula petræa florida anglica, foliis plurifariam divisis. Moris. hist. 3. p. 593. f. 14. t. 4. f. 4.*

*Habitat in Anglia, Helvetia.*

*Planta quasi media inter Osmundas ultimas & Acrosticha.*

## ACROSTICHUM.

\* *Fronde simplici indivisa.*

1. **ACROSTICHUM** frondibus lineari-lanceolatis acutis, caule scandente. *Fl. zeyl. 380. \* Amœn. acad. 1. p. 268. \**

*Tiripanna. Rheed. mal. 12. p. 141. t. 33.*

*Habitat in India.*

*Fructificatio non dum visa nobis fuit.*

2. **ACROSTICHUM** frondibus lanceolato-ovatis integerrimis, caule scandente. *Amœn. acad. 1. p. 269.*

*Lingua cervina scandens, citrei foliis, minor. Plum. fil. 107. t. 116.*

*Habitat in America meridionali.*

3. **ACROSTICHUM** frondibus integerrimis glabris petiolatis: sterilibus subrotundis: fertilibus linearibus. *Fl. zeyl. 378. \* Amœn. acad. 1. p. 268. t. 2. \**

*Phyllitis repens scandensve, foliis duplicibus: aliis latis & subrotundis; aliis longis & angustis. Raj. suppl. 13.*

*Filix malabarica. Pet. gaz. 3. t. 53. f. 12.*

*Ma etta-mala-maravara. Rheed. mal. 12. p. 87. t. 29.*

*Habitat in Malabar, Zeylona, Africa.*

4. A-

- crinitum.* 4. **ACROSTICHUM** fronde ovata obtusa hirsuta supra crinita.  
Phyllis crinita, latissimo folio. *Pet. fil.* 145. t. 13. f. 14.  
*Habitat* - - - - -

\* *Fronde simplici divisa.*

- septentrionalis.* 5. **ACROSTICHUM** fronde nuda lineari laciniata. *Fl. lapp.* 380. *Fl. succ.* 856. *Amoen. acad.* 1. p. 269.  
*Roy. lugdb.* 507. *Hall belv.* 134. *Dalib. parif.* 314.  
Filicula saxatilis corniculata. *Baub. pin.* 358.  
Filix saxatilis tragi. *Lob. ic.* 47.  
*Habitat in Europæ fissuris rupium.* &

- pectinatum.* 6. **ACROSTICHUM** nudum simplicissimum, spica secunda adscendente reflexa compressa. *Amoen. acad.* 1. p. 270. f. 4. \*  
Adiantum pectinatum, e capite bonæ spei. *Pet. mus.* 743.  
Juncus elegantissimus, capitulis pectinatis. *Pluk. alm.* 200. t. 95. f. 7. *Raj. suppl.* 629.  
Juncus africanus, pectinato capite. *Morif. hist.* 3 p. 233. f. 8. t. 9. f. 30.  
*Habitat in Æthiopia.*

- dichotomum.* 7. **ACROSTICHUM** nudum dichotomum, spicis secundis adscendentibus reflexis compressis.  
Filix cochine. *Pet. gaz.* t. 70. f. 12.  
*Habitat in China.*  
*Refert A. pectinatum caule & spica, at Caulis est pluries dichotomus totidem spicis.*

- digitatum.* 8. **ACROSTICHUM** caulibus nudis triquetris, fronde digitata lineari integerrima æquali. *Fl. zeyl.* 379. \* *Amoen. acad.* 1. p. 269. f. 1. \*  
Planta pluribus foliis triquetris instar graminis cyperini summitate foliorum in plurima folia biuncialia divisis.  
*Herm. zeyl.* 27.  
*Habitat in Zeylona.*

- polypodioides.* 9. **ACROSTICHUM** fronde pinnatifida, pinnis linearibus integerrimis patentibus connatis. *Amoen. acad.* 1. p. 271. \*  
Acrostichum fronde pinnata: foliolis linearibus alternis sessilibus, terminali plerumque trifida. *Gron. virg.* 198.  
Polypodium minus virginianum, foliis brevibus subtus argenteis. *Morif. hist.* 3. p. 563. f. 14. t. 3. f. 5.



*Polypodium minus*, pinnulis raris subtus cinereis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. p. 79.

*Filix polypodium dicta minima jamaicensis*, foliis averfa parte pulvere asplenii ritu circumquaque reiparfis.

*Pluk. alm.* 153. t. 289. f. 1.

*Habitat in Virginia, Jamaica.*

\* *Fronde pinnata.*

10. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: pinnis alternis *aureum*, linguiformibus integerrimis glabris. *Hort. cliff.* 477.

*Amæn.* 1. p. 273. \*

*Phyllitis ramosa aurea.* *Pet. fil.* 142. t. 8. f. 5.

*Lonchitis palustris maxima.* *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. p. 76.

*Lingua Cervina aurea.* *Plum. fil.* 87. t. 104.

*Filix palustris aurea*, foliis linguæ cervinæ. *Plum. amer.* 5. t. 7. *Raj. suppl.* 63.

*Filix simpliciter pinnatis foliis f. Phyllitis ramosa jamaicensis maxima*, averfa parte ferruginea lanugine circumquaque obducta. *Pluk. alm.* 154. t. 288. f. 1.

*Habitat in Jamaica, Dominicæ humentibus.*

11. *ACROSTICHUM* frondibus pinnatis; pinnis ob-*sortifolium*, longis integris ferratis acutis, stipitibus squamosis.

*Lonchitis calamifera*, pinnis ferratis. *Pet. fil.* 153. t. 9. f. 8.

*Filix scandens latifolia ferrata.* *Plum. amer.* 8. t. 12. *Raj. suppl.* 76.

*Filix major*, in pinnas tantum divisa raras oblongas latasque crenatas. *Sloan. jam.* 18. *hist.* 1. p. 84. t. 38.

*Filix jamaicensis hirsuta*, forbi aucupariæ folia quodammodo referens. *Morif. hist.* 3. p. 576.

*Filix jamaicensis*, pinnatis fraxini foliis tenuissime crenatis mucronatis. *Pluk. alm.* 153. t. 286. f. 3.

*Habitat in Jamaica, Domingo.*

12. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: pinnis alternis *areolatum*, linearibus apice ferratis. *Gron. virg.* 124. *Amæn. acad.*

1. p. 274.

*Filix mariana*, pinnulis seminiferis angustissimis. *Pet. act.* 246. p. 398.

*Habitat in Virginia, Marilandia.*

13. *ACROSTICHUM* frondibus pinnatis: pinnis alter-*platyneuros*, nis ovatis crenatis sessilibus sursum arcuatis. *Gron. virg.* 123. *Amæn. acad.* 1. p. 272. \*

*Filix*

*Filix polypodium dicta minima virginiana platyneuros.*  
*Pluk. alm. 153. t. 289. f. 2. Raj. suppl. 58.*  
*Asplenium virginianum, polypodii facie. Raj. suppl. 59.*  
*Polypodium minus virginianum, foliis brevibus subtus*  
*argenteis. Moris. hist. 3. p. 563. f. 14. t. 2. f. 5.*  
*Habitat in Virginia.*

- nodosum.* 14. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: pinnis lanceolatis oppositis, stipitis articulis nodosis.  
*Phyllitis pulverulenta nodosa major. Pet. fil. 143. t. 6. f. 16.*  
*Filix latifolia nodosa. Plum. amer. 4. t. 6. Raj. suppl. 63.*  
*Lingua cervina nodosa major. Plum. fil. 108.*  
*Habitat in Dominica.*

- arifoliatum.* 15. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: foliolis ternatis lanceolatis. *Amen. acad. 1. p. 274. \**  
*Acrostichum fronde pinnata; foliolis digitatis: pinnis linearibus: intermedia longiore. Hort. Cliff. 476.*  
*Phyllitis ramosa trifida. Sloan. jam. 88. hist. 1. p. 88. t. 45. f. 2.*  
*Phyllitis pulverulenta, foliis angustis trifidis. Pet. fil. 141. t. 8. f. 9.*  
*Lingua cervina triphylla angusta & leviter serrata. Plum. fil. 12. t. 144.*  
*Filix jamaicensis non ramosa trifolia angustifolia, caule lævi. Moris. hist. 3. p. 572. Raj. suppl. 73.*  
*Habitat in Jamaica.*

*\* Fronde sub-bipinnata.*

- siliquosum.* 16. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: pinnis alternis sursum pinnulatis linearibus: inferioribus bipartitis. *Fl. zeyl. 376. \* Amoen. acad. 1. p. 270. f. 3.*  
*Acrostichum maderaspatanum, foliis laciniatis. Pet. mus. 741.*  
*Millefolium aquaticum. Rumpf. amb. 6. p. 17, t. 74. f. 1.*  
*Planta siliquosa bivalvis unicapsularis, siliquis in plurimos ramulos foliatis diffusis, crithmi maritimi segmenta quodammodo mentientibus. Pluk. alm. 298. t. 215. f. 3.*  
*Habitat in Zeylona.*

- thalictroides* 17. *ACROSTICHUM* fronde pinnata: pinnis alternis utrinque pinnatifidis: sterilibus latoribus. *Fl. zeyl. 377. t. 4. \* Amoen. acad. 1. p. 275.*  
*Habitat in Zeylonæ aquis.*

18. A-

18. ACROSTICHUM frondibus sub-bipinnatis: pinnis *marantæ*. opposito-coadunatis subtus hirsutissimis: basi subdentatis.

Lonchitis folio ceterach. *Banb. pin.* 259. *Barr. ic.* 858. 857.

Lonchitis aspera marantæ. *Cam. epit.* 666.

Filicula crispa, lanugine hepatici coloris vestita. *Pluk. alm.* 150. t. 281. f. 4.

*Habitat in Europa australi.*

*Stipites spitamæ, atropurpurei. Frons ferme bipinnata, lanceolata, subtus dense imbricata squamis paleaceis, croceis, exsiccata contrahitur & occultat paginam anticam. Foliola opposita, fere pinnata. Pinnæ ovata, obtusæ, crassæ, integerrimæ; at inferiores basi sæpe utrinque dentatæ. Fructificationes sparse inter squamas foliaceas per totam paginam posticam.*

19. ACROSTICHUM fronde sub-bipinnata: pinnis opposito-coadunatis obtusis subtus hirsutis: basi integerrimis.

Polypodium fronde duplicato-pinnata: pinnulis coadunatis obtusis subtus hispida. *Fl. suec.* 850.

Polypodium duplicato-pinnatum: pinnulis obtusis remotis subtus villosum. *Fl. lapp.* 383.

Polypodium lonchitidis marantæ species cambrobritannica. *Pluk. alm.* 150. t. 89. f. 5.

Filicula alpina tenerior, alis latiusculis brevioribus integris profunde dentatis. *Morif. hist.* 3. p. 576. f. 14. t. 3. f. 23.

*Habitat in Europæ frigidissimæ rupibus.*

*Maxime affinis precedenti, at vix digito longior, nec spithameum; stipite virescente, nec atropurpureo ut illa.*

20. ACROSTICHUM fronde pinnata: pinnis sessilibus *ebeneum*, oblongis sinuatis: summis brevissimis integerrimis. *Amen. acad.* 1. p. 272. \*

Filix non ramosa minor (& minima), caule nigro, furculis raris, pinnulis angustis raris brevibus acutis subtus niveis. *Sloan. jam.* 20. *hist.* 1. p. 92. t. 53. f. 1. *Raj. suppl.* 83.

*Habitat in Jamaicæ sepibus humidiusculis.*

21. ACROSTICHUM fronde pinnata: pinnis pinnatifidis integerrimis. *Theophrastus.*

Filix mollis f. glabra, vulgari mari non ramosa acedens. *Banb. hist.* 730. t. 731. f. 1. *Theophrastus.*

*Thelypteris palustris non ramosa. Rupp. jen. 277.*

*Habitat in Europæ septentrionalioris paludibus.*

*Habitus Polyp. Filicis maris. Stipes glabre. Folia sterilia, latiora, obtusiora.*

\* *Fronde bipinnata.*

*cruciatum.* 22. **ACROSTICHUM** fronde bipinnata: foliolis oppositis lanceolatis: intimis cruciatim appendiculatis. *Amoen. acad. 1. p. 275. \**

*Filix pulverulenta, pinnulis obtuse dentatis. Plum. fil. 26. t. 38.*

*Adiantum pulverulentum, pinnis infra auritis. Pet. fil. 161. t. 9. f. 10.*

*Habitat in America meridionali.*

*barbatum.* 23. **ACROSTICHUM** fronde bipinnata: foliolis oppositis: pinnulis lanceolatis obtusis ferratis sessilibus alternis. *Hort. cliff. 476. Amoen. acad. 1. p. 274. \**

*Filix africana floridæ similis, in ambitu foliorum argute denticulata. Pluk. alm. 156. t. 181. f. 5.*

*Habitat in Africa.*

*calamelanos.* 24. **ACROSTICHUM** frondibus bipinnatis: pinnis alternis lanceolatis acuminatis pinnatifidis.

*Acrostichum fronde alternatim duplicato-pinnatum: pinnulis lanceolatis sessilibus: inferioribus ferratis incisis.*

*Hort. cliff. 476. Amoen. acad. 1. p. 274.*

*Filix non ramosa major, caule nigro, furculis raris, pinnulis angustis raris longis dentatis. Sloan. jam. 20. hist. 1. p. 92. t. 30. f. 2.*

*Filix albissimo pulvere conspersa. Plum. fil. 30. t. 40. Pet. fil. 156. t. 9. f. 11.*

*Adiantum nigro simile, albissimo pulvere conspersum. Plum. amer. 30. t. 40.*

*Adiantum calamelanos americanum f. Adiantum nigrum, foliis prona parte candidissimis. Pluk. alm. 111. t. 124. f. 3.*

*Habitat in America meridionali.*

*Stipes ita ater, at folia subius nivea.*

*pulchrum.* 25. **ACROSTICHUM** bipinnatum: pinnulis indivisis. *Sauv. monsp. 246. †*

*Adiantum pulcherrimum. Bauh. hist. 3. p. 737. 745.*

*Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. Bauh. pin. 355.*

*Habitat Montpelii, inque Hircynia.*

*Pollen est omnino crocei coloris. Sauv.*

## PTERIS.

\* *Frondibus simplicissimis.*

1. PTERIS fronde simplici lanceolata subangulata glabra: *lanceolata*.  
apice fructificante.  
Lingua Cervina foliis acutis & ad oras summitatum pulverulentis. *Plum. amer.* 28. t. 40. fil. 116. t. 132.  
*Morif. hist.* 3. p. 558. *Raj. suppl.* 52.  
Phyllitis lineata hinc inde dentata. *Pet. fil.* 123. t. 6. f. 5.  
*Habitat in Domingo.*
2. PTERIS fronde simplici lineari integerrima longitudi-*lineata*.  
naliter fructificante.  
Lingua Cervina longissimis & angustissimis foliis. *Plum. amer.* 28. t. 41. fil. 123. t. 143. *Morif. hist.* 3. p. 558. *Raj. suppl.* 52.  
Phyllitis lineata, graminis folio longissimo. *Pet. fil.* 126. t. 14. f. 3.  
*Habitat in Domingo.*
3. PTERIS fronde simplici lineari: apice trifido. *tricuspidata*.  
Lingua Cervina angusto trifidoque folio. *Plum. fil.* 121. t. 140.  
Phyllitis lineata apice trifido. *Pet. fil.* 124. t. 10. f. 6.  
*Habitat in Domingo.*
4. PTERIS fronde simplici dichotoma subtus hispida: 3-furcata,  
picibus fructificantibus.  
Lingua Cervina furcata. *Plum. fil.* 122. t. 141.  
Phyllitis aspera, furcis lineatis. *Pet. fil.* 125. t. 6. f. 6.  
*Habitat in America meridionali.*
- \* *Frondibus simpliciter pinnatis, compositis, oblongis.*
5. PTERIS frondibus pinnatis: foliolis pinnatifidis, cau-*arborea*.  
dice arboreo aculeato.  
Filix ramosa arborefcens & aculeata. *Plum. fil.* 6. t. 5.  
Filix arborefcens latifolia aculeata. *Plum. amer.* 3. t. 3.  
Filix lineata arborea, caudice aculeato. *Pet. fil.* 132. t. 4. f. 2.  
*Habitat in Martinica.*
6. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis oppositis ovato-*grandifolia*.  
linearibus acuminatis integerrimis.  
Pteris fronde pinnata: pinnis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus erectiusculis. *Hort. cliff.* 473.  
Phyllitis ramosa ad margines pulverulenta. *Pet. fil.* 127. t. 6. f. 15.

Y y y

Lingua

Lingua Cervina latifolia membrana tenui marginata.

*Plum. fil.* 88. *t.* 106.

Filix latifolia ad margines pulverulenta. *Plum. amer.* 6. *t.* 8.

Filix pinnata latifolia ad margines pulverulenta. *Raj. suppl.* 64.

Filix americana maxima: lobis oppositis acutioribus ad margines pulverulentis. *Morif. hist.* 3. *p.* 571.

*Habitat in* Dominicæ, Martinicæ *uliginosis.*

*longifolia.* 7. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis linearibus repandis: basi cordatis. *Hort. cliff.* 473.

Lonchitis lineata, pinnis longissimis. *Pet. fil.* 129. *t.* 6. *f.* 12.

Lonchitis americana major, alis longissimis non serratis ad basin auriculatis oppositis ad oras pulverulentis. *Morif. hist.* 3. *p.* 568.

Lonchitis non ramosa, longis angustis & ad basin auriculatis foliis. *Plum. fil.* 52. *t.* 69. *Raj. suppl.* 65.

Filix non ramosa, longissimis angustis & ad basin auriculatis foliis. *Plum. amer.* 12. *t.* 18.

*Habitat in* Dominicæ *sylvis juxta rivulos.*

*vittata.* 8. PTERIS frondibus pinnatis: pinnis linearibus rectis basi rotundatis.

*Habitat in* China. *Osbeck.*

*Præcedenti valde similis.*

*stipularis.* 9. PTERIS fronde pinnata: pinnis linearibus sessilibus, stipulis lanceolatis.

Filix altera longissimis angustis & ad basin foliosis foliis. *Plum. amer.* 12. *t.* 19. *fil. t.* 70.

Filix lineata ad basin foliosa. *Pet. fil.* 130. *t.* 12. *f.* 1.

*Habitat in* America meridionali.

*trichomanoides.* 10. PTERIS fronde pinnata: pinnis subovatis obtusis repandis: subtus hirsutis. *Hort. cliff.* 473.

Trichomanes argenteum ad oras nigrum. *Plum. fil.* 57. *t.* 75. *Pet. fil.* 137. *t.* 9. *f.* 16.

Trichomanes majus, pinnis sinuatis subtus niveis. *Sloan. jam.* 17. *hist.* 1. *p.* 80. *t.* 35. *f.* 1. *Raj. suppl.* 60.

*Habitat in* Jamaicæ, Dominicæ *rupibus.*

*missa.* 11. PTERIS fronde pinnata: pinnis oblongo-ovatis obtusis: subtus lanatis.

Acrostichum fronde pinnata: foliolis oblongo-ovatis vix cordatis hirsutis obsolete serratis. *Hort. cliff.* 475.

Filix

Filix minor, ruffa lanugine tota obducta, in pinnas tantum divisa raras non crenatas subrotundas. *Sloan. jam.*

19. *hist.* 1. p. 87. t. 45. f. 1.

*Habitat in America septentrionaliore.*

\* *Frondibus sub-bipinnatis f. ramosis.*

12. PTERIS frondibus quinquangulis trifoliatis: pinnis *pedata*, pinnatifidis: lateralibus bipartitis.

Pteris fronde simplici quinquangula producta tripartita: intermedia trifida: lateralibus bifidis. *Hort. cliff.* 473.

Hemionitis profunde laciniata ad oras pulverulenta.

*Plum. amer.* 24. t. 34. *fil.* 130 t. 152.

Hemionitis foliis atro-virentibus maxime dissectis; f. Filix geranii robertiani folio. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. p. 73.

Filix marginifera, geranii folio. *Pet. fil.* 176. t. 8. f. 12.

Filix Hemionitis americana, petroselinii foliis profunde laciniatis. *Pluk. alm.* 155. t. 286. f. 5. *Raj. suppl.* 55.

Adiantum monophyllum americanum, foliis profunde laciniatis ad oras pulverulentum. *Morif. hist.* 3. p. 592.

- β. Adiantum monophyllum antegoanum, ad oras pulverulentum platani in modum divisum: lacinia media longius producta. *Morif. hist.* 3. p. 392.

*Habitat in Jamaica, Dominica, Sibiria rupibus.*

*Planta sibirica minor & subtus nivea: margine ferrugineo.*

13. PTERIS fronde supradecomposita: foliolis pinnatis: *aguilina*, pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis: superioribus minoribus. *Hort. cliff.* 473. *Fl. suec.* 843. *Dalib. parif.* 309.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis.

*Baub. pin.* 357.

Filix femina. *Fuchf. hist.* 596. *Cam. epit.* 992.

*Habitat in Europæ sylvis, præsertim caduis.*

14. PTERIS fronde supradecomposita, pinnis linearibus: *caudata*, infimis basi pinnato dentatis; terminalibus longissimis.

*Hort. cliff.* 473.

Filix ramosa, pinnulis longiusculis: partim auriculatis.

*Plum. amer.* 14. t. 22. *fil.* 23. t. 29.

Filix femina vulgaris facie. *Pes. fil.* 135. t. 3. f. 12.

Filix femina rarissima jamaicensis, pinnula alas claudente longissima. *Pluk. alm.* 156.

Filix femina f. ramosa major, pinnulis angustis obtusis

Y y y 2

non

non dentatis: impari furculum terminante longissima. *Sloan. jam. 24. hist. 1. p. 101. Moris. hist. 3. p. 583.*

3. Filix femina f. ramosa major, pinnulis angustissimis rarisissimisque. *Sloan. jam. 24. hist. 1. p. 101. t. 63.*  
*Habitat in Jamaica, Dominica saxosis.*

- mutilata.* 15. PTERIS fronde decomposita: foliolis pinnatis: infimis semipinnatifidis, terminalibus baseosque longissimis.

*Lonchitis ramosa, limbo pulverulento. Plum. amer. 21. t. 30. fil. t. 51. Pet. fil. 131. t. 3. f. 10.*

*Habitat in Jamaica, Dominica.*

*Folia lateralía infima longiora ad basin, latere tantum inferiore pinnata.*

- atropurpurea.* 16. PTERIS fronde decomposita pinnata: pinnis lanceolatis: terminalibus longioribus.

*Pteris adianti facie, caule ramulis petiolisque politiore nitore nigricantibus. Gron. virg. 197.*

*Habitat in Virginia.*

*Stipes spithameus, atropurpureus, nitidus. Frons pinnata: pinnis lanceolatis, lato margine revolutis, quo magis inferius & etiam magis petiolata: inferioribus petiolis uno alterove pari pinnarum minorum sessilium auctis.*

- diantea.* 17. PTERIS fronde pinnata: pinnis pinnatifidis: infima bipartita.

*Filix pinnulis lonchitidis obtusis non dentatis ad oras pulverulentis. Plum. amer. 10. t. 14. fil. t. 15.*

*Filix lonchitidis pinnis. Pet. fil. 134. t. 3. f. 11.*

*Habitat in Domingo, Martiuica, Jamaica.*

- semipinnata.* 18. PTERIS fronde subbipinnata: foliolis lateralibus loboque infimo semipinnatifidis.

*Habitat in China. Osbeck.*

*Scapus laevis. Frondes lanceolatae, pinnatae. Foliola opposita, remota, pinnatifida: apicibus terminalibus elongatis; margo foliorum terram spectans saepius. & unice pinnatifidus, non vero superior, hinc quasi semipinnatae evadunt foliola; Infima demum laciniarum ceteris longior est & similiter semipinnatifida; reliquis omnibus integris, obtusis.*

- dichotoma.* 19. PTERIS frondibus dichotomis: pinnatis integerrimis. Filix furcata, pinnulis longiusculis non dentatis. *Plum. fil. 22. t. 28. amer. 13. t. 20. Raj. suppl. 96.*

*Filix*



*Filix furcata*, taxi foliis. *Pet. fil.* 51. t. 5. f. 4.

*Filix femina* f. ramosa major dichotoma, pinnulis longichitidis longis angustis non dentatis. *Sloan. jam.* 24. *bist.* 1. p. 102.

*Filix jamaicensis* dichotomos f. ramis bifidis, feminae nostratis, pinnulis ramosissima. *Pluk. alm.* 156.

*Habitat in* Jamaica, Martinicæ sylvis.

*Fructificatio a me visa non fuit.*

## BLECHNUM.

1. BLECHNUM fronde pinnata: pinnis lanceolatis op-orientals,  
positis basi emarginatis.

*Lonchitis* juxta nervum pulverulenta. *Pet. fil.* 128. t. 3.

f. 9. *Moris. bist.* 3. p. 568. f. 14. t. 2. f. 16.

*Lonchitis* f. *Hemionitis* pinnata juxta nervum pulverulenta. *Plum. Raj. suppl.* 66?

*Habitat in* America meridionali. Pinnae lanceolatae plurimae.

2. BLECHNUM fronde pinnata: pinnis linearibus al-occidentals,  
teanis.

*Habitat in* China *Osbeck.*

Frons tripedalis, stipite basi antice setis griseis magnis vestito; latus anterior stipitis sulcis 3 longitudinaliter exaratus. Folia lineari-lanceolata, sessilia, glabra, integerrima, ad angulum acutum striata, digiti longitudine.

## HEMIONITIS.

1. HEMIONITIS frondibus lanceolatis integerrimis. lanceolata.

*Phyllitis* angustifolia lineis catenatis. *Pet. fil.* 122. t.

6. f. 4. quæ *Plum. fil.* 127. f. 6.

*Habitat in* America meridionali.

2. HEMIONITIS frondibus palmatis hirsutis. palmata.

*Hemionitis* fronde palmata, lineis feminalibus reticulatis. *Hort. cliff.* 474.

*Hemionitis aurea* hirsuta. *Plum. amer.* 23. t. 33. f. 1. t. 51.

*Hemionitis* folio hirsuto & magis dissecto f. ranunculi folio. *Sloan. jam.* 14. *bist.* 1. p. 72. *Moris. bist.* 3. p. 560. f. 14. t. 1. f. 5.

*Filix*, ranunculi folio, prolifera *Pet. fil.* 177. t. 8. f. 11.

Filix Hemionitis dicta, saniculæ foliis, villosa. *Pluk. alm. 155. t. 291. f. 4.*  
*Habitat in America meridionali.*

## LONCHITIS.

- hirsuta.* 1. LONCHITIS frondibus pinnatifidis obtusis integerrimis, furculis ramosis hirsutis.  
 Filix ramosa, pinnulis quercinis. *Plum. fil. 18. t. 20.*  
 Adiantum pinnis quercinis, ramis villosis. *Pet. fil. 82. t. 4. f. 5.*  
*Habitat in America meridionali.*
- aurita.* 2. LONCHITIS frondibus pinnatis: pinnis infimis bipartitis, furculis indivitis aculeatis.  
 Filix latifolia spinulis mollibus & nigris aculeata. *Plum. fil. 14. t. 17.*  
 Filix spinosa, seminibus lunulatis. *Pet. fil. 172. t. 4. f. 4.*  
*Habitat in America meridionali.*
- repens.* 3. LONCHITIS frondibus pinnatis: pinnis alternis sinuatis, furculis ramosis aculeatis.  
 Filix aculeata repens. *Plum. fil. 11. t. 12.*  
 Filix ramosa aculeata, repens. *Pet. fil. 39. t. 4. f. 6.*  
*Habitat in America meridionali.*

## ASPLENIUM.

\* *Fronde simplicì.*

- rhizophylla.* 1. ASPLENIUM frondibus cordato-ensiformibus indivisis: apice filiformi radicante. *Amoen. acad. 2. p. 337.*  
 Phyllitis filicifolia parva saxatilis virginiana per summities foliorum radicata. *Pluk. alm. 154. t. 105. f. 3.*  
 Phyllitis non sinuata minor, apice folii radices agente *Sloan. jam. 14. bist. 1. p. 71. t. 26. f. 1.*  
 Phyllitis saxatilis virginiana per summities foliorum prolifera. *Morif. bist. 3. p. 557. f. 14. t. 1. f. 14*  
*Habitat in Jamaica, Virginia, Canada, Sibiria.*
- Hemionitis.* 2. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-hastatis quinquelobis integerrimis, stipitibus lævibus.  
 Hemionitis vulgaris. *Baub. pin. 353.*  
 Hemionitis vera. *Clus. bist. 2. p. 214.*  
*Habitat in Italia, Hispania.*

*Maxime affinis sequenti, at diameter frondis longitudinalis vix superat transversalem.*

3. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-lingu- *Scolopendria-*  
latis integerrimis, stipitibus hirsutis. *min.*

Asplenium frondibus ensiformibus integris: basi cordatis inflexis, petiolis hirsutis. *Vir. cliff.* 103. *Hort. cliff.* 474. *Fl. suec.* 843. *Mat. med.* 481. *Roy. lugdb.* 498. *Hall. belv.* 134. *Dalib. paris.* 310. *Sauv. monsp.* 27. *Lingua Cervina officinarum. Baub. pin.* 353. *Plum. fil.* 34. *t. A. f.* 4.

*Phyllitis. Cam. epit.* 579.

- β. *Phyllitis crispa. Baub. hist.* 3. *p.* 757.

γ. *Phyllitis* f. *Lingua Cervina maxima*, undulato folio auriculato per basin. *Pluk. phyt.* 248. *f.* 1.

δ. *Lingua Cervina* medio folii nervo in aculeum abeunte. *Morif. hist.* 3. *p.* 557. *f.* 14. *t.* 1. *f.* 9.

ε. *Lingua Cervina* multifido folio. *Baub. pin.* 353.

ζ. *Phyllitis* f. *Lingua Cervina crispa*, folio multifido, ramosa. *Pluk. phyt.* 248. *f.* 2.

*Habitat in Europæ umbrosis, nemorosis, saxosis. &*

4. ASPLENIUM frondibus simplicibus lanceolatis integerrimis glabris.

*Phyllitis indica maxima*, latissimis foliis planis musæ facie. *Morif. hist.* 3. *p.* 558. *f.* 14. *t.* 1. *f.* 15.

*Scolopendria indiæ orientalis*, musæ facie. *Breyn. cent.* 129. *t.* 99.

*Habitat in Javæ summis arboribus. Osbeck.*

Folia bipédalia, latitudine spithamæ, robusta & consistentia, glabra, ad angulum acutum striata. Lincæ fructificantes inter singulos nervos s. strias parallelas, breves, utpote vix  $\frac{1}{2}$  latitudinis folii attingentes. Radix insidet summis arboribus, unde folia exeunt in orbem digesta, erecta, instar umbellæ, intra cujus centrum Aves plerumque nidos suos conficiunt.

5. ASPLENIUM fronde simplici lanceolata serrata. *Serratum.*

*Lingva Cervina* longo lato serratoque folio. *Plum. amer.* 27. *t.* 39.

*Phyllitis major* margine crenato. *Pet. fil.* 106. *t.* 6. *f.* 7.

*Phyllitis* non sinuata, foliorum limbis leviter serratis.

*Sloan. jam.* 14. *hist.* 1. *p.* 72.

*Habitat in America calidiore.*

6. ASPLENIUM fronde binata: foliolis lanceolatis sub-bifolium.  
sinuatis connatis:

Y y y 4

Lin-

Lingua Cervina geminato folio. *Plum. fil.* 116. t. 133.  
Phyllitis folio geminato dentato. *Pet. fil.* 107. t. 13.  
f. 11.

*Habitat in America meridionali.*

\* *Fronde pinnatifida.*

*Ceterach.* 7. **ASPLENIUM** frondibus pinnatifidis: lobis alternis  
confluentibus. *Hort. cliff.* 474. *Mat. med.* 482. *Hall.*  
*belv.* 135. *Dalib. paris.* 310. *Sauv. monsp.* 270.

*Asplenium* f. *Ceterach.* *Bauh. hist.* 3. p. 479. *Morif. hist.*  
3. p. 561. f. 14. t. 2. f. 1. *Plum. fil.* XXXIII. t. B.  
f. 3. *Barr. ic.* 1043. 1044.

*Ceterach officinarum.* *Bauh. pin.* 354.

*Habitat in Walliæ, Italiæ fissuris rupium.*

*obtusifolium.* 8. **ASPLENIUM** fronde subpinnata: pinnis obtusis si-  
nuatis decurrentibus alternis.

*Adiantum* alis latioribus. *Pet. fil.* 117. t. 2. f. 4.

*Habitat in America.*

\* *Fronde pinnata.*

*salicifolium.* 9. **ASPLENIUM** fronde pinnata: pinnis falcato-lanceo-  
latis crenatis: basi sursum angulatis.

*Lonchitis glabra major.* *Plum. amer.* 18. t. 27. *fil.* t.  
60. *Raj. suppl.* 67.

*Lonchitis striata.* *Pet. fil.* 110. t. 3. f. 2.

*Lonchitis major*, pinnulis latioribus leviter denticulatis:  
superiore latere auriculatis. *Sloan. jam.* 16. *hist.* 1. p.  
78.

*Habitat in Antillis.*

*Trichomanes.* 10. **ASPLENIUM** frondibus pinnatis: pinnis subrotun-  
dis crenatis. *Fl. lapp.* 388. *Fl. succ.* 854. *Hort. cliff.*  
474. *Mat. med.* 483. *Roy. lugdb.* 498. *Hall. belv.*  
135. *Dalib. paris.* 311.

*Trichomanes* f. *Polytrichum officinarum.* *Bauh. pin.*  
356. *Plum. fil.* 26. t. V. f. 1.

*Trichomanes.* *Fuchs. hist.* 796. *Cam. epit.* 925.

β. *Trichomanes* foliis eleganter incis. *Tournef. inst.*  
539. t. 315. f. 7. C.

γ. *Trichomanes* minus & tenerius. *Bauh. pin.* 356.

*Habitat in Europæ fissuris rupium.*

*Trich. den- satum.* 11. **ASPLENIUM** frondibus pinnatis: pinnis cuneifor-  
mibus obtusis crenato-emarginatis.

*Polytrichum saxatile dentatum.* *Plum. amer.* 35. t. 50.

*Tri-*

*Trichomanes latifolium dentatum. Plum. fil. t. 101.*  
*Trichomanes striatum vulgaris facie. Pet. fil. 120. t.*  
 2. f. 15.

*Habitat in America meridionali.*

12. **ASPLENIUM** fronde pinnata: pinnis ovatis super-<sup>marinum.</sup>  
 ne basi gibbis ferratis obtusis. *Hort. cliff. 474. Hall.*  
*belv. 136.*

*Chamæ Filix marina anglica. Meris. hist. 3. p. 573. f.*  
 14. t. 3. f. 25. *bon.*

*Filicula maritima ex insulis stœchadis. Bauh. pin. 359.*  
*Burf. XX: 39.*

*Habitat in Anglia, insulis Stœchadum. Burf.*

13. **ASPLENIUM** fronde pinnata: pinnis falcato-lan-<sup>cultrifolium</sup>  
 ceolatis inciso-ferratis: basi deorsum angulatis. *Hort.*  
*cliff. 474.*

*Lonchitis latifolia, pediculis lœvidis & glabris. Plum.*  
*fil. 45. t. 59.*

*Habitat in Martinica.*

\* *Fronde decomposita.*

14. **ASPLENIUM** frondibus duplicato-pinnatis: pinnis <sup>*Adiant. ni-*</sup>  
 obovatis superne crenatis; foliolis inferioribus majo-<sup>*grym.*</sup>  
 ribus.

*Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo ni-*  
*gro. Bauh. pin. 355.*

*Adiantum nigrum officinarum. Bauh. hist. 3. p. 742.*

*Dryopteris nigra. Dod. pempt. 466.*

*Habitat in Europa australiore.*

15. **ASPLENIUM** frondibus alternatim decompositis: <sup>*Ruta mura-*</sup>  
 foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. Lugdb. 498.* <sup>*ria.*</sup>  
*Fl. succ. 855. Mat. med. 484. Dalib. paris. 311.*

*Ruta muraria. Bauh. pin. 356.*

*Paronychia. Cam. epit. 785.*

*Habitat in Europa ex rupium fissuris. 2*

16. **ASPLENIUM** frondibus tripinnatis: foliolis alter-<sup>*Onopteris.*</sup>  
 nis: pinnis lanceolatis inciso-ferratis.

*Asplenium frondibus duplicato-pinnatis, foliis inferiori-*  
*bus majoribus: foliolis ovatis superne crenatis. Roy.*  
*Lugdb. 498. Dalib. paris. 311.*

*Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo ni-*  
*gro. Bauh. pin. 355.*

*Adiantum nigrum officinarum. Bauh. hist. 3. p. 472.*

*Habitat in Italia, Gallia.*

Y y y 5

17. A-

- Trich. ramosum.* 17. **ASPLENIUM** frondibus duplicato-pinnatis: pinnis obovatis crenatis: foliolis inferioribus minoribus. *Roy. lugdb.* 498.  
*Trichomanes ramosum majus & minus. Baub. pin.* 356.  
*Trichomanes ramosum. Baub. hist.* 3. p. 747. *Raj. anglic.* 3. p. 119.  
*Habitat in Arvernix rupibus.*
- marginatum* 18. **ASPLENIUM** fronde composita: pinnis oppositis lanceolatis serratis.  
*Phyllitis ramosa margine membranaceo. Pet. fil.* 108. t. 12. f. 2.  
*Habitat in America.*
- squamosum.* 19. **ASPLENIUM** fronde composita: pinnis acuminatis incis, stipite squamoso.  
*Lonchitis ramosa, caule squamoso. Pet. fil.* 112. t. 5. f. 2.  
*Habitat in America.*
- striatum.* 20. **ASPLENIUM** fronde composita: pinnis pinnatifidis obtusis crenatis: terminali acuminata.  
*Filix striata, pinnis crenatis, major & minor. Pet. fil.* 113. 114. t. 3. f. 3. 4.  
*Habitat in America.*

### POLYPODIUM.

\* *Fronde indivisa.*

- lanceolatum.* 1. **POLYPODIUM** frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificantibus solitariis, radice nuda.  
*Phyllitis, folio longo, angustifolia, maculis majoribus. Pet. fil.* 8. t. 6. f. 2.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Dicimus fructificationes solitarias, quæ serie longitudinali tantum ab utroque latere disponuntur; seriales, quæ transversim, simplici serie, inter singulos nervos transversales digeruntur; sparsas, quæ inter singulos nervos transversales duobus pluribusque ordinibus digestæ sunt.*
- lycopodioides.* 2. **POLYPODIUM** frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, caule squamoso repente. *Hort. cliff.* 474.  
*Lingua Cervina scandens, caulibus squamosis. Plum. fil.* 104. t. 119.

Phyl.

- Phyllitis scandens, caulibus squamosis. *Plum. amer.* 29.  
t. 42. *Raj. suppl.* 53.
- Phyllitis minor scandens, foliis angustis. *Sloan. flor.* 15.  
*bist.* 1. p. 73.
- Filix maculata scandens, caulibus squamosis. *Pet. fil.*  
12. t. 4. f. 15.
- Filix sarmentosa bifrons f. *Dryopteris* scandens jamaicensis inter filicem & lycopodium media. *Pluk. alm.*  
156. t. 290. f. 3.
- Habitat in America:* Martinica, Domingo, Jamaica.
- Confer.* Filix maculata scandens, caulibus squamosis angustifolia. *Pet. fil.* 13. t. 4. f. 16.
- Filix scandens quercus folio, caulibus lycopodii. *Pet. fil.* 21. t. 15. f. 2.
3. POLYPODIUM frondibus lanceolatis integerrimis *piloselloides*.  
hirsutis: sterilibus ovatis, fertilibus lanceolatis, fructificationibus solitariis.
- Lingua cervina minima repens & hirsuta. *Plum. fil.* 103.  
t. 118.
- Filix foliis ovalibus & longis pilosis. *Pet. fil.* 175. t. 10.  
f. 5.
- Habitat in America meridionali.*
4. POLYPODIUM frondibus crenatis glabris: sterilibus *heterophyl-*  
subrotundis sessilibus; fertilibus lanceolatis, fructifi- *lum*.  
cationibus solitariis.
- Lingua cervina heterophylla scandens & repens. *Plum.*  
*fil.* 105. t. 120.
- Filix maculosa scandens, foliis rotundis & longis glabris. *Pet. fil.* 174. t. 15. f. 4.\*
- Habitat in America meridionali.*
5. POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris *intecrassifolium*.  
gerrimis, fructificationibus serialibus.
- Phyllitis maculata, amplissimo folio. *Pet. fil.* 1. p. 6.  
t. 8.
- β. Phyllitis maculata, breviori & crassiori folio. *Pet. fil.*  
2. p. 6. t. 1.
- Habitat in America meridionali.*
6. POLYPODIUM frondibus lanceolatis glabris *intephyllitis*.  
gerrimis, fructificationibus sparsis.
- Polypodium, linguæ cervinæ folio, majus. *Plum. amer.*  
26. t. 38. *Raj. suppl.* 52.
- Phyllitis folio longo & marginato. *Pet. fil.* 5. t. 6. f. 10.
- Phyl-

Phyllitis folio non sinuato tenuiori, rotundis pulverulentis maculis averſa parte punctato. *Sloan. jam.* 14. *hiſt.* 1. p. 72.

*Habitat in America meridionali.*

*Conſer.* Phyllitis folio longo leviter undulato. *Pet. fil.* 4. t. 6. f. 9.

Phyllitis, folio longo, anguſtifolia. *Pet. fil.* 7. t. 6. f. 3.

*comuſum.*

7. **POLYPODIUM** frondibus lanceolatis glabris integerrimis; apice multifido, fructificationibus ſparſis.

Lingva cervina, multifido cacumine, laciniata. *Plum. fil.* 115. t. 131.

Phyllitis folio, longo, apice palmato. *Plum. fil.* 6. t. 6. f. 11.

*Habitat in America meridionali.*

*Suſpecta affinitatis eſt cum precedenti.*

*trifurcatum.*

8. **POLYPODIUM** frondibus lanceolatis glabris repandoſinuatis: apice trilobis.

Lingva Cervina ſinuofa in ſummitate trifulca, *Plum. fil.* 120. t. 138.

Polypodium vulgare, ſummo trifido. *Pet. fil.* 34. t. 15. f. 3.

*Habitat in America meridionali.*

*Suſpecta etiam eſt ob affinitatem cum proxime precedentibus duabus.*

\* *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

*eripatum.*

9. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis glabris: lobis ſemiorbiculatis crenatis.

Polypodium, aſplenii folio criſpo, pendulum. *Pet. fil.* 25. t. 13. f. 12.

*Habitat in America meridionali.*

*ſuſpenſum.*

10. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis glabris: lobis ſemiovatis acutis.

Polypodium pendulum glabrum. *Plum. fil.* 67. t. 87.

Polypodium, aſplenii folio brevi, pendulum. *Pet. fil.* 24. t. 1. f. 15.

*Habitat in America meridionali.*

*aſpleniofolium.*

11. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis pilofiſ: lobis ſemiovatis acutis.

Polypodium aſplenii folio villoſo. *Pet. fil.* 26. t. 7. f. 16.

β.-Poly-



- β. Polypodium pendulum subtus villosum.** *Pet. fil.* 35.  
*t.* 14. *f.* 1.  
 Polypodium pendulum hirsutic rufa pubescens. *Plum.*  
*fil.* 68. *t.* 88.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Affinitas hujus cum antecedenti suspecta est.*
- 12. POLYPODIUM** frondibus serrato-pinnatifidis lan- *scolopendri-*  
 ceolatis. *oides.*  
 Polypodium incisuris asplenii. *Plum. fil.* 1. 91.  
 Polypodium minus, asplenii folio. *Pet. fil.* 23. *t.* 1. *f.*  
 14.  
 Filix non ramosa scolopendrioides. *Plum. amer.* 7. *t.* 11.  
*Habitat in Jamaica.*
- 13. POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis: pinnis ob- *vulgare.*  
 longis subserratis obtusis, radice squamata.  
 Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis indivisis  
 serrulatis alternis connato-sessilibus. *Hort. cliff.* 475.  
*Fl. suec.* 845. *Roy. lugdb.* 499. *Dalib. parif.* 311.  
*Mat. med.* 485.  
 Polypodium pinnatum: pinnis lanceolatis integris. *Fl.*  
*lapp.* 384.  
 Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359. *fil.* 27. *t.* A. *f.*  
 2.  
 Polypodium majus. *Dod. pempt.* 464.  
**β. Polypodium minus.** *Baub. pin.* 359. *Dod. pempt.* 464.  
*Habitat in Europæ rimis rupium.*
- 14. POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis: pinnis ob- *virginia-*  
 longis subserratis obtusis, radice lævi. *num.*  
 Polypodium minus vulgaris facie. *Pet. fil.* 22. *t.* 7. *f.*  
 9.  
 Polypodium radice tenui & repente. *Plum. amer.* 25.  
*t.* 36. *fil.* 60. *t.* 77. *Raj. suppl.* 56.  
 Polypodium virginienfe minus, foliis obtusioribus. *Mo-*  
*ris. hist.* 3. *p.* 563. *f.* 14. *t.* 2. *f.* 3.  
*Habitat in Virginia.*  
*Antecedenti simillima, sed minor, & subtus glabra.*
- 15. POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis: lobis lance- *Ontar.*  
 olatis alternis obtusis distantibus.  
 Polypodium, lonchitidis folio, minus. *Pet. fil.* 32. *t.* 1.  
*f.* 16.  
*Habitat in America.*
- 16. POLYPODIUM** frondibus pinnatis lanceolatis: lo- *pellinatum.*  
 bis

bis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda.

*Polypodium lonchitidis* folio, *Pet. fil.* 31. t. 7. f. 14.

*Polypodium nigrum* tenerius sectum. *Plum. amer.* 26. t. 37.

*Habitat in* Jamaica.

*taxifolium.* 17. **POLYPODIUM** frondibus pinnatis: lobis approximatis ensiformibus parallelis acutis adscendentibus, radice hirta.

*Polypodium taxi* folio pendulum. *Pet. fil.* 35. t. 14. f. 1.

*Polypodium tenue* & pendulum. *Plum. amer.* 69. t. 89.

*Habitat in* America meridionali.

*struthionis.* 18. **POLYPODIUM** frondibus pinnatis: lobis approximatis ensiformibus repandis horizontalibus.

*Polypodium fronde* pinnata: foliolis lanceolato-linearibus undulis acuminatis oppositis connatis. *Hort. cliff.* 475.

*Polypodium crispum struthionis* pennis. *Pet. fil.* 30. t. 3. f. 8.

*Polypodium radice* subcærulea & punctata. *Plum. fil.* 60. t. 78.

*Habitat in* America.

*squamatum.* 19. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis scabris: pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus integerrimis.

*Polypodium longifolium*, squamulis argenteis. *Pet. fil.* 29. t. 7. f. 11.

*Habitat* - - - - -

*loriceum.* 20. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis lævibus: pinnis lanceolatis distantibus horizontalibus repandis.

*Polypodium longifolium*, radice dulci. *Pet. fil.* 27. 28. t. 7. f. 10. 12.

*Habitat in* America.

*alatum.* 21. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis lævibus: pinnis oblongis distantibus dentatis.

*Polypodium ferratum* majus costa alata. *Pet. fil.* 37. t. 7. f. 13.

*Habitat in* America.

*combricium.* 22. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis: pinnis lanceolatis lacero-pinnatifidis ferratis.

Poly-

*Polypodium fronde pinnatifida: foliolis lanceolatis sinuato-pinnatifidis. Hort. cliff. 475. Roy. lugdb. 499.*

*Polypodium cambrobritannicum, lobis foliorum protunde dentatis. Morif. hist. 3. p. 565. f. 14. t. 2. f. 8. bene.*

*Polypodium cambro-britannicum, pinnulis ad margines laciniatis. Raj. hist. 137. angl. 3. p. 117.*

*Filix amplissima, lobis foliorum laciniatis, cambrica. Pluk. alm. 153. t. 30. f. 1.*

*Habitat in Anglia.*

23. **POLYPODIUM** frondibus pinnatifidis lævibus: pin- *antrum.*  
nis oblongis distantibus: infimis patulis; terminali  
maxima.

*Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis integerrimis basi connatis patulis: terminali maxima. Hort. cliff. 475.*

*Polypodium majus aureum. Plum. amer. 25. t. 25. fil. 59. t. 76. Raj. suppl. 56.*

*Polypodium maximum. Pet. fil. 15. t. 7. f. 8.*

*Polypodium altissimum. Sloan. jam. 15. hist. 1. p. 75.*

*Polypodium jamaicense majus & elatius, alis longioribus: punctis aureis averſa parte notatis. Morif. hist. 3. p. 563.*

*Habitat in America ad caudices vetuſtarum arborum.*

24. **POLYPODIUM** frondibus ſterilibus brevioribus *quercifolium.*  
obtusis ſinuatis; fructificantibus alternis pinnatis lanceolatis. *Fl. zeyl. 382.*

*Polypodium exoticum, folio quercus. Baub. pin. 359.*

*Morif. hist. 3. p. 564. f. 14. t. 1. f. 15.*

*Polypodium malabaricum, foliis biformibus. Pet. muſ. 794. Raj. suppl. 57.*

*Polypodium indicum. Cluſ. exot. 88. t. 89. Piſ. mant. 195.*

*Panna-kelengo-marava. Rheed. mal. 12. p. 23. t. 11.*

*Habitat in India.*

\* *Fronde trifoliata: pedunculo foliolis tribus.*

25. **POLYPODIUM** fronde ternata ſinuato-lobata: in- *trifoliatum.*  
termedia majore.

*Polypodium fronde ternata ſinuata: foliolis lateralibus bifidis; intermedio petiolato trifido majore. Hort. cliff. 475.*

*Polypodium trifoliatum. Pet. fil. 18. t. 7. f. 3.*

*Lonchitis maxima trifolia americana. Raj. suppl. 66.*

*Hemio-*

*Hemionitis maxima trifolia. Plum. amer. 22. t. 32. fil. 127. t. 148.*

*Hemionitidi affinis Filix major trifida auriculata: pin-  
nulis latissimis sinuatis. Sloan. jam. 18. hist. 1. p. 85.  
t. 42.*

*Filix f. Hemionitis dicta caribæorum, amplissimis foliis,  
trifoliata. Pluk. alm. 155. t. 291. f. 3.*

*Habitat in Caribæis insulis.*

*Confer. Hemionitis maxima quinquefolia. Plum. Raj.  
suppl. 67. Pet. fil. 148. t. 7. f. 2.*

*Polypodium auriculatum. Pet. fil. 16. t. 7. f. 5.*

*Polypodium auriculatum pentaphylloides. Pet.  
fil. 17. t. 7. f. 6.*

*Polypodium auritum majus: laciniis crispis.  
Pet. fil. 19. t. 7. f. 7.*

*Polypodium auritum tricuspidatum: oris pilosis.  
Pet. fil. 20. t. 7. f. 4.*

\* *Fronde pinnata simpliciter.*

*Lonchitis. 26. POLYPODIUM fronde pinnata: pinnis lunulatis  
ciliato-ferratis declinatis; petiolis strigosis. Hort. cliff.  
475. Gron. virg. 123.*

*Lonchitis aspera. Bauh. pin. 359.*

*Lonchitis aspera major. Moris. hist. 3. p. 566. f. 14. t.  
2. f. 1.*

*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Baldi, Arvonix, Monf-  
pelli, Virginix.*

*Virginicæ plantæ pinnæ magis elongatæ & minus incur-  
vatæ, serraturis minus ciliato-spinosis.*

*auriculatum 27. POLYPODIUM fronde pinnata: pinnis falcato-  
lanceolatis serratis: basi truncatis sursum auritis. Fl.  
zeyl. 383.*

*Filix zeylanica, lonchitidis facie. Breyn. cent. 189. t.  
44. f. 2. Raj. suppl. 69. Burm. zeyl. 98. t. 44. f. 2.*

*Filix f. Lonchitis aspera maxima indorum. Pluk. alm.  
152. t. 30. f. 4.*

*Lonchitis aspera zeylanica, alis falcatis levissime denti-  
culatis & superiore latere auriculatis. Moris. hist. 3.  
p. 566.*

*Habitat in India.*

*triangulum, 28. POLYPODIUM frondibus pinnatis: pinnis trian-  
gularibus dentatis.*

*Trichomanes folio triangulo dentato. Pet. fil. 76. t.  
1. f. 10.*

*Habitat in America.*

29. PO-

29. POLYPODIUM frondibus pinnatis : pinnis corda- cordifolium.  
 ris obtusis integerrimis repandis.

Trichomanes folio cordato. *Pet. fil.* 75. t. 1. f. 11.

*Habitat in America.*

\* *Fronde sub-bipinnata, cujus pinnae confluunt basi,  
 ut semi-bipinnata potius, quam perfecte duplica-  
 to-pinnata sit.*

30. POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis: foliolis in- *Phegopteris.*  
 firmis reflexis: paribus pinnula quadrangulati coaduna-  
 tis. *Hort. cliff.* 475. *Fl. succ.* 851.

Polypodium pinnatum: pinnis lanceolatis pinnatifidis in-  
 tegris: inferioribus nutantibus. *Fl. lapp.* 367. *Hall. helv.*  
 138. n 282.

Filix non ramosa minor & sylvestris. *Petit. epist.* 56 t.  
 50.

Filix minor britannica, pediculo pallidiore, alis inferio-  
 ribus deorsum spectantibus. *Morif. hist.* 3. p. 575. f.  
 14. t. 4. f. 17.

Filix virginiana non ramosa, foliis planis. *Pluk. alm.*  
 151. t. 254. f. 2.

*Habitat in Europæ fagetis & in Virginia.*

31. POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis: foliolis *retroflexum.*  
 plurimis reflexis: pinnis laceris.

Filicula alis inferioribus pendulis. *Pet. fil.* 72. t. 1.  
 f. 9.

*Habitat in America.*

32. POLYPODIUM frondibus sub-bipinnatis lanceola- *fragrans.*  
 tis: foliolis confertis: lobis obtusis serratis, stipite pa-  
 leaceo.

Dryopteris rubrum idæum spirans. *Amm. ruth.* 251.

*Habitat in Sibiria.*

*Habitus P. f. maris, at longe minor. Foliola densius  
 congesta, lobis lateralibus obtusis, profundius serratis.*

33. POLYPODIUM fronde sub-bipinnata lanceolata: *fontanum.*  
 foliolis subrotundis, stipite lævi.

Filicula fontana minor. *Banh. pin.* 358.

*Habitat in Sibiria, Galloprovincia.*

*Habitus P. fragilis, at foliola arctiora, minus profun-  
 de subdivisa, punctis floriferis majoribus, prodeunti-  
 bus non ex squama subrotunda, sed ex rima s. valun-  
 la lineari, oblonga, alba.*

- parafiticum*. 34. **POLYPODIUM** fronde semi-bipinnata lanceolata: lobulis rotundatis integerrimis striatis.  
*Kari-welli-panna. Rheed. mal. 12. p. 35. t. 17.*  
*Habitat in India supra arbores. Osbeck. 41.*  
*Stipes lævis. Foliola lanceolata ad medium pinnatifida, lobis obtusis non serratis substriatis, punctis fructificantibus sparsis.*
- varium*. 35. **POLYPODIUM** fronde lateribus bipinnata: foliolo infimo pinnatifido.  
*Habitat in China. Osbeck.*  
*Stipes hirtus pilis vagis. Frons pinnata: Foliolis lateralibus ad basin pinnatifidis: Pinnæ omnes sessiles argute & tenuissime serratæ. Pinnulæ bases deorsum spectantes juxta stipitem, longiores & semipinnatifidæ, qua nota facillime innotescit. Sic frons apice simpliciter pinnata, lateribus bipinnata, pinnula bases elongata, pinnatifida.*
- crissatum*. 36. **POLYPODIUM** frondibus sub-bipinnatis: foliis ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute serratis.  
*Polypodium fronde duplicato-pinnata: pinnulis obtusis coadunatis crenatis. Fl. succ. 848.*  
*Filix non ramosa major pinnulis latiusculis longioribus in profundos denticulos divisis. Moris. hist. 3. f. 14. t. 3. f. 11.*  
*Habitat in Europa septentrionali.*  
*Florent huic foliola superiora, non inferiora.*
- F. mas.* 37. **POLYPODIUM** fronde bipinnata: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Hort. cliff. 475. Fl. succ. 846. Mat. med. 486. Roy. lugdb. 499. Hall. belv. 139. Dalib. parif. 313.*  
*Filix mas non ramosa dentata. Bauh. pin. 358.*  
*Filix mas. Fuchs. hist. 594.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- F. femina.* 38. **POLYPODIUM** fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Fl. lapp. 386. Fl. succ. 847. Roy. lugdb. 499. Hall. belv. 140. Dalib. parif. 313.*  
*Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus profunde dentatis. Moris. hist. 3. p. 579. f. 14. t. 3. f. 8. Pluk. phys. 180. f. 4.*  
*Habitat in Europæ frigidioris subhumidis.*
- aculeatum*. 39. **POLYPODIUM** fronde bipinnata: pinnis lustratis dentatis, stipite strigoso. *Roy. lugdb. 500. Dalib. parif. 314.*  
*Filix*

*Filix aculeata major.* *Bauh. pin.* 358. *prodr.* 151.

*Habitat in Europa.*

40. POLYPODIUM fronde bipinnata: foliolis pinnis-~~rhætici~~  
que remotis lanceolatis: ferraturis acuminatis.

*Filix rhætica tenuissime denticulata.* *Bauh. hist.* 3. p. 740.

*Filicula fontana major* f. *Adiantum album*, filicis folio.

*Bauh. pin.* 151.

*Habitat in Gallia, Helvetia.*

41. POLYPODIUM fronde bipinnata: pinnis oblongis ~~novboracensis~~  
integerrimis parallelis, stipite lævi.

*Habitat in Canada.* *Kalm.*

*Habitus & structura omnino P. Filicis maris, at pinnae magis approximatae, integerrimae & punctis floriferis minimis copiosissimis; stipis dein laevis est.*

42. POLYPODIUM fronde bipinnata: pinnis basi sinu-~~marginali~~  
ato-repandis, fructificationibus marginalibus.

*Habitat in Canada.* *Kalm.*

*Habitus P. F. maris, sed pinnae oblongae non crenatae, at versus basin obtuse serratae; manifeste distinguitur pinnis ab utroque margine subtus punctis 2. f. 3. majoribus, distinctis, nec pluribus in disco uti F. maris.*

43. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: foliolis re-~~bulbiferum~~  
motis: pinnis oblongis obtulis serratis subtus bulbi-  
feris.

*Polypodium fronde duplicato-pinnata, foliolis oblongis obtulis incisissimis dorso bulbiferis.* *Roy. lugdb.* 500.

*Filix saxatilis canadensium globulifera.* *Pluk. alm.* 150.

*Filix baccifera.* *Corn. canad.* 5. *Morif. hist.* 3. p. 579.

f. 14. t. 3. f. 10.

*Habitat in Canada.*

44. POLYPODIUM fronde bipinnata: foliolis remotis: ~~F. fragile~~  
pinnis subrotundis incisis. *Fl. lapp.* 384. *Fl. suec.* 849.

*Roy. lugdb.* 500. *Dalib. parif.* 312.

*Filix saxatilis, cauliculo tenui fragili.* *Pluk. alm.* 150.

t. 180. f. 5.

*Filix pumila saxatilis.* 2. *Clus. pan.* 706.

*Filix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata.* *Bauh.*

*pin.* 358?

*Habitat in collibus Europae frigidioris.*

45. POLYPODIUM fronde bipinnata: foliolis suboppo-~~regium~~  
titis:

Z z z z

titis:

- sitis: pinnis alternis laciniatis. *Hort. cliff.* 475. *Roy. lugdb.* 500. *Dalb. parif.* 312.  
 Filix regia, fumarie pinnulis. *Vaill. parif.* 52. t. 9. f. 1.  
*Habitat in Gallia.*  
*Fructificationum pulvilli in hoc majores, quam in affinis.*
- leptophyllum.* 46. POLYPODIUM? frondibus bipinnatis: sterilibus brevissimis: pinnis cuneiformibus lobatis. *Magn. monsp.* 5. t. 5.  
*Adiantum minimum*, folio vario. *Magn. monsp.* 5. t. 5.  
*Adiantum filicinum leptophyllum* elatius hispanicum. *Barr. rar.* 1270. t. 431. opt.  
*Habitat in Hispania, Lusitania, Galloprovincia.*
- Bavometz.* 47. POLYPODIUM? frondibus bipinnatis: pinnis pinatifidis lanceolatis ferratis, radicibus lanatis.  
*Habitat in China, unde habui cum radice.*  
*Radix decumbens, crassa, vellere mollissimo densissimo intense flavo obvestita.* Stipites pedales s. sesquipedales, virides, laeves, obsolete angulati. Frons bipinnata: Foliolis oblongis infimis oppositis; reliquis alternis, axillis patulis. Pinnæ lanceolatae, acutæ, pinatifide lobis acutis apice ferratis. Sunt hæ frondes glabræ, nec fructificationem obtinui, sed ex facie hæc retuli.  
 \* *Spinis sparsis aculeata aut arborescencia.*
- arborescens.* 48. POLYPODIUM frondibus bipinnatis ferratis, caudice arboreo inermi.  
 Filix arborescens, pinnulis dentatis. *Plum. fil.* 1. t. 1. amer. 1. t. 1. 2.  
 Filix arborescens, pinnis dentatis. *Pet. fil.* 41. t. 1. f. 1. 2.  
*Habitat in America meridionali.*
- spinosum.* 49. POLYPODIUM frondibus bipinnatis ferratis, caudice arboreo aculeato.  
 Filix arborescens latifolia aculeata. *Plum. amer.* 3. t. 3. fil. 3. t. 3.  
 Filix arborescens, pinnis latis, caudice spinoso. *Pet. fil.* 42. t. 4. f. 1.  
*Habitat in America meridionali.*
- horridum.* 50. POLYPODIUM frondibus supradecompositis integerrimis semi-sagittatis, caudice aculeato.  
 Filix ramosa pinnis latis gladiatis, caudice spinoso. *Pet. fil.* 50. t. 5. f. 1.  
 Filix latifolia ramosa, cauliculis nigris & spinosis. *Plum. amer.* 3. t. 4. *Raj. suppl.* 92.  
*Habitat in America meridionali.*



51. **POLYPODIUM** fronde supradecomposita: pinnis *pyramidale*, terminalibus lanceolatis longissimis serratis, stipite inferne aculeato.  
*Filix ramosa pyramidalis, pinnis parvis. Pet. fil. 40. t. 4. f. 2.*  
*Habitat in America.*
52. **POLYPODIUM** fronde supradecomposita: pinnis *asperum*, obtusis apice serratis: terminalibus acuminatis, caudice arboreo aculeato.  
*Filix arborescens, caudice & caule spinosis. Pet. fil. 47. t. 4. f. 7.*  
*Habitat in America.*
53. **POLYPODIUM** fronde bipinnata: pinnis ovatis *univittatum*, denticulato-spinosis.  
*Filix pinnis aculeatis. Pet. fil. 53. t. 1. f. 6.*  
*Habitat in America.*
54. **POLYPODIUM** fronde bipinnata hirsuta: pinnis ob-*villosum*, longis obtusis: terminalibus acuminatis.  
*Filix dentata, caule & costa villosis. Pet. fil. 52. t. 4. f. 10.*  
*Filix ramosa villosa major, crenis rotundis dentata. Plum. amer. 15. t. 23. fil. 21. t. 27. Raj. suppl. 97.*  
*Filix ramosa major hirsuta, ramulis raris, pinnulis asplenii crebris latis brevibus subrotundis non dentatis. Sloan. jam. 23. hist. 1. p. 100.*  
*Habitat in America.*
55. **POLYPODIUM** fronde bipinnata: pinnis horizon-*decussatum*, talibus integerrimis obtusis: terminalibus lanceolatis.  
*Filix, taxi foliis, major & minor. Pet. fil. 61. 62. t. 2. f. 5. 6.*  
*Habitat in India.*
- \* *Fronde supradecomposita.*
56. **POLYPODIUM** fronde supradecomposita: foliolis *Dryopteris*, ternis bipinnatis. *Fl. suec. 852. Dalib. parif. 314.*  
*Polypodium trifidum, ramis pinnatis: pinnis pinnatifidis. Fl. lapp. 387.*  
*Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. Baub. pin. 358.*  
*Filix pumila saxatilis. Clus. hist. 2. p. 212.*  
*Habitat in Europæ nemoribus.*
57. **POLYPODIUM** fronde supradecomposita pilosa: *spolunca*, foliis lanceolatis pinnatis: pinnis oppositis pinnatifidis.  
*Fl. zeyl. 384.*      Z z z 3      *Filix*

*Filix bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus dentatis, cauliculis mucosa lanugine obductis. Pluk. alm. 155. t. 244. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

*lusitanicum.* 58. **POLYPODIUM** fronde supradecomposita: foliolis alternis: pinnis oblongis longitudinaliter pinnatifidis.  
*Roy. lugdb. 500.*

*Filix lusitanica, polypodii radice. Magn. hort. 79. t. 79.*

*Habitat in Lusitania.*

## ADIANTUM.

\* *Fronde simplici.*

*reniforme.* 1. **ADIANTUM** frondibus reniformibus simplicibus stipitatis multifloris.

*Adiantum monophyllum, foliis asari rotundis. Moris. hist. 3. p. 592.*

*Filix Hemionitis dicta maderensis, foliis asari rotundioribus, crenarum segmentis oblongo quadratis, per ambitum circumcirca reflexis. Pluk. alm. 155. t. 287. f. 5.*

*Hemionitis asari folio. Sloan. jam. 14. hist. 1. p. 15.*

*Habitat in Madera.*

*philippense.* 2. **ADIANTUM** frondibus reniformibus simplicibus alternis petiolatis lobatis multifloris.

*Adiantum philippense, folio rotundo laciniato. Pet. gaz. 8. t. 4 f. 4.*

*Habitat in Philippinis.*

\* *Fronde composita.*

*radiatum.* 3. **ADIANTUM** fronde digitata: foliolis pinnatis: pinnis unifloris.

*Adiantum alis radiatis. Pet. fil. 93. t. 14. f. 3.*

*Adiantum ramosum radiatum. Plum. amer. 33. t. 49.*

*Adiantum nigrum majus non ramosum, surculis e pedunculi summitate tanquam e centro stellæ in modum radiatis. Sloan. jam. 22. hist. 1. p. 95.*

*Adiantum jamaicense, pinnulis auriculatis, ramosum quinis ramulis ex eodem caulis puncto expansis. Pluk. alm. 11. t. 253. f. 3.*

*Lonchitis radiata, polytrichi facie. Plum. fil. 53. t. 100.*

*Trichomanes americanum radiatum. Moris. hist. 3. p. 599. f. 14. t. 4. f. 9.*

*Habitat in Jamaica, Domingo.*

4. **ADIANTUM** fronde pedata: foliolis pinnatis: pin- *pedatum*.  
 nis antice gibbis incisiss fructificantibus.  
*Adiantum* fronde bifida; foliolis alternis pinnatis: pinnis  
 obtusis recurvis superne incisiss multifloris. *Roy. lugdb.*  
 500.  
*Adiantum* fronde supradecomposita bipartita, foliis par-  
 tialibus alternis: foliolis trapeziformibus. *Gron. virg.*  
 123.  
*Adiantum* fruticosum americanum, summis ramulis re-  
 flexis & in orbem expansis. *Pluk. alm.* 10. t. 124. f.  
 2. *Morif. hist.* 3. p. 588. f. 14. t. 5. f. 12.  
*Adiantum* fruticosum brasilianum. *Bauh. pin.* 355.  
*prodr.* 150.  
*Adiantum* americanum. *Corn. canad.* 7. t. 6. *Raj. hist.* 148.  
*Habitat in* Canada, Virginia. 2
5. **ADIANTUM** fronde composita: pinnis tripartitis ob- *trilobum*.  
 tusis incisiss multifloris.  
*Adiantum* triphyllum repens. *Pet. fil.* 100. t. 11. f. 9.  
*Habitat in* America.
6. **ADIANTUM** fronde pinnata: pinnis obtusis obova- *serrulatum*.  
 tis serratis unifloris.  
*Trichomanes* majus nigrum, pinnis leviter dentatis tra-  
 pezii figura. *Sloan. jam.* 17. t. 35. f. 2.  
*Habitat in* Jamaica.
- \* *Fronde decomposita.*
7. **ADIANTUM** frondibus decompositis: pinnis alter- *flabellula-*  
 nis rhombeo rotundatis multifloris, pedunculis supra *tum.*  
 pubescentibus.  
*Adiantum* chinense perelegans ramosum, folio flabel-  
 liformi cum rubedine perfuso. *Pluk. alm.* 11. t. 4.  
 f. 3.  
*Adiantum*, foliis coriandri, ramosum. *Raj. hist.* 1853.  
*Habitat in* China. *Osbeck.*  
*Stipes rami & pedicelli supra canaliculati & ferrugi-*  
*neo villosi.*
8. **ADIANTUM** fronde decomposita, foliis alternis ter- *trifoliatum*,  
 natis linearibus unifloris.  
*Adiantum* clavatum triphyllum *Pet. fil.* 99. t. 11. f. 4.  
*Habitat in* America.
9. **ADIANTUM** fronde decomposita: pinnis alternatis *chusqueensis*.  
 pinnatifidis: lobis inæqualibus.  
*Habitat in* China.

*Frons lanceolata, glabra. Foliola alterna, lanceolata, alternatim pinnata. Pinnæ alternatim pinnatifidæ: lobis lineari-cuneiformibus, incis.*

*Capillus verneris.* 10. **ADIANTUM** frondibus decompositis: foliis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis.

*Adiantum ramis pinnatis, foliis circuli sectorem referentibus. Sauv. monsp. 245.*

*Adiantum foliis coriandri. Baub. pin. 356. Mat. med. 480.*

*Adiantum. Cam. epit. 924.*

*Habitat in Europa australi.*

*pulverulentum.* 11. **ADIANTUM** frondibus bipinnatis: pinnis ovalibus antice truncatis unifloris, caule hirsuto.

*Adiantum mas caule squamoso & pediculo pulverulento. Pet. fil. 84. t. 5. f. 7.*

*Adiantum nigrum ramosum pulverulentum & falcatum. Plum. fil. 22. t. 47. fil. t. 55. Raj. suppl. 100.*

*Habitat in America.*

\* *Fronde supradecomposita.*

*clavatum.* 12. **ADIANTUM** fronde supradecomposita: foliolis alternis: pinnis cuneiformibus integerrimis alternis unifloris.

*Adiantum fronde ramosissima divisa: foliolis linearibus retusis inferne attenuatis. Hort. cliff. 474.*

*Adiantum clavis simplicibus. Pet. fil. 95. t. 14. f. 7.*

*Adiantum minus, foliis in summitate retusis. Plum. amer. 34. t. 50. f. B.*

*Filicula pinnis obtusis. Plum. fil. 101. f. B.*

*Habitat in Dominica.*

*aculeatum.* 13. **ADIANTUM** frondibus supradecompositis: pinnis palmatis multifloris, caule aculeato.

*Adiantum caule fruticoso supra-decomposito aculeato, frondibus palmatis. Hort. cliff. 473.*

*Adiantum frutescens spinosum & repens. Plum. fil. 77. t. 94.*

*Adiantum repens spinosum. Pet. fil. 78. t. 11. f. 6.*

*Filix ramosa major, caule spinoso, pinnulis rotundis profunde laciniatis, cetera foliis. Sloan. jam. 23. hift. 1. p. 99. t. 61.*

*Habitat in Jamaica, Dominica. &*

14. ADI-

14. **ADIANTUM** frondibus supradecompositis: folio-*trapeziformi-*  
lis alternis: pinnis rhombeis incisis utriusque fructifi-  
cationibus.

*Adiantum* fronde alternatim supradecomposita: foliolis  
trapeziformibus acuminatis inciso-crenatis. *Hort. cliff.*  
473. \*

*Adiantum* ramosius, pediculis lucidis & nigris. *Plum. fil.*  
78. t. 95.

*Adiantum* nigrum ramosum maximum, foliis magnis  
trapezii in modum figuratis. *Sloan. jam.* 23. *hist.* 1.  
p. 98. t. 59. *bona.*

*Adiantum* fruticosum, coriandri, folio, jamaicense, pe-  
diculis foliorum politiore nitore nigricantibus. *Pluk.*  
*alm.* 10. t. 254. f. 1.

*Habitat in America meridionali.*

15. **ADIANTUM** frondibus supradecompositis: pinnis *hexagonis*  
sexangularibus emarginatis integerrimis utrinque uni-  
floris.

*Adiantum* pinnis hexagonis furcatis. *Pet. fil.* 94. t. 10.  
f. 2.

*Habitat in America.*

## TRICHOMANES.

\* *Fronde simplici.*

1. **TRICHOMANES** fronde simplici oblonga lacera. *membranaceis.*  
*Darea americana* lichenoides. *Pet. mus.* 763.

*Phyllitis* scandens minima, molci facie, foliis membra-  
naceis subrotundis. *Sloan. jam.* 15. *hist.* 1. p. 74. t.  
27. f. 1. *Meris. hist.* 13. p. 558. *Raj. suppl.* 53.

*Habitat in America.*

*Confer* *Adiantum* membranaceum lichenoides: *Pet. fil.*  
101. t. 13. f. 5. *Filix* *Hemionitis* *Lichenoides* ame-  
ricana auricularis c. *Salpini* *amula*, radice repente.  
*Pluk. phyt.* 285. f. 3.

2. **TRICHOMANES** frondibus pinnatifidis lanceolatis: *crispum.*  
pinnis parallelis subserratis.

*Trichomanes* fronde lanceolato-pinnata: pinnis sessili-  
bus parallelis subserratis. *Hort. cliff.* 476.

*Polypodium* *crispum* calyciferum. *Plum. fil.* 67. t. 86.

*Darea* filicis maris facie. *Pet. fil.* 103. t. 11. f. 8.

*Habitat in Martinica.*

polypodioides.

3. TRICHOMANES fronde lanceolata pinnatifida repanda, floribus solitariis terminalibus.

*Habitat in India.*

Frons *digiti longitudine & latitudine, pinnatifida ferme ad costam, lobis lanceolatis, obtuse serratis, apice acutis, & unico flore in singuli lobi apice instructis.*  
Frons *insuper pellucida venis alternis.*

\* *Fronde composita.*

bifurcatum.

4. TRICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis alternis pinnatifidis pilosis.

Filicula digitata. *Plum. spec. 13. fil. t. 50. t. B.*

Darea americana major pubescens. *Pet. mss. 762.*

Dareæ affinis digitata. *Pet. fil. 105. t. 15. f. 5.*

*Habitat in America.*

pyxidiferum.

5. TRICHOMANES frondibus sub-bipinnatis: pinnis alternis confertis lobatis linearibus.

Filix pyxidifera. *Plum. fil. 74. t. 50.*

Dareæ tunbrigensis facie. *Pet. fil. 104. t. 13. f. 13.*

*Habitat in America.*

tunbrigense.

6. TRICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis lobatis oblongis crenulatis.

Adiantum pettæum perpussilum anglicum, foliis bifidis trifidisque. *Raj. angl. 3. p. 123. suppl. 77.*

Adiantum radicosum humisparsum, f. Filicula pellucida nostras, coriandri foliis mollicellis, globuliferum. *Pluk. alm. 10. t. 3. f. 5. & 6.*

Darea tunbrigensis minor. *Pet. mss. 761.*

Museus montanus italicus, adianti foliis. *Bocc. mss. 2. p. 24. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Anglia, Italia.*

adiantoides.

7. TRICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis ensiformibus acuminatis inciso-serratis: serraturis bifidis.  
*Fl. zeyl. 385.*

Adiantum africanum rutæ murariæ æmulum, segmentis longioribus acutis. *Pluk. alm. 10. t. 123. f. 6.*

Filix non-ramosa zeylanica, foliis adianti in modum serratis. *Burm. zeyl. 97. t. 43.*

*Habitat in India, Africa.*

\* *Fronde supradecomposita.*

scandens.

8. TRICHOMANES frondibus supradecompositis: foliolis alternis: pinnis alternis oblongis serratis.

Adi-

*Adiantum scandens ramosissimum*, laciniis retusis dissectum. *Plum. fil.* 76. t. 93.

*Darcia ramosissima scandens*. *Pet. fil.* 102. t. 12. f. 5.  
*Habitat in America.*

9. TRICHOMANES fronde supra-decomposita, foliis <sup>chinens.</sup> pinnisque alternis lanceolatis: foliolis laciniis cuneiformibus.

*Habitat in China. Osbeck.*

Radix vix villosa. Stipes levis, antice subcanaliculatus sed margine obtuso, nec marginato ut in sequenti. Frons lanceolata, pedalis ex foliis alternis, lanceolatis. Folia alterna, alternatim pinnata. Pinnæ alternatim pinnatifidæ segmentis cuneiformibus, alternis, sapius bifloris.

10. TRICHOMANES fronde supradecomposita tripar-<sup>canariens.</sup> tita: foliolis alternis: pinnis alternis pinnatifidis.

Filix ramosa canariensis, rutæ murariæ pinnulis angustis altius incisus mediæ costæ alternatim alligatis. *Pluk. alm.* 156. t. 291. f. 2.

*Habitat in Canariis, Lusitania, ad latera montium.*

11. TRICHOMANES fronde supradecomposita: pin-<sup>capillaceum.</sup> nis filiformibus linearibus unifloris.

*Adiantum capillaceum*. *Plum. fil.* 83. t. 99. *Pet. fil.* 96. t. 10. f. 7.

*Habitat in America.*

## MARSILEA.

1. MARSILEA foliis oppositis simplicibus.

*Salvinia vulgaris* aquis innatans, foliis subrotundis punctatis late virentibus. *Mich. gen.* 107. t. 58.

*Lenticula palustris latifolia punctata*. *Baub. pin.* 362.

*Lens palustris patavina*. *Baub. hist.* 3. p. 785.

*Habitat in Italiæ fossis paludosis stagnantibus lente fluentibus.*

2. MARSILEA foliis quaternatis.

*Lemma*. *Juss. act.* 1740. p. 263. *Guett. stamp.* 1. p. 62.

*Lenticula palustris quadrifolia*. *Baub. pin.* 362. *Mapp. alsat.* 166. t. 166.

*Lens palustris quadrifolia*, *Baub. hist.* 3. p. 789. *Morff. hist.* 3. p. 619. f. 15. t. 4. f. 5.

*Lens*

*Lens palustris altera. Cam. epit. 853.*

*Habitat in Indiæ, Sibiria, Gallia, Alsatia fossis.*

*Genus distinguam, dum pracedens (1) fuerit examinata.*

## PILULARIA.

### globulifera. 1. PILULARIA.

*Pilularia palustris juncifolia. Vaill. parif. 159. t. 15. f. 6. Dill. musc. 538. t. 79. f. 1. Juss. arb. 1739. p. 240. t. 11.*

*Graminisfolia palustris repens, vasculis granorum piperis æmulis. Raj. hist. 1325. angl. 3. p. 136. Moris. hist. 3. p. 608. f. 15. t. 7. f. 49.*

*Gramen piperinum. Pet. herb. t. 19. f. 8.*

*Muscus aureus capillaris palustris, inter folia folliculis rotundis quadripartitis. Pluk. alm. 246. t. 48. f. 1.*

*Habitat in Europæ inundatis.*

## ISOËTES.

*lacustris.*

### 1. ISOËTES! *It. scan. 417. t. 419. Nov. gen. 1109.*

*Marsilea foliis subulatis femicylindricis articulatis. Fl. succ. 996.*

*Calamaria folio longiore & graciliore. Dill. musc. 541. t. 80. f. 2.*

*Subularia lacustris f. Calamistrum herba aquatica alpina.*

*Raj. angl. 1. p. 210. t. 210.*

*Habitat in Europæ frigida fundo lacuum.*

## MUSCI.

### LYCOPodium.

*linifolium.*

### 1. LYCOPodium foliis alternis remotis lanceolatis, floribus axillaribus.

*Selago linariae foliis. Dill. musc. 440. t. 57. f. 5.*

*Muscus maximus, linariae foliis. Plum. fil. 144. t. 166. f. C. b.*

*Habitat in America meridionali.*

*nudum.*

### 2. LYCOPodium foliis oppositis, spicis terminalibus: floribus distantibus.

*Lycopodioides frutescens, spicis laxis nudis. Dill. musc. 468. t. 64. f. 4.*

*Muscus frutescens, fructu tricapsulari. Plum. fil. 145. t. 170. f. A. A.*

*Habitat in Indiis.*

*Cau-*



*Caulis erectus, fere lignosus, tetragonus. Folia minima, acuta, remotissima, opposita. Rami terminales, dichotomi, triquetri, erecti. Pedunculi brevissimi, alterni, laterales, uniflori, apice bidentati, in cujus bifurcatūra Anthera sessilis, rotundo-tricocca, trilocularis, polline foeta.*

3. **LYCOPodium** foliis verticillato-quaternis, spicis *Phlegmaria*, terminalibus dichotomis.

*Lycopodium erectum dichotomum, foliis cruciatis, spicis gracilioribus. Dill. musc. 450. t. 61. f. 5. Fl. zeyl. 386. \**

*Selago indiæ orientalis f. Phlegmaria admirabilis zeylanica. Breyer. cent. 186. t. 92. Raj. hist. 1582. suppl. 655.*

*Tana-pouel paatia maravara. Rheed. mal. 12. p. 27. t. 14.*

*Habitat in Malabar, Zeylona.*

4. **LYCOPodium** foliis sparsis filamentosis, spicis *clavatum*, teretibus pedunculatis geminis.

*Lycopodium caule repente, foliis patulis, pedunculis spica gemina terminatis. Fl. lapp. 418. Fl. succ. 859. Hort. cliff. 476. Mat. med. 488. Roy. lugdb. 506. Hall. helv. 92. Dalib. parif. 339.*

*Lycopodium vulgare pilosum anfragosum & repens. Dill. musc. 441. t. 58. f. 1.*

*Muscus terrestris clavatus. Bauh. pin. 360.*

*Habitat in Europæ sylvis muscosis.*

5. **LYCOPodium** foliis sparsis filamentosis, spicis *rupestre*, terminalibus tetragonis.

*Lycopodium spica sessili tetragona, squamis carinatis mucronatis. Amæn. acad. 2. p. 337.*

*Lycopodium rupestre pilosum & incanum, spicis acute quadrangulis. Dill. musc. 457. t. 63. f. 11.*

*Muscus rupestris repens virginianus, clavis foliolis erectis quadratis. Pluk. alm. 248. t. 100. f. 2. Morisf. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5 f. 4. Raj. suppl. 32.*

*Habitat in Virginia, Canada, Sibiria.*

6. **LYCOPodium** foliis sparsis ciliatis lanceolatis, spicis *Selaginoides*, solitariis terminalibus foliosis.

*Lycopodium spicis solitariis sessilibus, foliis aculeato-ciliatis, capsulis tetraspermis. Fl. succ. 863. \**

Ly-

*Lycopodium caule repente, ramis spica foliis parula instructis* *Fl. lapp.* 421.

*Selaginoides foliis spinosis.* *Dill. musc.* 460. t. 88. f. 1

*Habitat in Europæ pascuis muscosis.*

*alopecuroides.*

7. **LYCOPODIUM** foliis sparsis ciliatis linearibus, spicis terminalibus foliosis.

*Lycopodium ramis reflexis, apicibus radicatis: foliolis subulatis basi ciliatis.* *Hort. cliff.* 476.

*Lycopodium terrestre repens, caule rotundo foliis dense oblito, radices ad summum emittens & se late propagans.* *Gron. virg.* 126.

*Lycopodium alopecuroides, flagellorum extremitatibus radicosis.* *Dill. musc.* 464. t. 62. f. 8.

*Muscus terrestris repens virginianus humi diffusus, viticulis longioribus, foliolis tenuibus vestitis.* *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 12. *Raj. suppl.* 32.

*Habitat in Virginia, Cahada.*

*inundatum.*

8. **LYCOPODIUM** foliis sparsis integerrimis, spicis terminalibus foliosis.

*Lycopodium caule repente, spicis solitariis sessilibus foliosis, foliolis lævibus.* *Fl. succ.* 862. *Dalib. parif.* 340.

*Lycopodium palustre repens, clava singulari.* *Vaill. parif.* 123. t. 16. f. 11. *Dill. musc.* 452. t. 62. f. 7.

*Habitat in Europæ inundatis.*

*Selago.*

9. **LYCOPODIUM** foliis sparsis octifariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis.

*Lycopodium caule erecto dichotomo.* *Fl. lapp.* 420. *Fl. succ.* 857. *Mat. med.* 487. *Hort. cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506.

*Selago vulgaris abietis rubræ facie.* *Dill. musc.* 435. t. 56. f. 1.

*Muscus erectus ramosus saturate viridis.* *Bauh. pin.* 360.

*Muscus erectus abietiformis.* *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 5. t. 5. f. 9.

*Habitat in Europæ borealis sylvis acerosis.*

*obscurum.*

10. **LYCOPODIUM** foliis sparsis decurrentibus, sarmentis repentibus, furculis erectis dichotomis.

*Lycopodioides radiatum dichotomum.* *Dill. musc.* 274. t. 67.

*Habi-*

*Habitat in Philadelphia.*

Sarmenta erecta, dichotoma at non fastigiata: ramis lateralibus scilicet brevioribus. Folia sparsa at tamen rariora, sita indeterminato, glabra, rigidiuscula, linearia, acuta, basi decurrentia s. adnata cauli, deinde paula. Fructificatio neque a me visa fuit.

11. **LYCOPODIUM** foliis sparsis quinquefariis subser-<sup>anbotinum.</sup> ratis, furculis annotino-articulatis, spicis terminalibus glabris erectis.

*Lycopodium caule erecto, spica glabra terminali. Fl. lapp. 419. Fl. succ. 858. Hall. belv. 93.*

*Lycopodium elatius juniperinum, clavis singularibus sine pediculis. Dill. musc. 455. t. 63. f. 9.*

*Muscus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus sine pediculis. Moris. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 3.*

*Muscus terrestris repens, clavis singularibus erectis.*

*Pluk. alm. 248. t. 258. f. 5.*

*Habitat in Europæ nemoribus.*

12. **LYCOPODIUM** foliis sparsis curvatis, caule ramo-<sup>cernuum.</sup> tissimo, spicis nutantibus.

*Lycopodium erectum ramosissimum, spicis ovatis sessilibus nutantibus. Fl. zeyl. 387.*

*Lycopodium frutescens capillaceum crispum, spicis brevibus nutantibus. Dill. musc. 456. t. 63. f. 10.*

*Lycopodium zeylanicum erectum ramosissimum. Burm. zeyl. 144. t. 66.*

*Muscus zeylanicus erectus perpetuo virens, in arboris proceritatem excrescens. Pluk. alm. 257. t. 47. f. 9.*

*Muscus zeylanicus terrestris clavatus erectus. Moris. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 6.*

*Muscus clavatus erectus, crispatis foliolis. Pluk. alm. 149. t. 431. f. 3.*

*Muscus maximus, coridis folio, viticulis late ramosis.*

*Plum. fil 144. t. 165.*

*Bellon-patlia. Rheed. mal. 12. p. 73. t. 39.*

*Habitat in Indis.*

13. **LYCOPODIUM** foliis sparsis imbricatis, ramulis *Bryopteris* convolutis.

*Lycopodioides squamosum hirsutum: extremitatibus convolutis. Dill. musc. 472. t. 66. f. 11.*

*Muscus erectus indicus platyceros nlicem referens.*

*Moris. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 7. f. 51.*

Mu-

*Muscus filicinus elegans* f. *Bryopteris*. *Pluk. alm.* 247.  
t. 100. f. 3. *Raj. suppl.* 32.  
*Habitat in India.*

*sanguinolentum.* 14. *LYCOPODIUM* foliis quadrifariis imbricatis, caulibus repentibus dichotomis, spicis sessilibus tetragonis. *Amœn. acad.* 2. p. 363. f. 26. \*

*Habitat in Camtschatca.*

*alpinum.* 15. *LYCOPODIUM* foliis quadrifariam imbricatis acutis, furculis erectis dichotomis, spicis sessilibus teretibus.

*Lycopodium caule repente, ramis tetragonis. Fl. lapp.* 417. t. 91. f. 6. † *Fl. succ.* 861. \* *Hort. cliff.* 476.  
*Roy. lugd.* 506. *Hall. belv.* 93. 445.

*Lycopodium sabinæ facie. Dill. musc. t. 58. f. 2.*

*Muscus clavatus, foliis cupressi. Raj. hist.* 121.

*Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ,*

*complanatum.* 16. *LYCOPODIUM* foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis.

*Lycopodium caule repente, ramis triquetrop-lanis. Fl. lapp.* 416. *Fl. succ.* 860. \*

*Lycopodium sabinæ facie. Dill. musc.* 445. *synonyma.*

*Muscus clavatus, foliis cupressi. Baub. pin.* 360.

*Muscus terrestris ramosus pulcher. Baub. hist.* 3. p. 759.

*Lycopodium digitatum, foliis arboris vitæ, spicis bigemellis teretibus. Dill. musc.* 448. t. 59. f. 3.

*Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis sylvis acerosis.*

*Confer. Lycopodium altissimum, spicis bigemellis quadrangulis. Dill. musc.* 449. t. 60. f. 4.

*carolinianum.* 17. *LYCOPODIUM* foliis bifariis patulis: superficialibus solitariis, scapis longissimis monostachyis.

*Lycopodium pinnatum repens, spicis & pediculis singularibus longis. Dill. musc.* 452. t. 62. f. 6.

*Habitat in Carolina.*

*helveticum.* 18. *LYCOPODIUM* foliis bifariis patulis: superficialibus distichis, spicis geminis pedunculatis.

*Lycopodioides denticulatum pulchrum repens, spicis pediculis insidentibus. Dill. musc.* 465. t. 64. f. 2.

*Lycopodioides foliis ellipticis alterne majoribus. Hall. belv.* 93.

*Muscus denticulatus major. Baub. pin.* 360.

Mu-

*Muscus repens*, foliis alternis subrotundis per siccitatem  
falcatis. *Morif. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 34.

*Habitat in Alpibus Helvetiæ.*

19. **LYCOPODIUM** foliis bifariis: alternis minoribus, *apodum.*  
caule repente, spicis sessilibus.

*Lycopodioides denticulatum pulchrum repens*, spicis a-  
podibus. *Dill. musc.* 467. t. 64. f. 3.

*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.*

20. **LYCOPODIUM** foliis bifariis: superficialibus di-*stichis*, caule erecto tereti. *stichis*, caule erecto tereti.

*Lycopodioides dentatum erectum filicinum*, caule te-  
reti ramosissimum. *Dill. musc.* 468. t. 65. f. 5.

*Muscus squamosus erectus*. *Plum. amer.* 35. t. 24. fil.  
t. 43. *Raj. suppl.* 31.

*Habitat in America calidiore.*

21. **LYCOPODIUM** foliis bifariis: superficialibus di-*stichis*, caule erecto canaliculato. *stichis*, caule erecto canaliculato.

*Lycopodioides erectum filicinum*, pinnulis acaciæ, cau-  
le sulcato. *Dill. musc.* 469. t. 65. f. 6.

*Muscus denticulatus major ex Cera.* *Pluk. amaltb.*  
*app.* t. 453. f. 8.

*Habitat in Amboina.*

22. **LYCOPODIUM** foliis bifariis patentibus: superfi-*cialibus distichis*, furculis erectiusculis, spicis termi-  
nalibus tetragonis. *cialibus distichis*, furculis erectiusculis, spicis terminalibus tetragonis.

*Lycopodioides dentatum dichotomum rigidum minus.*  
*Dill. musc.* 471. t. 66. f. 10.

*Muscus squamosus repens*. *Plum. amer.* 36. t. 24. fil.  
43. *Raj. suppl.* 31.

*Planta muscosa & plumosa guyanensis perelegans minor.*  
*Breyn. cent.* 1. p. 194. t. 101.

*Habitat in Indiis.*

*Confer.* *Lycopodioides dichotomum taxiforme.* *Dill.*  
*musc.* 471. t. 66. f. 9.

*Lycopodioides dentatum dichotomum rigidum minus.*  
*Dill. musc.* 471. t. 66. f. 11.

*Lycopodioides Lonchitidis auriculatis foliis.* *Dill. musc.*  
470. t. 66. f. 8.

3. **LYCOPODIUM** foliis bifariis patentibus: superfi-*cialibus distichis*, furculis repentibus, spicis sessilibus. *ornithopodioides.*

*Lycopodium procumbens repens*, ramis subspicatis, folio-  
lis

A a a a

lis distichis alternis ovatis appendiculatis. *Fl. zeyl.* 388.

*Lycopodioides repens*, pinnulis ornithopodii. *Dill. musc.* 464. t. 66. f. 1. B.

*Muscus lycopodioides denticulatus scandens repensve*, in extremitatibus ramulorum polyspermos. *Raj. supp.* 32.

*Habitat in India.*

denticulatum.

24. *LYCOPodium* foliis bifariis: superficialibus imbricatis, furculis repentibus, floribus sparsis.

*Lycopodioides imbricatum repens.* *Dill. musc.* 462. t. 66. f. 1. A

*Muscus denticulatus minor.* *Bauh. pin.* 360.

*Muscus terrestris lusitanicus.* *Clus. hist.* 2. p. 249.

*Habitat in Lusitania, Hispania, Iberia.*

### PORELLA.

pinnata.

1. *PORELLA*. †

*Porella pinnis obtusis.* *Dill. musc.* 459. t. 68. f. 1.

*Habitat in Pennsylvania.*

*Hanc neque ego vidi, nec eam in solo natali investigare potuit D. Kalm.*

### SPHAGNUM.

palustre.

1. *SPHAGNUM* ramis deflexis. *Fl. lapp.* 415. *Fl. suec.* 864.

*Sphagnum palustre molle deflexum*, squamis cymbiformibus. *Dill. musc.* 240. t. 32. f. 1.

*Muscus palustris in ericetis nascens.* *Pluk. phyz.* 101. f. 1. *Vaill. paris.* 139. t. 23. f. 3.

β. *Sphagnum palustre molle deflexum*, squamis capillaris. *Dill. musc.* 243. t. 32. f. 2.

*Habitat in Europæ paludibus profundis sylvaticis.*

alpinum.

2. *SPHAGNUM* subramosum erectum.

*Sphagnum subulatum viridissimum*, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 245. t. 32. f. 3.

*Habitat in Angliæ summis alpium paludibus.*

### PHASCUM.

acaulon.

1. *PHASCUM* acaule, anthera sessili.

*Sphagnum acaulon bulbiforme majus.* *Dill. musc.* 251. t. 32. f. 11.

Mu

- Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Pet. gaz.*  
126. t. 95. f. 14.
- β. Sphagnum acaulon bulbiforme minus. *Dill. musc.* 252.  
t. 32. f. 12.
- Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill. parif.*  
128. t. 27. f. 2.
- Habitat in Europæ agris, hortis & ad fossas.*
- Confer Sphagnum acaulon maximum, foliis in centro  
ciliaribus. *Hall itin. alp.* 83. t. 1. *Dill. musc.* 253.  
t. 32. f. 13.
- Sphagnum acaulon trichodes. *Dill. musc.* 251. t. 32. f. 10.
- Muscus trichodes minor acaulos, capillaceis fo-  
liis. *Vaill. parif.* 128. t. 29. f. 4.
- PHASCUM caulescens erectum. *caulescens.*  
Sphagnum foliis tenuibus gramineis pellucidis. *Dill.*  
*musc.* 550. t. 85. f. 15.
- Habitat in Pennsylvania.*
- PHASCUM caulescens repens. *repens.*  
Sphagnum vermiculare repens, capsulis intra foliorum  
squamosorum alas minimis. *Dill. musc.* 550. t. 85. f.  
16.
- Habitat in arborum truncis.*

## FONTINALIS.

- FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis a- *antipyretica*  
cutis, antheris lateralibus. *Fl. succ.* 866.
- Fontinalis capitulis lateralibus. *Roy. lugdb.* 506.
- Fontinalis triangularis major complicata e foliorum alis  
capsulifera. *Dill. musc.* 254. t. 33. f. 1.
- Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens.  
*Vaill. parif.* 140. t. 33. f. 5.
- Muscus aquaticus, terrestri vulgari similis, major. *Buxb.*  
*cent.* 3. p. 39. t. 69. f. 2.
- Muscus aquaticus, viticulis longis minus ramosis luci-  
dis. *Morif. bist.* 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 32.
- Muscus aquaticus denticulatus. *Læf. pruss.* 173. t. 52.
- Habitat in Europæ fluviis.*
- FONTINALIS foliis ovatis concavis trifariis acutis, *minor.*  
antheris terminalibus.
- Fontinalis triangularis minor carinata, e cymis capsulife-  
ra. *Dill. musc.* 257. t. 33. f. 2.
- Fontinalis capitulis terminalibus. *Roy. lugdb.* 506.

A a a a a

Habi-

*Habitat in Europæ fluviiis.*  
*Præcedenti nimis affinis.*

- squamosa.* 3. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capitulis lateralibus.  
 Fontinalis squamosa tenuis sericea atrovirens. *Dill. musc.* 250. t. 33. f. 3.  
 Fontinalis minor lucens. *Baub. hist.* 3. p. 778.  
*Habitat in Britannia, Gallia.*

- pennatum.* 4. FONTINALIS foliis bifariis patentibus, capsulis lateralibus.  
 Sphagnum pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. t. 32. f. 9.  
 Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Vaill. parif.* 129. t. 27. f. 4.  
*Habitat in Helvetiæ arboribus.*  
*Confer SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina*  
*+ squamosa. Dill. musc.* 250. t. 32. f. 8. 1. *pilosa.*  
 SPHAGNUM pennatum undulatum, vagina  
 pilosa. *Dill. musc.* 249. t. 32. f. 7. 1. *planum*

## SPLACHNUM.

- rubrum.* 1. SPLACHNUM umbraculo convexo. *Amæn. acad.* 2. p. 272. t. 3. f. 2. \*  
 Muscus norvegicus, umbraculo ruberrimo insignitus.  
*Pet. musc.* 70. t. 1. f. 10. *Dill. musc.* 547. t. 83. f. 9.  
 Muscus coronatus norvegicus, pediculo longissimo, umbraculo amplo. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 10.  
*Habitat in Norvegia, Finlandia, Russia, Sibiria.*
- intenum.* 2. SPLACHNUM umbraculo plano. *Amæn. acad.* 2. p. 277. t. 3. f. 1. \*  
*Habitat in Sueciæ paludibus sylvaticis.*
- ampullaceum.* 3. SPLACHNUM umbraculo ampullaceo clauso. *Amæn. acad.* 2. p. 280.  
 Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo striatiore. *Dill. musc.* 343. t. 44. f. 3.  
 Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. *Vaill. parif.* 130. t. 26. f. 4.  
 Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminatis etc. Etis mutuo incubitu adnatis. *Pluk. alm.* 246. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 16. f. 10.

Me



*Muscus capillaceus, capitulis pyriformibus tubulosis.*

*Buxb. cent. 2. p. 1. t. 1. f. 1.*

*Habitat in Europæ frigidioris paludibus sylvaticis.*

### POLYTRICHUM.

1. **POLYTRICHUM** caule simplici (*Fl. lapp. 395.*) an- *communis.*  
thera parallelepipedæ. *Fl. succ. 868. Dalib. paris. 316.*  
*Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis serratis. Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.*  
*Polytrichum aureum majus. Baub. pin. 356.*  
*Muscus juniperifolius, capitulo quadrangulo. Vaill. paris. 131. t. 23. f. 8.*
- β. *Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.*  
*Polytrichum aureum medium. Baub. pin. 356.*  
*Muscus coronatus humilis. Moris. bist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 6. 8.*  
*Muscus erectus, juniperi folio glauco. Vaill. paris. 131. t. 23. f. 6.*
- γ. *Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. Dill. musc. 426. t. 54. f. 3.*  
*Habitat in Europæ α. uliginosis, β. pascuis, γ sterilissimis. 2*
2. **POLYTRICHUM** caule ramosissimo, pedunculis *alpinis*, terminalibus.  
*Polytrichum alpinum ramosum, capsulis e summitate ellipticis. Dill. musc. 427. t. 55. f. 4.*  
*Habitat in Alpibus Helvetiæ, Snowdon.*
3. **POLYTRICHUM** caule ramosissimo, pedunculis *arnigeris*, axillaribus.  
*Polytrichum caule ramoso, capsulis basi destitutis apophysi. Fl. succ. 870. Dalib. paris. 315.*  
*Polytrichum ramosum setis ex alis urnigeris. Dill. musc. 427. t. 55. f. 5.*  
*Muscus ramosus erectus, calyptra villosa. Vaill. paris. 131. t. 28. f. 13.*  
*Habitat in Europa, Jamaica.*

### MNIUM.

1. **MNIUM** caule simplici, foliis ovatis. *Fl. succ. 911. pallidum.*  
*Mnium serpilli foliis tenuibus pellucidis. Dill. musc. 232. t. 31. f. 2.*  
*Bryum alternans calyptra variegata & scyphulis foliosis. Hall. helv. 118. t. 4. f. 8.*

A a a a 3

Mu-

*Muscus coronatus minimus*, capillaceis foliis, capitulis oblongis *Vaill. parif.* 130. t. 24. f. 7.

*Habitat in Europæ pascuis succulentis umbrosis.*

*fontanum.* 2. **MNIUM** caule simplici geniculis inflexo. *Fl. lapp.* 414. *Fl. succ.* 913.

*Bryum palustre*, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. musc.* 340. t. 44. f. 2.

*Muscus capillaceus tenuissimus*, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiore. *T. Vaill. parif.* 134. t. 24. f. 10.

*Muscus trichodes palustris erectus coronatus*, capitulis sphaericis amplioribus. *Morif. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 8.

*Muscus parvus stellaris.* *Pluk. alm.* 255. t. 47. f. 6.

*Habitat in Europa ad fontes paludosos frigidos.*

*palustre.* 3. **MNIUM** caule dichotomo, foliis subulatis. *Fl. lapp.* 413. *Fl. succ.* 912.

*Mnium majus*, ramis longioribus bifurcatis. *Dill. musc.* 233. t. 31. f. 3.

*Muscus palustris erectus flavescens*, capillaceo folio. *Vaill. parif.* 135. t. 24. f. 1.

*Muscus palustris*, flagellis erectis luteolis raro divisis, capitulis oblongis adianti. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 6. f. 9.

*Muscus stellaris ramosus palustris*, pediculo aureo erecto, capitulo magno sphaerico. *Buxb. cent.* 1. p. 45. t. 65. f. 1. 2. 3. 4.

*Habitat in Europæ paludibus.*

*androgynum* 4. **MNIUM**, caule ramoso, androgynum. *Fl. succ.* 910. *Mnium perangustis & brevibus foliis.* *Dill. musc.* 230. t. 31. f. 1.

*Bryum angustiori folio*, capsula longa pyriformi inclinata. *Hall. helv.* 114.

*Muscoides: muscus capillaris minimus*, capitulo minimo pulverulento. *Vaill. parif.* t. 29. f. 6.

*Muscus trichodes parvus*, capitulo glomerato s. botryoide. *Mich. gen.* 108. t. 59. f. 8. H. K.

*Muscus coronatus humilis minimus*, foliolis pediculis & capitulis minimis erectis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 20.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*hygrometricum.* 5. **MNIUM** acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona.

Brj-

- Bryum* capsula nutante turbinato-ovata, calyptra reflexa quadrangulari. *Fl. suec.* 903. *Dalib. paris.* 324.
- Bryum* bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 407. t. 52. f. 75.
- Muscus* foliis scutellatis, capitulo pyriformi nutante. *Vaill. paris.* 135. t. 26. f. 16.
- Muscus* coronatus minor, foliolis latiusculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtusis aureis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 17.
- Habitat in Europæ sylvis apricis sterilibus.*
6. **MNIUM** caule dichotomo: axillis pedunculiferis, antheris ~~purpureis~~ erectis, foliis carinatis.
- Bryum* capsula erectiuscula oblonga, caulium divisuris pedunculiferis: summitatibus stellatis, foliis carinatis. *Fl. suec.* 896. *Dalib. paris.* 325.
- Bryum* tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.* 386. t. 49. f. 51.
- Muscus* trichodes parvus, foliis musci vulgaris, capitulis longis acutis. *Morif. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 4. 16.
- Habitat in Europæ pascuis.*
7. **MNIUM** antheris erectis, operculis filiformibus longitudine capitulorum. ~~setaceum.~~
- Bryum* stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc.* 381. t. 48. f. 44.
- Habitat in Europæ muris, aggeribus, sepibus.*
- Caules erecti, brevissimi. Pedunculi atropurpurei, flexuosi, Antheræ cylindricæ, lividæ. Opercula & Calyptræ filiformes, longiores & angustiores, quam in reliquis.
8. **MNIUM** foliis arefactione revolutis. ~~cirratum.~~
- Bryum* cirratum & stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. musc.* 379. t. 48. f. 42.
- Muscus* muralis minimus roseus stellaris. *Vaill. paris.* 130. t. 24. f. 8.
- Habitat in Europæ sylvis & ad sepes.*
9. **MNIUM** foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, anthera nutante. ~~anthodium.~~
- Bryum* annotinum lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis. *Dill. musc.* 399. t. 50. f. 68.
- Habitat in Europæ humidiusculis.*

*hornum.*

10. MNIUM antheris pendulis, pedunculo curvato, furculo simplici, foliolis margine scabris.  
 Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.  
 Muscus capillaceus major stellatus. *Vaill. parif.* 2. 24. f. 4. 5.  
 Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus raris pallide viridantibus et vix pellucidis. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 3. 4.  
*Habitat in Europæ sylvis, aggeribus.*

*crundum.*

11. MNIUM antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis.  
 Bryum capsulis pendulis, calyptra recurvata, foliis subulatis acutis integerrimis, caule simplicissimo. *Fl. succ.* 907.  
 Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 51. f. 79.  
*Habitat in sylvis & declivitatibus.*

*pyriforme.*

12. MNIUM antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis fetiferis.  
 Bryum antheris nutantibus turbinatis, foliis ensiformibus nitidis. *Fl. succ.* 902.  
 Bryum trichodes aureum, capitulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 391. t. 50. f. 60.  
*Habitat in Europæ rupibus.*

*Polytrichoides.*

13. MNIUM calyptra villosa.  
 Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galeritis, aloes folio non serrato. *Dill. musc.* 428. t. 55. f. 6. *Dalib. parif.* 315.  
 Muscus capillaceus minor, calyptra tomentosa. *Vaill. parif.* 131. t. 26. f. 15.  
 Muscus coronatus rigidus minor & humilior, capitulis villosis brevioribus. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 7.  
 β. Polytrichum parvum, aloes folio serrato, capsulis oblongis. *Dill. musc.* 429. t. 55. f. 7.  
 Adiantum aureum medium, in ericetis proveniens. *Vaill. parif.* 131. t. 29. f. 11.  
 Muscus, adianti aurei facie, humilis, capitulo rotundo turgido, calyptra villosa incana. *Buxb. cent.* 1. p. 43. t. 63. f. 1.  
 γ. Polytrichum acaulon capillaceum, capsulis cylindricis. *Dill. musc.* 434. t. 55. f. 12.  
*Habitat in Europæ ericetis subnatis..*

14. **MNIUM** pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *serpyllifolium*.
- α. **Mnium** pedunculis aggregatis foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis.
- Bryum** capsulis nutantibus, foliis subovatis obtusis pellucidis punctatis, caulibus sterilibus procumbentibus, pedunculis aggregatis. *Fl. suec.* 901. *Dalib. paris.* 323.
- Bryum** caule procumbente, foliis alternis ovatis pellucidis. *Fl. lapp.* 404.
- Bryum** pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 81.
- Muscus** folio lato subrotundo, capitulo singulari nutante, pediculo longo subrubenti insidente. *Vaill. paris.* 136. t. 26. f. 5.
- Muscus** polytrichoides palustris major, serpilli latioris folio pellucido. *Morif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 39. 40.
- β. **Mnium** pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis sercuspidatum.
- Bryum** pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.
- Muscus** palustris, foliis subrotundis. *Vaill. paris.* 26. f. 18.
- Muscus** polytrichoides pellucidus fere, foliis denticulatis ad margines veluti crispis. *Pluk. alm.* 257. t. 98. f. 8.
- γ. **Mnium** pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis proliferum, lanceolatis acutis.
- Bryum** stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 411. t. 52. f. 77.
- Muscus** stellaris roseus. *Bauh. pin.* 361. *prodr.* 151. *Buxb. cent.* 2. p. 2. t. 1. f. 3.
- Muscus** coronatus humilis, foliolis latioribus stellatim nascentibus donatus. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 9.
- δ. **Mnium** pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis.
- Bryum** caule adscendente, foliis ovato-oblongis patulis pellucidis. *Fl. lapp.* 399. *Roy. lugdb.* 502. *Guett. stamp.* 90. *Dalib. paris.* 324.
- Bryum** dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 410. t. 52. f. 76.
- Muscus** roseus polycephalus, linariæ foliis undulatis. *Vaill. paris.* 135. t. 24. f. 3. *Mich. gen.* 108. t. 59. f. 5.

*Habitat in Europa fere ubique.*

*Varietates has pro distinctis speciebus sumunt varii; ego ob suas causas ita conjunxi, ut qui distinguendas velit, facile distinctas tradat.*

*triquetrum.* 15. **MNIUM** foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis.

*Bryum annotinum palustre, capsulis ventricosus pendulis. Dill. musc. 404. t. 51. f. 72?*

*Muscus denticulatus lucens fluviatilis maximus, ad ramorum apices adianti capitulis ornatus. Vaill. parisi. 135. t. 24. f. 2. 2? l. 22.*

*Habitat in Sueciæ paludibus turfosis.*

*Caules plurimi, in cespitem congesti, digitales & longiores, tomentosi. Folia trifariam posita, unde ramuli triquetri patuli, recentia palliæ viridia, antiqua fusca, parva, distantia, carinata, acuminata. Pedunculi solitarii, terminales, purpurei. Capsulæ erectæ, obliquæ s. arcuatæ, obtusissimæ, flavæ. Stellæ femineæ ramos terminant in eadem planta cum capsula, sed distinctis ramis.*

*trichomanis* 16. **MNIUM** foliis distichis integerrimis.

*Mnium trichomanis facie, foliolis integris. Dill. musc. 236. t. 31. f. 5.*

*Habitat in Sueciæ, Angliæ & dis.*

*ffum.*

17. **MNIUM** foliis distichis bifidis.

*Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. Dill. musc. 237. t. 31. f. 6.*

*Jungermannia terrestris repens, foliis ex rotunditate acuminatis bifidis: apertura pene visibili. Mich. gen. 8. t. 5. f. 14.*

*Habitat in Europæ rignis.*

*jungermannia,*

18. **MNIUM** foliis distichis, pinnis subtus auriculatis.

*Mnium caule procumbente simplici, foliis imbricatis integerrimis alternis antice appendiculatis. Fl. suec. 914. \**

*Lichenastrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. Dill. musc. 479. t. 69. f. 1.*

*Jungermannia alpina palustris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuissime denticulatis. Mich. gen. 6. t. 5. f. 16.*

*Habitat in Europæ subhumidis.*

**BRY.**

## BRYUM.

\* *Antheris sessilibus.*

1. BRYUM antheris sessilibus terminalibus, calyptra apocarpum, minima.

Sphagnum caulibus ramosis, foliis undique imbricatis capsulas obtegentibus. *Fl. succ.* 865.

Sphagnum foliis pilo terminales. *Roy. lugdb.* 500.

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. musc.* 245. t. 32. f. 4.

Muscus apocarpos hirsutus saxis adnascens, capitulis obscure rubris. *Vaill. parif.* 129. t. 21. f. 15.

2. Sphagnum nodosum hirsutum incanum. *Dill. musc.* 246. t. 32. f. 5.

Muscus squamosus saxatilis tortuosus ac nodosus. *Vaill. parif.* 123. t. 27. f. 18.

*Habitat in Europæ saxis, arboribus.*

3. BRYUM antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis striatum, sursumve pilosis.

Polytrichum calyptra striata sursumve pilosa. *Fl. succ.* 869. *Dalib. parif.* 314.

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus majus. *Dill. musc.* 430. t. 55. f. 8.

Muscus apocarpos arboreus ramosus. *Vaill. parif.* 129. t. 25. f. 5. 6.

4. Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus minus. *Dill. musc.* 431. t. 55. f. 9.

Muscus capillaceus minimus acaulos, calyptra striata. *Vaill. parif.* 130. t. 27. f. 10.

Muscus humilis tectorum subfuscus, capitulis brevibus, pileolis erectis, pedunculis curtis. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 6. f. 13.

5. Polytrichum capsulis sessilibus, foliis brevibus rectis carinatis. *Dill. musc.* 432. t. 55. f. 10.

6. Polytrichum capillaceum crispum, calyptris acutis pilosissimis. *Dill. musc.* 433. t. 55. f. 11.

Muscus capillaceus minimus, calyptra villosa. *Vaill. parif.* 130. t. 26. f. 9.

*Habitat in Europæ a. arboribus q. saxis, γ. rupibus, δ. sylvis.*

\* *Antheris pedunculatis erectis.*

- BRYUM antheris erectis sphericis. *Fl. succ.* 888. *Dalib. pomiforme. parif.* 317.

Bryum caule erecto, foliis setaceis, capitulis globosis. *Fl. lapp.* 400.

Bry-

*Bryum capillaceum*, capsulis sphaericis. *Et. lapp.* 400.  
*Dill. musc.* 339. t. 44. f. 1.  
*Muscus trichodes minimus sericeus capillaceus*, capitulis sphaericis. *Morif. hist.* 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 6.  
*Vaill. parif.* 129. t. 24. f. 9. 12.  
*Habitat in Europæ scopulis humosis.*

*pyriforme.* 4. *BRYUM* Antheris erectis obovatis, calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis.  
*Bryum antheris erectis turbinato-ovatis*: operculo obtusiusculo. *Fl. succ.* 890. *Dalib. parif.* 317,  
*Bryum serpillifolium pellucidum*, capsulis pyriformibus. *Dill. musc.* 345. t. 44. f. 6.  
*Muscus capillaceus minimus*, capitulis pyriformibus turgidis. *Vaill. parif.* 129. t. 29. f. 3.  
*Muscus minimus latifolius*, capitulis erectis turgidis. *Buxb. cent* 1. p. 44. t. 64. f. 1.  
*Muscus coronatus humilis stellaris*, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus erectis turgidiusculis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 16.  
*Habitat in Europæ pratis ad aggeres.*

*extinctorium* 5. *BRYUM* anthera erecta oblonga minori calyptris laxis æqualibus. *Fl. succ.* 891. *Dalib. parif.* 325.  
*Bryum calyptra extinctorii forma*, minus. *Dill. musc.* 349. t. 45. f. 8.  
*Muscus capillaceus minimus*, calyptra longa conoide nitida. *T. Vaill. parif.* 137. t. 26. f. 1.  
*Muscus capillaris minimus cucullatus.* *Magn. hort.* 139. t. 82.  
*Muscus coronatus humilis tenuifolius*, pileolo magno acuto infra aperto, extinctorium referente. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 12.  
 β. *Bryum calyptra extinctorii figura*, majus & ramosum. *Dill. musc.* 350. t. 45. f. 9.  
*Habitat in Europæ arenosis.*

*subulatum.* 6. *BRYUM* antheris erectis subulatis furculis acaulibus  
*Bryum capsulis longis subulatis.* *Dill. musc.* 350. t. 45. f. 10.  
*Muscus capillaris*, corniculis longissimis incurvis R. *Vaill. parif.* 133. t. 25. f. 8.  
*Habitat in Europæ aggeribus humidiusculis.*

*caule erecto.* 7. *BRYUM* antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Fl. succ.* 900. *Dalib. parif.* 320. *It. scan.* 118.  
*Bryum caule erecto*, foliis reflexis seta terminatis, capitulis falcatis. *Fl. lapp.* 397. *Bryum*



- Bryum rurale ungviculatum hirsutum elatius & ramosius. Dill. musc. 352. t. 45. f. 12.*
- Muscus capillaris tectorum, densis cespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinentibus. Vaill. parif. 133. t. 25. f. 3.*
- Muscus erectus hirsutus, capitulis longis acutis ungviculis avicularum similibus, vulgatissimus. Morif. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 12.*
- Habitat in Europæ muris, rusticorum tectis, arborum truncis. 2*
8. *BRYUM* antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, *murale*, furculis simplicibus cespitosis.
- Bryum tegulare humile pilosum & incanum. Dill. musc. 355. t. 45. f. 14.*
- Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus, foliis in pilum desinentibus. Vaill. parif. 133. t. 24. f. 15.*
- Muscus vulgaris omnium vulgatissimus non villosus. Vaill. parif. 133. t. 24. f. 14.*
- Muscus capillaris minor, capitulis erectis vulgatissimus non villosus. Vaill. parif. t. 25. f. 4.*
- Habitat in Europæ saxis, muris, tectis, tegulis.*
9. *BRYUM* antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Fl. succ. 898. Dalib. parif. 319.*
- Bryum caule inclinato, foliis arrectis subulatis, capitulis erectiusculis. Fl. lapp. 398.*
- Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie. Dill. musc. 357. t. 46. f. 16.*
- Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo tenuioribus. Vaill. parif. 132. t. 28. f. 12.*
- Muscus capillaceus, foliis pallidis, pediculis pluribus ex communi theca egredientibus. Buxb. cent. 2. p. 8. t. 4. f. 1.*
- Habitat in Europæ sylvis arenosis, in truncis putridis. 2*
10. *BRYUM* antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus serratis. *Fl. succ. 899. Dalib. parif. 320.*
- Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis. Dill. musc. 360. t. 46. f. 18.*
- Muscus erectus, linearæ folio, major. Vaill. parif. 132. t. 26. f. 17.*
- Habitat in Europæ sylvis, aggeribus, pratis umbrosis.*
11. *BRY-*

- glaucum.* 11. BRYUM antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis.  
 Bryum albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, setis brevibus. *Dill. musc.* 362. t. 46. f. 20.  
 Muscus trichodes montanus albidus fragilis. *Morif. hist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 22.  
 Muscus erectus capillaceus densissimus, glauco folio. *Vaill. paris.* 131. t. 26. f. 13.  
 Muscus saxatilis ericoides. *Bauh. pin.* 362. *prodr.* 151.  
*Habitat in Europæ ericetis apricis.*
- albidum.* 12. BRYUM antheris erectis foliis lingulatis obtusis patulis. †  
 Bryum nanum, lariginis foliis albis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 21.  
*Habitat in Insula Providentia.*
- pellucidum.* 13. BRYUM antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto.  
 Bryum palustre pellucidum, capsulis & foliis brevibus recurvis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 23.  
 Muscus polytrichodes elatior, foliis angustis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. alm.* 247. t. 44. f. 7.  
 Muscus polytrichodes angustifolius pellucidus ramosus. *Pluk. alm.* 247.  
 β. Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis. *Dill. musc.* 365. t. 46. f. 24.  
*Habitat in Europæ paludibus.*
- aciculare.* 14. BRYUM antheris erectis: operculo aciformi, foliis erectis subsecundis.  
 Bryum montanum hemiheterophyllum, operculis acutis. *Dill. musc.* 366. t. 46. f. 25.  
*Habitat in Anglia.*
- flexuosum.* 15. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. *Fl. suec.* 892.  
 Bryum pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 373. t. 47. f. 33.  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- heteromallum.* 16. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Fl. suec.* 895.  
 Bryum heteromallum. *Dill. musc.* 375. t. 47. f. 37.  
 Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus. *Vaill. paris.* 132. t. 27. f. 7.  
 Muscus trichodes, foliis capillaceis, capitulis minoribus. *Morif. hist.* 3 p. 628. f. 15. t. 6. f. 5. 7.  
*Habitat in Europæ ericetis, juniperetis.*

17. BRY-

17. BRYUM antheris erectis, foliis setaceis imberbibus: *tortuosum*.  
 siccitate retorquentibus. *Fl. succ.* 497.  
 Bryum alpinum, crinium crispum simile, capsula barbata. *Hall. helv.* 110. t. 4 f. 2.  
 Bryum cirratum, setis & capsulis longioribus. *Dill. musc.* 377. t. 48. f. 40.  
 Muscus alpinus cirrhosus f. crinium tortorum instar crispatus. *Schenck. alp.* 65. t. 19. f. 15.  
 Muscus helveticus trichodes crispatus. *Pet. gaz.* 159. t. 65. f. 8.  
*Habitat in montibus* Helvetiæ, Sveciæ, Cambriæ.
18. BRYUM antheris erectis subrotundis: operculo *truncatulum* cronato. *Fl. succ.* 889. *Dalib. parif.* 313.  
 Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc.* 347. t. 45. f. 7.  
 Muscus capillaceus, omnium minimus. *Vail. parif.* 130 t. 26. f. 2.  
 Muscus stellaris minimus, pediculo brevissimo, capitulis turgidis. *Buxb. cent.* 2. p. 4. t. 2. f. 2.  
 Muscus coronatus minimus, foliis & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. *Morif. hist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 18.  
*Habitat in Europa ad agros, fossas, sepes.*  
 Capsulæ amisso operculo apparent valde truncatæ, obovatae & rufæ, quibus manifeste differt a sequente.
19. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis a-*viridulum*.  
 cumminatis imbricato-patulis. *Fl. succ.* 893.  
 Bryum capillaceum breve, pallide & læte virens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 380. t. 48. f. 43.  
 Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & angustioribus. *Vaill. parif.* 130. t. 29. f. 5.  
*Habitat in Europæ agris, aggeribus.*  
 Folia viridissima. Capsulæ flavescentes, ciliatæ.
20. BRYUM acaulon, foliolis setaceis, antheris obtu-*paludosum*.  
 sistimis patulis.  
 Bryum trichodes acaulon palustre minimum, setis & capsulis brevissimis. *Dill. musc.* 387. t. 49. f. 53.  
*Habitat in Europæ humidis.*  
 Differt a *Viridulo*, capsulis fuscis & foliis siccitate minime crispis.
21. BRYUM antheris erectis, caule erectiusculo, ramis la-*Hypnoides*.  
 teralibus brevibus fertilibus. *Fl. lapp.* 396. *Fl. succ.* 894. *Dalib. parif.* 326.

Bry-

*Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum.* *Dill. musc.* 372. t. 47. f. 32.

*Muscus alpinus ramosior erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus.* *Pluk. alm.* 255. t. 47. f. 5.

*Muscus terrestris vulgari similis lanuginosus.* *Morif. bist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 7.

β. *Bryum hypnoides hirsutic virescens, fasciculare alpinum.* *Dill. musc.* 370. t. 47. f. 28.

γ. *Bryum hypnoides, ericæ facie, capsulis barbatis, alpinum.* *Dill. musc.* 371. t. 47. f. 31.

*Habitat in Europæ frigida rupibus, saxis, sabulosis.*

verticillatum. 22. *BRYUM* antheris erectis, pedunculis siccitate contractis, foliis piliferis, furculis fastigiatis.

*Bryum pilosum verticillatum.* *Dill. musc.* 374. t. 47. f. 35.

*Habitat ad latera collium.*

caulis. 23. *BRYUM* antheris erectiusculis, pedunculis longissimis, foliis setaceis, furculis acaulibus.

*Bryum trichodes acaulon minimum, setis & capsulis oblongis.* *Dill. musc.* 388. t. 49 f. 54.

*Habitat Upsaliæ.*

trichodes. 24. *BRYUM* antheris erectiusculis: ore ciliato absque annulo, pedunculo longissimo.

*Bryum trichodes aureum, capsulis incurvis obtusis infertis longis.* *Dill. musc.* 389. t. 49. f. 58.

*Habitat in Suecia, Germania.*

squarrosum, 25. *BRYUM* antheris obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoso.

*Muscus palustris, foliis reflexis cauliculos quinqueangulos formantibus.* *Buxb. cent.* 4. p. 36. t. 65. f. 1.

*Habitat in Europæ borealis paludibus apricis.* *Læfl.*

*Muscus distinctissimus ab Hypno squarroso. Surculi plures, conferti, erectiusculi, undique fusco pubescentes: Ramo uno alterove brevi. Folia minima, sessilia, ovata, acuminata, subcarinata, late viridia, imbricata, revoluta, quinquefariam exstantia. Pedunculus terminalis purpureus, longus. Capsula oblonga, obliqua.*

\* *Antheris nutantibus.*

argenteum. 26. *BRYUM* antheris pendulis, furculis cylindricis imbricatis lævibus *Fl. suec.* 909. *Dalib. paris.* 321.

*Bry-*

- Bryum pendulum* julaceum argenteum & sericeum.  
*Dill. musc.* 392. t. 50. f. 62.
- Muscus squamosus* argenteus, ericæ folio. *Vaill. parif.*  
 134. t. 26. f. 3.
- Muscus minimus* e viridi argenteus, capitulis oblongis  
 cernuis. *Morif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 17.
- Bryum pendulum*, furculis teretibus viridibus. *Dill.*  
*musc.* 394. t. 50. f. 63.
- Habitat in Europæ tectis, muris, rupibus.*
7. *BRYUM* antheris subrotundis, pedunculis reflexis, *pulvinatum*.  
 foliis piliferis. *Fl. suec.* 904. *Dalib. parif.* 321.
- Bryum* foliis setaceis, pedunculo reflexo, capitulis sub-  
 rotundis. *Fl. lapp.* 401.
- Bryum orbiculare pulvinatum* hirsutie canescens, ca-  
 psulis immersis. *Dill. musc.* 395. t. 50 f. 65.
- Muscus capillaceus lanuginosus minimus*. T. *Vaill. pa-*  
*ris.* 133. t. 29. f. 2.
- Muscus*, capitulo inflexo, pene acaulos. *Pet. gaz.* 127.  
 t. 95. f. 15.
- Habitat in Europæ muris, rupibus.*
8. *BRYUM* antheris pendulis, foliis lanceolatis acu-*cæspitium*.  
 minato-setaceis, pedunculis longissimis. *Fl. suec.* 905.  
*Dalib. parif.* 322.
- Bryum* foliis subulatis, pedunculo longissimo, capitulo  
 reflexo. *Fl. lapp.* 402.
- Bryum pendulum* ovatum *cæspitium* & pilosum, seta  
 bicolori. *Dill. musc.* 396. t. 50. f. 66.
- Muscus capillaceus minimus*, capitulo nutante, pedi-  
 culo purpureo. *Vaill. parif.* 134. t. 29. f. 7.
- Muscus trichodes*, capitulo parvo reflexo, pediculo ima  
 medietate rubro, summa luteo-viridi. *Morif. hist.* 3.  
 p. 629. f. 15. t. 6. f. 15.
- Habitat in Europæ muris, tectis, glazeosis.*
9. *BRYUM* antheris pendulis, foliis ovatis setiferis ca-*capillare*.  
 rinatis, pedunculis longissimis. *Fl. suec.* 906. *Dalib.*  
*parif.* 322.
- Bryum* foliis latiusculis congestis, capsulis longis nu-  
 tantibus. *Dill. musc.* 398. t. 50. f. 67.
- Muscus capillaceus major*, capitulis crassioribus cylin-  
 draceis nutantibus. *Vaill. parif.* 134. t. 24. f. 6.
- Muscus capillaris*, foliis latiusculis congestis, capitulis  
 longis reflexis. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 6. f.  
 19.

Muscus capillaris, folio longiore. *Magn. hort.* 138. t. 138.

*Habitat in Europæ siccis, muris, glareosis.*

*Præcedenti valde affinis.*

*carneum.*

30. BRYUM antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. *Fl. succ.* 908.

Bryum lanceolatum pellucidum, capsulis subrotundis, pedunculis carneis. *Dill. musc.* 400. t. 50. f. 69.

Muscus stellaris humilis, capitulis pendulis. *Buxb. ex.* 2. p. 5. t. f. 6.

*Habitat in Europæ ædis.*

## HYPNUM.

\* *Frondebis pennatis.*

*spiniforme.* 1. HYPNUM fronde simplicissima: foliolis patentibus subulatis, pedunculis radicalibus.

Hypnum erectum non ramosum spinarum halecumarum. *Dill. musc.* 332. t. 43. f. 68.

Adiantum f. Polytrichum aureum medium, capitulo proprio pediculo insidente. *Sloan. jam.* 12. *bist.* 1. p. 68. t. 25. f. 4.

*Habitat in Jamaica.*

*taxifolium.*

2. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera.

Hypnum foliis pinnatis contiguis linearibus, pedunculis radicalibus, capitulo subrotundo erecto. *Roy. lugd.* 504.

Hypnum taxiforme minus: basi capsulifera. *Dill. musc.* 263. t. 34. f. 2.

Muscus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. parif.* 136. t. 24. f. 11.

*Habitat in Europæ umbrosis.*

*denticulatum.*

3. HYPNUM fronde pinnata simplici: pinnis duplicatis basi pedunculifera.

Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis duplicatis recurvis. *Dill. musc.* 266. t. 34. f. 5.

Muscus pennatus denticulatus minor. *Vaill. parif.* 137. t. 29. f. 8.

Muscus pennatus, capitulis adianti. *Morif. bist.* 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 36.

*Habitat in Europa supra terram umbrosam.*

4. HYP.

4. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata a-*bryoides*.  
pice pedunculifera.  
Hypnum taxiforme exiguum versus summitatem capsu-  
liferum. *Dill. musc.* 262. t. 34. f. 1.  
Muscus polytrichoides, exiguis capitulis in summis sur-  
culis, f. foliis subrotundis erectis. *Vaill. parif.* 136. t.  
24. f. 13. *Morif. hist.* 3. p. 629. f. 15. t. 6. f. 11.  
Muscus terrestris minimus, foliis pennatim dispositis.  
*Buxb. cent.* 1. p. 44. t. 64. f. 3.  
*Habitat in Europæ umbrosis.*  
*Muscus minimus capituli ora magna ciliis rubris spe-*  
*ctabilis.*
5. HYPNUM fronde pinnata ramosa apice pedunculi-*acacioides*/  
fera.  
Hypnum pinnulis acaciæ, setis brevissimis. *Dill. musc.*  
265. t. 34. f. 4.  
*Habitat in Patagonia.*
6. HYPNUM fronde pinnata ramosa erecta medio pe-*adiantoides*.  
dunculifera.  
Hypnum taxiforme palustre ramosum majus & e-  
rectum. *Dill. musc.* 264. t. 34. f. 3.  
Muscus taxiformis ramosus. *Vaill. parif.* 136. t. 28. f. 5.  
Muscus filicifolius f. pennatus minor, pinnulis plurimis  
ad mediam costam adnexis. *Buxb. cent.* 2. p. 3. t.  
1. f. 4.  
*Habitat in Europæ paludosis. 2*
7. HYPNUM fronde pinnata ramosa: foliolis imbrica-*complan-*  
tis acutis complicatis compressis. *atum.*  
Hypnum pennatum compressum & splendens, capsulis  
ovatis. *Dill. musc.* 268. t. 34. f. 7.  
Muscus trichomanoides filicifolius splendens. *Vaill.*  
*parif.* 139. t. 23. f. 4.  
Muscus terrestris repens primæ speciei similis. *Morif.*  
*hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 5.  
*Habitat in Europa ad truncos arborum.*  
Confer Hypnum pennatum trichomanoides splendens ra-  
mosum. *Dill. musc.* 269. t. 34. f. 8.
8. HYPNUM fronde pinnata ramosa, foliolis patentis-*ornithopodi-*  
fimis ovatis carinatis mucronatis. *oides.*  
Hypnum pennatum, ornithopodii pinnulis pellucidis.  
*Dill. musc.* 270. t. 34. f. 9.  
*Habitat in Patagonia.*

\* *Surculis vagis.*

- lucens.* 9. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis punctatis.  
Hypnum pennatum aquaticum lucens, longis latisque foliis. *Dill. musc.* 270. t. 34. f. 10.  
*Habitat in Europæ paludosis.*
- undulatum.* 10. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis complicatis.  
Hypnum pennatum undulatum, lycopodii instar sparsum. *Dill. musc.* 271. t. 36. f. 11.  
Hypnum repens crispum, ramulis compressis filicinorum more dispositis. *D. Hall. belv.* 105. t. 3. f. 5.  
*Habitat in Anglia, Hibernia, Helvetia.*  
*Calyptre apice fusco distinctum. Dill.*
- crispum.* 11. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis.  
Hypnum pennatum undulatum crispum, setis & capsulis brevibus. *Dill. musc.* 273. t. 36. f. 12.  
Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Moris. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 10.  
*Habitat in Europæ locis saxosis.*
- triquetrum.* 12. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Fl. succ.* 881.  
Hypnum ramis inæqualibus, foliis laxè imbricatis triangularibus acutis. *Fl. lapp.* 409.  
Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. *Dill. musc.* 293. t. 38. f. 28.  
Muscus ramosus major spermatophorus. *Vaill. parif.* 137. t. 28. f. 9.  
*Habitat in Europæ pratis, sylvis, sepibus.*
- dentatum.* 13. HYPNUM ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis.  
Hypnum dentatum vulgatissimum operculis obtusis. *Dill. musc.* 295. t. 38. f. 29.  
Muscus myosuroides rutabuli fructu. *Vaill. parif.* t. 27. f. 8. & t. 23. f. 2.  
Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis ediantis. *Moris. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 35.  
*Habitat in Europæ sepibus, sylvis ad arborum radices.*



\* *Surculus pennatis.*

4. HYPNUM furculis pennatis: ramulis distantibus, *filicinum*. foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Fl. succ.* 875.

Hypnum repens filicinum crispum. *Dill. musc.* 282. t. 36. f. 19.

Muscus filicinus palustris. *Vaill. parif.* 138. t. 29. f. 9. *Habitat in Europæ humidiusculis.*

5. HYPNUM furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Fl. lapp.* 405. *Fl. succ.* 872. *proliferum.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus non splendentibus. *Dill. musc.* 276. t. 35. f. 14.

Muscus filicinus major. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 20. *Tournes. inst.* 556. t. 326. f. C. *Vaill. parif.* 140. t. 25. f. 1.

*Habitat in Europæ pratis, sylvis.*

6. HYPNUM furculis subproliferis plano-pinnatis cuspidatis, pedunculis aggregatis. *delicatulum.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minimis non splendentibus, setis capsulis brevioribus. *Dill. musc.* 546. t. 83. f. 6.

*Habitat in America, Europa septentrionali.*

*Præcedenti simillima, sed longe tenerior & forte sola varietas; antheras non vidi.*

7. HYPNUM furculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Fl. lapp.* 406. *Fl. succ.* 873. *parietinum.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus splendentibus. *Dill. musc.* 274. t. 35. f. 13.

Muscus filicinus major. *Buxb. cent.* 2. p. 2. t. 1. f. 2. & p. 3. t. 2. f. 1. & 4. t. 28. f. 1. & t. 29. f. 1.

*Habitat in Europa frequens.*

8. HYPNUM furculis subbipinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *prælongum.*

Hypnum filicinum, triangularibus parvis foliis, prælongum. *Dill. musc.* 278. t. 35. f. 15.

Muscus terrestris minor, foliis crispis. *Buxb. cent.* 4. p. 37. t. 63. f. 3.

*Habitat in Europæ terris, truncis, lignis.*

*Hæc species difficilins determinatur, quam dignoscitur.*

9. HYPNUM furculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Fl. succ.* 871. *crispa. caespitosa.*

B b b b 3

Hyp-

Hypnum ramulis plano-pinnatis: pinnis contiguis apicibus deflexis. *Fl. lapp.* 407.

Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsentans. *Dill. musc.* 284. t. 36. f. 20.

Muscus cristam castrensem repræsentans flavescens nemorosus ramosus castubicus. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 8.

Muscus terrestris repens subflavus, foliolis crispis minoribus, ramulisque densius confertis. *Vaill. parif.* 141. t. 27. f. 14.

Muscus pennatus major, caulibus ramosis in summitate veluti pinnatus. *Loef. pruss.* 167. t. 42.

*Habitat in Europa, Pennsylvania, ad radices Abietis.*

*abietinum.* 20. HYPNUM furculis pinnatis teretiusculis remotis inæqualibus. *Fl. lapp.* 408. *Fl. suec.* 874.

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. *Dill. musc.* 280. t. 35. f. 17.

Muscus pennatus minor, caulibus ramosis, in summitate veluti spicatus. *Loef. pruss.* 167. t. 43. *Vaill. parif.* t. 29. f. 12.

Muscus terrestris, furculis filamentosis tenacibus abietinis semel tantum divisis. *Morif. hist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 22.

*Habitat in Europæ sylvis abietinis.*

Pedunculi e media rachi furculi, solitarii, purpurei, recti, longitudine furculi, Calyptra erecta, subulata, pallida. Anthera ruffa, recurvata magis quam in ullo alio, margine oris integro, intra quem Cilia brevia, petula.

\* *Foliis reflexis.*

*cupressiforme* 21. HYPNUM furculo subpinnato, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Fl. suec.* 880.

Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis. *Dill. musc.* 287. t. 37. f. 23.

Muscus squamosus ramosus minor & crispus. *Vaill. parif.* 139. t. 27. f. 13.

Muscus terrestris aureus minor, flagellis clavisque brevioribus. *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 8.

*Habitat in Europæ sylvis ad arborum radices.*

*aduncum.* 22. HYPNUM furculo erectiusculo subramoso, foliis secundis recurvatis subulatis, ramis recurvatis. *Fl. suec.* 879.

Hyp-

*Hypnum palustre erectum summitatibus aduncis. Dill.*

*musc. 292. t. 37. f. 26.*

*Habitat in Europæ uliginosis.*

23. HYPNUM ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis secundis acuminatis.

*Hypnum scorpioides palustre magnum, lycopodii instar sparsum Dill. musc. 290. t. 37. f. 25.*

*Habitat in Anglia, Sueciæ paludibus profundis.*

*Muscus procumbens, ramis vagis fuscis, apicibus aduncis flavis.*

24. HYPNUM sarculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis.

*Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. Dill. musc. 307. t. 39. f. 43.*

*Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris. Vaill. parif. 137. t. 23. f. 1.*

*Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupressinis ut plurimum indivisis. Moris. hist. 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 7.*

*Muscus montanus gracilis ramosus, viticulis longioribus glabris. Pluk. alm. 255. t. 47. f. 4.*

*Muscus densis foliis juniperinis in cespitem aggestis. Loef. pruss. 49. t. 49.*

*Habitat in Europæ montosis aridis ad arbores.*

25. HYPNUM ramis vagis, foliis ovatis apice subulatis, undique reflexis. *Fl. suec. 878. \**

*Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. Dill. musc. 303. t. 39. f. 38.*

*Muscus terrestris erectior, foliis reflexis. Moris. hist. 3. p. 524. f. 15. t. 6. f. 2.*

26. HYPNUM repens, triangularibus reflexis foliis, minus.

*Dill. musc. 304. t. 39. f. 39.*

*Muscus erectus, foliis reflexis. Vaill. parif. 139. t. 27. f. 5.*

*Habitat in Europæ subhumidis.*

27. HYPNUM sarculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis.

*Hypnum loreum montanum, capsulis subrotundis. Dill. musc. 305. t. 39. f. 40.*

*Muscus squamosus major, foliis angustioribus acutissimis. Vaill. parif. 138. t. 25. f. 2.*

*Muscus repens major, foliis & flagellis longis & tenuibus donatus. Moris. hist. 3. p. 626. f. 15. t. 5. f. 24.*

B b b b 4

Mu-

Muscus montanus. *Tabern. ic.* 809.

Musco denticulato similis. *Bauh. pin.* 360.

*Habitat in Europæ montosis.*

\* *Surculis dendroidibus s. fasciculatis.*

*dendroides* 27. HYPNUM furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Fl. succ.* 886.

Hypnum caule erecto superne undique ramoso. *Fl. lapp.* 411.

Hypnum dendroides sericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. t. 40. f. 48.

Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides. *Tournef. inst.* 554. t. 326. f. B. *Vaill. parif.* 137. t. 26. f. 6.

Muscus dendroides elatior, ramulis crebris minus furculosis, capitulis pedunculis brevibus insidentibus. *Morif. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 5. f. 31.

*Habitat in Europæ pratis sylvisque subhumidis.*

*alopecurum.* 28. HYPNUM furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, antheris subnutantibus. *Fl. succ.* 887.\*

Hypnum dendroides obscurius, setis & capsulis brevioribus subnutantibus. *Dill. musc.* 315. t. 41. f. 49.

Muscus dendroides sylvarum erectus, ramulis kali æmulis, radice repente. *Morif. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 5. f. 30.

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. parif.* 137. t. 23. f. 5.

*Habitat in Europæ sylvis humidiusculis.*

\* *Surculis teretiusculis.*

*curtipendulum.* 29. HYPNUM furculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. *Fl. succ.* 877.

Hypnum dentatum curtipendulum, viticulis rigidis. *Dill. musc.* 333. t. 43. f. 69.

*Habitat in Europa, America, ad radices arborum, saxorum.*

*parvum.* 30. HYPNUM furculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus. *Fl. succ.* 876.

Hypnum ramis inæqualibus sparsis, foliis ovatis imbricatis, capitulis obliquis. *Fl. lapp.* 410.

Hypnum cupressiforme vulgare, foliis obtusis. *Dill. musc.* 309. t. 40. f. 45.

Muscus squamosus cupressiformis. *Vaill. parif.* 138. t. 28. f. 3.

*Habitat in Europæ pascuis, sylvis.*

31. HYPNUM furculis ramisque vagis teretibus erectius illecebrum.  
 sculis obtusis.  
 Bryum caule erecto ramoso, foliis ovatis undique imbricatis. *Fl. lapp.* 317. n. 409.  
 Hypnum cupressiforme rotundius vel illecebræ æmulum. *Dill. musc.* 311. t. 40. f. 46.  
 Muscus terrestris, furculis kali geniculati aut illecebræ æmulis, foliis subrotundis squamatim incumbentibus.  
*Vaill. parif.* 137. t. 25. f. 7.  
*Habitat in Europa & Americæ septentrionalis pascuis.*
32. HYPNUM furculis teretibus ramosis, foliolis acuriparium.  
 tis patulis distantibus.  
 Hypnum aquaticum, flagellis & teretibus & pennatis.  
*Dill. musc.* 308. t. 40. f. 44.  
 Hypnum ramosum fluitans pennatum. *Raj. angl.* 3. p. 81.  
*Habitat in Europa, ad fluviorum ripas.*
33. HYPNUM furculis vagis: apice foliis convolutis cuspidatum.  
 acuminato. *Fl. succ.* 884.  
 Hypnum palustre extremitatibus cuspidatis & pungentibus. *Dill. musc.* 300. t. 39. f. 34.  
 Muscus saxatilis repens, coma sparsa. *Buxb. cent.* 2. p. 6. t. 3. f. 1. 2. 3. 4.  
*Habitat in Europæ paludibus muscosis, quas replet.*
- \* *Surculis confertis.*
34. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, sericeum.  
 foliis subulatis, antheris erectis. *Fl. lapp.* 412. *Fl. succ.* 882. *Dalib. parif.* 326.  
 Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. musc.* 323. t. 42. f. 59.  
 Muscus terrestris luteo viridens sericeus repens. *Morif. hist.* 3. p. 626. f. 15. t. 5. f. 25.  
 Muscus arboreus splendens sericeus. *Vaill. parif.* 132. t. 27. f. 3.  
*Habitat in Europa, ad truncos, muros, inque campis.*
35. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, velutinum.  
 foliis subulatis, antheris subnutantibus. *Fl. succ.* 883.  
 Hypnum velutinum, capsulis ovatis cernuis. *Dill. musc.* 326. t. 42. f. 61.  
 Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis.  
*Vaill. parif.* 138. t. 26. f. 9.

Muscus terrestris minor omnium vulgatissimus. *Buxb. cent. 4. p. 35. t. 62. f. 23.*

*Habitat in Europa ad radices arborum umbrosas.*

*serpens.* 36. HYPNUM furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis.

Hypnum trichodes serpens, setis & capsulis longis erectis. *Dill. musc. 329. t. 42. f. 64.*

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis majusculis oblongis erectis. *Morif. hist. 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 14. 21. Vaill. parif. 138. t. 28. f. 2. 6. 7. 8.*

*Habitat in Europa, Virginia, ad caudices, ligna, saxa.*

*sciuroides.* 37. HYPNUM furculis erectis ramosis incurvatis. Hypnum arboreum sciuroides. *Dill. musc. 319. t. 41. f. 54.* Muscus arboreus splendens myosuroides. *Vaill. parif. t. 27. f. 12.*

Muscus repens, serici modo lucens, viticulis longioribus erectis. *Morif. hist. 3. p. 626. f. 15. t. 5. f. 27.*

*Habitat in Europæ truncis arborum.*

Pedunculi maturi funis instar torti; feminae furculi distincti crescunt.

*myosuroides.* 38. HYPNUM furculis ramosissimis: ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus.

Hypnum myosuroides tenuius, capsulis nutantibus. *Dill. musc. 317. t. 41. f. 51.*

Muscus trichodes humilis ramosus, capitulis oblongis tumidiusculis donatus. *Morif. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 3.*

Muscus squamosus minor myosuroides, capitulis incurvis. *Vaill. parif. 137. t. 27. f. 6.*

*Habitat in Europa supra lapides arborumque radices.*

*clavellatum.* 39. HYPNUM repens, ramulis erectis confertissimis, antheris incurvis; operculis inflexis.

Hypnum clavellatum parvum repens, setis brevibus. *Dill. musc. 551. t. 86. f. 17.*

*Habitat in Europæ lignis putridis.*

*julaceum.* 40. HYPNUM ramis erectis teretibus imbricatis obtusis, perichætiis longitudine fere pedunculorum.

Hypnum julaceum, perichætio setas æquante. *Dill. musc. 321. t. 41. f. 5. 6. l. 56.*

Hypnum sabinæ foliis, capitulis atro-fuscis, pediculis brevibus. *Gron. virg. 125.*

*Habitat in America septentrionali.*

## ALGÆ.

## JUNGERMANNIA:

\* *Frondibus pinnatis secundis.*

1. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis:
- asplenoides.*

foliolis ovatis subciliatis.

Jungermannia major, foliis brevioribus & obtusioribus non dentatis. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 3. o. o.*Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. musc. 482. t. 69. f. 5.*Muscus bifolius procumbens, foliis subrotundis. *Læf. pruss. 167. t. 47.*

2. Jungermannia caule ramoso repente, foliis imbricatis ovato-crenulatis: alternis minoribus.
- Roy. lugd. 508.*

Jungermannia major, foliis subrotundis tenuissime denticulatis. *Mich. gen. 7. t. 5. f. 1. 2.*Lichenastrum asplenii facie, pinnis confertioribus. *Dill. musc. 483. t. 69. f. 6.*Hepaticoides polytrichæ facie. *Vaill. paris. 99. t. 19. f. 7.*Muscus trichomanoides, foliis rotundioribus pellucidis squamatim conjuncte sibi incumbenibus. *Morif. hist. 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 42.**Habitat in Europæ, Indiæ udis umbrosis.*

2. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis:
- viticulosa.*

foliolis subulatis.

Jungermannia terrestris, viticulis longis, foliis perexiguis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 4.*Lichenastrum trichomanis facie e basi & medio florens. *Dill. musc. 484. t. 69. f. 7.**Habitat in Europæ udis umbrosis sylvis.*

3. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis:
- polyanthes.*

foliolis integerrimis imbricatis convexis.

Jungermannia palustris repens, foliis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 5.*Lichenastrum, trichomanes facie, polyanthemum breve & repens. *Dill. musc. 486. t. 70. f. 9.**Habitat in Europæ palustribus.*

4. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis
- lanceolata.*

lanceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis.

Jungermannia palustris minima repens, foliis subrotundis densissimis late virentibus. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 67.*

Li-

*Lichenastrum trichomanis* facie minus, ab extremitate florens. *Dill. musc.* 486. t. 70. f. 10.

*Habitat in Europæ humidis umbrosis.*

*bidentata.*

5. *JUNGERMANNIA* frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis.

*Jungermannia major* repens, foliis bifidis. *Mich. gen.* 8. t. 5. f. 12.

*Lichenastrum*, pinnulis acutioribus & concavis bifidis, majus. *Dill. musc.* 487. t. 70. f. 11.

*Hepaticoides*, polytrichi facie, foliis bifidis, major. *Vaill. parif.* 99. t. 19. f. 8.

*Museus lichenoides*, foliis pennatis bifidis, minor. *Merrif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 47.

*Habitat in Europæ ericetis umbrosis.*

*bkuspidata.*

6. *JUNGERMANNIA* frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis.

*Jungermannia minima* repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. *Mich. gen.* 9. t. 6. f. 17.

*Lichenastrum*, pinnulis acutissime bifidis, minimum. *Dill. musc.* 488. t. 70. f. 12.

*Habitat in Europæ umbrosis humidis.*

\* *Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis superne testis.*

*undulata.*

7. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis apice floriferis; foliolis subrotundis integerrimis.

*Lichenastrum* pinnulis auriculatis majoribus & non crenatis. *Dill. musc.* 490. t. 71. f. 17.

*Hepatica saxatilis undulata* seminifera. *Vaill. parif.* 98. t. 19. f. 6.

*Habitat in Europa.*

*nemorosa*

8. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis.

*Jungermannia nemorosa*, foliis acutioribus auritis tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo brevior.

*Mich. gen.* 7. t. 5. f. 8.

*Lichenastrum auriculatum*, pinnis minoribus crenatis. *Dill. musc.* 490. t. 71. f. 18.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*refupinata.*

9. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis inferne floriferis: foliolis crenulatis imbricatis rotundis.

*Jungermannia furculosa refupinata*, foliolis pinnato-imbricatis



bricatis deflexis rotundis integris: auricula laterali. *Fl. succ.* 926.

*Lichenastrum imbricatum*, pinnulis rotundis, crispum.

*Dill. musc.* 491. t. 71. f. 19.

*Habitat in Europæ rupibus.*

10. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis *a-albicans*.  
pice floriferis: foliolis linearibus recurvatis.

*Jungermannia furculis pinnatis*: foliolis recurvis planis auriculatis. *Fl. succ.* 916.

*Lichenastrum auriculatum*: pinnulis angustis planis recurvis. *Dill. musc.* 492. t. 71. f. 20.

*Hepaticoides albescens*, foliis pinnatis. *Vaill. parif.* 100. t. 19. f. 5.

*Habitat in Europæ umbrosis.*

11. *JUNGERMANNIA* frondibus subtus bipinnatis, *trilobata*.  
foliolis quadratis obsolete trilobis.

*Jungermannia furculis planis pinnatis*: foliolis obsolete trilobis auriculatis. *Fl. succ.* 917.

*Jungermannia* foliis latiusculis obtusis undulatis & veluti angulosis. *Mich. gen.* 7. t. 5. f. 10.

*Lichenastrum pinnulis obtuse trifidis nervo geniculato*.  
*Dill. musc.* 493. t. 71. f. 22.

*Habitat in Svecia, Anglia, Italia.*

12. *JUNGERMANNIA* frondibus subtus bipinnatis *a-reptans*.  
pice reptantibus, foliolis quadridentatis.

*Lichenastrum multifidum* exiguum ad basin florens per siccitatem imbricatum. *Dill. musc.* 494. t. 71. f. 24.

*Habitat in Europæ Ericetis udis.*

\* *Frondibus imbricatis.*

13. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus: foliolis *complanata*.  
interne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Fl. succ.* 922.

*Jungermannia* foliis circinatis imbricatis dispositis ex viridi flavescentibus. *Mich. gen.* 7. t. 5. f. 21.

*Lichenastrum imbricatum majus*, squamis compressis & planis. *Dill. musc.* 496. t. 72. f. 26.

*Habitat in Europa ad arborum truncos.*

14. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliis *infer-dilatata*.  
ne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Fl. succ.* 919.

Liche-

*Lichenastrum imbricatum* minus, squamis convexo-concavis. *Dill. musc.* 497. t. 72. f. 27.

*Hepaticoides*, furculis & foliolis thuyæ instar compressis, minor. *Vaill. parif.* 99. t. 19. f. 10.

*Muscoides* minimum, foliis alternis: superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente. *Mich. gen.* 10. t. 6. f. 6.

*Habitat in Europa, America, ad arborum truncos.*

tamarisci.

15. *JUNGERMANNIA* foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo-majoribus. *Fl. lapp.* 425. *Fl. suec.* 923. *Roy. lugd.* 503

*Lichenastrum imbricatum*, tamarisci narbonensis facie. *Dill. musc.* 499. t. 72. f. 31.

*Hepaticoides* quæ *Muscus trichomanoides* terrestris minor, floridus. *Vaill. parif.* 100. t. 23. f. 10.

*Muscoides* squamosum saxatile nigro-purpureum, furculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. t. 6. f. 5.

*Habitat in Europa ad truncos arborum, rupes.*

platyphylla.

16. *JUNGERMANNIA* furculis procumbentibus subtus imbricatis, foliolis cordatis acutis.

*Lichenastrum arboris vitæ* facie, foliis minus rotundis. *Dill. musc.* 501. t. 72. f. 32.

*Hepaticoides*, furculis & foliolis thuyæ instar compressis, major. *Vaill. parif.* t. 19. f. 9.

*Muscoides* squamosum atrovirens, foliis subrotundis. *Mich. gen.* 9. t. 6. f. 3. 4.

*Muscus muralis* floridus, foliis subrotundis creberrime imbricatis dispositis. *Morif. hist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 44.

*Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis sylvis.*

ciliaris.

17. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Fl. suec.* 918. \*

*Jungermannia* caule ramoso, furculis compressis, foliis imbricatis serie duplici ovato-acutis ciliatis. *Fl. lapp.* 426.

*Lichenastrum filicinum pulchrum villosum.* *Dill. musc.* 503. t. 73. f. 35.

*Muscus palustris*, absinthii folio. *Vaill. parif.* 140. t. 26. f. 11?

*Habitat in Europa passim.*

18. JUN-

18. JUNGERMANNIA furculis erectiusculis bifari-  
am imbricatis, foliolis bipartitis. *varia.*  
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis. *Mich.*  
*gen. 8. t. 5. f. 9.*  
Lichenastrum foliis variis. *Dill. musc. 505. t. 73. f.*  
*36.*  
*Habitat in Europæ sylvis ericetis.*  
\* *Surculis undique imbricatis foliolis sparsis.*
19. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis un-  
dique imbricatis, floribus pedunculatis. *fulacea.*  
Lichenastrum alpinum, bryi julacei argentei facie. *Dill.*  
*musc. 506. t. 73. f. 38.*  
*Habitat in Alpibus Britannia.*
20. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis  
subulatis secundis. *rupestris.*  
Jungermannia furculosa erectiuscula, foliosis undique  
imbricatis acuminatis hinc reflexis. *Fl. suec. 920. \**  
Lichenastrum alpinum nigricans, foliis capillaceis reflexis. *Dill. musc. 507. t. 73. f. 40.*  
*Habitat in Europæ frigidis rupibus humentibus.*
21. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis ca-  
pillaceis æqualibus. *trichophylla.*  
Jungermannia furculis erectiusculis, foliolis imbricatis  
acuminatis undique erectis. *Fl. suec. 921.*  
Lichenastrum trichodes minimum in extremitate florens.  
*Dill. musc. 505. t. 73. f. 37.*  
*Habitat in Europæ frigidis rupibus.*
22. JUNGERMANNIA furculis teretibus, foliolis o-  
vatis patentibus, calycibus imbricatis. *alpina.*  
Lichenastrum alpinum atrovirens teres, calycibus squa-  
mosis. *Dill. musc. 506. t. 73. f. 39.*  
*Habitat in Alpibus Britannia, inque rupibus Suecia.*  
\* *Acaules frondibus simplicibus.*
23. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi innato. *epiphylla.*  
*Fl. suec. 930. \**  
Jungermannia hypophylla. *It. wigth. 213.*  
Marfilia major atrovirens, floribus albicantibus e folio-  
rum medio egredientibus. *Mich. gen. 5. t. 4. f. 1.*  
Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio ena-  
scentibus. *Dill. musc. 508. t. 74. f. 41.*  
Lichen petræus, caliculo calceato. *Bauh. pin. 362.*

Lichen

Lichen alter minor, folio calceato. *Col. ecphr.* 1. p. 331. t. 332.

*Habitat in Europæ ripis elatioribus umbrosis udis.*

*pinguis.*

24. JUNGERMANNIA acaulis, fronde oblonga sinuata pingui. *Fl. suec.* 929.

Marsilea media pinguis pallide virens, floribus majoribus nigricantibus ad foliorum latera egredientibus.

*Mich. gen.* 5. t. 4. f. 2.

Lichenastrum capitulis oblongis juxta foliorum divisuras nascentibus. *Dill. musc.* 509. t. 74. f. 42.

Lichen parvus erectus, foliis profunde lacinatis. *Pluk. alm.* 216. t. 42. f. 2.

*Habitat in Europæ paludibus.*

*multifida.*

25. JUNGERMANNIA acaulis, fronde bipinnatifida. Lichenastrum ambrosiæ divisura. *Dill. musc.* 511. t. 74. f. 43.

*Habitat in Angliæ ericetis.*

*furcatum.*

26. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ramosa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Fl. suec.* 928.

Marsilea minima angustifolia, floribus nigricantibus ex inferiori foliorum parte e subhirsuta & turbinata vagina. *Mich. gen.* 5. t. 4. f. 4.

Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis globosis pilosis. *Dill. musc.* 512. t. 74. f. 45.

Hepatica arborea globulifera. *Vaill. parif.* 98. t. 23. f. 11.

*Habitat in Europa ad truncos, rupes & e terra.*

*pusilla.*

27. JUNGERMANNIA acaulis, fronde subbipinnatifida: lobis imbricatis, perichætio plicato.

Lichenastrum exiguum, capitulis nigris lucidis e corylis parvis nascentibus. *Dill. musc.* 513. t. 74. f. 46.

*Habitat in Europæ rupibus, ericetis bumentibus.*

## TARGIONIA.

*hypophylla.*

1. TARGIONIA.

Targionia minima & vulgaris. *Mich. gen.* 3. t. 3.

Lichen petraeus minimus, tractu orobi *Bauh. pin.* 361. *Dill. musc.* 532. t. 78. f. 9.

Lichen alter acaulos hypophyllocarpus. *Col. ecphr.* 1. p. 331. f. 333.

Lichen terrestris minor seminifer. *Buxb. cent.* 1. p. 41. t. 61. t. 4.

*Habitat in Italia, Hispania, Constantinopoli.*

MAR

## MARCHANTIA.

MARCHANTIA calyce communi decemfido. *Fl. polymorpha. succ. 931. Fl. lapp. 422. Roy. lugdb. 507.*

Marchantia major, capitulo stellato: radiis teretibus. *Mich. gen. 2. t. 1. f. 1.*

Lichen fontanus major stellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. musc. 523. t. 76. f. 6.*

Lichen petræus latifolius, f. Hepatica fontana. *Bauh. pin. 362.*

Lichen. *Fuchs. hist. 473. Cam. epit. 782.*

Marchantia stellata. *March. act. parif. 1713. p. 307. t. 5.*

Marchantia capitulo stellato: radiis teretibus. *Mich. gen. 2. t. 1. f. 2.*

Lichen domesticus minor stellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. musc. 527. t. 77. f. 7.*

Lichen petræus stellatus. *Bauh. pin. 362.*

Hepatica secunda. *Tabern. ic. 815.*

Marchantia calyce communi octopartito: lacinie plana no convexis. *Fl. lapp. 423. Roy. lugdb. 507.*

Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. gen. 1. t. 1. f. 5.*

Lichen petræus umbellatus. *Bauh. pin. 362.*

Hepatica tertia. *Tabern. ic. 815.*

*Habitat in Europa juxta aquas, locis umbrosis.*

MARCHANTIA calyce communi diinidiato palma-chenopoda. to quadrifido.

Lichen anapodocarpus. *Plum. fil. 143. t. 142. Dill. musc. 531. t. 77. f. 8.*

*Habitat in Martinica.*

MARCHANTIA calyce communi quadripartito: laciniis tubulosis. *Hort. cliff. 477.*

Lichen seminifer lunulatus, florifer pileatus tandem cruciatus. *Dill. musc. 521. t. 75. f. 5.*

Lichen hepaticus, capitulis quadrifidis. *Buxb. cens. 1. t. 62. f. 2.*

Lunpria vulgaris. *Mich. gen. 4. t. 4. et Lunulana*

*Habitat in Europæ umbrosis.*

MARCHANTIA calyce communi hemispherico a-tenella. piculato: margine radiato.

Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fimbriatis. *Dill. musc. 521. t. 75. f. 4.*

*Habitat in Virginia. D. Gronovius.*

- hemisphærica.* 5. **MARCHANTIA** calyce communi quinquefido hemisphærico, perichætio nullo. *Fl. suec.* 932. *Fl. lapp.* 424. *Roy. lugdb.* 507.  
*Hepatica media*, capitulo hemisphærico. *Mich. gen.* 3. t. 2. f. 2.  
*Lichen pileatus parvus*, foliis crenatis. *Dill. musc.* 519. t. 75. f. 2.  
*Lichen petræus*, capitulis stellatis crassis, pediculis brevibus insidentibus *Buxb. cent.* 2. p. 5. t. 5. f. 1.  
*Habitat in Europæ paludosis.*  
*Perichætia in hac specie nulla, nec Calyces saminiferi.*
- conica.* 6. **MARCHANTIA** calyce communi quinqueloculari subovato.  
*Lichen vulgaris major pileatus & verrucosus.* *Dill. musc.* 516. t. 75. f. 1.  
*Lichen petræus*, caliculo pileolum sustinente. *Bauh. pin.* 362.  
*Lichen plinii primus & pileatus.* *Col. eiphr.* 1. p. 330. t. 331.  
*Hepatica vulgaris maior s. officinarum italiæ.* *Mich. gen.* 3. t. 2. f. 1.  
*Habitat in Europæ locis umbrosis, ripis elevatis.*
- androgyna.* 7. **MARCHANTIA** calyce communi integro hemisphærico.  
*Lichen pileatus angustifolius dichotomus.* *Dill. musc.* 520. t. 75. f. 3.  
*Hepatica minor angustifolia*, capitulo hemisphærico. *Mich. gen.* 3. t. 2. f. 3.  
*Habitat in Italia, Jamaica inter saxorum crepedines.*  
*Monoica s. Androgyna est hæc species.*

## BLASIA.

- pufilla.* 1. **BLASIA.** *Fl. suec.* 933.  
*Blasia pufilla*, lichenis pyxidati facie. *Mich. gen.* 14. t. 7.  
*Mnium lichenis facie.* *Dill. musc.* 237. t. 31. f. 7.  
*Habitat in Europa ad latera fossarum, solo ex arena sterili.*

## RICCIA.

- crystallina.* 1. **RICCIA** frondibus superficie papillofis.  
*Riccia foliis aspergine crystallina perfusis, margine incrassatis.* *Fl. suec.* 935. *It. æt.* 154.  
*Riccia minima & minor pinguis aspergine crystallina perfusa.* *Mich. gen.* 107. t. 57. f. 7. 3. *Hepa-*

- Hepatica palustris*, lobis inflatis. *Vaill. parif.* 98. t. 19. f. 2.  
*Lichen palustris*, rutæ folio. *Celf. ups.* 28. *Dill. musc.* 535. t. 78. b. 12.  
*Habitat in Europæ locis subhumidis.*
2. **RICCIA** frondibus glabris bipartitis acutis. *Fl. suec. minima.* 934.  
*Riccia minima* nitida, segmentis angustioribus acutis.  
*Mich. gen.* 107. t. 57. f. 6.  
*Lichen omnium minimus*, foliolis fissis super terram expansis. *Dill. musc.* 534. t. 78. f. 11.  
*Habitat in Europæ inundatis.*
3. **RICCIA** frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis.  
*Riccia minima* pingvis, foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virescentibus. *Mich. gen.* 107. t. 57. f. 4.  
*Hepatica palustris bifurca*, foliis brevioribus carinatis. *Vaill. parif.* 98. t. 19. f. 1.  
*Lichen minimus*, foliis venosis bifariam vel trifariam se dividendo progredientibus. *B. Dill. musc.* 533. t. 78. f. 10.  
*Lichen terrestris minor*, foliis rutæ. *Buxb. cent.* 2. p. 10. t. 5. f. 5.  
*Habitat in Anglia, Italia, Gallia.*
4. **RICCIA** frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *It. fluitans.* 241.  
*Lichenastrum aquaticum* fluitans tenuifolium furcatum. *Dill. musc.* 243. t. 74. f. 47. p. 514  
*Hepatica palustris dichotoma* segmentis angustioribus. *Vaill. parif.* 98. t. 19. f. 3.  
*Habitat in Europæ fossis, piscinis, ad ripas supra aquam extensa.*

## ANTHOCEROS.

1. **ANTHOCEROS** frondibus indivisis sinuatis puncta-punctatis.  
*Anthoceros* foliis minoribus magis laciniatis. *Dill. musc.* 476. t. 68. f. 1.  
*Anthoceros minor*, foliis magis carinatis atque eleganter crenatis, subtus incurvatis. *Mich. gen.* 11. t. 7. f. 2.  
*Habitat in Angliæ, Italiæ uliginosis, umbrosis.*
2. **ANTHOCEROS** frondibus indivisis sinuatis lævibus. *lævis.*  
*Anthoceros.* *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 507.

C c c 2

Antho-

*Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. Dill. musc.*  
476. t. 68. f. 2.

*Anthoceros major. Mich. gen. 11. t. 7. f. 1.*

*Lichen hepaticus, pediculis gramineis. Buxb. cent. 1.*  
p. 40. t. 61. f. 1.

*Habitat in Europa & America boreali.*

- multifidus.* 3. **ANTHOCEROS** frondibus bipinnatifidis linearibus.  
*Anthoceros folio tenuissimo multifido. Dill. musc.* 477.  
t. 68. f. 4.  
*Habitat in Germania.*

## LICHEN.

### \* *Leprosi tuberculati.*

- scriptus.* 1. **LICHEN** leprosus albicans, lineolis nigris ramosis  
characteriformibus. *Fl. suec.* 941.  
*Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis veluti literis*  
*inscripta. Dill. musc.* 126. t. 18. f. 1.  
*Habitat in Europæ corticibus arborum.*

- geographicus.* 2. **LICHEN** leprosus flavescens: lineolis nigris mappam  
referens. *Fl. suec.* 940.  
*Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ instar pi-*  
*ctum. Dill. musc.* 126. t. 18. f. 5.  
*Habitat in Europæ rupibus altis.*

- rugosum.* 3. **LICHEN** leprosus albicans, lineolis simplicibus pun-  
ctisque nigris confertis.  
*Lichenoides punctatum & rugosum nigrum. Dill. musc.*  
125. t. 18. f. 2.  
*Habitat in Europæ sylvis supra arborum truncos.*

- sanguineum.* 4. **LICHEN** leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris.  
*Fl. suec.* 938.  
*Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuber-*  
*culis integerrimis. Dill. musc.* 126. t. 18. f. 3.  
*Habitat in Europæ rupibus truncisque arborum.*  
*Tubercula majuscula, gibba, atra, at diffracta intus*  
*rubra sunt.*

- fusco-atr.* 5. **LICHEN** leprosus fuscus, tuberculis atris.  
*Habitat in Europæ rupibus.*

- calcareus.* 6. **LICHEN** leprosus candidus, tuberculis atris. *Fl. suec.*  
937. *It. w. goth.* 29. 211. *It. gotl.* 183.  
*Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis*  
*atris. Dill. musc.* 128. t. 18. f. 8.  
*Habitat in Europæ rupibus marmoreis.*



7. LICHEN leprosus ater, tuberculis viridibus confertis *atro-virens*.  
*Fl. suec.* 939.  
*Habitat in Europæ rupibus.*  
*Tubercula parva, flavo-virescentia, conferta, ut tota aerea flavo-virens conspiciatur, quam cingit margo niger.*
8. LICHEN leprosus niger, tuberculis albis. *atro-albus*.  
*Habitat in Alpium rupibus.*
9. LICHEN leprosus flavus, tuberculis rubris. *ventosus*.  
*Habitat in Alpium rupibus.*
10. LICHEN leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Faginus*.  
*It. scan.* 59.  
*Habitat in Europa, vestiens truncos Fagi.*
11. LICHEN leprosus cinereus, tuberculis albidis rugo-carpineus.  
*lis.*  
*Lichen geographicus. It. scan.* 48.  
*Habitat in Carpini truncis, ramis.*
12. LICHEN leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *aricetorum*.  
*Fl. suec.* 936. *It. scan.* 34.  
*Lichen crustaceus, calyce convexo foliis majore. Fl. lapp.* 455.  
*Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. Dill. musc.* 76. t. 14. f. 1.  
*Fungus omnium minimus turbinatus croceus. Bocc. musc.* 2. p. 150. t. 10.  
*Fungilli incarnati coloris, minuti musco insidentes. Mentz. pug.* t. 6.  
*Habitat in Europæ sylvis sterilissimis, glareosis subnudis, uliginosis.*
- \* *Leprosi scutellati.*
13. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *candelarius*.  
*Byssus farinacea flava. It. æl.* 30. *It. w:goth.* 159.  
*Habitat in Europæ parietibus, muris, truncis arborum, præsertim Quercus.*
4. LICHEN crustaceus ex albedo virescens, scutellis tartareis.  
*flavescentibus; margine albo.*  
*Lichen leprosus candidus, scutellis fuscis: margine albo. Fl. suec.* 942.  
*Lichen tinctorius ruber. It. æl.* 29. *It. w:goth.* 146.

- Lichenoides tartareum* farinaceum, scutellarum umbone fusco. *Dill. musc.* 132. t. 18. f. 12.  
*Lichen crustaceus saxatilis* farinaceus verrucosus candidus omnium crassissimus, receptaculis florum nigris. *Mich. gen.* 96. t. 52. f. 6.  
*Habitat in Europa ad parietes rupium.*
- pallidus.* 15. *LICHEN* crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Fl. suec.* 944.  
*Lichenoides crustosum orbiculare incanum.* *Dill. musc.* 135. t. 18. f. 17.  
*Habitat in Europæ corticibus arborum.*
- subfusus.* 16. *LICHEN* crustaceus albicans, scutellis subfuscis: margine cinereo subcrenato. *Fl. suec.* 943.  
*Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis subfuscis.* *Dill. musc.* 134. t. 18. f. 16.  
*Habitat in Europa, arboribus & rupibus innascens.*
- upsaliensis.* 17. *LICHEN* crustaceus, foliis subulatis stratis.  
*Habitat in summis Jugis supra terram sterilissimam campi polonici, Upsaliæ, nec alibi nobis visus.*  
*Magnitudo Lichenis saxatilis, cinereo-albus, constans Setis rectis, albis, emarcidis, prostratis, inæqualibus, confusis, simplicissimis, longitudine unguis, fragilissimis, sæpe pluribus basi coalitis. Scutella alba, margine obtuso, majuscula, radicalia, nec setis infusca.*
- \* *Imbricati.*
- centrifugus.* 18. *LICHEN* imbricatus, foliolis multifidis obsolete levibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Fl. suec.* 945.  
*Lichen foliis planis multifidis obtusis: laciniiis linearibus, calycibus concavis.* *Fl. lapp.* 448. t. 11. f. 2.  
*Lichen-imbricatum viridans, scutellis badiis.* *Dill. musc.* 180. t. 24. f. 75.  
*Habitat in Europæ frigida rupibus. rupestris.*
- saxatilis.* 19. *LICHEN* imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Fl. suec.* 946.  
*Mat. med.* 494.  
*Lichen foliis planis acute laciniatis rubiginoso-albidis.* *Fl. lapp.* 447. *Roy. lugdb.* 507.  
*Lichen tinctorius.* *It. scan.* 409. \*  
*Lichen opere phrygio ornatus.* *Vaill. parif.* t. 21. f. 5.  
*Liche-*

*Lichenoides* vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum & cirrhosum. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 83.

Musco-fungus *Lichenoides* minor cinereus vulgatissimus. *Moris. hist.* 3. p. 634 f. 15. t. 7. f. 6.

*Habitat in Europæ rupibus. rupestris.*

20. **LICHEN** imbricatus, foliolis multifidis glabris ob-*omphalodes.* tuis incanis, punctis vagis eminentibus. *Fl. succ.* 947.

*Lichen* nigricans *omphalodes*. *Vaill. parif.* 116. t. 20. f. 10.

*Lichenoides* saxatile tinctorium, foliis pilosis purpureis. *Dill. musc.* 185. t. 24. f. 80.

*Habitat in Europæ rupibus. rupestris & arboreus.*

21. **LICHEN** imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. *olivaceus.* *Fl. succ.* 948.

*Lichen* foliis planis multifidis obtusis: laciniis apice latioribus. *Fl. lapp.* 449. *Roy. lugdb.* 511.

*Lichen* crustæ modo arboribus adnascens, *olivaceus.* *Vaill. parif.* t. 20. f. 8.

*Lichenoides* *olivaceum*, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. musc.* 184. t. 24. f. 78.

*Habitat in Europæ rupibus. arboreus & rupestris.*

22. **LICHEN** imbricatus: foliolis linearibus dichotomis *sahlunensis.* planiusculis acutis nigris, scutellis atris. *Fl. succ.* 1140.

*Lichenoides* tinctorium atrum, foliis minimis crispis. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 81.

*Habitat in Europæ rupibus nudis. rupestris.*

23. **LICHEN** imbricatus, foliolis palmatis incurvis atris. *flygins.* *Fl. succ.* 949.

*Habitat in Suecia, imprimis in Insula Balthici Blå-kulla. rupestris.*

24. **LICHEN** foliis imbricatis dentato-ciliatis, scutellis *cristatus.* folio majoribus.

*Lichenoides* gelatinosum, foliis imbricatis & cristatis. *Dill. musc.* 140. t. 19. f. 26.

*Habitat in Europa australi.*

25. **LICHEN** imbricatus, foliis crispis-fulvis, peltis con-*parietinus.* coloribus fulvis.

*Lichenoides* vulgare sinuosum, foliis & scutellis luteis. *Dill. musc.* 180. t. 24. f. 76.

*Habitat in Europæ parietibus, rupibus, lignis. arbo-reus f. rupestris.*

*physodes.*

26. **LICHEN** imbricatus: laciniis obtusis subinflatis.  
Lichen foliaceus subdepressus lævis, laciniis integerrimis truncatis subtus concavis lacunosis atris. *Fl. suec.* 951.

Lichen faxeus. *It. scan.* 409.

Lichen crustæ modo arboribus adnascens tenuiter divisus. *Buxb. cent* 3. p. 272. t. 14. f. 1.

Lichen pulmonarius arboribus adnascens: desuper cinereus, subtus anthracinus: segmentis teretibus tubulosis. *Mich. gen.* 91. t. 50. f. 1. 2.

Lichenoides ceratophyllum obtusius & minus, ramosum. *Dill. musc.* 154. t. 20. f. 49.

*Habitat in Europæ corticibus Betulæ, & Saxi acrupibus.*

*Dignoscitur a reliquis apicibus foliorum tumidis, & si transversim secantur, inflatis.*

*stellatis.*

27. **LICHEN** imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Fl. suec.* 950.

Lichen foliis laciniatis cinereis: laciniis obtusiusculis sæpius apice trifidis. *Roy. lugdb.* 510.

Lichen pulmonarius vulgatissimus superne albo-cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis, receptaculis nigricantibus. *Mich. gen.* 91. t. 43. f. 2.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. musc.* 176. t. 24. f. 70.

*Habitat in Europæ ramis arborum.*

*arboreus.*

*Affinis plurimum L. rupestri.*

\* *Foliacei.*

*ciliatis.*

28. **LICHEN** foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Fl. suec.* 952.

Lichen foliis laciniatis cinereis: laciniis linearibus apice pilosis. *Roy. lugdb.* 509.

Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis, major. *Vaill. paris.* 115. t. 20. f. 4.

Lichenoides hispidum majus & rigidius, scutellis nigris. *Dill. musc.* 150. t. 20. f. 45.

Musco-fungus arboreus cinereus scutellatus: marginibus pilosis. *Morif. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 6.

Muscos arboreus pyxoides pilosus. *Loef. pruss.* 171. t. 50.

*Habitat in Europæ arboribus.*

*arboreus.**cylindricis.*

29. **LICHEN** foliaceus ciliatus, peltis cylindricis rectis  
iparsis perforatis truncatis: duplici circulo. *Amerc.*

*acadm.* 2. p. 264.

*Lichen*

*Lichenoides foliorum laciniis crinitis.* *Dill. musc.* 149.

t. 20. f. 42.

*Habitat in* Pennsylvania, Lapponia. *D. Montin.*

30. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus; margini-*islandicus.*  
bus elevatis ciliatis. *Fl. succ.* 959. *Mat. med.* 493.

Lichen foliis oblongis laciniatis: marginibus conniven-  
tibus ciliatis. *Fl. lapp.* 445. *Roy. lugdb.* 508. *Hall.*  
*helv.* 75.

Lichen terrestris, foliis eryngii. *Buxb. cent.* 2. p. 11.  
t. 6. f. 1. 2.

*Lichenoides rigidum*, eryngii folia referens. *Dill. musc.*  
209. t. 28. f. 111.

Muscus islandicus purgans. *Borrich. act. Haffn.* 1674.  
p. 126.

31. Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus & crissi-  
oribus foliis. *Dill. musc.* 212. t. 28. f. 112..

γ. Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muliebris in-tenuissimus.  
star textum. *Dill. musc.* 113. t. 17. f. 32.

*Habitat in* Europæ sylvis sterilissimis, Pinetis. *ter-*  
*restris.*

Varietas γ. *habitat frequens in sterilissimis collibus Sæ-*  
*cici, Ramulis omnino teretibus, intus cavis, nec ciliatis*  
*adeoque diversissimus; at color luridus, basis rubra,*  
*varia specimina & gradus, unam eandemque speciem*  
*esse evincunt.*

31. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus crispus gla-*nivalis.*  
ber lacunofus albus margine elevato. *Fl. succ.* 958.

Lichen niveus sinibus dædaleis laciniatus, ramis erectis,  
calyce orbiculato. *Fl. lapp.* 446. t. 11. f. 1.

Lichenoides lacunofum candidum glabrum, endivia  
crispæ facie. *Dill. musc.* 162. t. 21. f. 56.

*Habitat in* Lapponiæ, Upsaliæ, Grœnlandiæ *alpinis,*  
*apricis, siccis, glareosis. terrestris.*

32. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra *pulmonarius*  
lacunofus; subtus tomentosus. *Fl. succ.* 960. *Mat.*  
*med.* 490. *It. w:goth.* 215.

Lichen foliis oblongis divitis, superficte reticulato-pun-  
ctata. *Fl. lapp.* 444. *Roy. lugdb.* 509.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, margini-  
bus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 29. f. 113.

Muscus pulmonarius. *Bauh. pin.* 361.

Pulmonaria. *Fuchs. hist.* 631. *Cam. epit.* 783.

C c c c 5

Ha

*Habitat in Europæ sylvis umbrosis super arbores antiquas, præsertim in Fagis & Quercibus. arboreus.*

*furfuraceus.* 33. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: lacinis acutis: subtus lacunosis atris. *Fl. succ.* 953.

Lichen foliis planis laxis flaccidis inæqualiter laciniatis supra albis subtus atris. *Fl. lapp.* 450.

Lichen arboreus leucomelanus: ramulis altera parte antracinis, altera candidissimis. *Buxb. cent.* 2. p. 12. e. 7. f. 1.

Lichenoides cornutum amarum: desuper cinereum; inferne nigrum. *Dill. musc.* 157. t. 21. f. 52.

Musculus amarus, ablinthii folio. *Bauh. hist.* 3. p. 764. *Habitat in Europæ arboribus. arboreus.*

*ampullaceus* 34. LICHEN foliaceus planiusculus lobatus crenatus, petitis globosis inflatis.

Lichen foliis laciniatis, marginibus convolutis in vesiculam abeuntibus. *Roy. lugdb.* 509.

Lichenoides tinctorum glabrum vesiculosum. *Dill. musc.* 183. t. 24. f. 82.

*Habitat in Lancastria Angliæ.*

*farinaceus.* 35. LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus: lateribus verrucosis. *Fl. succ.* 957.

Lichen foliis multifidis, calycibus in margine foliorum sessilibus. *Roy. lugdb.* 510.

Lichen cinereus angustior, scutis in marginibus segmentorum. *Vaill. parif.* 115. t. 20. f. 14. 15. 13.

Lichenoides segmentis angustioribus ad margines verrucosis & pulverulentis. *Dill. musc.* 172. t. 23. f. 63.

*Habitat in Europæ arboribus, præsertim Quercibus fraxinetis.*

*calicaris.* 36. LICHEN foliaceus erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus. *Fl. succ.* 956.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Vaill. parif.* 115. t. 20. f. 6.

Lichenoides coralliforme rostratum & canaliculatum. *Dill. musc.* 170. t. 23. f. 62.

Musco-fungus arboreus, capitulis rostratis. *Morif. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 5.

*Habitat in Europæ arboribus, rupibus.*

*fraxineus.* 37. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublacinatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Fl. succ.* 955.

- Lichen foliis oblongis planis rugosis sinuatis, calycibus orbiculatis petiolatis. *Roy. lugdb.* 509.
- Lichen pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias divisus. *Tournef. inst.* 549. *f.* 325. *f. A. B.*
- Lichenoides longifolium rugosum rigidum. *Dill. musc.* 165. *t.* 22. *f.* 59.
- Musco-Fungus quernus latifolius cinereus. *Morif. hist.* 3. *p.* 634. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 14. 3. 4.
- Habitat in Europæ Arboribus, præsertim Buxinis. arboreus.*
38. LICHEN foliaceus erectiusculus lævis subtomentosus *fuciformis*.  
ramosus, laciniis lanceolatis.  
Lichenoides fuciforme tinctorium, corniculis longioribus & acutioribus. *Dill. musc.* 168. *t.* 22. *f.* 61.
- Fucus verrucosus tinctorius Roccella. *Baub. pin.* 365.  
*Baub. hist.* 3. *p.* 797.
- Fucus marinus, Roccella tinctorum. *Baub. pin.* 365.  
*Habitat in India, Canariis.*
39. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunofus: subtus *prunastri*.  
tomentosus albus. *Fl. suec.* 954.
- Lichen foliis mollibus candicantibus dichotomis, calycibus orbiculatis sessilibus. *Roy. lugdb.* 570.
- Lichen cinereus vulgatissimus cornua damæ referens.  
*Vaill. parif.* 115. *t.* 20. *f.* 11. 12.
- Lichenoides cornutum, bronchiale molle subtus incanum. *Dill. musc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.
- Habitat in Europæ arboribus, præsertim in Prunospinoso. arboreus.*
40. LICHEN foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis *juniperinus*.  
vidis. *Fl. suec.* 967.
- Lichen fulvus sinibus dædaleis laciniatus. *Fl. lapp.* 459.  
*Roy. lugdb.* 510.
- Habitat in Europæ juniperetis. arboreus.*
- Differt a L. parietino colore pallide flavo; foliis laxis erectiusculis; peltis disco brunneis.*
41. LICHEN pallide viridis rugosus margine undulatus. *caperatus*.  
*Roy. lugdb.* 510. *Guett. stamp.* 1. *p.* 31.
- Lichenoides caperatum rosaceæ expentum. *Dill. musc.* 193. *t.* 25. *f.* 97.
- Musco-fungus lichenoides, crustæ modo adnascens major cinereus. *Morif. hist.* 3. *p.* 633. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 1.
- Habitat in Europa & America ad saxa & arbores.*

*glaucus.*

42. LICHEN foliaceus depressus lobatus glaber: margine crispo farinaceo. *Fl. succ.* 966.

Lichenoides endiviæ foliis crispis splendentibus subtus nigricantibus. *Dill. musc.* 192. t. 25. f. 96.

Musco-Fungus lichenoides arborum crispas cinereus subtus nigricans. *Morif. hist.* 3. p. 633. f. 15 t. 7. f. 4.

*Habitat in Europæ frigida, præsertim Succia, transis Betulinis.* *arboreus.*

\* *Coriacei.*

*aquaticus.*

43. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus, peltis hemisphæricis maximis.

Lichenoides scutellis amplis. *Dill. musc.* 150. t. 20. f. 44.

*Habitat in Suecia sub aqua, in paludibus.*

*Planta diversa a Lichene crinito.* *Dill. musc.* t. 84. f. 8.

Folia lobata, pallide viridia, margine integerrima. Peltis sessiles, primum plana, demum dilatata, foliis majores, incarnato fusca, marginis reflexo, supra discum folii posita.

*raspinatus.*

44. LICHEN foliaceus repens lobatus, peltis marginalibus posticis.

Lichen pulmonarius major f. minor ex obscuro cinereus: interne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris ad latera oblongis. *Mich. gen.* 86. t. 44. f. 1. 2.

Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill. musc.* 206. t. 28. f. 105.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*terrestris.**venosus.*

45. LICHEN foliaceus repens ovatus planus subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Fl. succ.* 964.

Lichenoides parvum virescens, peltis marginalibus planis. *Dill. musc.* 208. t. 28. f. 109.

*Habitat in Europa ad margines scrobiculorum in sylvis.* *terrestris.*

*apthosus.*

46. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Fl. succ.* 963. *Mat. med.* 422. *Amæn. acad.* 2. p. 69.

Lichenoides digitatum late virescens, verrucis nigris notum. *Dill. musc.* 207. t. 28. f. 106.

*Habitat in Europæ Sylvis acerosis sterilibus sub juniperis.* *terrestris.*

*arcticus.*

47. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus lavis subrus avenius villosus. *Fl. succ.* 962.



Lichen foliis planis subrotundis lobatis obtusis, calyce plano ovali lacinula propria adnato, niveus *Fl. lapp.* 442.

*Habitat in Suecia boreali, sub juniperis. terrestris.*

Folia lata, integra, albida, subtus nivea. Pelta subtus versus marginem, magna, livido-incarnata, magnitudine pollicis, adeoque inter omnes Lichenes latissima. Supra læve est folium.

48. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus *caninus*, subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Fl. succ.* 961. *Mat. med.* 491.

Lichen foliis planis subrotundis lobatis obtusis calyce plano lacinia propria adnato. *Fl. lapp.* 441. *Roy. lugdb.* 508.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill. paris.* 116. t. 21. f. 16.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis sinuosis. *Dill. musc.* 200. t. 27. f. 102.

Musco-Fungus terrestris latifolius cinereus, hepaticæ facie. *Morif. hist.* 3. p. 632. f. 15. t. 7. f. 1.

*Habitat in Europæ sylvis, juxta lapides, in terra terrestris.*

49. LICHEN foliaceus repens subrotundus planus sub-*croceus*, tus venosus villosus croceus, peltis sparsis adnatis. *Fl. succ.* 965.

Lichen foliis subrotundis planis levissime incis, calycibus orbiculatis disco folii adnatis. *Fl. lapp.* 443. t. 11. f. 3. *Roy. lugdb.* 509.

Lichen alpinus viridis subtus aurantius, scutis magnis nigris planissimis. *Hall. belv.* 74.

Lichenoides subtus croceum, peltis appressis. *Dill. musc.* 221. t. 30. f. 120.

*Habitat in Lapponia, Helvetia, Grœnlandia. terrestris.*

\* *Umbilicati, squalentes quasi fuligine.*

50. LICHEN foliaceus gibbus punctatus subtus *fulvus. miniatus.* Lichen pulmonarius alpinus cinereus punctatus. *Hall. belv.* 75. t. 2. f. 2.

Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum subtus fulvum. *Dill. musc.* 223. t. 30. f. 127.

*Habitat in Angliæ, Helvetiæ, Italiæ, rupibus alpinis.*

*vellens.*

51. LICHEN foliaceus umbilicatus subtus hirsutissimus.  
*Fl. succ.* 968.

Lichen folio subrotundo peltato: margine fere integro, subtus maxime hirsutus. *Fl. lapp.* 454. *Roy. lugdb.* 511.  
 Lichenoides coriaceum, latissimo folio umbilicato & verrucoso. *Dill. musc.* 545. t. 82. f. 5.

*Habitat in alpinis Lapponiæ, Sueciæ, Angliæ. rupestris.*

*pustulatus.*

52. LICHEN foliaceus umbilicatus: subtus lacunofus.  
*Fl. succ.* 969,

Lichen folio orbiculato margine integrifusculo, superficie subtus puculata. *Fl. lapp.* 453. *Roy. lugdb.* 511.  
 Lichenoides crustæ modo saxis adnascens verrucosus cinereus & veluti deustus. *Vaill. parif.* 116. t. 20. f. 9.

Lichenoides pustulatum cinereum & veluti ambustum.  
*Dill. musc.* 227. t. 30. f. 131.

*Habitat in Europæ rupibus apricis.*

*rupestris.**probooscideus*

53. LICHEN foliaceus umbilicatus, peltis turbinatis truncatis perforatis.

*Habitat in Suecia.*

Folium magnitudine pollicis, subrotundum, orbiculatum, margine inequaliter & obtuse lobatum, centro radicatum, subtus læve, hinc inde & rarius fibræ radicantem exserens; Pagina superior planiuscula vel nonnihil contorta, cinerea, punctis fuscis elevatis exasperata. Peltæ per discum sparsæ, atræ, minimæ, turbinatæ, truncatæ, poro pertusæ usque ad folium, margine lato plano.

*densus.*

54. LICHEN foliaceus umbilicatus undique lævis. *Fl. succ.* 970. *It. w. goth.* 217.

Lichen folio orbiculato peltato margine integrifusculo undique glaber. *Fl. lapp.* 452. *Roy. lugdb.* 511.

Lichen pulmonarius saxatilis e cinereo fulcus minimus. *Vaill. parif.* 116. t. 21. f. 14.

Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compressis. *Vaill. parif.* 229. t. 30. f. 117. 1. *Dill. musc.*

*Habitat in Sueciæ, Galliæ rupibus s. caulis elatis apricis.*

*rupestris.**polyphyllus.*

55. LICHEN foliaceus polyphyllus utrinque lævis æternatus.

Lichenoides tenue pullum, foliis utrinque glabris. *Dill. musc.* 225. t. 30. f. 129.

*Habitat in Europæ rupibus elatis apricis.*

*rupestris.*

56. LI

16. LICHEN foliaceus polyphyllus utrinque lævis poly-polyrhizos.

Lichenoides pullum superne & glabrum, inferne nigrum & cirrhosum. *Dill. musc.* 226. t. 30. f. 130.

*Habitat in Arvonix, Sveciæ rupibus apricis elatis. rupestris.*

\* *Scyphiferi.*

17. LICHEN scyphifer simplex integerrimus, stipite cy-cocciferus, lindrico, tuberculis coccineis. *Fl. suec.* 972. *Mat. med.* 496.

Lichen caule simplici, calyce turbinato margine carnosulo colorato prolifero. *Fl. lapp.* 429. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *Vaill. parif.* 115. t. 21. f. 4. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 3.

Lichenoides scyphiforme, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. t. 14. f. 7. 1. *Coralloides*.

*Habitat in Europæ sylvis sterilibus, ericetis, rupibus.*

18. LICHEN scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Fl. suec.* 974. *cornucopioides.*

Lichen caule simplici, calyce turbinato: centro multipliciter prolifero. *Fl. lapp.* 432. *Gron. virg.* 204. 128.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. musc.* 85. t. 14. f. 9.

Muscus pyxoides. *Barr. rar.* 1284. t. 1268. f. 2.

*Habitat in Lapponiæ, Sveciæ, Angliæ sylvis glareosis.*

19. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculis pyxidatus, fuscis. *Fl. suec.* 971.

Lichen caule simplici, calyce turbinato: margine tenui. *Fl. lapp.* 428. *Gron. virg.* 203. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus major. *Tournef. inst.* 549. t. 325. f. 1. *D. Vaill. parif.* 115. t. 21. f. 8. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 1.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 79. t. 14. f. 6.

Fungus terrestris pyxidatus. *Magn. hort.* 83. t. 83.

20. Lichen caule simplici, calyce turbinato: centro simpliciter prolifero. *Fl. lapp.* 431. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus prolifer. *T. Vaill. parif.* 115. t. 21. f. 5. 9. 11.

Lichen pyxidatus major alpinus, receptaculis copiosioribus & rufescentibus. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 2. 7. 9.

*Habitat in Europæ sylvis.*

- funbriatus.* 60. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Fl. suec.* 973.  
 Lichen caule simplici, calyce turbinato: margine acuto prolifero. *Fl. lapp.* 430.  
 Lichen pyxidatus minor: *Vaill. parif.* 115. t. 21. f. 6.  
*Mich. gen.* 83. t. 41. f. 45.  
 Coralloides scyphiforme gracile: marginibus ferratis. *Dill. musc.* 84. t. 14. f. 8.  
*Habitat in Europæ sylvis sterilibus.*
- gracilis.* 61. LICHEN scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *Fl. suec.* 975.  
 Lichen pyxidatus & corniculatus ramosus alpinus etusco cinereus, pyxidulis crenatis. *Mich. gen.* 81. t. 41. f. 5.  
 Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. musc.* 88. t. 14. f. 13.  
 Musco-fungus pyxidatus gracilior ramosus, calycibus ferratis. *Morif. hist.* 3. p. 362. f. 15. t. 7 f. 6.  
*Habitat in Europæ ericetis, montosis, sylvaticis.*
- digitatus.* 62. LICHEN scyphifer ramosissimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Fl. suec.* 978.  
 Lichen caule inordinate ramoso, ramis in calyces turbinatos margine carnosos delinentibus. *Fl. lapp.* 436.  
 Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 96. t. 15. f. 19.  
*Habitat in Europæ sylvis sterilibus.*
- convolutus.* 63. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris, *Fl. suec.* 976.  
 Lichen caule simplici, subulato rarius bifido. *Fl. lapp.* 434. *Roy. lugdb.* 512.  
 Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc.* 90. t. 15. f. 14.  
 Muscus fistulosus corniculatus. *Barr. rar.* 1286. t. 1277. f. 1. *Bocc. musc.* 2. p. 149. t. 107.  
*Habitat in Europæ ericetis.*
- deformis.* 64. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis, *Fl. suec.* 977.  
 Lichen caule simplici, apice acuto s. calyce turbinato terminato. *Fl. lapp.* 433. t. 11. f. 3 f.  
 Lichen pyxoides teres, acetabulis minoribus repandis. *Mich. gen.* 80. t. 41. f. 1.

Coral-

*Coralloides crassius subincanum, calycibus dentatis.*

*Dill. musc. 95. t. 15. f. 18. mala.*

*Habitat in Europæ ericetis.*

\* *Fruticulosi.*

65. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Fl. succ. 980.*

Lichen caule erecto tereti ramosissimo, alis perforatis. *alpestris.*

*Fl. lapp. 437. Gron. virg. 203. 127. Roy. lugdb. 511.*

*Coralloides montanum, fruticuli specie ubique candicans. Dill. musc. 107. t. 16. f. 29.*

Musco fungus coralloides montanus ramosissimus cinereus vulgaris. *Morif. hist. 3. p. 633. f. 15. t. 7. f. 9.*

Muscus coralloides s. cornutus montanus. *Bauh. pin. 361.*

Muscus corallinus s. *Corallina montana. Tabern. hist. 1198. Tabm.*

66. Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis capitatis. *sylvaticus.*

*Roy. lugdb. 511.*

*Coralloides fruticuli specie candicans, corniculis rufescentibus. Dill. musc. 110. t. 16. f. 30.*

Muscus terrestris coralloides erectus, corniculis rufescentibus. *Bauh. pin. 361. prodr. 152.*

*Habitat in Alpibus, Europæ frigida sylvis sterilissimis, Alpestris differt a sylvatico, ut flos plenus a simplici.*

67. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Fl. succ. 979.*

Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis brevissimis acutis. *Fl. lapp. 438. Roy. lugdb. 511.*

*Coralloides perforatum minus, molle & tenue. Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.*

*Habitat in Europæ ericetis*

68. LICHEN fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Fl. succ. 981.*

Lichen caule erecto dichotomo, ramis subulatis. *Fl. lapp. 435. Roy. lugdb. 512.*

*Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.*

Muscus corniculatus. *Tabern. ic. 809. Bauh. hist. 3. p. 767.*

*Habitat in Europæ sylvis, ericetis.*

69. LICHEN fruticulosus solidus tectus foliolis crustaceis. *Fl. succ. 982.*

Lichen caule ramoso solido foliolis crustaceis tecto. *Fl. lapp.* 439. *Roy. Ingb.* 512.

Lichen alpinus glaucus ramosus botryoides. *Schenck alp.* 137. *t.* 19. *f.* 4.

Coralloides crispum & botryoides alpinum. *Dill. musc.* 114. *t.* 17. *f.* 33.

Corallina alpina valde crispa. *Pet. musc. t.* 65. *f.* 7.

Musco-fungus coralloides terrestris dense ramificatus cinereus & veluti incrustatus norvegicus. *Morif. hist.* 3. *p.* 633. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 12.

Muscus cupressiformis ramosus. *Læs. pruss.* 168. *t.* 48.

*Habitat in* Helvetiæ, Italiæ, Cambriæ, Lapponiæ, Scaniæ, Grœnlandiæ, Pensylvaniæ *alpestribus.*

*fragilis.* 69. LICHEN fruticulosus solidus, ramulis teretibus obtusis. *Fl. suec.* 983.

Lichen erectus ramosissimus, ramulis teretibus nudis filiformibus obtusis. *Fl. lapp.* 440. *t.* 11. *f.* 4.

Coralloides alpinum, corallinæ minoris facie. *Dill. musc.* 116. *t.* 17. *f.* 34.

*Habitat in* Europæ *alpinis* *que, per Sueciam in rupibus.*

*Roccella.* 70. LICHEN fruticulosus solidus aphyllus subramosus, tuberculis alternis.

Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium fuci teretis facie. *Dill. musc.* 120.

Muscus ceranoides palmenfis, cornis digitatis orbiculatus. *Pet. gaz.* *t.* 7. *f.* 12.

Muscus ceranoides albus fungosus apicibus nigris. *Plin. alm.* 255. *t.* 205. *f.* 6.

Fucus marinus Roccella tinctorum. *Bauh. pin.* 365.

Fucus capillaceus Roccella. *Bauh. pin.* 365.

*Habitat in insulis* Archipelagi, Canariis, *ad rupes marinas.*

\* Filamentosi.

*plicatus.* 71. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis scutellis radiatis. *Fl. suec.* 984. *Mat. med.* 495.

Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis confertis. *Fl. lapp.* 457. *Gron. virg.* 203. 127.

Usnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.

Muscus arboreus, Usnea officinarum. *Bauh. pin.* 366.

*Habitat in* Europæ & Americæ borealis *sylvis* *decumbrosisque* *aggetis.*

72. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, *ra-barbatus*.  
mis patentibus. *Fl. succ.* 985.

Lichen caule tereti coriaceo, ramulis tenuissimis cine-  
reis. *Roy. lugdb.* 513.

Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill. musc.* 63.  
*t. 12. f. 6.*

Muscus capillaceus longissimus *Bauh. pin.* 361.

*Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis sylvis sa-  
getis.*

73. LICHEN filamentosus pendulus: axillis compressis. *inbatus*.  
*Fl. succ.* 986.

Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis, alis com-  
pressis. *Fl. lapp.* 456.

Usnea jubata nigricans. *Dill. musc.* 64. *t. 12. f. 7.*

Muscus arborum niger & tenuior. *Dod. pempt.* 471.

*Habitat in Europæ sylvis & rupibus.*

4. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens im-*lanatus*,  
plicatus opacus. *Fl. succ.* 987.

Usnea lanæ nigræ instar saxi adhærens. *Dill. musc.* 66.

*t. 13. f. 8.*

*Habitat in Europæ frigida rupibus.*

5. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens im-*pubescens*,  
plexus nitidus

Usnea cæspitosa exilis capillacea atra. *Dill. musc.* 66.

*t. 13. f. 9.*

*Habitat in Europa septentrionali, Lapponia, Suecia.*

6. LICHEN filamentosus subramosus decumbens im-*chalybeiformis*,  
plicato-flexuosus. *Fl. succ.* 988.

Usnea rigida horsum vorsum extensa. *Dill. musc.* 66.

*t. 13. f. 10.*

Muscus caule rigido instar fili chalybei. *Raj. anglie.* 3.

*p. 65.*

*Habitat in Europa supra rupes & sepimenta.*

LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuber-*hirtus*,  
culis farinaceis sparsis. *Fl. succ.* 989.

Usnea vulgarissima tenuior & brevior sine orbiculis.  
*Dill. musc.* 67. *t. 13. f. 12.*

Muscus ramosus. *Tabern. ic.* 807.

*Habitat in Europæ arboribus, sepimentis.*

LICHEN filamentosus ramosissimus erectus fastigia-*vulpinus*,  
tus inæquali-angulosus. *Fl. succ.* 990.

D d d d 2

Uf-

*Usnea capillacea citrina*, fruticuli specie. *Dill. musc.* 73. t. 13. f. 16.

*Habitat in Europæ tectis ligneis, muris.*

*articulatus.* 79. Lichen filamentosus articulatus, ramulis tenuissimis punctatis. *Roy. lugdb.* 513. n. 29.

*Usnea capillacea & nodosa.* *Dill. musc.* 60. t. 11. f. 4.

*Muscus arboreus nodosus.* *Baub. pin.* 361.

*Musco-fungus arborum nodosus* f. geniculatus. *Morif. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 11.

*Dendrobryon geniculatum* f. nodosum. *Col. scphr.* 84. t. 83. f. 2.

*Habitat in Europæ australis sylvis.*

*floridus.* 80. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Fl. suec.* 991.

Lichen caule ramoso solido, foliis setaceis, receptaculis maximis orbiculatis peltatis ciliato-radiatis. *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 513.

*Usnea* vulgarissima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. musc.* 69. t. 13. f. 13.

*Muscofungus arborum capillaceus*, scutellis amplis per ambitum pilis radiatis. *Morif. hist.* 3. p. 635. f. 15. t. 7. f. 14.

*Muscus arboreus* cum orbiculis. *Baub. pin.* 361.

*Muscus ramosus floridus.* *Tabern. ic.* 808.

*Habitat in Europæ jagetis.*

### CHARA.

*tomentosa.* 1. CHARA aculeis caulinis ovatis. *Fl. suec.* 993.

*Equisetum fragile majus subcinereum* aquis immersum.

*Morif. hist.* 3. p. 621. f. 15. t. 4. f. 9.

*Equisetum* f. *Hippuris lacustris*, foliis mansu arenosis.

*Pluk. alm.* 135. t. 29. f. 4.

*Habitat in Europæ stagnis, mari, lacubus.*

*vulgaris.* 2. CHARA caulibus lævibus, frondibus interne dentatis.

*Chara vulgaris.* *Fl. lapp.* 469. *Fl. suec.* 992.

*Chara caulibus lævibus.* *Roy. lugdb.* 533.

*Chara vulgaris foetida.* *Vaill. act.* 1719. p. 23. t. 3. f. 1.

*Equisetum foetidum* sub aqua repens. *Baub. pin.* 16. prodr.

25. theatr. 251. *Baub. hist.* 3. p. 731.

*Habitat in Europæ aquis pigris.*

*bispida.* 3. CHARA aculeis caulinis capillaribus confertis. *Fl. suec.* 994. \*

Cha



*Chara caulibus aculeatis. Hort. cliff. 477. Roy. lugdb.*  
214.

*Chara major, caulibus spinosis. Vaill. act. 1719. p. 18.*  
t. 3. f. 3.

*Equisetum f. Hippuris muscosus sub aqua repens. Pluk.*  
alm. 135 t. 193. f. 6.

*Habitat in Europæ maritimis.*

4. CHARA caulium articulis inermibus diaphanis super-flexilis,  
ne latioribus. *It. gotl. 215. Fl. succ. 995.*

*Chara transluens minor flexilis. Raj. angl. 3. p. 133.*  
*Habitat in Europæ maritimis.*

### TREMELLA.

1. TREMELLA sessilis membranacea auriformis fulva. *juniperina.*  
*Fl. succ. 1017.*

*Byssus gelatinosa fugax, junipero innascens. Fl. lapp.*  
p. 531.

*Habitat in Juniperetis primo vere.*

2. TREMELLA plicata undulata. *Fl. succ. 1018. Nostoc.*

*Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. Dill. musc.*  
52. t. 10. f. 14.

*Byssus gelatinosa fugax terrestris. Fl. lapp. 530.*

*Linkia terrestris gelatinosa membranacea vulgarissima.*  
*Mich. gen. 126. t. 67. f. 1.*

*Nostoc paracelli. Act. parif. 1708. p. 228.*

*Habitat in Pratis post pluvias.*

3. TREMELLA sessilis membranacea auriformis cinea. *Auricula.*  
*rea. Fl. succ. 1119.*

*Agaricum auriculæ forma. Mich. gen. 124. t. 66. f. 1.*

*Fungorum perniciosorum genus 1. Clus. hist. 2. p. 276.*

*Habitat ad Arbores putridas.*

4. TREMELLA frondibus erectis planis: margine crispo lacinulato. *Fl. succ. 1020. Lichenoides.*

*Lichenoides pellucidum, endiviæ foliis tenuibus crispis.*

*Dill. musc. 143. t. 19. f. 31.*

*Lichen terrestris membranaceus mollior fuscus. Mich.*  
*gen. 26. t. 38.*

*Musco fungus terrestris minor fuscus, foliis e latitudine crenatis musco innascens. Morif. bist. 3. p. 632. f.*

*15. t. 7. f. 4.*

*Habitat in Muscis, locis umbrosis ad montes.*

- verrucosa.* 5. TREMELLA ~~la~~ tuberculosa solida rugosa. *Fl. suec.* 1021.  
*It. gotl.* 181.  
 Tremella subrotunda sinuosa difformis gelatinosa. *It. w-goth.* 193.  
 Tremella fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill. musc.* 54 t. 10. f. 16.  
 Linkia palustris gelatinosa saxis adnascens ex obscuro fulva & concava vesicam referens. *Mich. gen.* 126. t. 67. f. 2.  
*Habitat supra Lapidem in rivulis.*
- hemisphærica.* 6. TREMELLA hemisphærica sparsa. *It. w-goth.* 193.\*  
*Habitat in Rupibus & Conservis submarinis.*
- purpurea,* 7. TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra. *Fl. suec.* 1022.  
 Lichenoides tuberculosum amœne purpureum. *Dill. musc.* 127. t. 18. f. 6.  
*Habitat in Arborum ramis moribundis & emortuis.*

## FUCUS.

\* *Dichotomi frondescentes.*

- serratus,* 1. FUCUS fronde plana dichotoma serrata ad apices tuberculata. *Hort. cliff.* 478. *Fl. suec.* 1001.  
 Fucus folio dichotomo plano serrato laciniato. *Guetz. stamp.* 2. p. 402. *Fl. lapp.* 462.  
 Fucus f. Alga latifolia major dentata. *Morif. bist.* 3. p. 648. f. 15. t. 9. f. 1.  
*Habitat in Oceano.*
- vesiculosus,* 2. FUCUS fronde dichotoma integra, caule medium folium transcurrente, vesiculis verrucosis terminalibus.  
*Fl. lapp.* 466. *Fl. suec.* 1002. *It. w-goth.* 168. *It. xl.* 83. *Roy. lugdb.* 514. *Guetz. stamp.* 2. p. 401.  
 Fucus marinus f. Quercus maritima vesiculas habens. *Banh. pin.* 363.  
 Quercus marina. *Lob. ic.* 2. p. 255.  
 β. Fucus maritimus f. Quercus maritima foliorum extremis tumidis. *Banh. pin.* 365.  
*Habitat in Mari atlantico.*
- ceranoides,* 3. FUCUS fronde dichotoma plana integra: apicibus bifidis vesiculosis. *Fl. lapp.* 465. *Fl. suec.* 1005.  
 Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 13.  
*Habitat in Oceano.*

4. FU-

4. FUCUS fronde dichotoma integra, caule fo-*spiratis*.  
lium percurrente: inferne nudo, vesiculis verruco-  
lis terminalibus. *Fl. lapp.* 467. *Fl. succ.* 1003. *Roy. lugdb.* 514.  
Fucus spiralis maritimus major. *Raj. angl.* 3. p. 41.  
*Habitat in Oceano.*
5. FUCUS fronde bifida: laciniis ovato-lanceolatis in-*inflatis*.  
flatis apice divisis. *Fl. lapp.* 468. *Fl. succ.* 1004.  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
6. FUCUS fronde membranacea lineari dichotoma di-*divaricatis*.  
varicata integra: ramificationibus vesiculosis.  
Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis  
compressis bifidis. *Morif. hist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8.  
f. 5.  
*Habitat in Anglia, Lusitania.*
- \* *Dichotomi caulescentes.*
7. FUCUS fronde filiformi teretiuscula dichotoma recta: *elongatis*.  
geniculis tumidiusculis.  
Fucus caule lineari aphyllis dichotomo. *Roy. lugdb.* 514.  
Fucus spongiosus teres ramulosus viridis erectus. *Morif.*  
*hist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8. f. 7.  
*Habitat inter Angliam & Hispaniam.*
8. FUCUS dichotomus linearis: axillis divaricatis. *excisus*.  
Fucus pumilus dichotomus: segmentis ex una parte gib-  
bosis, ex altera excavatis. *Raj. angl.* 3. p. 43.  
Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flavesce-  
ceranoides, angulos rotundiuseulos efformans. *Morif.*  
*hist.* 3. p. 646 f. 15. t. 8 f. 11.  
*Habitat in Oceano Europeo.*
9. FUCUS caule compresso dichotomo medio ramorum *nodosus*.  
in veticulam dilatato. *Roy. lugdb.* 514. *Fl. succ.* 1006.  
Fucus caule tereti compresso dichotomo, vesicula me-  
dio ramorum innata, vesiculis axillaribus laxis. *Mort.*  
*cliff.* 479.  
Fucus caule tereti compresso dichotomo, foliis oppositis  
minimis, vesicula in medio singuli rami. *Fl. lapp.* 464.  
*Guet. stamp.* 2. p. 401.  
Fucus maritimus, vesiculis majoribus singularibus per  
intervalla dispositis. *Morif. hist.* 3. p. 647. f. 15. t.  
8. f. 2.  
Fucus maritimus nodosus. *Dod. pempt.* 781.  
*Habitat in Mari Atlantico.*

D d d d 4

10. FU-

*concatenatus* 10. FUCUS caule tereti ramosissimo, fructificationibus oblongis concatenatis. *Roy. lugdb.* 514.  
*Habitat in Oceano.*

\* *Ramosi foliis distinctis.*

*botanico.* 11. FUCUS caule tereti ramosissimo, foliis lanceolato-ferratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis *Fl. zeyl.* 389. *Roy. lugdb.* 513.  
Fucus folliculaceus, ferrato folio. *Bauh. pin.* 365.  
Lenticula marina, ferratis foliis. *Dalech. hist.* 1397.  
Sargazo. *Pis. bras.* 2. p. 266.  
*Habitat in Pelago libere natans, nec radicatus.*  
*Vegitabile ni fallor, inter omnia in orbe, numerosissimum.*

*acinaris.* 12. FUCUS caule tereti ramoso, foliis linearibus integerrimis, fructificationibus globosis pedunculatis.  
Fucus folliculaceus, linearæ folio. *Bauh. pin.* 365.  
Lenticula marina serapionis. *Lob. ic.* 2. p. 256.  
Acinaria imperati. *Donat. marin.* 35. t. 4. f. 1. \*  
*Habitat in Italia & Oceano australiori.*

*lendigerus.* 13. FUCUS caule tereti corymbofo, foliis lanceolatis denticulatis alternis, fructificationibus cymosis.  
*Habitat ad insulam Adscensionis. Osbeck.*  
Caulis filiformis, fuscus, spithameus, foliis alternis, quæ deciderunt. Rami ex singulis alis simplices, caule longiores, filiformes, laxi. Folia alterna, lanceolata, dentata, pellucida. Cyma pedunculata ex singulis alis superioribus, continens plurimas fructificationes subulatas, foliis breviores, fuscas, nodosas, sessiles.

\* *Ramosi fronde unita.*

*turbinatus.* 14. FUCUS ramosus teres, fructificationibus turbinatis membrana cinctis. *Hort. cliff.* 478.  
Fucus marinus vesiculas habens membranis extantibus alas. *Sloan. jam.* 4. *hist.* 2. p. 58. t. 20. f. 6.  
*Habitat in Americæ rupibus marinis.*

*siliquosus.* 15. FUCUS caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis vesiculis oblongis acuminatis. *Fl. lapp.* 463. *Fl. suec.* 1007. *Gaett stamp.* 2. p. 403.  
Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. *Bauh. pin.* 368.  
Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.  
*Habitat in Oceano.*

16. FU-

16. FUCUS vesiculis oblongis pedunculatis: terminatis <sup>barbatus.</sup>  
foliolis linearibus.  
Fucus folliculaceus, foliis abrotani. *Bauh. pin.* 365?  
Fucus maritimus, foliis tumidis barbatis. *Bauh. pin.* 365.  
Quercus maritima barbata. *Bauh. prodr.* 154.  
*Habitat in Oceano.*
17. FUCUS vesiculis ovatis pedunculatis, foliis multi-faniculaceis  
fidis linearibus.  
Fucus folliculaceus, fœniculi folio. *Bauh. pin.* 365.  
*Habitat in Oceano.*
18. FUCUS fronde bipinnata subfiliformi: apicibus ve- <sup>abrotanifo-</sup>  
liculosis dilatatis. *Læst. epist.* 1. 4. <sup>lins.</sup>  
*Habitat in mari Anglico.*
- \* *Fruetificationibus non vesicariis.*
19. FUCUS caule tereti ramossissimo, ramis sparsis spi- <sup>Muscoides.</sup>  
nis mollibus alternis.  
Ficus folliculaceus fuscus f. nigricans ex insula cypro.  
*Pet. mus.* 219? *Raj. suppl.* 13.  
*Habitat ad Insulam Adscensionis. Osbeck.*  
*Refert ita Muscum, ut exsiccatum nequeat a muscis*  
*distingui. Madidus constat substantia coriacea fuci,*  
*diaphana: caulibus ramisque confertis, filiformibus,*  
*undique adpersis rudimentis ramulorum; spinis mol-*  
*libus, substantia & colore totius, brevissimis, inertibus.*
20. FUCUS cartilagineus, caule teretiusculo compres- <sup>cartilagineus</sup>  
so: frondibus supradecompositis pinnatis: laciniis li-  
nearibus coloratis. *Roy. lugdb.* 515. *Guett. stamp.* 2.  
*p.* 404.  
Fucoides rubens varie dissectum. *Raj. angl.* 8. *p.* 37.  
Muscus marinus tenuissime dissectus ruber. *Bauh. pin.*  
363.  
*Habitat in Oceano australiore.*
21. FUCUS caule tereti brevissimo, folio maximo en- <sup>saccharinus.</sup>  
siformi subsimplici. *Fl. lapp.* 460. *Fl. succ.* 1010. *It.*  
*w:goth.* 169.  
Fucus longissimo latissimo crassoque folio. *Bauh. prodr.*  
154. *Raj. hist.* 74.  
Fucus alatus f. phasnagoides. *Bauh. pin.* 364.  
Fucus scoticus latissimus edulis dulcis. *Sibb. scotb.* 26.  
*Habitat in Mari Atlantico.*

- palmatus.* 22. **FUCUS** frondibus planis palmatis. *Roy. lugdb.* 515.  
*Fucus membranaceus ceranoides. Bauh. prodr.* 155.  
*Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens.*  
*Morif. hist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 1.  
*Habitat in Oceano.*
- rubens.* 23. **FUCUS** caule tereti ramoso, frondibus oblongis undulatis sinuatis. *Roy. lugdb.* 514.  
*Alga minor suave rubens varie divisa. Mart. cent.* 32. t. 32.  
*Habitat in Oceano.*
- pauonicus.* 24. **FUCUS** fronde sessili reniformi decussatim striata.  
*Fucus maritimus gallopavonis pennas referens. Bauh. prodr.* 155. *Morif. hist.* 3. p. 645. f. 15. t. 8. f. 7.  
*Alga marina gallopavonis plumas referens. Bauh. pin.* 364.  
*Fungus anricularis. Bauh. pin.* 368.  
*Habitat in Mari Europæ australis.*
- fastigiatus.* 25. **FUCUS** dichotomus ramosissimus teres uniformis fastigiatus. *It. æl.* 120. *Fl. succ.* 1008.  
*Fucus caule lineari dichotomo. Roy. lugdb.* 514.  
*Fucus palmaris tenuis in orbem expansus, in segmenta bifida breviora teretia divisus. Morif. hist.* 3. p. 649. f. 15. t. 9. f. 9.  
*Fucus marinus polyschides. Læf. pruss.* 77. t. 15.  
*Habitat in Oceano Balthico.*
- filum.* 26. **FUCUS** filiformis simplex subfragilis opacus.  
*Fucus filiformis simplex. Fl. lapp.* 459. *Fl. succ.* 1009.  
*Roy. lugdb.* 513. *It. w-goth.* 168. *Guett. stamp.* 2. p. 395.  
*Fucus f. Filum maritimum germanicum. Bocch. mss.* 1. p. 271. t. 9. f. 9.  
*Alga nigro capillaceo folio. Bauh. pin.* 364.  
*Filum maritimum germanicum. Bauh. prodr.* 155.  
*Linum marinum. Bart. æt.* 1671. p. 118. f. 8.  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
- tendo.* 27. **FUCUS** filiformis simplex tenuissimus subdiaphanus.  
*Fucus indicus teres, setam piscatoriam referens, longissimus. Pluk. a.m.* 160. t. 184. f. 3.  
*Gramen sparteum setas equinas referens, e quibus javanenses tapetia texunt. Bauh. prodr.* 11.  
*Habitat in China.*

## ULVA.

1. ULVA tubulosa simplex. *Fl. lapp.* 458. *Fl. succ.* 1013. *intestinalis.*  
*It. xl.* 33. *Hort. cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 515. *Gron.*  
*virg.* 204. 128.  
Tremella marina tubulosa intestinorum figura. *Dill.*  
*musc.* 47. t. 9. f. 7.  
Fucus cavus. *Baub. pin.* 364.  
*Habitat in Mari omni.*
2. ULVA tubulosa ramosa compressa. *It. gotl.* 262. *Fl. compressa.*  
*succ.* 1014. \*  
Tremella marina tenuissima & compressa. *Dill. musc.*  
48. t. 9. f. 8.  
*Habitat in Europæ mari & tectis maritimis.*
3. ULVA filiformis articulata: articulis alternatim com- *conseruoides*  
*pressis.* *Hort. cliff.* 478. \*  
Conserua marina fistulosa. *Dill. musc.* 34. t. 6. f. 39.  
*Habitat in Mari.*
4. ULVA oblonga plana undulata membranacea viridis. *latissima.*  
*It. w. gotl.* 160  
Fucus longissimo latissimo tenuique folio. *Baub. prodr.*  
154.  
*Habitat in Mari Europæ.*
5. ULVA palmata prolifera membranacea: ramentis in- *Lactuca.*  
*ferne angustatis.*  
Ulva marina lactucæ similis. *Raj. angl.* 3. p. 62.  
Tremella marina vulgaris, lactucæ similis. *Dill. musc.*  
42. t. 8. f. 1.  
Muscus marinus lactucæ similis. *Baub. pin.* 364.  
*Habitat in Oceano.*  
Fronde aggregatæ, membranaceæ, pallidæ, palmatæ: se-  
gmentis singulis iterum in frondes palmatas enatis,  
undatis, obovatis, obtusis, pellucidis.
6. ULVA fronde dilatata sublinuata, centro radicata. *umbilicatis.*  
Tremella marina umbilicata. *Dill. musc.* 45. t. 8. f. 3.  
Fucus umbilicus marinus dictus. *Baub. pin.* 364.  
*Habitat in Oceano.*
7. ULVA fronde oblonga bullata. *Linza.*  
Tremella marina fasciata. *Dill. musc.* 45. t. 9. f. 6.  
Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ similis. *Baub.*  
*hist.* 3. p. 81.  
Muscus lactucæ marinæ similis. *Baub. pin.* 364.  
*Habitat in Oceano.*

8. UL-

- prænitens*. 8. *ULVA* subglobosa solitaria. *Fl. suec.* 1015. \*  
*Fucus globosus sessilis mollis. Gleditsch. monogr.*  
*Habitat in lacubus Sueciæ, Borussia.*
- granulata*. 9. *ULVA* solitaria aggregata. *Fl. suec.* 1016. \*  
*Tremella palustris, vesiculis sphericis fungiformibus.*  
*Dill. musc.* 55. t. 10. f. 17.  
*Habitat in Europa ad ripas fluviorum.*

## CONFERVA.

\* *Filamentis simplicibus æqualibus geniculis destitutis.*

- rivularis*. 1. *CONFERVA* filamentis simplicissimis æqualibus longissimis. *Fl. suec.* 1023.  
*Conferva capillaris simplicissima enodis. Roy. Lugd.*  
*511. Guett. stamp.* 1. p. 45.  
*Conferva fluviatilis sericea vulgaris & fluitans. Dill.*  
*musc.* 12. t. 2. f. 4.  
*Habitat in Europæ rivulis fluviisque pacatioribus.*
- fontinalis*. 2. *CONFERVA* filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus.  
*Conferva minima, byssi facie. Dill. musc.* 14. t. 2. f. 3.  
*Habitat in Europæ fontibus.*

\* *Filamentis ramosis æqualibus.*

- bullosa*. 3. *CONFERVA* filamentis æqualibus ramosis, bullas aëreas includens.  
*Conferva filis ramosis æqualibus radicatis. Fl. suec.* 1024.  
*Conferva palustris bombycina. Dill. musc.* 18. t. 3. f. 2.  
*Alga bombycina. Banb. pin.* 363.  
*Muscus aquaticus bombycinus, tenuissimis filamentis.*  
*Loef. pruss.* 173. t. 55.  
*Habitat in Europæ aquis stagnantibus.*
- canalicularis* 4. *CONFERVA* filamentis æqualibus basin versus ramosioribus.  
*Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. Dill. musc.* 21. t. 4. f. 15.  
*Alga in tubulis aquam fontanarum ducentibus. Banb. pin.*  
*364.*  
*Habitat in Europæ rivulis, tubulis, canalibus molarinarum.*
- amphibia*. 5. *CONFERVA* filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coëuntibus in aculeos.

con-



*Conferva amphibia, fibrillosa & spongiosa. Dill. musc.*  
22. t. 4. f. 17.

*Habitat in Europæ nidis, fessis, umbrosis, ubi aquæ vicissitudines servant.*

6. CONFERVA filamentis æqualibus ramosissimis *c-littoralis*, longatis scabriusculis.

*Conferva maritima filiformis longissima fusca, ramis alternis simplicibus brevioribus pallidis. Fl. suec. 1028.*

*It. goth. 261. n. 3.*

*Conferva marina capillacea longa ramosissima. Dill. musc. 23. t. 4. f. 19.*

*Habitat in Europæ marinis rupibus.*

7. CONFERVA filamentis ramosis mollibus digito bre- *atriginosa*, vioribus viridissimis.

*Conferva marina capillacea brevis viridissima mollis.*

*Dill. musc. 23. t. 4. f. 20.*

*Habitat in Angliæ fucis.*

8. CONFERVA filamentis æqualibus dichotomis. *dichotoma.*

*Conferva dichotoma, setis porcinis similis. Dill. musc.*

*17. t. 3. f. 9.*

*Habitat in Angliæ fessis pratorum.*

9. CONFERVA filamentis proliferis fastigiatis hirtis. *scoparia.*

*Conferva marina pennata. Dill. musc. 24. f. 23.*

*Habitat in mari Europæo.*

*t. 4.*

10. CONFERVA filis ramosis: filamentis alternis bre- *cancellata*, vibus multipartitis digitatis.

*Conferva marina cancellata. Dill. musc. 24. t. 4. f. 22.*

*Habitat in mari Europæo.*

*Filamenta lateralia quasi intra totidem vesiculas aërem recondunt.*

*\* Filamentis anastomosantibus.*

11. CONFERVA filamentis reticulatim coadunatis. *reticulata.*

*Conferva reticulata. Dill. musc. 20. t. 4. f. 14. Fl. suec.*

*125. Guett. stamp. 1. p. 45.*

*Conferva reticulata crispa. Pink. alm. 113. t. 24. f. 2.*

*Morif. hist. 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 4.*

*Muscus aquaticus bombycinus retiformis. Læs. pruss.*

*173. t. 54.*

*Habitat in Europæ fluviis ad eorum littora.*

*\* Filamentis nodosis.*

12. CONFERVA filis simplicissimis setiformibus rectis: *fluvialilis*, geniculis crassioribus angulatis. *Con-*

*Conferva filis simplicissimis setiformibus rectis, tuberculis sparsis. Fl. suec. 1026.*

*Conferva fluviatilis lubrica fetosa, equiseti facie. Dill. musc. 39. t. 7. f. 47.*

*Habitat in Europæ fluviiis confragosis.*

*gelatinosa.* 13. *CONFERVA* filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis.

*Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major & fusca. Dill. musc. 36. t. 7. f. 42. Guett. stamp. 1. p. 46.*

*Conferva fontalis geniculata lubrica major. E. N. C. cent. 5. 6. app. 60. t. 13. f. 3.*

*Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor & viridis. Dill. musc. 37. t. 7. f. 43.*

*Corallina pingvis ramosa viridis. Vaill. parif. 40. t. 7. f. 6.*

*Habitat in Europæ fontibus præstantissimis limpidissimis.*

*Confer.* *Conferva stagnalis, globulis virefcentibus mucosis. Dill. musc. 38. t. 7. f. 44.*

*Conferva alpina lubrica, filamentis nodosis cæruleis. Dill. musc. 38. t. 7. f. 45.*

*Conferva fontana nodosa lubrica, filamentis tenuissimis nigris. Dill. musc. 39. t. 7. f. 46.*

\* *Filamentis geniculatis.*

*capillaris.* 14. *CONFERVA* filis geniculatis simplicibus: articulis alternatim compressis.

*Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. Dill. musc. 25. t. 5. f. 25.*

*Conferva fluitans, filamentis geniculatis. Pluk. alm. 113. t. 84. f. 9. Morif. hist. 3. p. 644. f. 15. t. 4 f. 3.*

*Habitat in Europæ lacubus, stagnis, vadis, fossis.*

*corallinoides* 15. *CONFERVA* filis geniculatis dichotomis.

*Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata crassior. Dill. musc. 33. t. 6. f. 36.*

*Habitat in Mari Europæo, colore albo & rubenti.*

*Confer.* *Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata tenuior. Dill. musc. 33. t. 6. f. 37.*

*catenata.* 16. *CONFERVA* filis geniculatis, articulis cylindricis. *Conferva ramosa, geniculis longioribus cateniformibus. Dill. musc. 27. t. 5. f. 27.*

*As.*

*Habitat in Mari Europam australem & Americam meridionalem alluente.*

17. CONFERVA filamentis geniculatis, ramis fascicu- *polymorpha*.  
latis.

Conferva marina articulata capillacea ramosissima viridis. *It. goth.* 261. n. 2. *Fl. suec.* 1031.

Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. musc.* 32. t. 6. f. 35.

Corallinæ affinis f. Muscus coralloides, multifido capillaceo folio, palmites pelagica nigra. *Pluk. alm.* 119, t. 47. f. 10.

Muscus tridactylites capillaceus maritimus multifidus niger, radice fibrosa. *Bocc. musc.* 1. p. 268. t. 5. f. 11.

Muscus marinus crispus pachycaulos loricatus niger. *Bocc. musc.* 315. t. 7. n. 1.

Fucus crispus loricatus nigricans. *Barr. rar.* 1323. t. 1301.

*Habitat in Mari Europæo.*

18. CONFERVA filamentis geniculatis flexuosis, ramis *vagabunda*.  
ramulisque brevioribus.

Conferva marina trichodes, lanæ instar expansa. *Dill. musc.* 30. t. 5. f. 32.

*Habitat in Mari Europæo, libera vagatur in aquarum medio.*

19. CONFERVA filamentis geniculatis, ramulis brevi- *glomerata*.  
oribus multifidis.

Conferva fontinalis ramosissima glomeratim congesta. *Dill. musc.* 28. t. 5. f. 34.

Conferva viridis capillacea, brevioribus setis, ramosior f. Conferva minor ramosa. *Marif. hist.* 3. p. 644. f. 15. t. 4. f. 2.

Alga fontalis trichodes. *Bauh. pin.* 364.

*Habitat in Europæ fontibus, fossis, rivulis.*

20. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis vi- *rupestris*.  
ridibus.

Conferva marina trichodes ramosior *Dill. musc.* 28. t. 5. f. 29.

Conferva marina trichodes f. Muscus marinus virens tenuifolius. *Pluk. mant.* 53. t. 182. f. 6.

*Habitat in Europæ marinis rupibus copiosissima.*

CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis c- *agropila*.  
centro confertissimis globum constituentibus.

Cor-

Conserva globosa, filamentis articulatis ramosissimis e centro prodeuntibus rectis. *Fl. suec.* 1027.

*Habitat in Sueciæ lacubus Dannemora, Stockholmie. &c.*

### BYSSUS.

#### \* *Filamentosa.*

- Flos aquæ.* 1. BYSSUS filamentis plumosis natantibus.  
 Byssus farinacea virescens aquæ insparfa. *Fl. lapp.* 532.  
*Fl. suec.* 1128. *Guetz. stamp.* 1. p. 3. *Roy. lugd.* 520.  
 β. Byssus membranacea aquatica. *Fl. lapp.* 529.  
 Byssus latissima, papyri instar supra aquam expansa. *Dill. musc.* 1.  
*Habitat in Mari & omni aqua, prima æstate, nō descendit parum, die natat fere.*  
*Constat farina cujus moleculæ, Conservæ instar, capillares, ramosæ, plumæ similes, niveæ. P. Bergius.*
- phosphorea.* 2. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adnascens. *Dill. musc.* 4. t. 1. f. 6. *Fl. suec.* 1130.  
*Habitat in Europæ lignis putrescentibus.*
- velutina.* 3. BYSSUS filamentosa viridis.  
 Byssus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. musc.* 7. t. 1. f. 14.  
 Byssus terestris viridis herbacea & mollissima, filamentis ramosis & non ramosis. *Mich. gen.* 211. t. 89. f. 5.  
*Habitat in Terra.*
- antra.* 4. BYSSUS capillacea pulverulenta, fructificationibus sparsis, filamentis simplicibus ramosisque. *Gleditsch fung.* 1.  
 Byssus petrææ crocea, glomerulis lanuginosis. *Dill. musc.* 8. t. 1. f. 16.  
 Byssus aurea derbentis humifusa. *Pet. gaz.* 1. t. 15. f. 3.  
 Byssus minima saxatilis inodora, filamentis partim simplicibus partim ramosis. *Mich. gen.* 210. t. 89. f. 2.  
*Habitat in rupibus Arvoniz, Italiæ.*
- cryptarum.* 5. BYSSUS capillacea perennis cinerea tenax rupi innata. *Fl. lapp.* 527. *Fl. suec.* 1127.  
*Habitat in spelunca rupestri Medelpadiæ.*

#### \* *Pulverulenta.*

- antiquitatis.* 6. BYSSUS pulverulenta atra. *It. gotl.* 298. *Fl. suec.* 1126.  
*Habitat in ædium muris antiquissimis.*

7. BYSSUS

7. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. *saxatilis.*  
*Habitat in Saxo omni, diutius aëri exposito, quod per-*  
*enni cinereo colore obducit, ipsa vix manifesta.*
8. BYSSUS pulverulenta sanguinea saxis innascens. *Jolithus.*  
 Byssus perennis pulverulenta rubra lapidibus innascens.  
*Fl. lapp. 528. Fl. succ. 1125. \* Gvett. stamp. 1. p.*  
*3. Roy. lugdb. 520.*  
 Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem  
 spirans. *Mich. gen. 210. t. 89. f. 3.*  
*Jolithus f. lapis violaceus. Swenck. foff. 382. It. w:got.*  
*9. 250. \* 254. 263.*  
*Habitat in Europæ frigida sylvis opacis, supra saxa*  
*ante unum alterumve annum eversa & supinata.*
9. BYSSUS pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. candelaris.*  
*musc. 3. t. 1. f. 4*  
 Byssus farinacea flava. *It. w:goth. 159. 52. It. æl 30.*  
*Habitat per omnes quatuor mundi plagas in corticibus*  
*arborum, parietibus antiquis, tectis diutius ven-*  
*to humido expositis.*
10. BYSSUS pulverulenta viridis. *botryoides.*  
 Byssus botryoides saturate virens. *Raj. angl. 3. p. 5. 6.*  
*Dill. musc. 3. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in terra diutius humida, umbrosa, ut in ollis*  
*Hortulanorum.*
11. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ instar strata. *incana,*  
*Dill. musc. 3. t. 1. f. 3. Fl. succ. 1131.*  
*Habitat solo glareoso, ad latera fossularum, juxta vias*  
*publicas.*
12. BYSSUS pulverulento-crustacea albißima. *lactea.*  
 Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill.*  
*musc. 2. t. 1. f. 2.*  
*Habitat in Muscis & arborum corticibus.*

## SPONGIA.

\* *Tenaces.*

- SPONGIA tenax subramosa, ramis difformibus per-*officinalis.*  
*tulis. Roy. lugdb. 521. Mat. med. 527.*  
 Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis per-  
 via. *Tournef. inst. 575.*  
 Spongiæ compressæ Schiacciata. *Bauh. hist. 3. p. 818.*  
 Spongia globosa. *Bauh. pin. 362.*  
*Habitat in Oceano australiore.*

E e e e

2. SPON-

- oculata.* 2. SPONGIA tenax ramosissima erecta: ramis teretibus sculis obtusis. *Hort. cliff.* 480. *Roy. lugdb.* 521. Spongiosus fucus. *Bauh. pin.* 369. *Habitat in Italia.*
- nodosa.* 3. SPONGIA scabra ramosa tenacissima: ramis nodos perforatis. *Roy. lugdb.* 522. Spongia dura ramosa nigra suberis instar. *Boerb. lugdb.* 1. p. 9. *Habitat in Mari australi.*
- flabelliformis.* 4. SPONGIA flabelliformis rigidiuscula, fibris capillaribus densissime reticulatis. *Roy. lugdb.* 522. Spongia flabelliformis, caule teretiufculo, disco compresso-plano vix diviso. *Hort. cliff.* 480. Keratophyton majus nigrum, fibris tenuioribus elegantissime & densissime reticulatum. *Boerb. lugdb.* 1. p. 6. *Habitat in Indiis.*
- fistulosa.* 5. SPONGIA tubulosa simplex. *Hort. cliff.* 480. *Roy. lugdb.* 522. Spongia dura f. spuria major alba fistulosa, fibris crassioribus. *Sloan. jam.* 6. *hist.* 1. p. 62. t. 23. f. 2. *Habitat in mari ad Antillas.*
- tubulosa.* 6. SPONGIA tubulosa ramosa. *Roy. lugdb.* 522. Spongia ramosa fistulosa millepora. *Boerb. lugdb.* 1. p. 9. *Habitat in Indiis.*
- aculeata.* 7. SPONGIA cavernosa extus aculeata. *Roy. lugdb.* 522. Spongia dura f. spuria, superficie apicibus acutis exstantibus aspera, intus cavernosa. *Sloan. jam.* 7. *hist.* 1. p. 63. t. 23. f. 4. *Habitat in mari ad Americam.*
- muticata.* 8. SPONGIA ramosissima, poris cylindricis subulatis prominentibus æqualibus multifidis hispida. *Tenison. mus.* 118. t. 11. f. 1. \* *Habitat in India.*
- infundibuliformis.* 9. SPONGIA turbinata cava. Spongia forma infundibuli. *Bauh. pin.* 369. Spongia elegans. *Clus. exot.* 125. *Habitat in Europa australi.*

\* *Fragiles.*

10. SPONGIA repens fragilis, ramis teretibus obtusis. *lacustris.*  
*Hort. cliff.* 480. \* *Fl. suec.* 1132. *Roy. lugdb.* 522.  
*It. scan.* 422. \*

Spongia ramis teretibus obtusis. *Fl. lapp.* 535.

Spongia ramosa fluviatilis. *Raj. hist.* 81.

*Habitat in fundo Lacuum.*

1. SPONGIA erecta fragilis, ramis teretiusculis. *Fl. fluviatilis.*  
*suec.* 1133.

Spongia fluviatilis ad conservam accedens. *Rupp. jen.*  
 308. t. 3. f. 1.

Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis ramosissima.  
*Pluk. alm.* 356. t. 112. f. 3.

Badiaga major. *Buxb. act.* 2. p. 343.

Musculus aquaticus ceratoides. *Læf. pruss.* 172. t. 52.

*Habitat in Europæ fossis, paludibus.*

## FUNGI.

## AGARICUS.

\* *Stipitati, pileo orbiculato.*

AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Chantarellus.*  
*Fl. suec.* 1049. *It. w. goth.* 215. *Dalib. paris.* 364.

Agaricus caulescens fulvus, pileo concavo: margine reflexo, lamellis erectis, stipite brevissimo. *Fl. lapp.* 493.

Elvela pediculata pileata, pileo subtus reticulato. *Grev.*  
*stamp.* 1. p. 12.

Fungus minimus flavescens infundibuliformis. *Banh. pin.* 373. *Vaill. paris.* t. 11. f. 9. 10.

Fungus pileo per maturitatem instar agarici intybacci.  
*Vaill. paris.* t. 11. f. 11. 12. 13.

Fungus angulosus & velut in lacinias sectus. *Vaill. paris.* t. 11. f. 14. 15.

*Habitat in Pratis.*

*Variat mire ex Agarico in Elvelam.*

AGARICUS stipitatus, pileo subflavescente partito  
 lamellis albidioribus interne dentato-connexis. *quinquepartitus.*

Agaricus caulescens, pileo cinereo quinquepartito, lamellis albis. *Fl. suec.* 1063. \*

*Habitat in Pratis.*

AGARICUS stipitatus, lamellis omnibus magnitudi-  
 ne æqualibus. *Fl. suec.* 1071.

E e e e 2

Aga

*Agaricus caulescens*, pileo plano-concavo purpureo lamellis stipiteque albis. *Fl. lapp.* 486.

*Agaricus major*, pediculo longo modice crasso, lamellis albis creberrimis superne ad margines apparentibus. *Raj. suppl.* 18. *Buxb. cent.* 4. p. 12. t. 19.

β. *Agaricus caulescens*, petiolo crassiusculo albo, pileo pino sanguineo, lamellis albis. *Fl. lapp.* 487.  
*Habitat in Sylvis.*

*muscarius.* 4. *AGARICUS* stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis stipite volvato: apice dilatato, basi ovato. *Fl. jac.* 1076.

• *Agaricus caulescens*, pileo sanguineo: verrucis lamellis que albis, stipite albo basi globoso. *Fl. lapp.* 595.  
*Fungus* pileo sanguineo verrucoso, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulbofo. *Hall. belv.* 39. n. 70.  
*Fungorum perniciosorum genus* 12. n. 4. *Clus. hist.* p. 280.

*Habitat in Pratis.*

*Cimices necat & eradicat promtissime. It. scan.* 430.

*dentatus.* 5. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis.

*Agaricus caulescens*, pileo flavo laevi margine inflexo lamellis pallidioribus basi angulatis. *Fl. jac.* 1048.

*Habitat in Sylvis.*

*Pileus flavescens, levis, subviscidus. Lamellae basae stipite discedentes, ubi denticulo acuminato instructae. Stipes fistulosus, angustus, cylindricus, nudus, versus pileum striatus, confertim natus.*

*deliciosus.* 6. *AGARICUS* stipitatus, pileo testaceo succo luteo te.

*Amanita lateritii coloris, croceo succo turgens. D. giff.* 179.

*Fungus perniciosus, lateritio colore varians, succum crem & croceum fundens. Mich. gen.* 141. *H. belv.* 49. n. 70.

*Habitat in Montibus, sterilibus, sylvestris.*

*lactifusus.* 7. *AGARICUS* stipitatus, pileo plano carneo lactescen- te, lamellis rufis, stipite longo carneo. *Fl. lapp.* 48

*Fungus flavo-rufus in medio depressus, lacte non emanans. Hall. belv.* 50. n. 80. 80

*Habitat in Sylvis.*



8. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo lactescente: *piperatus*.  
 margine deflexo lamellis incarnato-pallidis. *Fl. suec.*  
 1036.  
 Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens.  
*Mich. gen.* 141. *Hall. belv.* 34. n. 1.  
 Fungus albus acris. *Baub. pin.* 371.  
*Habitat in Pascuis, Sylvis.*
9. AGARICUS stipitatus, pileo convexo squamato al-campes-  
 tris, lamellis rufis. *Fl. suec.* 1045.  
 Agaricus caulescens, pileolo fordido lacero, petiolo al-  
 bomembranaceo, lamellis rufescentibus. *Fl. lapp.* 482.  
 Agaricus pediculo annulato, pileo superne albus, infer-  
 ne rubeus. *Gruett. stamp.* 1. p. 22.  
 Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Baub.*  
*hist.* 3. p. 824. *Mich. gen.* 174. *Hall. belv.* 50. n.  
*Habitat in Pratis.* S.
10. AGARICUS stipitatus, pileo rimoso: margine vio-  
 laceo tomentoso, stipite cærulescente lana ferruginea.  
*Fl. suec.* 1066. *Dalib. parif.* 371.  
 Fungus esculentus bulbosus dilute purpureus. *Mich. gen.*  
 149. t. 49. f. 1.  
 Fungus cæruleus major. *Buxb. cent.* 4. p. 7. t. 11.  
*Habitat ad margines Sylvarum.*
11. AGARICUS stipitatus, pileo fordide flavo, lamellis *cinnamome.*  
 luteo-rufis. *Fl. suec.* 1047. \* *ns.*  
 Agaricus caulescens flavus, pileo plano. *Fl. lapp.* 494.  
*Habitat in Sylvis.*
12. AGARICUS stipitatus, pileo purpurascente, fusco *viscidus.*  
 viscido, lamellis fusco-purpurascens. *viscidus.*  
 Agaricus caulescens, pileo convexo purpurascens, la-  
 mellis rufis, stipite brevi crassiusculo albo. *Fl. lapp.*  
 485. *Fl. suec.* 1070.  
*Habitat in Sylvis.*
3. AGARICUS stipitatus, pileo pallido: disco stella-  
 tim luteo, lamellis sulphureis. *Fl. suec.* 1060. \* *equestr.*  
 Agaricus caulescens, pileo convexo fordido: margine  
 inflexo, lamellis pallidis: basi remotis, stipite cyin-  
 draceo. *Fl. lapp.* 502.  
*Habitat in Pascuis, Sylvis.*
4. AGARICUS stipitatus, pileo flavo convexo, lamel-  
 lis albis. *Fl. suec.* 1052. *georgii.*

*Agaricus caulescens*, pileo plano sulphureo, lamellis albis, stipite crassiusculo. *Fl. lapp.* 496.

*Fungus orbicularis exalbidus pratensis.* *Bauh. pin.* 370. *Hall. herb.* 38.

*Fungus divi georgii*, coloris exalbidi cum pauca flavitie, esculenti pratensis 1. *Bauh. hist.* 3. p. 824.

*Fungus croceus magnus.* *Sterb. fung.* 63. t. 11. f. 3.

*Habitat in Sylvis.*

*mammosus.*

15. *AGARICUS stipitatus*, pileo convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo.

*Agaricus caulescens*, pileo convexo sordido: umbilico prominente, lamellis pallidis, stipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 501.

*Fungus minor*, capitulo pileum nauticum referente, pediculo longiore. *Buxb. cent.* 4. p. 13. t. 21. f. 1.

*Habitat in Sylvis.*

*clypeatus.*

16. *AGARICUS stipitatus*, pileo hemispharico viscido acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico albo. *Fl. lapp.* 506. *Fl. succ.* 1057. *Dalib. parif.* 373.

*Fungus viscidus papillaris striatus terreus*, subtus albus. *Hall. herb.* 41. n. 35.

*Habitat in pratis sylvaticis.*

*extinctorius.*

17. *AGARICUS stipitatus*, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo.

*Agaricus caulescens albus*, pileo conico, stipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 481. *Fl. succ.* 1037. 1044.

*Agaricus caulescens albus*, petiolo longissimo, pileo conico. *Fl. lapp.* 480.

*Habitat in fimetis & ad pagos.*

*fimetarius.*

18. *AGARICUS stipitatus*, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosus, stipite fistuloso.

*Agaricus caulescens*, pileo conico cinereo, lamellis nigris: margine lacero, stipite longissimo albo. *Fl. lapp.* 503. *Fl. succ.* 1056.

*Fungus comatus.* *Sterb. fung.* 218. t. 22. f. 7. K. L. *Fungus albus ovum* referens. *Buxb. cent.* 4. p. 16. t. 27. f. 1.

*Fungorum perniciosorum* genus 14. spec. 3. *Clas. hist.* 2. p. 282.

*Habitat in Fimetis.*

19. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo. *campanulatus.*

Agaricus caulescens, pileo conico cinereo lamellis albis, stipite longo. *Fl. lapp.* 507. *Fl. succ.* 1054.

Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo murino. *Vaill. parif.* 71. t. 12. f. 1. 2.

*Habitat in Pratis.*

20. AGARICUS stipitatus, pileo lævi livido, lamellis nigricantibus separatis, stipite bulboso volvato. *separatus.*

*Habitat in Stercoratis.*

21. AGARICUS stipitatus, pileo convexo viscido pellucido lamellis luteis, stipite nudo. *fragilis.*

Fungus pileo croceo splendoris particeps *Vaill. parif.* t. 11. f. 16. 17. 18.

*Habitat ad ambulacra.*

22. AGARICUS stipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *umbelliferus.* *Fl. succ.* 1033.

Agaricus caulescens albus parvus, stipite longo, pileo plano pellucido: margine multifido. *Fl. lapp.* 471.

Agaricus minimus, capitulo turbinato plano albo, lamellis margine fuscis. *It. æl.* 38.

Fungus minimus totus albus, pileo hemisphærico utrinque striato, lamellis rarioribus. *Mich. gen.* 166. t. 80. f. 11.

*Habitat inter Folia congesta, semiputrida.*

23. AGARICUS stipitatus albus, pileo plicato membranaceo, stipite nigro. *Androsaces.* *Fl. succ.* 1034. *It. w. goth.* 215.

*Dalib. parif.* 374.

Agaricus caulescens albus minimus, petiolo angusto, pileo plano verrucoso: margine octofido. *Fl. lapp.* 472.

Fungus caule nigro capillari, androsaces capitulo. *Bocc. mus.* 143. t. 104.

Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pediculo fusco splendente. *Vaill. parif.* 69. t. 11. f. 21. 22. 23.

*Habitat in foliis dejectis Pini.*

24. AGARICUS stipitatus, pileo luteo convexo striato, lamellis stipiteque albis. *clavus.* *Fl. succ.* 1053.

Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill. parif.* 76. t. 11. f. 19. 20. *Hall. helv.* 38.

*Habitat in Nemoribus, inter folia decidua.*

\* *Parasitici, acaules, dimidiati.*

- Quercinus.* 25. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus.  
*Fl. succ.* 1082.  
 Agaricus villosus, lamellis sinuosis & invicem implexis.  
*Buxb. cent.* 5. p. t. 4. f. 1.  
 Agarico fungus lamellis crassissimis rigidis. *Hall. belv.*  
 57.  
*Habitat in Quercubus.*
- Betulinus.* 26. AGARICUS acaulis coriaceus villosus: margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Fl. succ.* 1085.\*  
*Habitat in Betulis.*
- Alnus.* 27. AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis.  
*Fl. succ.* 1083.  
 Agarico-Fungus lamellis bifidis pulverulentis. *Hall. belv.*  
 58.  
*Habitat in Alno.*  
*Paucas species Fungorum recenseo, ut evitem varietates, quæ plures sunt, quam vulgo creditur, & quidem sæpe aliena genera constituentes, ut in bisetjammum valde deficiat Res herbaria.*

## BOLETUS.

\* *Acaules, parasitici.*

- suberosus.* 1. BOLETUS acaulis pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus.  
 Boletus acaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris difformibus rotundis flexuosisque. *Fl. succ.* 1093.  
*Habitat in Betulis.*
- somentarius.* 2. BOLETUS acaulis pulvinatus inæqualis obtusus, poris teretibus æqualibus glaucis. *Fl. succ.* 1092.\*  
*Habitat in Betulis.*
- igniarius.* 3. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis.  
*Fl. succ.* 1096.  
 Agaricus pedis equini facie. *Tournef. inst.* 562.  
*Habitat in Betulis aliisque arboribus.*
- versicolor.* 4. BOLETUS acaulis: fasciis dicoloribus poris albis.  
 Agarico-polyporus versicoloribus lineis variis, poris albis tenuissimis. *Hall. belv.* 26.  
*Habitat ad truncos Arborum antiquarum.*

5. **BOLETUS** acaulis, superne lævis, salicinus. *Fl. navesolens.*  
*lapp. 522. Fl. succ. 1095.*  
*Habitat in Salice.*

\* *Stipitati.*

6. **BOLETUS** stipitatus perennis, pileo utrinque planius *perennis.*  
*sculo. Fl. lapp. 519. Fl. succ. 1086. Dalib. paris. 383.*  
 Fungus lignosus fasciatus. *Vaill. paris. t. 12. f. 7.*  
*Habitat in sylvis super terram, subiectis caudicibus ar-*  
*borum putridis.*

7. **BOLETUS** stipitatus, pileo pulvinato viscido, poris *viscidus.*  
 teretibus convexis immersis distinctis, stipite lacero.  
 Boletus caulescens, pileo luteo, poris teretibus distinctis  
 lividis, stipite lacero. *Fl. succ. 1089.*  
*Habitat in Sylvis.*

8. **BOLETUS** stipitatus, pileo pulvinato subviscido, po- *luteus.*  
 ris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido.  
 Boletus caulescens, pileo livido subviscido, poris flavis  
 convexis, stipite albido. *Fl. succ. 1088. Dalib. paris.*  
*381.*

Snillus annulatus terreus, inferne flavescens. *Hall.*  
*helv. 29.*

Fungus porosus autumnalis viscidus. *Buxb. cent. 5. p.*  
*7. t. 14.*

*Habitat in Sylvis.*

9. **BOLETUS** stipitatus, pileo glabro pulvinato margina- *bovinus.*  
 nato, poris compositis acutis: porulis angulatis bre-  
 vioribus.

Boletus caulescens, pileo testaceo, poris compositis  
 angulatis griseis. *Fl. succ. 1087. Dalib. paris.*  
*382.*

Boletus julii mensis. *Dill. giff. 188.*

Snillus fulvus inferne ex flavo virefcens. *Hall. helv. 29.*  
*Habitat in Pratis.*

10. **BOLETUS** stipitatus, pileo viscido pulvinato, po- *granulatus.*  
 ris teretibus subangulatisque truncatis: angulo granu-  
 lato.

*Habitat in Sylvis.*

Pileus convexus, viscidus, carnosus, lividus, margine  
 acuto cinctus. Pori flavi, diffformes, inaequales, tere-  
 tes & subangulati, truncati: margine laterali ad an-  
 gulos quasi farinae particula solitaria ancti. Stipes fla-  
 vus, pileo brevior.

E c c e s

11. BO-

*subtomentosus.* 11. BOLETUS stipitatus, pileo flavo subtomentoso, poris subangulatis difformibus fulvis planis, stipite flavo. *Fl. succ.* 1091. \*  
*Habitat in sylvis.*

*subsquamosus.* 12. BOLETUS stipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuosis niveis. *Fl. succ.* 1090.  
*Habitat in Sylvis.*

## HYDNUM.

*imbricatum.* 1. HYDNUM stipitatum, pileo convexo imbricato. *Fl. lapp.* 523. *Fl. succ.* 1097. *It. W. goth.* 215. *Roy. lugdb.* 519.

Erinaceus esculentus albus crassus. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 2.

Fungus pæne candidus, prona parte erinaceus. *Buxb. hist.* 3. p. 822.

*Habitat in Sylvis acerofis.*

*repandum.* 2. HYDNUM stipitatum, pileo convexo lævi flexuoso. *Fl. succ.* 1098. *Dalib. parif.* 383.

Hydnum pediculatum, pileo inæqualiter laciniato scabro flavo. *Guet. stamp.* 1. p. 383.

Erinaceus esculentus pallide luteus. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 3.

*Habitat in Sylvarum desertis.*

*tomentosum.* 3. HYDNUM stipitatum, pileo plano-infundibuliformi. *Fl. succ.* 1099.

*Habitat in Sylvis acerofis.*

*auriscalpium.* 4. HYDNUM stipitatum, pileo dimidiato. *Fl. lapp.* 524. *Fl. succ.* 1100. *Roy. lugdb.* 519.

Erinaceus parvus hirsutus ex fulco fulvus, pileo semiorbiculari, pediculo tenuiore. *Mich. gen.* 132. t. 72. f. 8.

Fungus erinaceus parvus in conis abietis nascens. *Buxb. cent.* 1. t. 57. f. 1.

Fungus erinaceus parvus, pediculo longiore auriscalpium referens buxei coloris. *Buxb. ball.* 129. t. 129.

*Habitat in Sylvis acerofis supra terram, subjacente ramo aut strobilo.*

## PHALLUS.

*esculentus.* 1. PHALLUS pileo ovato, stipite nudo rugoso. *Fl. succ.* 1102. *Dalib. parif.* 383.

Phal-

Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo. *Hort. bliff.* 379. *Roy. lugdb.* 517.

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infertus. *Tournef. inst.* 561. t. 329. f. A.

Boletus esculentus rugosus 1, 2, 3. *Mich. gen.* 203. t. 85. f. 1. 2.

Fungi esculenti species tres. *Clus. hist.* 2. p. 164.

*Habitat in Sylvis antiquis.*

1. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso. *impudicus.*

Phallus volvatus pileo apice clauso. *Act. stockb.* 1732. p.

20. t. 2. f. 1. *Fl. succ.* 1101.

Phallus volva exceptus, pilei apice pervio. *Hort. cliff.*

478. *Roy. lugdb.* 517. *Guest. stamp.* 1. p. 17.

Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. *Mich.*

*gen.* 201. t. 83.

Phallus hollandicus s. batavicus. *Dalech. hist.* 1398.

Fungus foetidus penis imaginem referens. *Bauh. pin.*

374.

*Habitat in Sylvis.*

## CLATHRUS.

\* *Acaules.*

CLATHRUS acaulis subrotundus. *Hort. cliff.* 479. *cancellatus.*

*Roy. lugdb.* 518.

Clathrus ruber. *Mich. gen.* 214. t. 93.

Boletus cancellatus purpureus. *Tournef. inst.* 561: t. 329.

f. 6.

Fungus coralloides cancellatus. *Clus. app. alt.*

Fungus rotundus cancellatus. *Bauh. pin.* 375.

*Habitat in Europa australiori.*

\* *Stipitati.*

CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo volvato. *denudatus.*

Clathrus pediculatus purpureus, capite oblongo. *Guest.*

*stamp.* 1. p. 16.

Clathroides purpureum pediculo donatum. *Mich. gen.*

214. t. 94. f. 1.

*Habitat in Europa australiore.*

CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo axi lon-

gitudinali adnato. †

Clathroidastrum. *Mich. gen.* 214. t. 94.

*Habitat in Italix lignis putridis.*

EL-

## ELVELA.

\* *Stipitata*,*Mitra.*

1. ELVELA pileo deflexo adnato lobato difformi. *Fl. succ.* 1103.  
 Fungoides fungiforme crispum laciniatum & varie com-  
 plicatum. *Mich. gen.* 204. t. 86. f. 7.  
 Fungus autumnalis velut apex flaminis. *Mentz. pag.*  
 t. 6.  
*Habitat in Truncis patridis.*

\* *Acaulis*.*Pineti.*

2. ELVELA acaulis.  
 Agaricus acaulis utrinque planiusculus. *Fl. lapp.* 517. *Fl. succ.* 1084.  
*Habitat in Pinu, Abiete.*

## PEZIZA.

\* *Acaules*.*lentifera.*

1. PEZIZA campanulata lentifera.  
 Peziza calyce campanulato. *Hort. cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 518.  
 Peziza caliciformis lentifera lavis. *Dill. giff.* 195. *Fl. succ.* 1109.  
 Cyathoides cyathiformis cinereum & veluti sericeum.  
*Mich. gen.* 222. t. 102. f. 1.  
 Fungoides infundibuli forma, semine foetum. *Vaill. parif.* 56. t. 11. f. 6. 7.  
 Fungus campaniformis niger parvus, multa semina in se  
 continens. *Pluk. phyt.* 184. f. 9.  
 Fungus pyxoides seminifer. *Læs. pruss.* 98. t. 16.  
 Fungus caliciformis seminiferus. *Mentz. pag.* t. 6.  
 β, Peziza calyce campanulato, interne striato, externe squa-  
 moso. *Gætt. stamp.* 1. p. 15. *Dalib. parif.* 387.  
*Habitat in Agris, Lignis, Sepimentis.*

*punctata.*

2. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. *Fl. succ.* 1111.  
 Elvela petiolo brevissimo, pileo turbinato, disco pun-  
 ctato. *Hort. cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 518.  
 Fungus minimus infundibuliformis, superne nigris por-  
 tis notatus. *Raj. suppl.* 21.  
 Muscus minimus lignosus, disco punctato *Bocc. maj.*  
 p. 25. t. 107.



*Habitat in Stercore equino.*

*Discus niveus, punctis atris eminentibus.*

3. PEZIZA infundibuliformis, disco patente sinuato pun- *cornucopia-*  
ctato. *des.*

Elvela infundibuliformis: ore expanso laciniato puncta-  
to. *Guett. stamp. 1. p. 11. Dalib. paris. 384.*

Fungoides nigricans majus cornucopiæ forma. *Vaill.*  
*paris. t. 13. f. 2. 3.*

*Habitat in Gallia.*

4. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis ramosis. *Acetabulum.*

Fungoides fuscum acetabuliforme: externe ramifica-  
tum. *Vaill. paris. 57. t. 13. f. 1.*

Fungoides fuscum majus. *Buxb. act. 4. p. 283. t. 29.*  
*f. 1. 2.*

Fungoides maximum vasis fusorii forma. *Mieb. gen.*  
*206. t. 8. 6. f. 1.*

*Habitat in Europa australi.*

5. PEZIZA cyathiformis: margine obtuso erecto. *Fl. cyathoides.*  
*snec. 1110.*

Peziza lutea parva: marginibus lævibus. *Raj. angl. 3. p.*  
*479. t. 24. f. 4.*

*Habitat in Terra.*

6. PEZIZA globofo-campanulata: margine crenato. *cupularis.*

Peziza calice campanulato globofo: ore crenato. *Guett.*  
*stamp. 16. Dalib. paris. 388.*

Fungoides glandis cupulam reterens, margine dentato.  
*Vaill. paris. 57. t. 11. f. 1. 2. 3.*

*Habitat in Gallia,*

7. PEZIZA plana: margine convexo piloso. *scutellata.*

Peziza lutea parva, marginibus pilosis. *Raj. angl. 3.*  
*p. 18. t. 24. f. 3.*

Elvela sessilis scutellata. *Guett. stamp. 1. p. 10.*

Fungoides, qui Fungus minimus scutellatus, coloris au-  
rantii. *Vaill. paris. t. 13. f. 13. 14.*

*Habitat in Parietibus putridis.*

8. PEZIZA turbinata cochleata. *cochleata.*

Elvela sessilis multis anfractibus cochleata. *Guett. stamp.*  
*1. p. 10. Dalib. paris. 384.*

Fungoides auriculam judæ referens, intus rufescens, ex-  
tus

tus candicans & quasi farinosum. *Vaill. parif. 57. t. 11. f. 8.*

*Habitat in umbrosis.*

## CLAVARIA.

### \* *Indivisa.*

- pistillaris.* 1. CLAVARIA claviformis simplicissima. *Fl. suec. 1104. Dalib. parif. 385.*  
 Clavaria clavata integerrima obtusa erecta. *Hort. cliff. 479. Roy. lugdb. 517.*  
 Clavaria alba pistilli forma. *Vaill. parif. 39. t. 7. f. 5.*  
 Clavaria major lutea. *Mich. gen. 208. t. 87. f. 1.*  
 Fungus clavatus albidus pistillaris. *Bocc. mus. 1. t. 307.*  
*Habitat in Sylvis umbrosis.*

- militaris.* 2. CLAVARIA clavata integerrima: capite squamula. *Guett. stamp. 1. p. 8. Dalib. parif. 385.*  
 Clavaria militaris crocea. *Vaill. parif. 39. t. 7. f. 4.*  
*Habitat in sylvis australibus.*

- Ophioglossoides.* 3. CLAVARIA clavata integerrima compressa obtusa. *Guett. stamp. 1. p. 8. Dalib. parif. 386.*  
 Clavaria ophioglossoides nigra. *Vaill. parif. 39. t. 7. f. 3.*  
*Habitat in sylvis australibus.*

### \* *Ramosa.*

- digitata.* 4. CLAVARIA ramosa lignea nigra. *Guett. stamp. 1. p. 10. Dalib. parif. 387.*  
 Agaricus digitatus niger. *Tournef. inst. 562.*  
*Habitat in sylvis australibus.*

- Hypoxylon.* 5. CLAVARIA ramoso-cornuta compressa. *Fl. suec. 1105.*

Fungus ramosus niger compressus parvus: apicibus albidis *Raj. angl. 3. p. 15.*

β. Agaricus ramulos cornu rangiferi referens. *Mich. Eberet. tab.*

Hypoxylon digitatum. *Bruck. monogr.*

Fungus cornu dorcadis facie. *E. N. C. dec. 1. ann. 4. p. 195.*

*Habitat in Cellis, navibus, aliisque nunquam sole illustratis.*

- coralloides.* 6. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Fl. suec. 1106. Dalib. parif. 386.*  
 Clavaria ramosissima. *Roy. lugdb. 518.*

Co

Corallo-fungus flavus. *Vaill. parif.* 41. t. 8. f. 4.  
 Coralloides flava & albida. *Tournef. inst.* 564. t.  
 332. f. B.  
 Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. t. 11. f. A. B. C. D.  
*Habitat in Sylvis opacis.*

7. **CLAVARIA** ramis confertis ramosissimis fastigiatis fastigiata,  
 obtusis luteis. *Fl. succ.* 1107.  
 Fungoides fungiforme luteum foetidum & minus ramo-  
 sum. *Raj. angl.* 3. p. 479. t. 24. f. 5.  
*Habitat in Sylvis.*
8. **CLAVARIA** ramis ramosis acuminatis inæqualibus muscoides.  
 luteis. *Fl. succ.* 1108.  
 Fungus parvus ramosus luteus. *Raj. angl.* 3. p. 16. t. 24.  
 f. 7.  
*Habitat inter Muscos.*

## LYCOPERDON.

\* *Solida, subterranea absque radice.*

1. **LYCOPERDON** solidum muricatum, radice destitutum. *Tuber.*  
*tutum.*  
*Lycoperdon solidum.* *Fl. lapp.* 526. *Fl. succ.* 1116  
*Roy. Ingdb.* 519. *Dalib. parif.* 391.  
 Tuber brumale, pulpa obscura odorata. *Mich. gen.* 221.  
 t. 164. 102  
*Tuber. Matth. Diosc.* 544. *Mich. gen.* 221. t. 102.  
*Habitat sub Terra.*

2. **LYCOPERDON** solidiusculum centro farinifero, *Cervinum.*  
 radice destitutum.  
*Lycoperdastrum* tuberosum arrhizon fulvum, cortice  
 duriore crasso & granulato, medulla ex albo purpura-  
 scente, semine nigro crasfiore. *Mich. gen.* 220. t.  
 99. f. 4.  
*Tubera cervina.* *Banb. pin.* 376.  
*Tuberum genus quibusdam Cervi Boletus.* *Banb. hist.*  
 3. p. 851.  
*Habitat in Bohemia, Silesia. Vermelandia.*

\* *Pulverulenta, radicata supra terram.*

- LYCOPERDON** subrotundum: lacerato dehiscens. *Bovista.*  
*Fl. lapp.* 525. *Fl. succ.* 1115. *Dalib. parif.* 388. *Roy.*  
*Ingdb.* 518.  
*Lycopperdon vulgare.* *Tournef. inst.* 563.

Fun-

Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus germanis Bofist. *Bauh. hist.* 3. p. 848.  
*Habitat in Campis sterilibus.*

*aurantium.* 4. LYCOPERDON sphæroidale basi rugosum stipitatum: laciniis obtuse emarginatis dehiscens. *Dalib. parif.* 390. n. 9.

*Lycoperdon aurantii* coloris, ad basin rugosum. *Vaill. parif.* 123. t. 16. f. 9. 10.

*Habitat in Gallia.*

*stellatum.* 5. LYCOPERDON volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Hort. cliff.* 479. *Fl. succ.* 1113. *Dalib. parif.* 390. *Roy. lugdb.* 519.

*Lycoperdon stellatum*, calyce inverso. *Buxb. cent.* 1. p. 45. t. 49. f. 3.

*Geaster major*, umbilico fimbriato. *Mich. gen.* 220. t. 100. f. 1. 2. 3.

Fungus pulverulentus, *Crepitus lupi* dictus, coronatus & inferne stellatus. *Raj. angl.* 3. p. 27, t. 1. f. 1.

Fungus stellatus. *Bocc. mus.* 1. t. 305.

*Habitat in Collibus.*

*Carpobolus.* 6. LYCOPERDON volva multifida, fructu globoso et feminibus combinatis. †

*Carpobolus.* *Mich. gen.* 221. t. 101.

*Habitat in Italia.*

*pedunculatum.* 7. LYCOPERDON stipite longo, capitulo globoso glabro: ore cylindrico integerrimo. *Hort. cliff.* 478. *Fl. succ.* 1112. *Roy. lugdb.* 519. *Hall. helv.* 12. *Dalib. parif.* 390.

*Lycoperdon parisiense* minimum pediculo donatum. *Turmes. inst.* 563. t. 331. f. E. F.

Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo insidens. *Raj. angl.* 3. p. 27.

*Habitat in Campestribus.*

\* *Parasitica, in farinam fatiscientia.*

*Epidendrum* 8. LYCOPERDON cortice farinaque purpurea. *Fl. succ.* 1114.

*Lycoperdon epidendron*, miniatum pulverem fundens. *Buxb. hall.* 203. *Hall. helv.* 11.

*Lycoperdon sanguineum* sphæricum 1. *Buxb. cent.* 1. p. 15. t. 29. f. 2.

*Habitat in Lignis, Parietibus antiquis.*

9. LYCOPERDON aggregatum parasiticum : ore mul-epiphyllum.  
tideo lacero : pulvere fulvo.  
*Habitat in dorso foliorum Tussilaginis.*

## MUCOR.

## \* Perennes.

1. MUCOR perennis, stipite filiformi nigro, capitulo *sphærocephalus*.  
globofo cinereo. *Fl. suec.* 1121. *It. scan.* 20.  
*Sphærocephalus niger*, villo ochroleuco. *Hall. belv.* 9.  
*t. 1. f. 3.* *n. 3*  
*Habitat in Parietibus, Lapidibus, Lignis.*
1. MUCOR perennis, stipite subulato nigro, capitulo *Lichenoides*.  
lenticulari cinereo. *Fl. suec.* 1122. \*  
Coralloides fungiforme arborum nigrum vix crustosum.  
*Dill. musc.* 78. *t. 14. f. 3.*  
*Habitat in corticibus Pini.*
1. MUCOR seta nigra, villo fusco. *Embolus*.  
*Embolus seta nigra villo fusco. Fl. suec.* 1136.  
*Embolus nigerrimus villo albo adpersus. Hall. belv.*  
*8. t. 1. f. 1.*  
*Habitat in lignis putridis.*
1. MUCOR perennis pallidus, pileo fulvo. *fulvus*.  
*Habitat Uptaliæ D. Solander.*
1. MUCOR perennis viridis, foliis furfuraceis, stipite fi-*furfuraceus*.  
liformi, capitulo globofo.  
*Habitat in Terra nuda passim in Suecia. Dan. Solan-*  
*der.*

## \* Fugaces.

- MUCOR stipitatus, capsula globosa. *Mucedo*.  
Mucor filamentis granulatis fugacibus putrescentibus in-  
natis. *Fl. lapp.* 534. *Fl. suec.* 1119. *Roy. lugdb.* 520.  
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro,  
pediculo griseo. *Mich. gen.* 215. *t. 95. f. 1.*  
Mucedo capitulo diaphano deinde viridi & postremo  
nigro. *Malp. vegetat.* *t. 25. f. 108. p. 2.*  
*Habitat in variis putridis : pane, plantis. &c.*

- MUCOR setaceus, seminibus radicalibus. *leprosus*.  
Alpergillus cespitosus densissimus, initio niveus, dein-  
de aureus, seminibus ovatis. *Mich. gen.* 213. *t. 91.*  
*f. 5.*  
*Habitat in cavernulis autumnno.*

F f f f.

8. MU-

*glaucus.*

8. MUCOR stipitatus, capitulo subrotundo, aggregato. Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus rotundis. *Mich. gen. 212. t. 91. f. 1.*  
*Habitat in Citris, Melonibus, Pomis aliisque corruptis.*

*crustaceus.*

9. MUCOR stipitatus, spicis digitatis. Mucor crustaceus albus, capitulis fetisque aqueis. *Fl. succ. 1118.*  
 Byssus filamentosa fugax alba, putrescentibus innata. *Fl. lapp. 533. Guett. stamp. 1. p. 3. Roy. lugdb. 520.*  
 Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis. *Mich. gen. 212. t. 91. f. 3.*  
*Habitat in Cibis corruptis.*

*capitosus.*

10. MUCOR stipite ramoso, spicis ternatis. Aspergillus albus tenuissimus, graminis daetyloidis fracie, seminibus rotundis. *Mich. gen. 213. t. 91. f. 3.*  
 β. Aspergillus terrestris capitosus & ramosus albus. *Mich. gen. 213. t. 93. f. 4.*  
*Habitat in Putrescentibus.*

*Erysiphe.*

11. MUCOR albus, capitulis fuscis sessilibus. *Fl. succ. 1124.*  
*Habitat in foliis Humuli, Aceris, Lamii, Galeopfidis, Lithospermi.*

## PALMÆ.

## FLABELLIFOLIÆ.

## CHAMÆROPS.

CHAMÆROPS frondibus palmatis plicatis, stipitibus *humilis*.  
*spinosis. Hort. cliff. 482. Roy. lugdb. 4.*

Palma minor. *Bauh. pin. 506.*

Palma humilis f. Chamæripes. *Bauh. hist. 1. p. 368.*

Chamæripes. *Dod. pempt. 820.*

*Habitat in Europa australi, præsertim Hispania.*

## BORASSUS.

BORASSUS frondibus palmatis plicatis cucullatis, *flabellifer*.  
*stipitibus serratis.*

Borassus frondibus palmatis. *Fl. zeyl. 395.*

Palma coccifera, folio plicatili flabelliformi; mas, fe-  
 mina. *Raj. hist. 1366.*

Ampana. *Rheed. mal. 1. p. 13. t. 10.*

Carimpana. *Rheed. mal. 1. p. 11. t. 9.*

Lontarus domestica. *Rumpf. amb. 1. p. 45. t. 10.*

*Habitat in India.*

## CORYPHA.

CORYPHA frondibus pinnato-palmatis plicatis filo *umbraculife-*  
*interjectis. Hort. cliff. 482. Fl. zeyl. 394. Roy. lugdb. 4. 10.*

Palma montana, folio plicatili flabelliformi maximo se-  
 mel tantum frugifera. *Raj. hist. 1363.*

Codda-pana. *Rheed. mal. 3. p. 1. t. 1. -- 12.*

Saribus. *Rumpf. amb. 1. p. 42. t. 8.*

*Habitat in India.*

*Confer.* Palma thebaica. *Pocock. orient. 1. p. 281. t. 73. thebaica.*  
*cui Frondes pinnato-palmatæ plicatæ, filo interjecto,*  
*stipitibus ciliato-spinosis, Caudice dichotomo.*

## PENNATIFOLIÆ.

## CYCAS.

- circinalis.* 1. CYCAS frondibus pinnatis circinalibus: foliolis planis. Cycas frondibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, stipitibus spinosis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 393. *Roy. lugdb.* 5.  
 Palma indica, caudice in annulos protuberante distincto. *Raj hist.* 1360.  
 Arbor Zagoe amboinensis. *Seb. thes.* 1. p. 39, t. 25. f. 1.  
 Tessio. *Kämpf. jap.* 897.  
 Olus calappoides *Rumpf. amb.* 1. p. 86. t. 22. 23.  
 Todda-pana f. Mouta-panna. *Rheed. mal.* 3. p. 9. t. 13. -- 21.  
*Habitat in India.*  
*Foliatio circinalis more Filicam peragitur.*

## COCOS.

- nucifera.* 1. COCOS frondibus pinnatis: foliolis replicatis. Coccus frondibus pinnatis: foliolis ensiformibus margine villosis. *Hort. cliff.* 483. *Fl. zeyl.* 391. *Roy. lugdb.* 4.  
 Palma indica coccifera angulosa. *Baub. pin.* 502.  
 Palma indica nucifera. *Baub. hist.* 1. p. 375.  
 Calappa. *Rumpf.* 1. p. 1. t. 1. 2.  
 Tenga. *Rheed. mal.* 1. p. 1. t. 1. 2. 3. 4.  
*Habitat in Indiæ paludosis, umbrosis.*  
*Foliola omnia (excepto utrinque infimo) retro-plicata sunt, contra ac in sequente.*

## PHOENIX.

- dactylifera.* 1. PHOENIX frondibus pinnatis: foliolis complicatis. Phoenix frondibus pinnatis: foliolis alternis ensiformibus basi complicatis, stipitibus compressis dorso rotundatis. *Hort. cliff.* 482. *Hort. upj.* 306. *F. zeyl.* 397. *Roy. lugdb.* 5.  
 Palma major. *Baub. pin.* 506.  
 Palma dactylifera major vulgaris. *Sloan. jam.* 174.  
 Palma. *Baub. hist.* 1. p. 351. *Dod. pempt.* 819. *Raj hist.* 1352.  
 Palma hortensis mas. | Palma hortensis femin  
*Kämpf. amœn.* 688. t. | *Kämpf. exot.* 668. 669  
 1. 2. f. 1. 2. | t. 1. 2. f. 2. 16. 11.  
*Habitat in India.*

ARE



## ARECA.

1. ARECA frondibus pinnatis: foliolis plicatis oppositis *Cathec.*  
præmorsis. *Fl. zeyl.* 592.

Areca f. Fauvel, avellana indica versicolor. *Raj. hist.*  
1363.

Palma arecifera nucleo versicolore moschatæ simili.

*Pluk. alm.* 275. t. 309. f. 4.

Palma cujus fructus sessilis Fauvel dicitur. *Baub. pin.*  
510.

Pinanga. *Rumpf. amb.* 1. p. 26. t. 4.

Caunga. *Rheed. mal.* 1. p. 9. t. 5. 6. 7. 8.

*Habitat in India.*

## ELATE.

1. ELATE frondibus pinnatis: foliolis oppositis.

*Sylvestris.*

Palma dactylifera minor humilis sylvestris, fructu minore. *Herm. prodr.* 361. *Fl. zeyl.* 397.

Palma sylvestris malabarica, folio acuto, fructu pruni-  
facie. *Raj. hist.* 1364.

Katou-indel. *Rheed. mal.* 3. p. 15. t. 22. 23. 24. 25.

*Habitat in India.*

## BIPENNATIFOLIÆ.

## CARYOTA.

1. CARYOTA frondibus bipinnatis: foliolis cuneiformibus  
oblique præmorsis. *Fl. zeyl.* 396.

Palma indica, folio bicomposito, fructu racemoso. *Raj.*  
*hist.* 1365.

Palma dactylifera, fructu acerrimo. *Plum. spec.* 3.

Seguaster major. *Rumpf. amb.* 1. p. 64. t. 14.

Schunda-panna. *Rheed. mal.* 1. p. 15. t. 11.

*Habitat in India.*

Palmarum omnium historia fructificationis adhuc imper-  
fecta est, nec suffecit industria Rheedi, cui tamen de-  
bemus in his quidquid adhuc certi innotuerit. Utinam  
Botanici nobis traderent distinctas harum species ex  
structura frondium, quæ serius & varius apud nos  
floreant.

## APPENDIX.

## ACHRAS.

Zapota.

## 1. ACHRAS.

Sapota fructu ovato majori. *Plum. gen.* 43.Zapotes. *Laët. amer.* 277. 332. 343.Cypote. *Chabr. sciagr.* 24.Avellanæ indicæ 3 genus. *Bauh. pin.* 418.Malus Persica maxima, foliis magnis integris longis, fructu maximo oblongo scabro, officulo partim rugoso partim glabro. *Sloan. jam.* 180. *hist.* 2 p. 124. t. 218.Arbor americana pomifera, frondosis ramulis, foliis amplis longioribus obtusis duris & venosis margine æquali. *Pluk. alm.* 39. t. 268. f. 2.Fructus oblongus utrinque acuminatus f. conicus lævis splendens spadiceus. *Raj. hist.* 1800.*Habitat in Jamaica.* b

## ADANSONIA.

digitata.

1. ADANSONIA. B. *Jussiei.*Baobab. *Alp. ægypt.* 66. t. 67.Baobab. f. Abavi. *Bauh. hist.* 1. p. 110.Abavo arbor, radice tuberosa. *Bauh. pin.* 434.Guanabanus scaligeri. *Bauh. hist.* 1. p. 109. *Raj. angl.* 137r.*Habitat in Ægypto,* b*Arborem dixit summus Botanicus B. Jussæus a discipulo egregio, qui Africæ rarissimas plantas investigavit; generis characterem non dum nobis notum ab amicissimo Auctore indefinenter expetimus.*

## BROSSÆA.

coccinea.

## 1. BROSSÆA.

Brossæa frutescens, flore coccineo, fructu nigro. *Plum. gen.* 5.*Habitat in America calidiore.*

Rami alterni. Folia alterna, ovata, serrata, petiolata.

Flores aliquos, ramos terminantes, alterni.

## BUCEPHALON.

racemosum.

## 1. BUCEPHALON.

Bucephalon fructu racemoso rubro. *Plum. gen.* 52.*Habi-*

*Habitat in America.*

*Folia ovata, acuminata, integerrima, alterna: petiolis brevissimis. Spicæ laterales, solitariae, oppositæ.*

## FUCHSIA.

## 1. FUCHSIA.

*triphylla.*

*Fuchsia triphylla, flore coccineo. Plum. gen. 14.*

*Habitat in America.*

*Caulis herbaceus, simplicissimus. Folia terna, laceolata, sessilia. Racemus terminalis, erectus.*

## HIPPOCRATEA.

1. HIPPOCRATEA. *Hort. cliff. 484.*

*volubilis.*

*Coa scandens, fructu trigemino subrotundo. Plum. gen.*

*8.*

β. *Coa scandens, fructu trigemino oblongo. Barr. æquin.*

*36.*

*Habitat in America calidiori.*

*Caulis volubilis. Folia opposita, ovata, crenata, petiolata.*

## HIPPOMANE.

1. HIPPOMANE foliis ovatis serratis. *Hort. cliff. 484. Mancanilla.*

*Macanilla pyri facie. Plum. gen. 50. Catesb. car. 1.*

*p. 95. t. 95.*

*Juglandi affinis arbor julifera lactescens venenata pyrifolia. Sloan. jam. 129. hist. 2 p. 3. t. 159.*

*Malus americana, laucocerasi folio, venenata. Comm.*

*hort. 1. p. 131. t. 68.*

*Arbor venenata Mancinello dicta. Raj. hist. 1646.*

*Habitat in Caribæis sæpius inundatis.*

## 2. HIPPOMANE foliis ovato-oblongis serratis: basiglandulosa glandulosis.

*Mancanilla lauri foliis oblongis. Plum. gen. 50.*

*Titymalus arbor americana, mali medicæ foliis amplioribus tenuissime crenatis, succo maxime venenoso.*

*Pluk. alm. 369. t. 229. f. 8. Raj. suppl. 428.*

*Habitat in America calidiore. h.*

*Folia utrinque, ad latus baseos petioli, glandulam gerunt.*

*Amentum subulatum, longissimum, terminale.*

## 3. HIPPOMANE foliis subovatis dentato-spinosis.

*spinosa.*

*Mancanilla aquifolii foliis. Plum. gen. 50*

*Ilex, aquifolii folio, americana. Pluk. alm. 197. t. 196. f. 3.*

F f f f 4

Ha-

*Habitat in America calidiore. b*

*Ad classsem Monoccia spectat, ordine non dum manifesto.*

### HYMENÆA.

- Courbaril.* 1. HYMENÆA. *Hort. cliff.* 484. *Hort. ups.* 305. *Mat. med.* 515.

Ceratia diphyllas antegoana, ricini majoris fructu nigro, siliqua grandi incluso. *Pluk. alm.* 96. t. 82. f. 2.

Arbor siliquosa ex qua Gumi Elemi elicetur. *Baub. pin.* 404.

*Habitat in Brasilia. b*

### MATTHIOLA.

- Jacabra.* 1. MATTHIOLA.

Matthiola folio aspero subrotundo, fructu nigricante.

*Plum. gen.* 16.

Rategal arbor indiana. *Zanon. hist.* 167. t. 75?

*Habitat in America.*

### PLUKENETIA.

- volubilis.* 1. PLUKENETIA.

Plukenetia scandens, hederæ foliis serratis, fructu serrato. *Plum. gen.* 47.

Sajor volubilis, fructibus corniculatis. *Rumpf. amb.* 1. p. 194. t. 79. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

Caulis volubilis. Folia cordata, serrata, acuta. Petioli laxi. Racemus compositus ex flosculis masculis numerosis, infimis semineis paucis. Ad monœciam pertinet.

### RANDIA.

- mitis.* 1. RANDIA inermis.

Randia. *Hort. cliff.* 485.

Lycium majus americanum, jasmini flore, foliis subrotundis lucidis. *Pluk. alm.* 234. t. 97. f. 6.

Cacao affinis frutex spinosus, lyci facie, jasmini flore albo. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 18. t. 161. f. 1.

*Raj. dendr.* 82

*Habitat in Jamaica. b*

- aculeata.* 2. RANDIA aculeata.

Randia aculeata, buxi foliis majoribus. *Juss. Roy. Ingdb.* 537.

*Habitat - - - - b*

RHEE.

## RHEEDIA.

## 1. RHEEDIA.

lateriflora.

Van Rheedia folio subrotundo, fructu luteo. *Plum. gen.* 45.

*Habitat in America.*

Folia opposita, ovata, integerrima, petiolata. Pedunculi laterales, simplices, uniflori, numerosi.

## RUMPHIA,

## 1. RUMPHIA.

amboinensis.

Myxa pyramiformis, officulo trispermo. *Raj. hist.* 1556.

Thiem-tani. *Rheed. mal.* 4. p. 25. t. 11.

*Habitat in India.* ♀

*Pertinet ad Triandriam Monogynam.*

## THALIA.

1. THALIA. *Roy. lugdb.* 11.

geniculata.

Cortusa arundinacea, amplis cannatori foliis. *Plum. gen.* 26.

Canna indica, radice alba alexipharmaca. *Sloan. jam.* 22. *hist.* 1. p. 253. t. 149. f. 2. *Raj. suppl.* 573.

Canna indica angustifolia, pediculis longis ad imum folium nodo singulari geniculato. *Pluk. alm.* 79.

Radix quædam in malacca, quæ ad versus vulnera sagittis toxico illitis facta, præsentaneum remedium. *Bauh. pin.* 301.

Agutigvepo-obi. *Marcgr. bras.* 53. *Raj. hist.* 1203.

*Habitat in America.*

Folia alterna, ovato-oblonga: nervis transversis, parallelis. Petioli teretes, geniculo instructi; inferne membranacei vaginales. Culmus summus ramosus, exserens e singula spatha florem unum alterumve.

## TREVIA.

## 1. TREVIA.

nudiflora.

Arbor racemosa malabarica, fructu triquetro. *Comm. mal.* 30.

Caschi. *Rheed. mal.* 1. p. 76. t. 42.

*Habitat in Malabarix arenosis.* ♀

*Ad classem Monæciæ pertinet.*

## XIMENIA.

## 1. XIMENIA foliis solitariis.

americana.

Ximenia. *Hert. cliff.* 483.

Ximenia aculeata, flore villosa, fructu luteo. *Plum. gen.* 6. F f f f 5

fla-

*Habitat in America.* 5

Folia ovato-oblonga, alterna, petiolata, integerrima.  
Spina ad singulam axillam foliorum. Racemus mul-  
tiflorus inter spinam & ramum.

*ægyptiaca.* 2. XIMENIA foliis geminis.

Lycio affinis ægyptiaca. *Bauh. pin.* 479. *Raj. suppl.* 1629.

*Agihalid. Alp. ægypt.* 38. t. 39.

*Habitat in Ægypto.* 5

*diandra.*

5. BOERHAVIA\* glabra, floribus diandris\* (*inferenda.* pag. 3. post 4.)

*Habitat in India. Ott. Munchausen. L. B.*

Habitus & statura omnino Boerhaviae diffusa, sed Caulis & fructus glabri, pedunculi folio breviores, sævus triflori. Flores minores, albi, pedicellati. Fructus sulcati, pentagoni, truncati, glabri.

*peltatus.*

32. CONVOLVULUS foliis peltatis, pedunculis multifloris. (155. post 12.)

Convolvulus lævis indicus major. *Rumpf. amb.* 6. p. 428. t. 159.

*Habitat in Amboina.*

*phlomoides.* 10. VERBASCUM foliis ovatis utrinque tomentosis, inferioribus petiolatis. (178. post. 2.)

Verbascum femina, flore luteo magno. *Bauh. pin.* 239.

Verbascum montanum tomentosum & incanum, folio subrotundo, caule non alato, staminibus purpureis.

*Till. piss.* 171.

*Habitat in Europa australi. D. Monti* 8

Caulis erectus, spicatus, valde tomentosus. Folia ovata, minime cordata, sed basi integra, crenata, inferiora petiolata, petiolo supra plano, superiora sessilia, subamplexicaulia, non decurrentia. Racemus spiciformis ex bracteis sparsis, lanceolatis. Flores intra singulam bracteam quatuor, quorum intermedius primum, tum infimus, demum laterales florent. Capsulæ oblongæ.

*Cervaria.* 3. SELINUM foliis radicalibus ovatis inæqualiter serratis. *Hort. cliff.* 92. *Hort. ups.* 59. (244. post 2.) †

Daucus montanus, apii folio, major. *Bauh. pin.* 150.

Dauci tertium genus *Fuchs. hist.* 233.

*Cervaria. Riv. pent.* 12.

*Habitat in Helvetiæ, Sabaudia, Geneva, Alsatia, Galloprovincia montibus.* 2

9. A-

9. **ATHAMANTA** foliis subbipinnatis: foliolis deorsum *condensata*. imbricatis, umbella lenticulari. (244. post 1.)

*Habitat in Sibiria.* 2

Radix perennis. Caulis simplex, pedalis, lævis, inferne angulatus, superne sulcatus præsertim pedunculo. Rami duo vel tres, floriferi, ex summis alis foliorum. Petioli canaliculati, basi membranacei, subtus angulati. Folia subbipinnata, foliolis alternatim pinnatifidis lobo infimo majore, unde quasi cruciata evadunt oppositiones ad basin & inferior lacinia se extendit supra folium inferius; subtus nitida. Umbella densissima utrinque convexa, antequam floret rufescens, Flores tamen albi, exceptis antheris fuscis. Petala inflexa. Involucrum universale sæpe deficit & tantum rudimenta ostendit. Partiale longitudine florum.

31. **ALLIUM** scapo subnudo tereti, foliis linearibus, *canadense*. capitulo bulbifero. (300. inter 22. - 23.)

*Habitat in Canada. Kalm.* 2

Radix perennis. Folia linearia, plana, lævia, recta, spithamea, vix ad caulem ad basi vaginantia. Scapus nudus, teres, lævis. Spatha ovata, mutica, acutiuscula. Capitulum ex bulbis; pauci flosculi pedicellati albi: Petalis ovalibus. Stamina simplicia longitudine corollæ: Antheris rufescentibus.

9. **GYPSOPHILA** foliis lanceolatis lævibus, caulibus prostrata. diffusis, pistillis corolla campanulata longioribus. (407. post 2.)

*Habitat - - - semina misit D. Wachendorff.*

Radix perennis protrudit Caules plurimos, undique procumbentes, diffusos, læves, teretes, vix pedales, virides, nec ad articulos rufescentes. Folia lanceolata, glabra, vix ramosa. Panicula terminalis, brachiata, trichotoma: intermedio pedunculo simpliciore in triangulum erecto. Calyx viridis. Corolla alba: petalis obtusis, apice canaliculatis, patentibus. Stamina corolla dimidio breviora, Antheris flavis. Styli corolla paulo longiora. Habitus omnino Gypsophilæ repentis, a qua differt radice vix repente; geniculis cæcis viridibus nec purpurascentibus. Calycis foliolis non carinatis. Corollis minoribus albis nec subrubentibus; Antheris flavis; Pistillis petalo longioribus: Styli apice divergentibus; Foliis minus carnosiss.

## 8. STEL-

*a. renaria.*

8. STELLARIA caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis. (423. post 7.)

*Habitat in Hispania.*

Radix fibrosa, annua. Caulis spithameus, erectus, teres, pilis patulis pubescens & subglutinosus. Rami alterni, longitudine fere caulis. Folia opposita, sessilia, subtus & margine pilosa, supra vero vix manifeste, ligulata apice ovato, basin versus angustiora linearia. Primus flos e dichotomia caulis, ubi caulis bifidus evadit; reliqui ex alis ramorum alterni, omnes majusculi. Pedunculus erectus, foliis longior. Calyx pentaphyllus, viscosus uti tota planta, apicibus purpurascens uti etiam folia floralia. Corolla campanulata, calyce longior, obtusissima vel vix manifeste emarginata aut retusa, alba. Stamina alba, longitudine calycis. Antheræ cærulescentes. Germen globosum. Styli 3, longitudine staminum.

*Hispanica.*

7. COTYLEDON foliis oblongis subteretibus, floribus fasciculatis. (430. post 6.)

Cotyledon maritima, sedi folio, flore carneo, fibrosa radice. *Tournef. inst.* 90.

Cotyledon hispanica, sedi teretifolii folio, flore umbellato rubro, fibrosa radice. *Minuart. sched.* 3.

*Habitat in Hispania. Læsing. ♂*

Radix fibrosa. Caulis simplex digitalis, teres, erectiusculus. Folia oblonga, teretiuscula, obtusiuscula, sessilia, subpilosa, supra planiuscula, rufo-punctata. Corymbus terminalis. Flores infundibuliformes. Corollæ erectæ, extus rufescentes, subpilosæ: limbo plano, quinquepartito, acuto, supra incarnato striis tribus purpurascens & apice purpureo. Antheræ minime, Filamenta crassiuscula, prominula. Calyx brevis. Facies Herbæ Sedi albi.

*dubium.*

9. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adpressis foliis pinnatifidis incis. (507. post 5.)

Argemone capitulo longiore glabro. *Morif. bles.* 233. *bist.* 2. p. 279. f. 3. t. 14. f. 11.

*Habitat inter Sueciæ, Angliæ segetes. ☉*

Planta media inter P. argemone & Rhæas. Capsulis clavatis & pilis pedunculo adpressis cum P. Argemone convenit & a P. Rhæde differt.

*scamatus.*

29. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis obtectis squamis orbiculatis (526. post. 13.)

*Habi-*



*Habitat in Hispania. Læfl. 9.*

Suffrutex ramis erectiusculis, inferne tetragonis. Folia ovali-lanceolata, crassiuscula, petiolata, opposita aut tria utrinque. Stipulæ minutissimæ, reflexæ, marcescentes, sessiles. Pedunculi teretes. Planta tota obiecta squamis orbiculatis centro depressis.

11. RUBUS foliis ternatis subtus tomentosis, caule parvisfolius. tiolisque aculeis recurvis. (494. post. 5.)

Rubus moluccanus parvisfolius. *Rumpf. amb. 5. p. 88.*

t. 47. f. 1.

*Habitat in India Osbeck. 5*

Caules fruticosi, teretes, incani. Folia ternata, subtus albo-tomentosa, venosa, petiolis subtus recurvato-aculeatis. Calyces tomentosi, in racemum digesti.

12. RUBUS foliis simplicibus cordatis lobatis, caule amoluccanus. culeato decumbente. (494. post. 6.)

Rubus moluccanus latifolius. *Rumpf. amb. 5. p. 88. t.*

47. f. 2.

*Habitat in Amboina. 5*

22. ANEMONE foliis reniformibus lobatis crenatis, in-malvisfolia. volucro multifido. (539. post. 7.)

Anemone, cyclaminis f. malvæ folio, lutea. *Bauh. pin.*

173.

Anemone hortensis latifolia, simplici flore. *Clus. hist. 1.*

p. 243.

*Habitat in Hispania ad vias. 2*

Corollæ exteriora petala subtus hirsuta, ut in Pulsatillis Tournefortii.

6. OCYUM caule suffruticoso, foliis ovatis, racemis gratissimum. teretibus. (597. post. 4.)

*Habitat in India. 5*

Frutex bipedalis: Canle subferrugineo, fusco. Folia opposita, ovata, acuta, profunde serrata, pallide viridia, subtus scabra, serraturis 7 s. 9 utrinque obtusis. Petioli longitudine folii, supra subvillosi, plani. Racemi terminales, sessiles. Bractææ oppositæ, reflexæ, cordato-lanceolatæ, nec concavæ, acuminatæ. Flosculi tres intra singulam bracteam, pedicello longitudine calycis. Calyx & Corolla Ocymi tenuiflori. Corollæ minima. Odor gratus.

29. ANTIRRHINUM foliis subulatis canaliculatis car-partem. nosis: inferioribus ternis, caule paniculato corollisque glaberrimis. (ad pag. 612. post. 10.)

*Habi-*

*Habitat in Hispania. Læsing.*

Radix altero anno florens, Caule pedali, glaberrimo, paniculato, erecto, minus stricto: ramis virgatis. Folia primordialia, antequam caulem floriferum erigit, ternata, oblonga; reliqua alterne subulata, canaliculata, glabra, carnosæ, rectæ. Flores racemosi. Calyces glabri Corollæ flavæ, palato glabro cum tinctura rubicunda in retuso gibbo palati.

*molle.*

30. ANTIRRHINUM corollis subcaudatis, calycibus lanceolatis pedunculatis, foliis subtomentosis ovatis (617. ante 25.)

Antirrhinum hispanicum villosum, origani folio. Tournef. inst. 168. glutinoso. Barr. ic. 598. mal.

*Habitat in Hispania.*

Facies Ant. majoris, a quo differt Caulibus prostratis, Foliis caulinis oppositis. Herba tota villo vix conspicuo mollissima, calcari corollæ magis protuberante; Pedunculis flore longioribus.

*fenestralis.*

10. CHEIRANTHUS foliis conferto-capitatis recurvatis undatis. (662. post. 4.)

*Habitat - - - - - δ*

Radix fibrosa. Caulis semipedalis infra flores, crassitie digiti, erectus, inferne nudus. Folia in capitulum dense congesta, lanceolata, obtusa, incana, sessilia, recurvata, undata. Racemi erecti, stricti. Flores purpurei & Siliquæ tomentosa, curvata ut in Ch. incano, cui maxime affinis, vix tamen varietatem dixerim.

*lagopodioides.*

34. HEDYSARUM foliis ternatis ovatis obtusis, spicis hirsutis. (749. post 25.)

*Habitat in China. Osbeck.*

Folia ternata: foliolis ovatis, obtusis, nudis, minima seta terminatis. Spicæ ovata, densæ, hirsutissima. Flores interstincti. Bracteis ovatis, subulato-acuminatis, longitudine florum. Pedicelli hirsuti. Calyces brevissimi, terminati setis tribus hirsutis. Corollæ parvæ. Legumina monosperma.

*resedifolia.*

9. SCORZONERA foliis pinnato-dentatis, caule ramotissimo subnudo divaricato (791. post 6.)

Tragopogon; resedæ minoris folio, supinum. Barr. ic. 800.

*Habitat in Hispania. Læsing.*

24. **CARDUUS** acaulis, calyce glabro. *Fl. suec.* 656. acaulos.  
*It. gotl.* 297. \* *Dalib. parif.* 248. (826. *post* 23.)  
 Carlina acaulos, minor, purpureo flore. *Baub. pin.* 380.  
 Chamæleon exiguus. *Baub. hist.* 3. p. 62.  
*Habitat in Europæ pascuis apricis, depressis. &*
3. **FILAGO** floribus pyramidatis pentagonis : flosculis femineis seriatis.  
*Habitat in Hispania. Læsing. ☉*  
 Caulis pollicem unum alterumve altus, simplex, erectus. Rami 4. s. 5, radicales, ascendentes, simplices. Folia lanceolata, obtusiuscula. Habitus Gnaphalii germanici. Flores caulem terminant sessiles, cincti foliis in orbem positis, longioribus & ramis duobus simplicibus, ut flores e dichotomia caulis quasi oriuntur. Flores plures, pentagoni, pyramidati, tomentosi ut tota planta, unus in medio, quem quinque cingunt, & hos plures, compositi paleis calyce communi quinque fariam imbricato squamis acuminatis & inter hos flosculi nudi feminei, stylo bipartito divaricato; discus minimus, quinqueflorus, masculus absque paleis in Filagine prima calyx teres nec pentagonus est.
15. **QUERCUS** foliis lanceolato-ovatis integerrimis in-molucca.  
 divitis glabris. (994. *post* 1.)  
*Quercus molucca. Rumphf. amb.* 3. p. 85. t. 56.  
*Habitat in Moluccis. b*
14. **CROTON** foliis lanceolatis petiolatis integerrimis variegatum.  
 glabris. (1004. *post* 1.)  
 Codicæum chrysothichum. *Rumphf.* 4. p. 65. t. 25.  
 β. Codicæum teniosum. *Rumphf.* 4. p. 68. t. 26.  
 γ. Codicæum sylvestre. *Rumphf.* 4. p. 69. t. 27.  
*Habitat in India.*  
 Opus eximium beati Rumphii cura amplissimi D. Burmanni orbi botanico redditum, ad me accessit primum absoluto a typographo opere, cujus itaque synonyma alibi seorsim tradere animus est.

## ADDENDA.

- P. 17. Gratiola virginiana (adde) T. fiera Manga Nari. *Rheed. mal. 9. p. 165. t. 85.*
25. Salvia pratensis. - *Habitat in Europæ pratis.* 2
353. Erica arborea - - *Habitat in Europa australi.* 5
494. Rubus Chamæmorus. *Hæc species omnino Dioica est.*
665. Arabis canadensis. *Habitat in America septentrionali.*
696. Hibiscus furcatus. *Herba criniam. Rumpf. amb. 4. p. 40. t. 16.*
721. Lupinus angustifolius. *Habitat in Hispania.* ☉
781. Medicago polymorpha. *Habitat in Europa australi.* ☉
825. Carduus tataricus. - *Folia radicalia in hac specie pinnatifida sunt, non vero in præcedenti.*
479. Pyrus communis (rectus) PYRUS foliis serratis, floribus corymbosis.
- Pyrus Malus (rectius) PYRUS foliis serratis, umbellis sessilibus.



# INDEX GENERUM.

A.

<b>A</b> calypha	1003	Amorpha	713	Arundo	87
Acanthus	639	Amygdalus	472	Asarum	442
Acer	1054	Anabasis	223	Asclepias	214
Achillea	896	Anacardium	383	Ascyrum	787
Achyranthes	204	Anacyclus	892	Aspalathus	711
Achras	1190	Anagallis	148	Asparagus	313
Acnida	1037	Anagyris	374	Asperugo	138
Aconitum	532	Anastatica	641	Asperula	103
Acorus	324	Anchusa	133	Asphodelus	309
Acrostichum	1067	Andrachne	1014	Asplenium	1078
Aëtea	594	Andromeda	393	Aster	872
Adansonia	1190	Andropogon	1045	Astragalus	755
Adenanthera	384	Androlace	141	Astrantia	235
Adiantum	1094	Andryala	808	Athamanta	244
Adonis	547	Aneimone	538	Asrætylis	829
Adoxa	367	Anethum	263	Atragene	542
Ægilops	1050	Angelica	1250	Atraphaxis	333
Æginetia	632	Ammonia	536	Artiplex	1052
Ægopodium	265	Anthemis	893	Atropa	181
Ælchynomene	713	Anthericum	310	Avena	79
Æsculus	344	Anthoceros	1139	Averrhoa	423
Æthusa	256	Anthospermum	1058	Avicennia	110
Agaricus	1171	Anthoxanthum	28	Axyris	979
Agave	323	Antholydæa	37	Azalea	150
Ageratum	839	Anthyllis	719		
Agrimonia	448	Anzidesma	1027		
Agrostemma	435	Antirrhinum	612		
Agrostis	61	Aphanes	123		
Aira	63	Aphyllanthus	294		
Ajuga	561	Apium	264		
Aizoon	488	Apluda	82		
Alcea	687	Apocynum	213		
Aldrovanda	281	Aquilegia	532		
Aletris	319	Arabis	644		
Alchemilla	123	Arachis	741		
Alisma	342	Aralia	273		
Allium	294	Arbutus	395		
Allophyllus	348	Arctium	816		
Aloë	319	Arctopus	1058		
Alopecurus	60	Arctotis	922		
Alpinia	2	Araca	1189		
Alpine	272	Arenaria	423		
Althæa	686	Aretia	141		
Alyssum	650	Arethusa	950		
Amaranthus	989	Argemone	508		
Amaryllis	292	Aristida	82		
Ambrosia	987	Aristolochia	960		
Amethystea	21	Arnica	834		
Ammanthia	119	Arredia	242		
Ammi	243	Artemisia	845		
Amomum	1	Asuin	964		

B.

Baccharis	860
Bækea	358
Ballora	582
Bannisteria	427
Barleria	616
Barreria	274
Bartia	602
Bartramia	389
Basella	272
Bauhinia	374
Begonia	1056
Bellis	886
Bellonia	172
Berberis	330
Besleria	619
Beta	222
Betonica	573
Betula	982
Bidens	831
Bignonia	622
Bilcutella	662
Biferrula	762
Bixa	512
Blasia	1138
Blazia	

100

# INDEX GENERUM

Maris	112	Camphorosma	122	Chrysobalanus	513
Blechnum	1077	Canna	1	Chrysocoma	840
Blitum	4	Cannabis	1027	Chrysogonum	920
Bobartia	54	Capparis	503	Chrysophyllum	191
Bocconia	505	Capraria	628	Chrysosplenium	394
Boerhavia	3	Capficum	188	Cicer	738
Bolus	1176	Cardamine	654	Cichorium	811
Bombax	511	Cardiospermum	366	Cicuta	255
Bontia	638	Carduus	820	Cinchona	173
Borassus	1187	Carex	972	Cinna	5
Borbo.ia	707	Carica	1036	Cireæa	9
Borrage	137	Carlina	828	Cissampelos	1031
Bofea	225	Carpesium	859	Cissus	117
Brabejum	121	Carpinus	9098	Cistus	523
Brassica	666	Carthamus	830	Citharexylum	625
Breynia	503	Carum	263	Citrus	783
Briza	70	Caryophyllus	515	Clathrus	1179
Bromelia	285	Caryota	1189	Clavaria	1183
Bromus	76	Cassia	376	Claytonia	204
Brosses	1190	Cassine	268	Clematis	548
Browallia	631	Casslytha	35	Cleome	671
Brunfelsia	191	Carananche	812	Clerodendrum	637
Brunia	199	Catesbæa	109	Clethra	396
Bryonia	1012	Caucalis	240	Cliffortia	1038
Bryum	1115	Ceanothus	195	Clinopodium	587
Bubon	253	Celastrus	196	Clitoria	753
Bucephalon	1190	Celofia	205	Clusia	509
Buchnera	630	Celsia	621	Clusia	1042
Buddleja	112	Celtis	1043	Clypeola	652
Bulsonia	123	Cenchrus	1049	Cneorum	34
Bulbocodium	294	Centaurea	909	Cnicus	226
Bunias	669	Centunculus	116	Cochlearia	647
Bunium	243	Cephalanthus	95	Cocos	1188
Buphtalmum	903	Cerastium	437	Coffea	172
Bupleurum	236	Ceratocarpus	969	Coix	972
Burmanna	287	Ceratonia	1026	Colchicum	341
Buromus	372	Ceratophyllum	992	Coldenia	125
Buxus	983	Cerbera	208	Collinsonia	28
Byssus	1168	Cercis	374	Columnea	638
		Cerinthe	136	Colutea	723

## C.

Cacalia	834	Ceropegia	211	Commelina	40
Cactus	466	Cestrum	191	Conferva	1164
Cacalipina	380	Cachrys	246	Conium	243
Calendula	921	Charophyllum	258	Connarus	675
Calamus	325	Chamarops	1187	Conocarpus	176
Calla	968	Chara	1256	Convallaria	314
Callicarpa	111	Cheiranthus	661	Convolvulus	153
Callitriche	969	Chelidonium	505	Conyza	861
Calophyllum	513	Chelone	611	Corchorus	529
Caltha	558	Chenopodium	218	Cordia	190
Camellia	698	Cherleria	425	Coreopsis	907
Cameraria	210	Chironia	8	Coriandrum	256
Campanula	163	Chondrilla	796	Coriaria	1037
		Chrysanthemum	887		

Cachrys. 246.  
callicarpum 530.

Coris

## INDEX GENERUM.

Corypha	177	Dafica	1037	Eriocaulon	87
Corispermum	1187	Datura	179	Eriophorum	52
Cornucopiae	4	Daucus	242	Erym	738
Cornus	54	Dalibarda	491	Eryngium	2 732
Cornutia	117	Delphinium	530	Erysimum	660
Coronilla	628	Dentaria	653	Erythrina	706
Cortigiola	742	Dianthera	27	Erythronium	305
Cortula	271	Dianthus	409	Eugenia	470
Corylus	144	Diapensia	141	Evonymus	197
Corymbium	998	Dictamnus	383	Eupatorium	836
Costus	928	Digitalis	671	Euphorbia	450
Cotula	2	Dillenia	535	Euphrasia	604
Coryledon	891	Dioidia	104	Exacum	112
Cracca	429	Dioscorea	1032		
Crambe	752	Diosma	198		F.
Cranioalaria	671	Dirca	358		
Crassula	618	Diospyros	1057	Fagonia	386
Crataegus	282	Dipfacus	97	Fagus	997
Cratava	475	Diodartia	633	Ferula	246
Crepis	444	Dodecatheon	144	Festuca	73
Crescentia	805	Dolichos	725	Fevillea	1013
Cressa	626	Doronicum	885	Ficus	1059
Crinum	223	Dorstenia	121	Filago	927
Crithum	291	Dofaba	642	Flagellaria	333
Crocus	246	Dracocephalum	594	Fontinalis	1107
Crocalaria	36	Dracontium	967	Fraxaria	494
Croton	714	Drosera	281	Frankenia	331
Crucianella	1004	Dryas	501	Fraxinus	1057
Cucubalus	108	Drypis	413	Fritillaria	303 303
Cucumis	414	Duranta	637	Fuchsia	1191
Cucurbita	1011			Fucus	1152
Curatium	1010			Fumaria	699
Cupania	254	Ebenus	764		G.
Cupressus	200	Echinophora	239		
Curcuma	1002	Echinops	814	Galanthus	288
Cuscuta	2	Echium	139	Galax	200
Cycas	124	Elagnus	121	Galega	714
Cyclamen	1188	Elatine	367	Galenia	359
Cynbaria	145	Elate	1189	Galeopsis	579
Cynanchum	618	Eleocharpus	5915	Galium	105
Cynara	212	Elephanropus	814	Garcinia	443
Cynosurus	827	Elvela	1180	Garidella	425
Cynoglossum	72	Elymus	83	Gaura	347
Cynommetra	134	Empetrum	1022	Gaultheria	395
Cynomorium	382	Ephedra	1040	Genista	709
Cyperus	970	Epidendrum	952	Gentiana	227
Cypripedium	44	Epigea	395	Geranium	676
Cytillus	951	Epilobium	347	Gerardia	610
	739	Epimedium	117	Gesneria	612
		Equisetum	1061	Geryllis	442
		Eranthemum	9	Geum	500
		Erica	352	Gladiolus	36
		Erigeron	863	Glaux	207
		Erinus	630	Glechoma	578
		Eriocephalus	926	Gleditsia	1066

# INDEX GENERUM.

Glinus	463
Globularia	95
Gloriosa	305
Glycine	753
Glycirrhiza	741
Gmelina	626
Graphalium	850
Gnidia	358
Gomphrena	224
Gossypium	693
Gratiola	17
Grevia	964
Grillea	348
Gronovia	202
Gvajacum	381
Guettarda	991
Guilandina	381
Gundelia	814
Gypophila	406

## H.

Hemanthus	325
Hemathoxylum	324
Halleria	625
Hamamelis	124
Hebenitretia	629
Hedera	202
Hedysotis	101
Hedysarum	745
Helenium	886
Helianthus	904
Heliocarpus	448
Helicteres	963
Hellioropium	130
Helonias	343
Helleborus	557
Hemerocallis	324
Hemioniris	1077
Heracleum	249
Hernannia	673
Hernandia	981
Herniaria	218
Helperis	663
Heuchera	226
Hibiscus	693
Hieracium	799
Hippocratea	1191
Hippocrepis	744
Hippomane	1191
Hippophae	1023
Hippuris	4
Hirrella	34
Holcus	1047
Holosteum	88

= Houstonia.

Hordeum	84
Horminum	596
Hottonia	145
Hugonia	675
Humulus	1028
Hura	1008
Hyacinthus	516
Hydnum	1178
Hydrangea	397
Hydrocharis	1036
Hydrocotyle	234
Hydrophyllum	146
Hymenaea	1192
Hyoceyamus	179
Hyoferis	808
Hypocoum	124
Hypericum	783
Hypnum	1122
Hypochaeris	810
Hyllopus	569

## I.

Jambolifera	349
Jasione	928
Jasminum	7
Jatropha	1006
Iberis	648
Ilex	125
Illecebrum	206
Impatiens	937
Imperatoria	259
Indigofera	751
Insula	881
Ipomoea	159
Iris	38
Isatis	670
Ischaemum	1049
Isnardia	120
Isoetes	1100
Isopterum	557
Itea	199
Iva	988
Juglans	997
Juncus	325
Jungermannia	1131
Juniperus	1039
Justicia	388
Justicia	15
Ixia	36
Ixora	110

## K.

Kalmia

109.

Kampheria	84
Kiggelaria	596
Knautia	145
Knoxia	675

## L.

Lachnea	516
Lactuca	1178
Lagrecia	397
Lagurus	1036
Lamium	234
Lantana	146
Lapsana	1192
Laserpitium	179
Lathraea	808
Lathyrus	124
Lavandula	783
Lavatera	1122
Laurus	810
Laufonia	569
Lechea	
Ledum	
Leinna	
Leontice	
Leonodon	
Leonurus	
Lepidium	
Leucadendron	
Leucocjum	
Lichen	
Ligusticum	
Ligustrum	
Lilium	
Limodorum	
Limosella	
Lipnza	
Linum	
Lippia	
Liquidambar	
Liriodendrum	
Lithospermum	
Lobelia	
Loeflingia	
Loefelia	
Lolium	
Lonchitis	
Lonicera	
Loranthus	
Lorus	
Ludwigia	
Lunaria	
Lupinus	
Lychnis	
Lycium	

Lyc-



## INDEX GENERUM:

[illegible]

## INDEX GENERUM.

Sci+

## INDEX GENERUM.

Digitized by Google

# INDEX GENERUM.

Vitis	302	Xeranthemum	857	Zanonia	1028
Volkameria	637	Ximenia	1193	Zanthoxylum	270
		Xyris	42	Zea	971
				Zizania	991
Waltheria	673	Yucca	319	Ziziphora	21
				Zoltera	968
Xanthium	987	Zanichellia	969	Zygophyllum	385



# INDEX SYNONYMORUM.

<b>A</b>	<b>A.</b>				
Abavo	1190	Acinos	21. 592	Agnanthus	623
Abies	1001. 1002	Aconitifolia	505	Agrimonia	389. 444
Abrotanoides	93. 845. 928	Aconitum	367. 504. 531.	Agrimonia similis	448
	846. 849. 927		550. 557. 906.	Agrimoniaoides	448
Abrus	754	Acorus	39	Agul	745
Abinthium	844. 845. 846.	Acrivola	345	Agutigvepo-obi	1193
	847. 848. 849. 898	Acrostichum	1074	Argyroceme	852
	900. 988.	Actæa	548	Ahouaj	208. 209
Abuliro affinis	963	Aculcofa	170	Aira	1048
Abutilo	675. 685. 686.	Adaca-Manjen	927	Aizoon	431
	688.	Adamboe	160	Alaternoides	195. 196.
Acacia	380. 382. 517. 519.	Adhatoda	15. 619		1025. 1042
	523. 709 722. 1057	Adiantum	1065. 1067.	Alaternus	194
Acacia accedens	517		1068. 1072. 1075.	Alcea	529. 530. 675. 684
affinis	722		1078. 1080. 1081.		685. 686. 687. 689.
similis	520		1092. 1098. 1099.		690. 692. 693. 694.
Acacia	371		1112. 1122		695. 696. 697. 698.
Acalypha	980	Admirabilis	177		783.
Acanthium	827	Agilops	77. 1045	Alcea affinis	685
Acanthoides	828	Agoceras	675	Alchainilla	123. 207. 398.
Acaricuba	234	Agopodium	256. 263		406
Acarna	820. 823. 828. 829.	Adhatoda	635	Alectorolophus	602. 608.
	830	Æschynomene	518		610
Acetia-valli	35	Æthiopis	27	Alga	968. 1167. 1162.
Acer	427. 428	Afra	322		1164. 1167
Aceri affinis	428	Agarico fungus	1176	Algoides	969
cognata	998	polyporus	1176	Alhenna	349
Acetosa	336. 337. 338.	Agaricum	1157	Alifanus	346
Achyrantha	205	Agaricus	1176. 1180. 1182	Alisma	884
Achyrophorus	810	Agaty	722	Altekengi	181. 382.
Actinaria	1160	Ageratum	630. 845. 855.		183.
Actini species	591		897. 900	Alliaria	661
Actinodendrum	390	Agerato affinis	989	Allium	1044
		Agihallid	1194	Alni effigie	476. 478
				Alni	

# INDEX SYNONYMORUM.

Alnifolia	396	Anacardium	110	Apiofcorodon	444
Alni fructu	176	Anagallidastrum	116	Apium 244. 246. 250. 253.	
Alnus 176. 193. 983		Anagallis 12. 116. 147.		260. 264. 265.	
Aloe 282. 319. 323. 324.		148 157. 171		Apocynum 209. 210. 211.	
635		Anagyris 739.	739	— 217.	
Alopecuros 579.	573.	Ananas	285	Aquifolium	125
Alopecurus	167	Anandria	865	Aquilegia	557
Alpina	2	Anasrali-maravara	952	Arabis	660.
Alfina	993	Ananthocyclus 891.	892	Araca-puda	282
Alfinastrum	368	Anapodophyllum	505	Arachnoides	741
Alfina 13. 14. 88. 89. 116.		Analcovadi	814	Arachidaa.	730. 741
119. 120 123. 128.		Anblatum	606	Aracus	730
142. 169. 172. 207.		Anchusa 132. 133. 137.		Araliastrum	1059
226. 272. 332. 344.		Anchusa degeneris facie		Arapabaca 149. 150	
359 407. 414. 421.		137		Arbor agocerathos	675
422. 423. 424. 425.		Andropogon	78	ethiopica	121
438. 439. 440 441.		Andromeda	391	africana	512. 512.
463. 464. 631. 632		Androsamum 783. 784.		alni fructu	782
Alfina affinis	141	786. 787.		americana 208. 265.	
Alfines facie	993	Androface	141	625. 284. 370.	
Alfinoides	88. 123	Anemone	543	390. 533. 1190	
Alphæa 673. 674. 675. 684.		Anemonospermios 922. 923		baccifera 371. 426	
685. 686. 687. 688.		Anerifolius	94	brasiliانا	471
690. 691. 693. 694.		Angelica 248. 256. 259.		cacavifera	782
695. 696		261. 263. 265. 273		camphorifera	369
Althæa similis	673	Angeli-maravara	953	crepitans	1008
Alty-alu	1060	Angiopteris	1062	cucurbitifera	626
Alypum	96	Anguina	1008	exotica	381
Alyfoides	651	Angurek Warna 952. 952		ferens folia argen-	
Alyffon. 582. 642. 651.		Anguria	1011	tea	94
652		Anil	751	fraxini folio	384
Alyffum 574. 642. 656		Anisum	253. 264	Gvajaci	625
Amalago	29	Anera	192. 513. 537	Indica 385. 512.	
Amanita	1172	Anonis 716. 717. 718. 754.		513. 1027. 1027.	
Amaracus	590	767. 773.		Jude	374
Amarantho affinis	224	Anonyma 391. 395. 607		ligni sancti	382
Amaranthoides 205. 224.		Anonymos 102. 111. 120.		maderaspatana	341
225		200 207. 704		malabarina	118
Amaranthus 122. 204. 205		Antisanifophyllum	3	malabarensum	
206. 225		AntEuphobium.	834	110	
Ambapaya	1036	Anthemis	891	mexicana	512
Ambelboi	910	Anthora	532	negundo	938
Ambrosia 648.	846	Anthyllis 89. 122. 223.		platani folio	1036
Ambuyambo	960	331. 332. 563. 764		Poyfon-wood-Tree	
Amelanchier	8	Antirrhinum	603	266	
Amellus.	864	Aparine 18. 105. 106. 108.		racemosa 390. 1193	
Ameri	751	1052		Salvifolia	1044
Amethystina	21	Aparines folio	120	sebisera.	1004
Ammi 252. 253. 255		Apate	796	S Thomæ	375
Ammoides	260	Apeiba	512	Siliquosa 516. 519.	
Ampa	1187	Aphaca	729	625. 1192	
Ampelopragum	297	Aphyllanthes	96. 929	stercoraria	34
Amygdalus	121	Aphyllon	633	trifolia	266
Amygdalis similis	782	Apiastrum	592	tristis	6
Anacampteros 430. 431.		Apios	733. 713	venenata	1491
446				Arbor	



# INDEX SYNONYMORUM.

Arbor virginiana 370. 371	Astragaloides 756. 759	Bellon-patha 1103
vita 1002. 1002	Astragalus 719. 728. 751.	Bem-curini 25
zagoe 1188	753. 756. 762.	Bemnofi 638
Zeylanica 8	Athanasia 845	Bemschetti 110
Arbuscula afra 1038	Atractylis 829. 830	Bem-Tamara 511
aficana 333	Atraphaxis 359	Bermudiana 36. 952
baccifera 117	Attriplex 4. 5. 219. 220. 331.	Beta 337
jamaicensis 390	359. 979.	Betonica 15. 413. 570. 572.
mariana 393	Avellana 999. 1006	620. 673
nerii foliis 860	Avellane indica 3 genus	Begonia folio 573
viscosa 118	1190.	Beella 29
Arbutus 395. 397	Avena 64	Bidens 814. 900. 901. 908.
Arcahu 1059	Aurantia 782	919
Archangelica 351	Aureliana 1058	Bifolium 946
Arethorheca 923	Auricula 143. 144. 145.	Bihai 1043
Arenaria 422. 425. 440	179. 421.	Bilimbi 428
Aretia 141. 142	Azadirachta 385	Bistorta 360
Argemone 506. 508.	Azalea 392	Biri-maram-maravara 953
1196	Azedarach 384. 385	Blairia 19
Arguzia 141		Blattaria 178. 179. 446.
Argyracome 852. 861	<b>B.</b>	621. 698
Argyrodendros 94	Baccharis 864	Blennochæos 180
Asta. Asta.	Baccifera 111. 182. 1027	Blinbingum 428
Aria Bepou 385	Badiaga 1171	Blitum 204. 230. 990
Aria-veela 672	Baducca 504	Boahab 1190
Arifarum 966. 967	Balam-pulli 34	Bobartia 907
Armeniacæ 473. 474	Balaustia 472	Boletus 1179
Armeria 410	Balemcanda-schulstrandi	Boni 172
Armerius 409. 412. 421	36	Bona 737
Aroela 389	Balle 158	Bonarora 11
Artemisia 844. 845. 928	Ballore 582. 584.	Bondue 381
Arum 324. 967. 968	Bandura 955	Bontia 953
Aruncus 490	Balsamina 937. 938. 959.	Bonus Hænicus 218
Arundo r. 54. 55. 325. 391.	1009	Borago 133. 135
1050	Balsamita 897	Borrys 219. 220. 561
Afarina 612	Ballanum alpinum 393	Borrris 1186
Afelepias 218	Toluranum 384	Brassica 159. 665. 666. 671.
Afeyron 785	Bandura 955	965
Afeyrum 784. 786. 788	Baobab 1190	Brcynia 928
Aspalathus 708. 709. 722.	Barba Capre 490	Briza 86
723.	Caprina 1183	Brunella 570. 600. 601
Asparagus 339	hirci 789	Bryonia 140. 1012. 1028.
Aspergillus 1185. 1186	Bardana 816	1032
Asperula 103	Batatas 154	Bryonia similis 1033
Asphodelus 310. 311	Batti-Schorigeram 985	Bryonioides 1013
Asplenium 1070	Beetla-codi 29	Bryum 1108. 1109. 1110.
Asta fœtida 248	Behen album 414. 914.	1111. 1112. 1113. 1114.
Aster 841. 859. 861. 864.	Beid-el-offar 214	Bubonium 883
865. 869. 881. 882. 883.	Belilla 177	Bucanephyllum 510
884. 885. 886. 888. 900.	Belladonna 182	Buccaferrea 128
903. 904. 926.	Bellidistrum 886	Buchnera 630
Asteri similis 864	Bellis 96. 97. 658. 843. 876.	Buglossum 133. 134. 137.
Asterias 227	886. 888. 889. 890. 892.	138. 139. 792.
Asteriscus 896. 903. 920	923	Bugula 561. 601
Astroccephalus 100		Bulbine 311
		Bul-

# INDEX SYNONYMORUM

Bulbocastanum	243	Canna Indica	1193	Cataria	570. 573.
Bulbocodium	36	Cannoides	1	Catula-vegon	961
Bulbus	309	Canfichi	1193	Cattu-gatturi	696
Bunium	253	Canabrica	158	Cattu-tirpali	29
Bupariki	694	Capnos	701	Catulli-pola	290
Buphrthalmum	548. 895.	Capo-molago	189	Caucalis	239. 240. 242. 243
896. 902.		Capparis	385	Cavalam	1008
Buphrthalmo-fimile	893	Capraria	90. 116	Cauda muris	284
Bupleuroides	252	Caprifiscus	1059	vulpis	61
Bupleurifolia	928	Caprifolium	173	Caulo-Rapum	667
Bupleuri similis	928	Capur Gallinaceum	751	Caapeba	1031. 1032
Burau	1008	Cara	1033	Caunga	1189
Bursa Pastoris	642. 643.	Caragana	722	Ceanothus	820
647.		Caraguata	286	Cedronella	594. 596
Bursa Pastoris similis	665	Carambu	119.	Cedrus	1001. 1039. 1040.
Buxus	196	Caranoli	938	Celastrus	195. 196. 197
Byssus	1141. 1157. 1186	Caraschulli	636	Cenchruraidea	509. 782
		Caraveela	671	Centaurea	819
		Caraxeron	224	Centaurium	112. 190. 204.
		Cardamine	644	208. 230. 232. 272. 818.	
		Cardamindum	345	826. 839. 910. 915. 918.	
		Cardiaca	584. 586.	Centaurii species	912
		Cardiopermum	921	Cepa	299. 300. 301.
		Carduo-cirsium	817	Cepaea	431
		Carduus	285. 413. 639.	Cerata	474. 475
		814. 815. 816. 817. 820.		Cerati similis	473
		826. 827. 828. 829. 830.		Cerato affinis	474.
		831. 917. 919.		Cerastus	267. 425. 426. 473.
		Carduus-acanthus	939	474.	
		Carduncellus	831	Ceraria	374. 653. 706. 1192
		Caretti	381	Ceratocephalus	833. 908.
		Carim-curini	15	Ceratoides	979
		Carimgola	288	Ceratonia affinis	503
		Carlina	826. 829. 1199	Cerfolium	257. 258. 259
		Carou-melli	193	Cereus	466. 467. 469
		Carpinus	118	Cerithe	136
		Carpobolus	1184	Cerri glans	998
		Carthamoides	831	Cervaria	171. 1194
		Carthamus	829	Cerviana	272
		Carua	369	Cervicaria	167
		Carum	253	Cervilpina	193
		Carvi	253. 261.	Ceterach	1080
		Carvisfolia	261	Chaa	515
		Garyophyllata	500. 501	Charefolium	257
		Garyophyllus	88. 191. 274.	Cherophyllo-fimilis	123
		294. 406. 413. 415.		Cherophyllum	257
		421. 422. 436. 438. 439.		Chalceos	815
		472. 887.		Chamebuxus	704
		Calchon	383	cerasus	173. 174
		Caia	1022	cistus	151. 396. 202.
		Callia	369. 371	525. 527. 528.	
		Callida	598. 599. 600	678.	
		Calline	125	crista	379. 380
		Callanea	344. 998	daphne	111. 391.
		Callorea	637	394	
				Chama	

# INDEX: SYNONYMORUM.

Chamaedrifolia	441	869. 886. 892. 895.	Codda-pana	1187
drya 11. 13. 502.		896. 901. 902. 903.	Codium	1199
564. 566. 603.		904. 905. 906. 907.	Codi-avanacu	981
filix 1081		908. 909. 920. 923.	Coilantha	227
genista 710		924. 927	Coilophyllum	510
jafme 559	Chrysis	905	Colchicum	292. 294
iris 38	Chrysolome	841. 853. 858.	Colera-veetla	636
larix 711	859		Colocasia	965
lea 35. 195. 981.	Chrysolplenium	631	Colocynthis	1008. 1011
1042	Cicer 719. 738. 752. 756.		Colubrin liagni genus	189
leagnus 1024	757		Coluppa	225
leon 815. 820. 828.	Cicci affinis	759	Colurea 373. 381. 742. 743.	
915. 1199	Cichopium 793. 805. 806.		751	
linum 281	807. 811. 900		Coma 840. 841. 843. 854	
melum 888. 889.	Cicuta 243. 255. 256.		Condondum	513
891. 892. 891.	259		Conna	378
894. 895. 896.	Cicutaria 243. 255. 256.		Conocarpodendron 93. 94.	
melo affine 893	258. 259		95	
mespilus 479	Cimicifuga	504	Conserua	1163
moly 302	Cinara 827. 828		Confolida media	561
nerion 348	Cinaroides	25	regalis	531
orchis 948	Cineraria 925. 992		Convolvulus 160. 161. 162.	
peuce 819	Cinnamomum 369. 370.		364. 1031	
pirys 356. 562. 595.	371		Convolvulo - Tithymalus	
rhododendron 150	Girfium 817. 818. 819.		1054	
rhododendros 150.	820. 821. 822. 823.		Conyza 836. 840. 841. 842.	
151	824. 825. 826		851. 860. 861. 863.	
riphes 1187	Cistoides.	674	864. 865. 870. 881.	
rubus 494	Cistus 150. 151. 198. 271.		882. 925	
lyce 455	391. 392. 394		Coyza affinis	882. 883
Chameisfine 105	Citrullus	1011	Coral	706. 707
Chamelea 357	Clandestina	606	Corallina 1154. 1166. 1167	
Chamelco 829	Clatroides	1179	Corallodendron	706
Champacam 536	Clatroidastrum	1179	Corallofungus	1183
Chanschena-pou 375	Clematis 189. 209. 210.		Coralloides 1144. 1145.	
Charantia 1009	366. 374. 427. 542.		1151. 1154. 1183. 1185.	
Cheiranthus 664. 665.	543. 623. 624. 625.		Corchoro affinis	529
933	955. 956. 957. 958.		Corchorus	803
Chelidonia 550	959. 960. 1034. 1043.		Cordis indi folio	366
Chelidonium 505. 550	Clematitis	544. 836	Corduba	314
Chenopodium 35. 204	Clinopodium 21. 22. 23.		Cordylina	319
China 1029. 1031	567. 568. 571. 591.		Corindum	367
Chlora 232	601. 602.		Coriogrammatodendros	
Chondrilla 790. 792. 793.	Clitoria	752	1025	
794. 796. 797. 798.	Clirgrius	753	Coris	787
799. 806. 811. 812.	Clymentum	737. 732	Corispermum.	969
813. 835. 864. 865.	Cneorini	357	Corni species	1043
909	Cnicus	829. 830. 831	Cornus	349. 371
Chovanba-mandaru 375	Coa	1191	Corona 303. 904. 905. 906	
Christophoriana 273. 274.	Cocculus	341	Coronaria	436
504. 548	Cocconileia	267	Coronilla	752
Christophoriana facie 504	Coccus	1188	Coronopus	114. 115.
Chrysanthemoides 923	Codagan	234	Corula 179. 226. 406. 1193	
Chrysanthemum 95. 832.	Codaga-pala	209	Corula species	630
833. 835. 842. 860.	Coda-pileva	276	Corymbifera	898

Coryza



# INDEX : SYNONYMORUM.

Coryza	831	Cynofurus	71	Draconi affinis	319
Coltus	845	Cynoxylon	1058	Draçocephalo affinis	594
Corinus	267	Cyperella	43	Draconium	964
Cotonea	480	Cyperoides	972. 974. 975.	Dracunculus	849. 898.
Cotram	597		976. 977. 978. 979.		907. 964. 965. 968
Cotula	892	Cyperus	42. 44. 49. 50. 51.	Drakena	121
Cotyledon	234. 282. 283.		52. 121.	Dryopteris	1081. 1089
	399. 431	Cyporel	1190	Drypis	414
Covalam	444	Cypripedium	948. 951	Dugglassia	637
Cracca	735. 738	Cysticapnos	701	<b>E.</b>	
Crambe	640. 670	Cyrtii facie	641		
Crassula	129	Cyrtius	373. 709. 710. 713.	Ebenus	193
Crategus	479		720. 764. 778	Ebulus	269
Crepis	792. 798	<b>D.</b>		Echolium	15
Crista Galli	603			Echino-Melocastus	466
	Pavonis.	Dactylis	55. 57	Echinophora	241. 242.
	380		55. 57		345
Crithmum	239. 883. 884.	Dalea	764	Echinophora affinis	814
Crocodyloides	829. 830	Damasonium	343	Echinus	276
Crocodylium	815. 914.	Dantia	120	Echii facie	133
Croton	980. 1042	Daphnoides	356	Echioides	132. 138
Cruciata	149. 1051. 1052	Darea	1097. 1098. 1099	Echium	131
Cucubalus	418. 419. 437	Dasystephana	228	Edera	202
Cucullaria	699	Dauci tertium genus	1194	Ela Calli	452
Cucumis	35. 1009. 1010.	Daucus	243. 244. 245. 252.	Elajocarpus	575
	1013.		253. 260. 264. 1194.	Elatine	613
Cucurbita	1008	Dens Canis	305	Eleachnus	121
Cucurbitifera	444	Leonis	798. 799. 808.	Elengi	349
Cudupariti	693		809. 885.	Elephas	603
Cultramara	993	Dentaria	666. 607	Elestari	1
Cuminum	124. 203	Dentaria-facie	146	Elleborus	558
Cunila	574. 575		633	Elleborus	558. 1044
Cunonia	37	Dentellaria	104. 151	Elichryso-affinis	205. 842.
Cupamenii	1003	Descurca	659		861. 989
Cupi	177	Diapensia	235	Elichrysium	840. 842.
Cupressopinulus	199	Diconangia	199		843. 844. 850. 851.
Curumi	366	Dictamnium	589		852. 853. 854. 855.
Cururu-ape	366	Dictamnus	584. 589		857. 858. 859.
Curutu-pala	211	Diervilla	175	Ellicryson	844
Cuscuta	35. 272	Digitalis	610. 611. 612.	Eliocarmos	307
Cyanus	93. 909. 910. 911.		634	Eluteria	1042
	912. 913. 916. 919	Dimorphotheca	923	Elvela	1171. 1180. 1181.
Cyanoides	918	Diuretica	884	Elymus	84. 752
Cyathoides	1180	Dodonaea	118. 125	Embolus	1185
Cyclaminus	145	Doria	87.	Endivia	796. 813
Cydonia	440. 444	Doronici species	885	Entada	518
Cymbalaria	612	Doronicum	880. 881. 884.	Ephemerium	9. 41. 42.
Cynanchum	211. 212		906		288. 342
Cynocrambe	993. 1035	Dortmannia	929	Epidendron	953
Cynoglossa	134	Dorycnium	158. 712. 720.	Epipactis	945. 949
Cynoglossoides	137. 138		742. 762. 764. 776.	Epipogium	945
Cynoglossum	131. 136.	Draba	645. 649. 660. 664.	Epithymum	124
	138.		931.	Equisetum	4. 368. 992.
Cynomorium	382. 383	Draco	849		1156. 1157.
Cynoforchis	940. 941				

Eran-

# INDEX SYNONYMORUM.

Erangelia	288	Felfel - Taril	452	Frutex cinereus	928.
Erefia	149	Ferrum equinum	744	coronarius	470
Erica 112. 198. 199. 393.		Ferula 246. 353. 354		foliis oblongis	394
960. 651. 1022. 274.		Ferulago	247	ferratis	394
Eriocaulis	199	Festuca 76. 77. 78. 79. 80.		Indica orientalis	834
Eriocaulis	229	1046. 1051.		indica 639. 963.	
Ericu	214. 224	Ficoides	488	pavoninus	380
Erigeron	808. 882	Ficoides 466. 467. 468.		peregrinus	225
Erigeron	867	481-488		peruvianus	29
Erinacea	720	Ficus 468. 469. 482. 483.		scandens	203
Erinaceus	1178	488. 1036. 1043		spicatus	489
Eriniogenus	169	Filago	856	spinofus	110
Erioccephalus	354	Filicifolia	981	viminibus lenis	196
Eriophorum	808	Filicula 1068. 1071. 1081.		Virginianus	118
Eritræa	230	1089. 1091. 1096. 1098		viscosus	536
Eruca 657. 658. 659. 660.		Filipendula 490. 608. 610		Fruticulus capsularis	981.
665. 667. 668. 670.		Filix 1062. 1063. 1066. --		982.	
Erucago	450. 670	1078. 1082. 1083.		convolvulaceus	
Erva	234	1085. 1087. -- 1094.		1029	
Ervilia	727	1096. 1098. 1099		foliis rufci	339
Ervum	573	Filum	1162	steneus	573
Eryngium 252. 814. 830.		Fistularia	607	Frustus	1190
831.		Flammula 543. 544. 548		Fucoides	1161
Erythimum 364. 657. 658.		Flos adonis	547	Fucus 118. 1147. 1154.	
659. 661		africanus	887	1163. 1164. 1167.	
Erythimifimilis	666	clitoridis	753	Fumaria	367
Etula 213. 456. 457. 462.		cuculi	656	Fungi esculenti species	
Eupatoria 818. 836. 837.		constantinopolitanus		1179	
839. 862.		436		Fungilli	1147
Eupatorio affinis	819	inocatus	696	Fungoides 1180. 1181. 1183	
Eupatorioides 831. 852.		pavonis	380	Fungus 970. 1141. 1151.	
853.		passionis 956. 957.		1162. 1171. 1175. 1177.	
Eupatorio-phalacron 902.		958. 959. 960.		1180. 1182. 1184.	
920.		foliis	905. 906	Fungorum perniciosum	
Eupatorium 448. 832. 839.		Thivialis	1015	genus	1172. 1174.
860. 862. 909. 928.		Paniculum 246. 260. 263.		Fu-Ran	954
Euphorbium 450. 451. 452.		Pannum Burgundicum 779			
Euphrasia 15. 16. 602. 603.		Græcum 718. 766.			
606. 607. 630.		777. 778-			
Euphrasia affinis	16	Fontinalis	116	Gaidarothymo	582
Evonymoides	196	Fragaria	499. 500	Gale	1024. 1025
Evonymo affinis 197. 480.		Fragaria affinis	284	Galega	714
515. 1037.		Franca	331. 332	Galega affinis	723
Evonymo similis	172	Frangula	193. 269	Galeopsis 102. 579. 580.	
Evonymus 195. 196. 392.		Fraxinella	183	586	
490.		Fructus 1190.		Galium	1052
Eyrythalia	231	cannæ	325	Gallitrichum	25. 596
		orbicularis	189	Gallium 104. 105. 106.	
		Frumentum ludicum 971		107	
Faba	578. 737	972. 1047.		Gaster	1184
Fabago	385. 386	Frutex aethiopicus 94. 196.		Gelsemium	623. 625
Fagopyrum 363. 364. 365		269. 707. 708. 853.		Genista 373. 707-712. 715.	
Fagotricheo similis	364	1038. 1042.		741. 745. 746.	
Fagotricheum	364. 365	atricanus 354. 1058		Genista spartium 708. 711.	
Fagus	533. 1163	Bascifer 111. 365.		720. 745. 763.	

F.

G.

Geniste

# INDEX SYNONYMORUM.

Genista affinis	762	Gramen caryophyllum	Gramen panicula pendula
Genistella	710. 711.	975	aurea 73
Gentiana 190. 226. 272.		creticum 84. 1051	paniculatum 55. 61.
459. 633.		cyperoides 43. 44.	62. 64. 66. 68. 69.
Gentianella 229. 231. 635.		45. 46. 47. 50.	74. 75. 1048.
Gentianoides	231	51. 52. 58. 972.	paniculis altissimis
Gerbera	885	979	68. 71
Gesneria	618	Dactyloides 73	parnassi 273. 316
Gesneria	622	Dactylon 57. 58. 72.	parvum 66. 71
Geum	401. 402	73. 972. 1045.	phalaroides 60. 66.
Glandifolia	1014	1046. 1047.	68. 76.
Gingidium	239. 242	echinatum 1050	piperinum 1100
Gladiolo aethiopico simili		Eranthemum 71	pratense 28. 52. 63.
lis 37		eriphorum 36	64. 67. 68. 72. 74.
lacustri accedens	42	festuceum 74. 75	75. 1048.
Gladiolus 37. 39. 288. 372.		floridum 422	pusillum 50
929		fluviale 44	sciurum 73
Glaucium	506	foliis junceis 65. 74.	secalinum 83. 84
Glaucoides	332	geniculatum 55	1095
Glaux 120. 332. 759. 760.		glumis variis 72	segetum 61. 65
1044		hirtum 329. 330	serotinum 62
Globularia	94	holosteum 328	sparteum 28. 53. 78.
Globularia affinis	87	hordeaceum 84. 85.	82. 1162
Glycyrrhiza	373. 758	Indicum 54	spica Brizae 78
Gnaphalium	840. 927	ischamum 72. 72	echinata 1049
Gnaphalodes	852	junceum 43. 44. 48.	triticea 87
Gossypium	511. 512	50. 87. 115. 327.	spicatum 42. 71. 78
Gramen	63. 422	328. 338.	81. 82. 84. 85.
Gramen aculeatum	42	juncoides 328	339. 1051
alopecuroides 56. 72		lanatum 1048	supinum 62
81		legitimum 58	sylvaticum 61. 69.
alopecuro simile 60		locustis echinatis	77.
alopecurum 61. 72		1050	tenue 74
alpinum 65. 67. 74		loliaceum 53. 69. 80.	tomentosum 52. 53
976		83. 84.	tremulum 70
americanum 1050		Mariae Borussorum	tribuloides 1050
aquaticum 55. 60.		1048	triticeum 78
64. 67. 75		maritimum 60. 71.	typhinum 60
aromaticum 1046		1050	typhoides 55. 59. 60
arundinaceum 52.		miliaceum 59	vernum 70
55. 64. 82. 1048		minimum 63. 66. 68.	virginianum 59
arvense 70. 72		1050	xerampelinum 70
avenaceum 61. 62.		montanum 62. 66.	Graminifolia 642. 1100
64. 65. 66. 67.		74. 75. 1050	Grana paradii 2
75. 76. 77. 79.		murorum 69. 75	Granadilla 955. 956. 957.
80. 82. 560. 1045		myloicophorum 71	958. 959.
Barcinonense 73		myuros 54	Gratiola 634
hermudense 57		nemorosum 65. 328.	Gratiola affinis 628
bromoides 76. 78		329. 974.	Grossularia 200. 201. 390
busonium 328		nodosum 79	Guajacana 1058
bulbosum 993		orientale 54. 64. 84.	Guajava 470
Caninum 62. 64. 83.		1050	Guanabana 537. 1190
86. 1049.		palustre 55. 67	Guazuma 530. 782.
capillatum 61		panicum 56. 57. 73	Guidonia 443
			Guilandinoides 382

# INDEX SYNONYMORUM.

<i>H.</i>		809. 810. 811. 812.			
Hacub	814	Hieraclos	1048	lcaco	513
Halicacabum	183. 367	Hinapariti	694	lex	994. 995. 1191
Halimus	1053	Hippolapathum	336	Illecehra	432
Hamdamanias	514	Hippophæstum	917	Illecebrum	35
Hedera 266. 340. 578. 612.		Hippocelinum	263	lly	81
1091		Hirculus	403	Imperatoria	548
Hedera species	619	Holotchenus	49	Indigophora	373
Hederula	970	Holoteco-affinis	284	Indiame	1034
Hediuada	191	Holotcum 88. 114. 115.		Inrybum	813
Hedypnois	798. 809	328.		Inrybus	801. 813
Hedylarum	713. 743	Hordeum	84. 86	Jolithus	1169
Heisteria	704	Horminum 23-27. 571.		Jon-Draba	652. 653
Helenium	881. 905	573. 603		thlaspi	652
Helianthemoides	271	Hummatu	179	lra f. Balari	45
Helianthemum	525-529	Hyacintho affinis	292. 325	Irio	658. 659
Helianthus	904	Hyacinthus	292. 308. 309.	Irion	668
Helichrysoides	831	316. 319.		Iripa	383
Heliotropii flore	141	Hydroceratophyllum	992	Ischemum	1047
Heliotropium	140. 578.	Hydropiper	361. 367	Isophyllum	237
1024		Hyoferis	811	lora Murri	963
Helix	202	Hyperitoides	784...787	Iticanni	175
Helleboraster	558	Hypericum	788. 198	Juglandi affinis	1191
Helleborine	949. 950. 951	Hypocistis	442	Jujuba	194. 195
Helleborus	235. 548. 556.	Hypoglossum	1041	Jujube	195
557. 558. 1044.		Hypophyllocarpodendron		Juncago 226.	338. 339
Helminthotheca	793	93.		Juncaria	560
Helxine	363. 364. 1052	Hypoxis	306	Juncellus	48. 49
Helichrysium	842. 851. 853.	Hypoxylon	1182	Junco affinis	43
857		Hylopitolia	447	Juncoides	326. 327. 329.
Heimerocallis	291. 303.	Hyssopus	569. 595. 603	330	
Hemionitis	1075. 1078.	Hyssopum	569	Juncoidi affinis	338
1088. 1094				Juncus	43. 44. 47.--50. 52
Hepatica	273. 538. 1132.	<i>J.</i>		53. 54. 338. 372. 1046.	
1136-1139		Jaborandi	29	1068	
Hepatorium	832. 909	Jacea	818. 819. 824. 840.	Jungermannia	1114
Herba britannica	336	857. 858. 910.--918.		Judica	1007
crinum	1200	936			
gerardi	265	Jacobaea	837. 843. 862. 867.	<i>K.</i>	
indica	937	--870. 872. 880. 881.		Kaka-roddali	365
maxima	905	884. 892. 924.--926		Kaka-pu	619
mimosa	434	Jacobaea affinis	924	Kali 3. 4. 221.--224. 359.	
non nominata	162	Jacobæastrum	924	430. 488	
S. Jacobi	870	Jacoboides	924	Kalou-aleu	1060
stella	115	Jabetapira	513	Kanlijram-mara vara	953
viva	434	Jalappa	177	Kapa-mava	383
Hermium	947	Janbolones	349	Kappa-Kelengu	154
Hernadastylus	40	Jan-Raja	1032	Karatas	285
Herniaria	35. 123. 206. 207	Jasminoides	191. 192	Kari-Kandel	443
Heiperis	660. 661. 662	Jasminum	6. 110. 160. 172	Karil	1008
Hieracioides	806. 807	175. 191. 210. 382.		Karin pola	967
Hieracium	790. 792. 793.	388. 628		Kari-welli-panna	1090
799. 806. 807. 808.		iberia	645	Katou-conna	517
515.				Katou-Beloeren	697
				Katou	

# INDEX SYNONYMORUM.

catou indel	1189	Laurus 267. 268. 304. 536.	Limonium	944
catou - Kadali	391	1025. 1037. 1041	Linon	783
catou Thobam	991	Lavandula 19	Limonium	274. -- 277.
catuil - kelengu	1033	Lavendula 572	510	
catjiletti - pullu	42	Ledon 523. 524. 525. 529	Linagrotis	53
catu - kara - valli	1027	Ledum 392. 523. 524	Linaria 18. 207. 221. 278.	
catu - katuil	1033	Lemina 1099	559. 613. -- 617. 841	
catu - kurka	572	Lens 738. 970 1099. 1100	Lingua Cervina 1067. 1069.	
catu - pitiegammulla	6	Lentibularia - 18. 970	1070. 1073. 1074.	
catu - ragera	751	Lenticula 281. 963. 969.	1079. 1080. 1082. --	
catu - tsiaca	95	970. 971. 1099. 1160	1084	
catu - kelengu	155	Lentiscus 388. 389. 1026	Linkia	1157. 1158
cauki	349	Leontodoides 808	Linocarpum	281
cavara	623	Leontodon 806	Linofytis	841
cempheria	19	Leontopetaloides 313	Linum 111. 148. 1162	
cerarophyron	1170	Leontopetaloides affinis 312	Lichonthalpi	646
cerinia 673. 674. 695. 696.		Leontopetalon 312	Lithospermum 131. 134.	
697		Leontopodium 114 855	279 559. 972	
dirganelli	982	Leonurus 580. 586. 587	Lobus	952
kleinia	834. 835	Lepidium 151. 648. 649	Locusta	34
knavel	406	Lepicarpodendron 91. 92	Lolium	435
lobbe	267	Leprotachya 601	Lonchitis 1063. 1064. 1067.	
lodda - pail	963	Leucadendros 93. 94	1069 1071. 1074. 1076.	
olongging	952	Leucanthemum 888. 889.	1077. 1080. -- 1082.	
ondampalla	937	896	1087	
tonni	754	Leucas 571	Lonicera 111. 176. 331.	
		Leucojum 288. 642. 643.	615 626	
		648. 651. 652. 661.	Lori similis	1058
		662. 663. 664. 665	Lori arboris folio	509
		Leucoxylon 624	Lorus 511 712. 719. 740.	
		Levisanus 199	764. 765. 772. 776.	
		Leviticum 250	778. 1043. 1044. 1057	
		Libanotis 244 246. 247.	Loto affinis 719. 764. 778.	
		248. 260	376	
		Lichen 1135. -- 1140. 1157	Ludvigia	120. 388
		Lichenaltrum 1114. 1131.	Lunaria 336. 651. 652. 778.	
		-- 1136. 1139	779. 1064. 1065. 1137	
		Lichenoides 1140. 1142. -	Lupinaster	766
		- 1151. 1157. 1158	Lupulinum	772
		Ligno brasiliano simile 381	Lupulo simile	985
		Lignum campechianum	Lupulus 427. 1028. 1054	
		384	Luteola 448. 449. 1037	
		moluccence 1004	Lutum	448
		peregrinum 381	Lychnidea 152. 153. 630	
		Ligustroides 637	Lychnis 88. 151. 331. 332.	
		Ligustrum 8. 9. 349. 637.	408. 409. 413. -- 421.	
		1043	425. 436. 438. 439. 852	
		Lilio - alphodelus 292. 324	Lychni - scabiosa	101
		Narcissus 291. -- 294	Lychnoides	152. 424
		Lilium 292. 294. 303. 305.	Lycio affinis	1194
		324. 339	Lycium 197. 331. 626. 636.	
		Convallium 315.	1192	
		316	Lycopericon	186
		Lineum 550	Lycopodioides 1100. 1102.	
		Limbia 204	-- 1106	

Jo( )o(

Ly.

## INDEX SYNONYMORUM.

Musculoskeletal



# INDEX SYNONYMORUM.

Muscus foliis scutellatis mi	Mutellina	255	Nigellastrum	425
folio lato 1113	Myagrum	661	Nirvala	444
frutescens 1100	Myoforis	437 - 439	Niota-niodem-valli	211
helveticus 1119	Myoforus	556	Nir-pulli	42-751
humilis 1115	Myrrhis 245. 252. 256. 357 -		Niruri	983
Illandicus 1145	- 249		Nætalali	1027
juniperifolius 1109	Myrica	1038	Noli me tangere	938
lactuce similis 1163	Myrobalanus	518. 982	Nothæ paracelsi	1157
Lichenoides 1132	Myrobatindum	626. 627	Nuciperfica	472
lycopodioides 1106	Myrtifolia	196	Nuciprunifera	367
marinus 1161. 1163	Myrtillus	350	Nucula	243
1167	Myrtoides	472. 1024	Nummularia	148. 631
maximus 1100. 1103	Myrto-Cistus	783	Nuxeni-kelengu	1032
montanus 1098.	Myrtus 1024.	471	Nux avellana	1006
1127. 1128	Myxa	1193	americana	367
nninius 1116. 1121	Myxistax	675	juglans	997
1180			malabarica	1007
muralis 1111. 1134			vesicaria	981
myofuroides 1124			voimica	189
norvegicus 1108			zeylanica	1008
palustris 1106. 1110.				
1113. 1120. 1134				
parvus 1110				
pendulus 1121				
pennatus 1122. 1126				
polytrichoides 1112.				
1113. 1118. 1123				
pulmonarius 1145				
pyxidatus 1151				
pyxoides 1151				
ramulosus 1109. 1124.				
1155. 1156.				
repens 1105. 1127.				
1130				
roseus 1113				
rupestris 1101				
saxatilis 1118. 1129				
squamulosus 1105.				
1107. 1115. 1121.				
1127 - 1130.				
stellaris 1110. 1113				
1119. 1122.				
taxiformis 1123				
terrestris 1101.				
1102 - 1104. 1106.				
1108. 1120. 1123 -				
1130. 1153.				
trichoides 1107.				
1110. 1111. 1116.				
1118. 1121. 1130.				
trichomanoides				
1123. 1151.				
tridactylites 1167				
vulgaris 1117. 1118.				
1131				

## N.

Naga-mu-valli	374
Naghas	515
Nalagu	441
Napellus	532
Napo brassica	667
Napus	666
Narcissus	290 - 294
Nardo celticæ affinis	33
Nardo celticæ similis	32
Nardus 32. 33. 68. 835	
Narinari-poulli	695
Narthetium	311
Narum-panel	536
Narukila	288
Nasturtium 353. 641. 642.	
644. 646. 654. 655. 656.	
657. 659. 1059	
Nati-schambu	470
Nathalam	341
Natrix	718
Nedel-ambel	145
Nelam-mari	747
Nelam-parenda	937
Nelenschema	966
Neli-pouli	428
Nelipu	18
Neli-tali	714
Nella-randale-Corti	716
Nellika	982
Neortia	945. 948
Nepeta	569
Nerio affinis	209. 624
Nerium	210. 211
Nhandiroba	1013
Nidus avis	945
Nigella	425

## O.

Obeliscotheca	907
Ochrus	727
Ocimum	597
Ocymastrum	580
Ocymoides	417. 419
Ocymophyllum	120
Ocymum	364
Odollam	268
Odontites	436
Oel-ambel	535
Oenanthe 252. 253. 260.	
545	
Oepata	111
Olea 121. 385. 638.	
Oliganthemum	289
Olus calappoides	1188
Omphalodes	135
Onagra 346. 347. 386. 516	
Onobrychis 168. 207. 745.	
747. 748. 749. 750. 751.	
760	
Ononis	754
Ophioxylon	112
Ophris	946. 947
Opfantha	230
Opulus	268
Opuntia	468. 469
Orchiastrum	946

## Orchis

# INDEX SYNONYMORUM.

Orchis 325. 944. 945. 947. 948. 949. 950. 951. 953	Panover-Thierana 121	Persicaria 360-3
Orchidi affinis 950	Papaver 414. 506. 508. 509	Persici officulo fructus 4
Orega 589	Papaya 1036	Personata 2
Oreofelinum 244	Papaya-maram 1036	Pes. anferinus 2
Origano cognata 588	Papia 578	Petastites 8
Origanum 22. 588	Papyrus 47	Petilium 3
Orleana 512	Parietaria 121. 605. 985	Petræa 5
Ornithogalo affinis 204	Parietariæ affinis 993	Petrofelinum 252. 2
Ornithogalum 339	Paris 340	Phaca 7
Ornithopodium 743. 746	Pariti 694	Phagus 9
Ornithopodiæ affinis 744.	Paronychia 205. 206. 207. 404. 1081	Phælypæa 60
759.	Paronychiæ facie 105	Phalangium 310-312. 31
Orobanche 387. 388. 606. 607 945.	Parqui 191	324.
Orpheus 738. 752	Parthenium 899. 989	Phaeoloides 75
Oryza 55	Parcheniastrum 988	Phaeolo affinis 74
Osmunda 1062	Paslerina 279. 559	Phaeolus 516. 675. 725
Ostrya 998	Pastinaca 239. 242. 243.	727. 739. 753. 754.
Olyris 221. 616. 841	Patagonica 149	Philyrea 29
Oxalidi affinis 433	Paullinia 427	Phlomis 17
Oxalis 337. 338	Pavate 110	Phylla 19
Oxyantha 477. 478	Pavel 1009	Phyllanthos 469
Oxycedrus 1038	Pavia 344	Phyllis 1054
Oxyoides 434	Pecten 257	Phyllitis 1067. 1069. 1070
Oxys 432-435	Pedicularis 602. 611. 629	1073. 1077. --- 1080.
	Pee-inota-modien 184	1082. -- 1084. 1097
	Peekandel 443	Phyllochnois 561
	Pee-mottenga 52	Phyllon 1035. 1036
	Peetandali-cotti 715	Phyllum 1035
	Peojanga-pulpani 635	Phyteuoides 116
	Peetumba 16	Picca 1002
	Penæa 703	Picnomon 20
	Penar-valli 1028	Picris 790. 799
	Pentaphylloides 284 495 -	Pilosella 574. 642. 665. 800
	497 499.	807. 850
	Pentaphyllum 497. 498.	Pimpinella 116. 117. 252.
	500. 502	261. 994
	Pentstemon 612	Pinanga 1189
	Peplis 455	Pinalter 1000
	Peplon 455	Pinguicula 17
	Peplus 456	Pingvin 285
	Pepo 1009. 1010	Pinus 1004
	Peragu 637	Piper 189
	Peralu 1060	Piperi similis 638
	Peretkia 469	Pistachia 270
	Perfoliata 236. 237. 238	Pistacia 124. 270. 397
	Perfoliarum 238	Pistacio-virex 638
	Periclymenum 118. 173.	Pistolochia 699. 961. 962
	176. 627. 628.	Pisum 366. 737. 754
	Periclymeni similis 637	Pitronia 140. 141
	Perinkara 515	Pityhusa 457. 458
	Periploca 212	Planta 631
	Perlea 370	africana 385
	Persica 472	annua 112
	Persicæ similis 200	lactaria 452
		leguminosa 708. 753
		Planta
Pachyphylla 180		
Paco-teroca 2		
Pada-valian 1008		
Padus 193. 473. 474		
Pederota 11		
Pænoe 515		
Pajaneli 623		
Painaschylli 639		
Paiparoca 964		
Pala 210		
Palega 625		
Paliuro affinis 637. 1026		
Paliurus 194		
Palma 944. 1043. 1187.		
1189		
Palmata 944		
Palmodecca 156		
Panaces 249. 274		
Panambu-valli 333		
Panax 247. 249. 262.		
Pandipavel 1009		
Panicatrella 1050		
Panicum 73		
Panna-kelengo-marava.		
1087		



# INDEX SYNONYMORUM.

anta mirabilis	955	Provenzalia	968	Quahmearl.	496
muscola	1105	Pruna	475	Quercus	1158. 1161
posterior	364	Prunella	595	Quinquefolio affinis	497
prior	364	Prunifera	370	Quinquetolium	496-499.
Scandens	1070	Pruno affinis	382. 489		502. 671
antraginella	631	Prunum	428	Quinquina	173
antagini accedens	288	Prunus	365. 371. 513		
antago	342. 343	Pseudo ambrosia	648		
antula Cardamines emu-		apocynum	614		
la 654		asphodelus	311. 312		
morilandica	704	capsicum	184		
latanaria	971	Chamaepithys	562.		
latanocephalus	95		595		
lumeria	374	Cyperus	42. 978		
oa 64. 71. 73. 74. 75. 1048		Cytisus	641		
cerinfii	367	Distamnium	583. 584		
oliantes	292	Distamnus	583		
olifolia	393	Gelseminum	624		
olium	563. 565. 566	Gnaphalium	927		
olyacanthus	823	helychrysum	860		
olygala	206. 742	Helycrysum	989		
olygonatum	304. 305.	Limodorum	943		
315. 316		Lotus	1057		
olygonoides	530	Lyfimachium	348		
olygonum	129. 206. 207.	Melanthium	436		
218. 223. 271. 281.		Narcissus	290. 294		
304. 331. 332. 406.		Ruta	384		
408. 423. 440. 447.		Santalum	380		
1040		Stachys	581		
Polypodium	1062. 1068.	Sycomorus	384		
1070. 1071. 1197		Psyllium	116		
Polyturon	220	Ptarmica	858. 897-899.		
Polytrichum	1080. 1112.		900 988.		
1115		Pteris	1066. 1067.		
Poma	185. 480	Pterocephalus	101		
Pomifera	383	Pterospermadendron	698		
Ponja	511	Ptora	550		
Ponna	514	Pulcolli	16		
Ponnam pou - mara vara		Pulegium	102. 567. 577.		
952			578		
Ponnam - Tongera	379	Pulli-Schoradi	163		
Ponraletfche	349	Pulmonaria	803. 1145		
Populago	558	Pulsatilla	538-540. 543		
Porophyllum	835	Pyra	479		
Porrum	295. 297. - 299.	Pyrethrum	889. 890. 895.		
301			896		
Portulaca	88. 223. 469.	Pyrola	118. 273. 344		
1053			245		
Portulaca affinis	223	Pyrole affinis	395		
Potamogeton	28. 361. 969.	Pyro similis	370. 370		
1015		Pyrochiton	306		
Poterio affinis	994				
Potha	968				
Prionitis	636				
Protea	91-93				

## R.

Radiola	281
Radix dulcis	742. 395
idra	345. 742
quadam in malacca	
dec.	1193
Ranz morsus	1016
Randalia	87
Ranunculo affinis	234
Ranunculus	234. 343. 367.
541. 542. 545. 548. 557	
Rapa	667
Raphanus	648. 657. 670
Rapistrum	640. 659. 664.
668. 669. 671.	
Rapum	632. 667
Rapunculum	164
Rapunculus	164. 165. 169.
171. 358. 929-933.	
Rapuntio affinis	189
Rapuntium	170. 929-933
Rategal	1192
Rava-pou	6
Regina prati	490
Releda	1045
Releda affinis	450
Rha	915
Rhabarbarum	372
Rhagadioloides	809
Rhagadiolus	812
Rhagrostis	4
Rhamnoides	1024
Rhamni species	1024
Rhamnus	192. 349. 1024.
1026	
Rhaponticoides	914
Rhaponticum	372. 915
Rhicophora	1033
Rhizophora	1033
Rhodia	1035
Rhododendrum	209
Rhoi similis	389
Rhois	267
Rhus	197. 1024. 1037.
Ribes	372
Ribesium	201
Ricinocarpus	980. 1036
Rici-	

α α 3

# INDEX SYNONYMORUM.


Ricinoides 196. 1004-1006.	Scabiosa 87. 95-97. 101.	Selinum 244.
1042	102. 815. 902. 913.	Semen sanctum 845.
Ricinus 195. 1004-1007.	927	Sempervivum 129. 401. 432.
1042	Scabiosa affinis 199. 588	Sendera-claudi 157.
Ricophora 1032	Scammonia 212	Senecio 808. 834. 835. 860.
Ritro 815	Scammonia affinis 212	861. 863. 880. 902.
Romphal 965	Sceptrum Carolinum 608	carduus 909.
Ros folis 281. 282	Schadidaalli 450	Senecioides 863.
Rosa hierocuntea 61. 282	Schageri-Cottam 514	Senna 376-381. 741.
Rosa hienensis 694	Scherubala 204	Senna affinis 375.
Rosmarinus 391. 563	Scherunam-Cottam 1042	Serapias 950. 951.
Royena 628	Scherutti 110	Seriana 365. 366.
Royce 176	Schinoides 389	Seriphium 659.
Rubeola 102. 104. 107. 1051	Schit-elu 634	Serpentaria 341. 567.
Rubia 102-105. 107-109.	Schoenanthus 82	Serpentina 115.
560.	Schoenoprasum 301	Serpyllum 591.
Rudbeckia 176. 177. 908	Schorigeram 980	Serpyllifolia 631.
Ruellia 17	Schovanna-adamboe 159	Sesamoides 207. 415.
Ruppia 968	Schunambu-valli 117	449. 559
Rus 675	Schunda-panna 1189	Sesamum 972.
Ruscum 1041	Schunga-Cuipi 753	Sesban 722.
Rura 444. 546. 621. 1081	Scirpo-Cyperus 50. 51	Seseli 238. 239. 240. 244.
Ruychiana 595	Scirpoides 49	246. 248. 250. 259.
	Scirpus 43. 54	260. 264
	Sclarea 35. 26	Sherardia 19. 359
	Scolopendria 1079	Sicyoides 1013.
	Scolopendriae facie 885	Sideritis 574. 578. 579. 581.
	Scolymocephalus 93	584. 588. 596
	827. 828	Silaum 246.
	Scoparia 90	Silene 332. 414. 415. 436.
	Scordio affinis 603	437
	Scordium 565. 567. 587	Siler 246. 249.
	Scorodonia 19. 564	Siliqua 34. 374. 1026.
	Scorodoprasum 298	Silybum 814.
	Scorodo-Thlaspi 646	Simaruba 1026.
	Scorpii spina 232	Sinapi 659. 668. 669.
	Scorpioides 744-746	Sinapis 640.
	Scorpius 711	Sinapistrum 672.
	Scorzonera 813	Sioanna-pola-tali 291.
	Seutellaria 588	Sifarum 251.
	Sebestena 190	Sifymbria 657.
	Secale 83	Sifymbrium 576. 655. 660.
	Securidaca-743. 752. 758.	667
	762	Sifyrinchium 36. 40. 306.
	Sedo-affinis 372	Sitz f. Sits-ding 266.
	Sedum 129. 142. 144.	Sio affinis 655.
	221. 236. 398-400	Sium 252. 253. 255. 262.
	402-405. 425. 429.	Smilax 155. 304. 723. 994.
	464. 465. 642.	1032
	Seguaster 1189	Soda 223.
	Selaginoides 1102	Solanifolia 9.
	Selago 1122. 1100. 1101.	Solano-congener 340.
	1102.	Solanoides 122.
		Solanum 3. 122. 177. 179.

## INDEX SYNONYMORUM.

181. 184. -184. 340.	T.	Tilia	225
367. 441. 635		Tilia affinis	426
Soldanella 159	Tahaxir 81	Tinda-pana	986
Solidago 870. 871. 924. --	Tagadi 1049	Tinus 267. 268	
926	Tagera 376	Tiri panna 1067	
Soncho - adfinis 811	Tagetes 835	Tirucalli 453	
Sonchus 790. 792. 796.	Tagolina 835	Tithymali myrsinitis 111.	
797. 798. 808	Tala-neli 156	112. 1035	
Sorbus 476. 478	Taludama 3	Tithymalus 213. 450-463	
Sparteum 707	Tainara 428. 511	1191	
Spartium 720. 762	Tamariscus 1994. 271. 928	Todda-pana f. monta-pan-	
Spathula 39	Tanacetum 887. 890. 899	na 1188	
Speculum veneris 168.	Tana-pouel-paatiamarara	Todda-vaddi 434	
169. 635	vara 1101	Tormentilla 123	
Spergula 88. 272. 281. 408.	Tandali-Cotti 715	Tora-pivi 1008	
444. 633	Tanghekelli 292	Toxicodendron 265. 266	
Sphaerocephalus 1185	Taraxaconoides 799	Trachelium 164. 166. 167.	
Sphagnum 1106. -- 1108.	Taraxacanaltrum 808. 809	168. 171	
1115	Taracacum 798	Tragacantha 762	
Sphondylium 249. 350	Tarchonanthos 989	Tragacanthæ affinis 762	
Sphondylococcus 111	Tartou-Raire 356	Tragium 784	
Spongiolus fucus 1170	Tatula 179	Tragopogon 791. 1198	
Spica celtica 32	Telephialtrum 446	Tragorchis 940	
trifolia 771	Telephioides 1014	Tragoriganum 593	
Spina 413	Telephium 423. 430. 1035	Tragofelinum 264	
alba 815. 827	Tenga 1188	Tragum 1040	
toментofa 827	Terebintus 509. 1025. 1026	Tremella 1163. 1164.	
Spiræa 198	Tettieuli species 939	Tretorrhiza 231	
Stachyoides 307	Testiculus 941. 946	Tribulus 120	
Stachys 573. - 575. 587	Terragonocarpus 480	Trichomanes 1074. 1080-	
Stachas 572. 573	Teucri facie 125	1082. 1088. 1089. 1094	
Stachadi affinis 840	Teucrum 561. 598. 600.	1095	
Stachelina 602	602	Trifolialtrum 766	
Staphisagria 531	Thaliatroides 504	Trifolii spica 225	
Staphylo dendron 270. 397	Thaliatrum 542. 557	Trifolio affinis 692	
Stellaria 969	Thapia 242	Trifolium 145. 386. 433.	
Stæbe 813. 818. 819. 912.	Thee 515	435. 538. 672. 719. 740.	
914-916. 919. 928. 994	Thelypteris 1072	749. 763. 764-776-781	
Stæchas 853. 854	Theveria 208	Trilopus. 124	
Stæchadi cirinjæ affinis 853	Thlaspi 642. 643. 645. 647.	Trinitatis herba 936	
Stramonionoides 179	653	Trionum 697	
Stratiotes 897. 963	Thlaspidium 649. 652	Triopteris 428	
Styrax 999	Thora 550	Triorchis 940. 946. 948	
Suber 995	Thrafi 45	Triosteospermum 176	
Subularia 1100	Thuris telium 510	Tripolum 151. 873	
Succisa 98	Thylacitis 228	Triticum 83. 605	
Suffrutex cricæformis 704	Thymbra 567. 704	Triumfetta 389	
Suillus 1177	Thymelea 96. 207. 356.	Trixago 603	
Sumach 265	358. 559. 560. 629	Trixis 88	
Syalita 535	Thymelæa facie 284	Tlerou-katou - navegam	
Sycomorus 1059	affinis 1038	389	
Symphoricarpus 175	Thymo simile 591	Tsiageri-nuren 1032	
Symphytum 135. 177	Thymum 567. 568	Tsiama-pullu 58. 69	
Syringa 111. 191. 470.	Thymus 567-569. 591	Tsiam-pangam 381	
623	Tiera-kuren-pullu 54	Tsiela 1060	

## INDEX SYNONYMORUM.

Tfielt	47	Urtica	579. 580. 979. 982.	Virga sanguinea	118
Tfiem-cumulu	632	1003		Viscago	416. 417. 419. 420
Tfieregammulla	6	Urucu	512	Viscum	110. 286. 287. 953
Tfiem-Tani	1193	Uinea	1154-1156	Vistru-clandi	157
Tfiera Maga Nari	1200	Utricaria	955	Vitalba	544
Tfiera-famstravadi	471	Uva urti	395. 478	Vitaliana	144
Tfierou-mau-maravara	952	Uvifera	365	Virex	266. 267
Tfierou-ponna	514			Viricella	100
Tfieru-kandel	443			Viris	202. 1012. 1028
Tfieru-kirganelli	982			idæa	175. 196. 349-
Tfieru-korfjelleri-pullu	87	Vaccaria	409		352. 395. 397. 478
Tfieru-valli-panna	1063	Valdia	637	Volubilis	162. 952. 1033
Tfieru veela	672	Valeriana	162. 840	Volli-panna	1013
Tfieru-uren	675	Valerianella	3. 34. 101.	Vulneraria	719
Tfietti-mandam	380		103. 232. 234. 629.	Vulvaria	220
Tfubakki	698	Valerianoides	629. 1058		
Tfufufu	150	Vallia-capo-molago	189		
Tuber	1183	Valli-onapu	937		
Tubera	1183	Valliferioides	1015		
Tuberaria	526	Vanillas	952		
Tuberum	1183	Vanille	952		
Tulipifera	535	Van Rheedia	1193		
Tuna	468. 469	Velutra-mandaru	375		
Tunica	408. 410-412	Veratrum	235		
Turpethum	155	Verbasco folio	112		
Turrita	666	Verbasculum	143		
Turritis	661. 664. 665	Verbasceum	585. 621		
Tufai	303	Verbena	601. 660		
Tuffilago	836. 881	Verbena affinis	342		
Tuzpatlis	121	Verbesina	901		
Typha	324	Vermicularis	432		
Tyffelinum	244	Vermiculara	406		
		Veronica	116. 615		
		Veronica similis	19		
		Vesicaria	651		
		Viburnum	268. 627		
		Vicia	729. 734. 738. 759		
		Vicia similis	730		
		Vidi-maram	190		
		Vincetoxicum	216		
		Viola	17. 167. 345. 653.		
			662. 663.		
		Virga aurea	140. 863. 871.		
			878. - 881		



NO:

NOMINA TRIVIALIA.

NOMINA TRIVIALIA.

**A.**

Abelmoschus  
Abies  
Abrotanum  
Abrus  
Absinthium  
Abus  
Acarna  
Acanthium  
Acerabulum  
Acerola  
Acerofella  
Acinodendrum  
Acinos  
Aemella  
Adhatoda  
Adiant. nigrum  
Egilops  
Ethiopsis  
Ageratum  
Agnus Castus  
Ahouai  
Aizoon  
Atamafca  
Alaternus  
Alcea  
Alhagi  
Alkekengi  
Alopecuros  
Alfinastrum  
Alypum  
Alyssu  
Amalago  
Amarella  
Amelachier  
Amellus  
Amini  
Anmoides  
Anmonum  
Ampeloprasum  
Anacamperos  
Anagallis  
Ananas  
Anandria  
Anblatum  
Androsamum  
Anguria  
Angyina  
Anium  
Anserina  
Anthephorbium

696 Anthora  
1002 Antrifcus  
845 Aparine  
753 Aphaca  
848 Apios  
376 Aquifolium  
820 Arbor tristis  
827 Archangelica  
1181 Aretostaphylos  
317 Arcturus  
338. 433 Areira  
389 Argemone  
591 Aria  
901 Arisarum  
15 Armeria  
1081 Armoracia  
996 Aruncus  
25 Aclepium  
897 Asfa ferida  
638 Ascyron  
208 Alterifcus  
430 Auricula  
292 Auricularia  
193 Auriscalpium  
689 Auranthium  
745 Avellana  
183 Azarohus  
573 Azedarac  
368 Azediracla

**B.**

Baducca  
Balanghas  
Balsamina  
Balsamita  
Balsamum  
Bambos  
Basilicum  
Barba Jovis  
Barbarea  
Baromerz  
Bataras  
Beccabunga  
Behen  
Bella donna  
Bellidialtrum  
Benzoin  
Bermudiana  
Beple

532 Beronica  
240. 257 Bidens  
108. 1051 Bihai  
729 Bilimbi  
457. 753 Bistorta  
125 Blattaria  
6 Blitum  
250 Bonarota  
351 Bonduc  
178 Bonus henricus  
389 Botrys  
506 Bovista  
475 Brignola  
966 Britannica  
274. 410. 420 Bryopteris  
648 Bulbocastanum  
490 Bulbocodium  
261 Bursa pastoris  
248  
789  
920

**C.**

Cacao  
Cajan  
Cainito  
Cakile  
Calaba  
Calabura  
Calamintha  
Calamus  
Calamagrostis  
Calceolus  
Calendula  
Calitrapa  
Calomelanos  
Canara  
Campechianum  
Camphora  
Candel  
Candelabrum  
Caprifolium  
Capillus Veneris  
Caput Galli  
Medusa  
Caracalla  
Caragana  
Carambola  
Cardamomum  
Cardiaca

## NOMINA TRIVIALIA

Cardinalis	930	Citrullus	1010	Diclamnus	839
Cardunculus	827-831	Clava Herculis	270	Diervilla	175
Carica	1059	Clymenum 732.	730	Dodonæa	125
Cariophyllus	410	Cneorum	157-357	Donax	81
Carota	242	Cobbe	267	Doronicum	380
Carpobolus	1184	Cocculus	340	Dortmanna	929
Carvi	263	Cœli rosa	436	Dorychnium	776
Cascarilla	1042	Colocasía	965	Draba	646
Cassia	369	Colocynthis	1011	Dracontium	964
Cassina	125	Coma aurea	840	Dracunculus	350-964
Castanea	997	Conocarpodendrum	93	Dryopteris	1093
Catalpa	622	Consolida	530	Dudaim	1011
Catechu	1189	Contrajerva	121	Dulcamara	185
Cedrus	1001	Copallium	266		
Ceiba	511	Convolvulus	364		
Cembra	1000	Coralloriza	945		
Centaureum	229-910	Coris	787		
Cepa	301	Coronaria	436		
Cepea	431	Coronopus	115-648	Ebulus	269
Cephalotes	582	Cora	894	Echinus	276
Cerasus	474	Corinus	267	Ecbolium	15
Ceratonía	523	Coroneaster	479	Elaterium	1010
Ceretolium	257	Cotula	894	Elatine	612
Cerris	997	Caurbaril	1192	Elengi	349
Cervaria	167-1194	Coryledon	398	Elephas	603
Cerviana	272	Cracca	735	Eluteria	1042
Ceterach	1080	Crista	380	Emerus	742
Chama-Buxus	704	Galli	603	Embolus	1185
Cistus	392	Crocodylium	919	Endivia	813
Crista	379	Cruciata	1052	Entada	518
Cyparissias	842	Crupina	909	Ephemerum	146
drys	13-565	Crus Galli	56-476	Epidendrum	1184
Jasme	559	Crux andree	787	Epiglottis	759
Ilea	981	Cucullaria	699	Epiphyllanthus	981
Mespilus	479-981	Cujere	626	Epipogium	945
Moly	301	Cunonia	37	Eragrostis	68-70
Morus	494	Curcas	1006	Erinacea	720
pitys	562	Cururu	365	Erinus	169-958
peuce	819	Cyanus	911	Eruca	667
Syce	455	Cydonia	480	Erucago	670
Cherophyllos	555	Cymbalaria	405-613	Erucastrum	667
Chamomilla	891	Cyminum	254	Ervilia	730
Champaca	536	Cynapium	256	Erygipe	1186
Characias	463	Cynops	116	Esculus	996
Charantia	1009	Cynocrambe	993	Esula	461
Cheiranthus	933	Cynosbatus	202	Eupatoria	448
Cheiri	661				
Chelidonia	655				
Chia	894				
China	1029				
Chironium	249				
Chryfogonura	312				
Cicer	757				
Cieera	730				
Cinamomum	369				

NOMINA TRIVIALIA.

Fagopyrum	36	Holofœchenus	49	Laburnum	739
Farfara	865	Horminum	24	Lacryma Jobi	962
Ferulago	247	Hydropiper	361.	Laſtica	1163
Ficaria	550	Hydypnois	809	Ladanum	579
Ficoidea	225	Hypociftis	443	Lagopus	114
Ficus indica	468	Hypogloſſum	1041	Lantana	268
Filipendula	490	Hypophyllocarpod.	93	Lappa	816
Filum	1162	Hypophyllum	1041	Lappula	444. 111
Flammula	544. 548	Hypopirchys	387	Lathanthus	785
Flos acris	952	Hippocaſtanum	344	Larik	1001
aquæ	1168	Hyllopitolia	447. 647	Lathyrus	457
cuculi	436	Hylterophorus	988	Laurentia	931
Jovis	436	Hystrix	560	Laureola	857
Fœnum græcum	777	Hypoxylon	1182	Laurocérâfus	474
Frangula	193			Lavenia	902
Fumaria	525			Lebbeek	516
fœniculu. 263.		I.		Lentago	268
G.				Lentilcus	1026
Galanga		Jabotapita	513	Leontopodium	855
Galbanum	2	Jacea	914	Leonthopetalon	312
Gale	253	Jacobæa	870	Leonurus	587
Galeobdolon	1024	Jalappa	177	Lepidocarpodendron	94
Gerbera	586	Jambos	470	Leptostachya	601
Geum	885	Jberis	645	Leucanthemum	888
Gingidium	401	Icaco	513	Leucoxylon	624
Githago	242	Ilex	995	Levifanus	199
Glaucium	435	Illecebrum	1129	Levillicum	250
Glaux	508	Inga	516	Libanotis	244. 246
Gnidium	759	Inſia	522	Liljago	310
Grana parad.	2	Intybus	813	Liljaltrum	324
Granatum	472	Jolithus	1169	Liljo Alphodelus	324
Grossularia	201	Jonquilla	290	Hyacinthus	308
Gvajava	470	Jonthlafpi	652	Lima	72
Guazuma	782	Ipecacuannha	455	Limon	782
Guidonia	443	Iria	45	Limonia	389
		Irio	659	Linonium	274
		Iiora	963	Linaria	616
		Jujuba	194	Lingua	545. 950
		Jungermannia	1114	Linophyllum	207
				Linolyris	841
H.		K.		Linum itellatum	148
Halimus	1052			Linza	1163
Halicacabum	366			Locusta	33
Harmala	444	Kali	222	Lonchitis	1088
Heisteria	704	Karatas	285	Lophanthus	569
Helenium	881	Kaurki	349	Loeas	157. 194. 511
Helleborine	949	Kleinia	834	Luffa	1009
Helianthemum	528			Lunaria	336. 656. 1064
Helix	202. 1017			Luteola	448
Heparica	538			Lycopersicum	185
Herba venti	586			Lupinaſter	766
Hemionitis	1078			Lupulus	1028
Hirculus	402				
		L.			
		Lablab	783		
		Labruſca	203		

Ma-

# NOMINA TRIVIALIA.

**M.**

<i>mariscus</i>	42
Mangostana	443
Mahaleb	474
Majorana	590
Malacodendron	699
Malanirris	29
Malus	479
Mancinella	1196
Manghao	208
Mangle	443
Manihot	696. 1007
Marmelos	444
Marragon	303
Marrubialstrum	584
Marum	564
Maurocena	269
Max	725
Meadia	146
Medium	156. 167
Meleagris	304
Melo	1011
Melocactus	466
Melongena	189
Melopepo	1010
Mercurialis	980
Metel	179
Meum	247
Mozereum	356
Mitreola	150
Mitra	1180
Mulle	388
Moly	301
Mombin	371
Monorchis	947
Morgana	385
Moringa	381
Morio	940
Morius rana	4036
Moscharellina	367
Moscheutos	693
Mucedo	1185
Mungos	110
Murucuja	957
Muscari 317	317
Muscipula	423
Murellina	255
Myrobalanus	475
Myrsinites	461
Myrrillus	349
Myrtax	675
Myxa	190

**N.**

Napeca	194
Napellus	532
Napus	666
Nardus	1046
Nasturtium	657
Natrix	717
Negundo	638. 1056
Nelumbo	511.
Nepeta	593
Nidus	1079
Nigellastrum	945
Ninfi	425
Niruri	251
Nissolia	981
Noctoc	729
Nux vomica	1157
Nyctelca	189
Numularia	160

**O.**

Ochrus	727
Oculus Christi	881
Odonites	604
Oenopolia	194
Oleander	209
Oleastrum	262
Onites	590
Onobrychis	751. 760
Onopreris	1081
Opopanax	262
Opulus	268
Opuntia	468
Orellana	512
Oreoselinum	244
Oronchium	617
Ornus	1057
Ostruthium	259
Ostrya	998
Orites	415. 1089
Oxyacantha	477
Oxycedrus	1038
Oxycoccus	351

**P.**

Padus	477
Paliurus	194

Panaces	249
Papaya	1036
Papyrus	47
Paralias	458
Paronychia	206
Pareira	1051
Parthenium	890
Passerina	559
Patientia	333
Pavia	844
Peclen	256
Pelecinius	762
Penza	703
Pentacarpos	697
Pentagonia	169
Pentstemon	612
Pepius	456
Pepo	1010
Peragua	268
Pereikia	469
Periclymenum	173
Perfica	472
Perficaria	561
Pes caprae	159. 434
Pigidis	162
Perasites	866
Petroselinum	264
Phelypæa	606
Phlegopteris	1089
Phellos	994
Phlegmaria	1101
Phu	32
Phylanthus	469
Phyteuma	447. 930
Pilosella	800
Pimenta	472
Pinea	1000
Pingvin	285
Piscipula	707
Pityusa	458
Plantago	342
Pneumonanthe	228
Pnionitis	636
Polium	566
Polygonatum	315
Pomponium	302
Porophyllum	835
Portum	295
Portula	332
Portulacastrum	223
Posopofa	1036
Prunastri	1147
Pseudo-Acacia	723
Acmella	901
Acorus	38

*Podagraria*. 205.



# NOMINA TRIVIALIA.

Pseudo-Capsicum	184	Saxifraga	263. 421	T.	
chamaepitys	562	Scabiosa	913	Tabacum	180
china 867.	1031	Scamonia	153	Tæda	1000
Cyperus	978	Sceptrum Carolin.	608	Tagera	377
Cytisus	641	Sclarea	27	Tapia	444
Dictamnus	583	Schcenoprasum	31	Tarton raira	356
Narcissus	289	Scolymacephalus	92	Taraxacum	798
Plantanus	1054	Scolopendrium	1079	Tazetta	290
Phyllum	115	Scolymus	827	Telephium	430
Prarimica	898	Scoparia	221	Tendo	1162
Pterocephalus	100	Scordium	565. 620	Terebinthus	1025
Pulsarella	539	Scoropoprasum	297	Ternatea	757
Pulegium	577	Scorpius	708	Tetralix	353
Pistilochia	962	Securidaca	742	Tetralix	579
Pyracantha	478	Senago	1102	Thapsus /h/	177
Pyracanthus	197	Senega	704	Thelyperis	1071
Pyralter	479	Senegal	521	Thevetia	209
Pyrethrum	895	Senna	377	Thora	550
		Seriana	365	Thymbra	567
		Serpyllum	590	Thymelæa	356
		Serraria	93	Tigilium	1004
Quamoclit	159	Sesban	714	Tinus	267
		Siler	249	Tirucalli	452
		Siliqua	1026	Toxocodendr.	266
		Siliqualtrum	374	Trachelium	166
Radiola	281	Simaruba	1026	Tragacantha	762
Rapa	666	Siriboa	29	Trapa	929
Rapunculus	164	Sisaurum	251	Trichomanes	1080
Raphanistrum	668	Silyrinchium	40	Tripolium	481
Rhabarbarum	372	Smilax	994	Triptaris	32
Rhagadiolus	812	Soda	223	Trixago	602
Rhaponticum	571	Soja	727	Tuber	1183
Rhœas	507	Soldanella	159	Tuberaria	526
Ribes	372	Sophera	379	Turca	468
Ritro	815	Sophia	659	Turpethum	155
Robur	996	Sorghum	1047	Turritia	665
Roccella	1154	Speculum	168		
Rosa sinensis	694	Spelta	86	V.	
Rorang	325	Sphondylium	249	Ulmaria	490
Royoc	176	Spica	572	Unedo	395
Rutabulum	1124	Spicant	1066	Unguis cati	623
Ruta muraria	1081	Spina Christi	195	Uva-crispa	201
Ruyfchiana	597	Squamaria	606	Uva-ursi	395
		Stæchas	573. 853	Uvaria	523
Sabdariffa	695	Staphisagria	531	Uvedalia	923
Sabina	1039	Stæbe	914	Uvifera	365
Salicaria	416	Stramonium	179		
Sambac	6	Stratioros	963	V.	
Santolina	896	Strobilus	1001	Vanilla	952
Santonium	845	Strutiopteris	1066	Vernix	265
Sappau	381	Suber	995	Vesicaria	651
Saponaria	366	Succisa	98	Victorialis	295
Sarcocolla	111	Sycomorus	1059	Vincetoxicum	216
Sassafras	371	Symphoricarpos	175	Vinteranus	371
Sassaaparilla	1029			Viorna	543
				Vir-	

# NOMINA TRIVIALIA.

Virgaurea]	880	X.	Zapota	1190
Vishaga	242		Zacintha	811
Vitalba	544	Xiphium	40	
Vitaliana	143	Xylottium	174	
Viticella	548	r.	Zenociton	85
Vitis idæa	351	Yervamora	225	
Volema	479	Z.	Zerumber	1
Vulneraria	719		Zingiber	1
Vulvaria	220	Zanonia	41	
			Ziziphus	194
			Zygis	591



## ADDENDA.


- P. 17. *Gratiola virginiana* (adde) *Tsiera Manga Nari. Rheed. mal. 9. p. 165. t. 85.*
25. *Salvia pratensis.* - *Habitat in Europæ pratis. 2*
353. *Erica arborea.* - *Habitat in Europa australi. 3*
494. *Rubus Chamæmorus* - *Hæc species omnino Dioica est.*
665. *Arabis canadensis* - *Habitat in America septentrionali.*
696. *Hibiscus surattensis* - *Herba crinium. Rumpf. amb. 4. p. 40. t. 16.*
721. *Lupinus angustifolius* - *Habitat in Hispania ☉*
781. *Medicago polymorpha* - *Habitat in Europa australi ☉*
825. *Carduus tataricus* - *Folia radicalia in hac specie pinnatifida sunt, non vero in precedenti.*
479. *Pyrus communis* (rectius) *PYRUS foliis serratis, floribus corymbosis.*
- Pyrus malus* - *PYRUS foliis serratis, umbellulis sessilibus.*
858. *Xeranthem: speciosissimum. Habitat in Æthiopia. 3*
348. §. 4. *EPILOBIUM: major. Bauh. pin. 303.*
927. *MICROPUS (supinus) procumbens, foliis geminis.*
- 2 *MICROPUS erectus, foliis solitariis. tractus.*
- Habitat in Hispania. ☉*
1199. 3. *Filago (pyramidata) conjugatur Gnaphalio germanico p. 857.*
4. *FILAGO floribus conicis terminalibus axillari- montana.*  
*busque, caule subdichotomo erecto. est Gnaphalium gallicum p. 857. n. 33. l. monlaet.*
5. *FILAGO floribus conicis lateralibus, caule arvensis.*  
*paniculato. est Gnaphalium arvense. p. 856. n. 32.*
6. *FILAGO floribus subulatis axillaribus, caule di- gallicum.*  
*chotomo erecto. est Gnaphalium gallicum p. 857.*
- n. 34.



# ERRATA.

P. 6. n. 3. <i>Virginia lege virginica.</i>	P. 169. n. 34 adde <i>heterophylla.</i>
30. n. 14. <i>petatum - peltatum.</i>	296. n. 6. - <i>magicum.</i>
59. n. 9. <i>filiforme - filiforme.</i>	538. n. 1. - <i>Hepatica.</i>
108. n. 19. <i>aparine - Aparine.</i>	652. n. 3. - <i>campestris.</i>
246. n. 2. <i>vaicum - pyrenaicum.</i>	869. n. 15. - <i>crucifolia.</i>
312. n. 2. <i>Laontopetalum Leontopetalum.</i>	99. Scabiosa 9. corollis trifidis <i>error</i> <i>typographi secundum</i> <i>Cl. Authorem.</i>
345. n. 1. <i>maius - minus.</i>	300. Allium. 23. <i>Synonymon ex Hort.</i> <i>cliff. excludatur.</i>
373. n. 1. <i>alo pedes - alopecuroides.</i>	420. Silene 23. <i>LYCHNIS deletur.</i>
408. n. 13. <i>hybrina - hybrida.</i>	570. Nepeta 5. <i>linea tertia deletur.</i>
447. n. 6. <i>thymifolia. thymifolia.</i>	844. Tanacetum 2-3. * <i>fruticosa de-</i> <i>letur.</i>
514. n. 1. <i>aniculata - paniculata.</i>	Tanacetum 3-4. * <i>Herbacea ad-</i> <i>datur.</i>
2. <i>ateriflora - lateriflora.</i>	
540. n. * <i>Anemenoide - Anemonoidea.</i>	
557. n. 1. <i>amaroides - Fumarioides.</i>	
596. n. 11. <i>triflora - triflorum.</i>	
608. n. 7. <i>vecucisa - vecutita.</i>	
708. n. 2. <i>radiafum - radiatum.</i>	
798. n. 7. <i>altissima - repens.</i>	
896. n. 16. <i>triumfeti - triumpheti.</i>	
1006. n. 3. <i>Gurcas - Curcas.</i>	
P. 61. MILIUM 1. <i>foliis dispermis</i>	<i>lege</i>
83. LOLIUM 1. ☉ - - -	<i>floribus dispermis.</i>
2. ♀ - - -	26.
93. LEUCADENDROS 12. 13. - - -	☉.
193. RHAMNUS 1. <i>spicis</i> - - -	LEUCADENDRON.
221. CHENOPODIUM 18. <i>Chenopodium.</i> -	<i>spinis.</i>
268. VIBURNUM 4. <i>ovatis</i> - - -	<i>Salsola.</i>
436. AGROSTEMMA 3 <i>laciniatis</i> - - -	<i>plicatis.</i>
LYCHNIS 4. <i>bifidis corymbosis</i> - - -	<i>lanceolatis.</i>
479. PYRUS 1. <i>foliis basi</i> - - -	<i>bifidis, floribus corymbosis.</i>
524. CISTUS 5. <i>trinerviis</i> - - -	<i>pomis basi.</i>
527. CISTUS 19. <i>solitariis subtestilibus bractea tri-</i>	<i>trinerviis.</i>
<i>plici</i> - - -	<i>erectis, pedicellis horizonta-</i> <i>libus.</i>
598. SCUTELLARIA 3. <i>floribus lævibus</i> -	<i>foliis lævibus.</i>
777. TRIGONELLA 3. <i>pedunculatis</i> -	<i>sessilibus.</i>
824. CARDUUS 18. <i>sessilibus</i> - - -	<i>petiolatis.</i>
843. TANACETUM 1. * <i>Herbacea</i> -	* <i>Fruticosa.</i>
916. CENTAUREA 37. <i>sinuatis</i> -	<i>lyratis.</i>
1077. BLECHNUM 2. <i>alteanis</i> - - -	<i>alternis.</i>
859. §. 7. <i>HERANTHEMUM</i> - - -	XERANTHEMUM
828. §. 3. <i>CARLINA vulgaris</i> - - -	<i>corymbosa</i>
§. 4. <i>corymbosa</i> - - -	<i>vulgaris</i>
1199. §. 3. <i>absque paleis in</i> - - -	<i>absque paleis. In</i>
1135. §. 19. <i>gulaea</i> - - -	<i>gulaea</i>
1011. §. 5. <i>foliorum angulis</i> - - -	<i>foliis dentatis integra</i>
63. §. 1. <i>spicatum</i> - - -	<i>indicum</i>
598. §. 1. <i>America</i> - - -	<i>Armenia</i>
1192. Plukenetia fr. <i>serrato</i> - - -	<i>fructu tetragono</i>
420. §. 21. <i>SILENE portensis excludatur, cultura enim constitit eandem esse cum</i> <i>SILENE 19 in aperta, quæ in hortis corollam non protrudit.</i>	
418. §. 10. <i>SILENE gigantea - CUCUBALUS giganteus ad genus itaque an-</i> <i>tecedens amandetur.</i>	

Paginas & Paragraphos allegatas cum libris conferre otia non admiseri, quas L. B. emendet, usque dum altera prodeas edisio.







Planta 5870.

Syst. 6697.

Sp. ed. 1762 chne  
2765.

cryptogam. 7072

cryptogam. 241  

---

7315

